

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL01_8)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATION D'ALCOOL | | Total |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| | Au moins une fois par an | Jamais ou presque jamais | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 90.4 | 9.6 | 3960 |
| Femme | 79.5 | 20.5 | 4196 |
| Total | 84.9 | 15.1 | 8156 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 83.0 | 17.0 | 1085 |
| 25-34 | 86.9 | 13.1 | 1568 |
| 35-44 | 90.1 | 9.9 | 1558 |
| 45-54 | 89.6 | 10.4 | 1248 |
| 55-64 | 81.2 | 18.8 | 1060 |
| 65-74 | 74.3 | 25.7 | 1023 |
| 75 + | 69.6 | 30.4 | 614 |
| Total | 84.9 | 15.1 | 8156 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 59.3 | 40.7 | 259 |
| Primaire | 69.0 | 31.0 | 1143 |
| Secondaire inférieur | 81.1 | 18.9 | 1387 |
| Secondaire supérieur | 85.8 | 14.2 | 2331 |
| Supérieur | 93.2 | 6.8 | 2707 |
| Total | 84.8 | 15.2 | 7827 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 67.4 | 32.6 | 568 |
| 20.000-30.000 | 75.7 | 24.3 | 1601 |
| 30.000-40.000 | 84.5 | 15.5 | 1916 |
| 40.000-60.000 | 89.7 | 10.3 | 2616 |
| >60.000 | 93.6 | 6.4 | 1090 |
| Total | 84.9 | 15.1 | 7791 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 88.2 | 11.8 | 5857 |
| Très mauvaise à moyenne | 75.0 | 25.0 | 1994 |
| Total | 85.4 | 14.6 | 7851 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 80.7 | 19.3 | 3684 |
| Dans le passé | 89.4 | 10.6 | 1917 |
| Modéré (< 20) | 88.4 | 11.6 | 1563 |
| Gros fumeur | 87.6 | 12.4 | 830 |
| Total | 85.0 | 15.0 | 7994 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 86.3 | 13.7 | 2913 |
| Région Bruxelloise | 76.3 | 23.7 | 2350 |
| Région Wallonne | 85.1 | 14.9 | 2893 |
| Belgique | 84.9 | 15.1 | 8156 |
| Personnes âgées de 15 ans et plus | | | |

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL01_8)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATION D'ALCOOL | | Total |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| | Au moins une fois par an % | Jamais ou presque jamais % | N |
| SEXE | | | |
| Homme | 92.3 | 7.7 | 1447 |
| Femme | 80.1 | 19.9 | 1466 |
| Total | 86.3 | 13.7 | 2913 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 87.0 | 13.0 | 414 |
| 25-34 | 88.5 | 11.5 | 579 |
| 35-44 | 92.4 | 7.6 | 528 |
| 45-54 | 90.8 | 9.2 | 459 |
| 55-64 | 81.6 | 18.4 | 400 |
| 65-74 | 71.6 | 28.4 | 352 |
| 75 + | 61.1 | 38.9 | 181 |
| Total | 86.3 | 13.7 | 2913 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 71.1 | 28.9 | 54 |
| Primaire | 71.3 | 28.7 | 393 |
| Secondaire inférieur | 82.9 | 17.1 | 530 |
| Secondaire supérieur | 85.1 | 14.9 | 965 |
| Supérieur | 94.8 | 5.2 | 862 |
| Total | 86.0 | 14.0 | 2804 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 71.5 | 28.5 | 96 |
| 20.000-30.000 | 78.7 | 21.3 | 521 |
| 30.000-40.000 | 84.0 | 16.0 | 716 |
| 40.000-60.000 | 88.9 | 11.1 | 1025 |
| >60.000 | 94.8 | 5.2 | 391 |
| Total | 86.2 | 13.8 | 2749 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 89.5 | 10.5 | 2274 |
| Très mauvaise à moyenne | 73.4 | 26.6 | 567 |
| Total | 86.5 | 13.5 | 2841 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 83.0 | 17.0 | 1373 |
| Dans le passé | 90.0 | 10.0 | 701 |
| Modéré (< 20) | 89.9 | 10.1 | 560 |
| Gros fumeur | 88.0 | 12.0 | 241 |
| Total | 86.5 | 13.5 | 2875 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL01_8)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATION D'ALCOOL | | Total |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| | Au moins une fois par an % | Jamais ou presque jamais % | N |
| SEXE | | | |
| Homme | 79.1 | 20.9 | 1133 |
| Femme | 73.7 | 26.3 | 1217 |
| Total | 76.3 | 23.7 | 2350 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 65.8 | 34.2 | 280 |
| 25-34 | 74.7 | 25.3 | 455 |
| 35-44 | 81.9 | 18.1 | 455 |
| 45-54 | 85.1 | 14.9 | 361 |
| 55-64 | 77.2 | 22.8 | 294 |
| 65-74 | 70.7 | 29.3 | 298 |
| 75 + | 75.6 | 24.4 | 207 |
| Total | 76.3 | 23.7 | 2350 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 29.1 | 70.9 | 107 |
| Primaire | 51.7 | 48.3 | 297 |
| Secondaire inférieur | 68.7 | 31.3 | 332 |
| Secondaire supérieur | 83.4 | 16.6 | 540 |
| Supérieur | 90.0 | 10.0 | 954 |
| Total | 76.8 | 23.2 | 2230 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 46.3 | 53.7 | 245 |
| 20.000-30.000 | 59.4 | 40.6 | 452 |
| 30.000-40.000 | 77.2 | 22.8 | 487 |
| 40.000-60.000 | 91.6 | 8.4 | 641 |
| >60.000 | 94.8 | 5.2 | 418 |
| Total | 76.6 | 23.4 | 2243 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 81.6 | 18.4 | 1643 |
| Très mauvaise à moyenne | 65.4 | 34.6 | 604 |
| Total | 77.5 | 22.5 | 2247 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 66.5 | 33.5 | 990 |
| Dans le passé | 84.1 | 15.9 | 558 |
| Modéré (< 20) | 82.7 | 17.3 | 456 |
| Gros fumeur | 84.5 | 15.5 | 276 |
| Total | 76.0 | 24.0 | 2280 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL01_8)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATION D'ALCOOL | | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| | Au moins une fois par an | Jamais ou presque jamais | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 90.1 | 9.9 | 1380 |
| Femme | 80.3 | 19.7 | 1513 |
| Total | 85.1 | 14.9 | 2893 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 81.1 | 18.9 | 391 |
| 25-34 | 88.0 | 12.0 | 534 |
| 35-44 | 88.4 | 11.6 | 575 |
| 45-54 | 88.5 | 11.5 | 428 |
| 55-64 | 81.5 | 18.5 | 366 |
| 65-74 | 79.6 | 20.4 | 373 |
| 75 + | 79.1 | 20.9 | 226 |
| Total | 85.1 | 14.9 | 2893 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 65.2 | 34.8 | 98 |
| Primaire | 70.5 | 29.5 | 453 |
| Secondaire inférieur | 80.7 | 19.3 | 525 |
| Secondaire supérieur | 88.0 | 12.0 | 826 |
| Supérieur | 91.8 | 8.2 | 891 |
| Total | 85.0 | 15.0 | 2793 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 74.2 | 25.8 | 227 |
| 20.000-30.000 | 76.2 | 23.8 | 628 |
| 30.000-40.000 | 87.0 | 13.0 | 713 |
| 40.000-60.000 | 90.9 | 9.1 | 950 |
| >60.000 | 89.4 | 10.6 | 281 |
| Total | 85.2 | 14.8 | 2799 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 87.8 | 12.2 | 1940 |
| Très mauvaise à moyenne | 79.7 | 20.3 | 823 |
| Total | 85.6 | 14.4 | 2763 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 80.5 | 19.5 | 1321 |
| Dans le passé | 89.8 | 10.2 | 658 |
| Modéré (< 20) | 87.7 | 12.3 | 547 |
| Gros fumeur | 88.0 | 12.0 | 313 |
| Total | 84.9 | 15.1 | 2839 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : EXCES DE CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | 6 VERRES D'ALCOOL OU PLUS LE MEME JOUR * (en %) | | | | | | Total N |
|--|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| SEXE | | | | | | | |
| Homme | 9.7 | 43.0 | 18.1 | 13.7 | 10.9 | 4.5 | 3934 |
| Femme | 20.6 | 64.0 | 9.1 | 3.4 | 1.8 | 1.0 | 4167 |
| Total | 15.1 | 53.5 | 13.6 | 8.6 | 6.4 | 2.7 | 8101 |
| GROUPES AGE | | | | | | | |
| 15-24 | 17.0 | 46.3 | 18.2 | 9.1 | 7.9 | 1.5 | 1083 |
| 25-34 | 13.1 | 51.1 | 16.2 | 11.1 | 6.1 | 2.4 | 1565 |
| 35-44 | 9.9 | 50.7 | 17.4 | 10.0 | 7.8 | 4.1 | 1546 |
| 45-54 | 10.5 | 55.0 | 12.5 | 10.1 | 8.0 | 4.0 | 1238 |
| 55-64 | 18.9 | 59.9 | 8.9 | 5.7 | 4.7 | 1.9 | 1053 |
| 65-74 | 26.2 | 64.2 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 1011 |
| 75 + | 30.9 | 61.8 | 2.8 | .9 | 2.2 | 1.4 | 605 |
| Total | 15.1 | 53.5 | 13.6 | 8.6 | 6.4 | 2.7 | 8101 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 42.6 | 47.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 257 |
| Primaire | 31.2 | 50.0 | 5.7 | 4.1 | 6.3 | 2.6 | 1129 |
| Secondaire inférieur | 19.0 | 51.1 | 10.0 | 9.3 | 7.6 | 3.1 | 1379 |
| Secondaire supérieur | 14.2 | 54.4 | 13.1 | 8.5 | 6.7 | 3.1 | 2312 |
| Supérieur | 6.8 | 55.3 | 19.4 | 10.5 | 5.6 | 2.5 | 2697 |
| Total | 15.3 | 53.4 | 13.6 | 8.6 | 6.3 | 2.8 | 7774 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | |
| < 20.000 | 32.4 | 43.4 | 8.6 | 5.8 | 4.1 | 5.7 | 563 |
| 20.000-30.000 | 24.5 | 50.2 | 11.1 | 4.9 | 6.4 | 2.8 | 1588 |
| 30.000-40.000 | 15.7 | 55.9 | 10.5 | 7.2 | 8.1 | 2.6 | 1897 |
| 40.000-60.000 | 10.3 | 55.7 | 15.2 | 10.3 | 6.1 | 2.5 | 2607 |
| >60.000 | 6.4 | 52.6 | 20.4 | 13.1 | 4.7 | 2.8 | 1083 |
| Total | 15.1 | 53.5 | 13.6 | 8.6 | 6.3 | 2.8 | 7738 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 11.8 | 54.2 | 15.1 | 9.8 | 6.7 | 2.4 | 5825 |
| Très mauvaise à moyenne | 25.3 | 51.9 | 9.1 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 1974 |
| Total | 14.7 | 53.7 | 13.8 | 8.8 | 6.3 | 2.7 | 7799 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | |
| Jamais | 19.4 | 59.8 | 10.9 | 6.0 | 2.8 | 1.1 | 3663 |
| Dans le passé | 10.7 | 55.3 | 16.9 | 9.0 | 6.0 | 2.1 | 1906 |
| Modéré (< 20) | 11.6 | 44.1 | 17.1 | 11.7 | 11.0 | 4.5 | 1555 |
| Gros fumeur | 12.4 | 38.8 | 12.7 | 13.8 | 14.1 | 8.2 | 822 |
| Total | 15.1 | 53.4 | 13.7 | 8.7 | 6.4 | 2.8 | 7946 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | | |
| Région Flamande | 13.8 | 54.1 | 13.7 | 9.7 | 6.9 | 1.8 | 2902 |
| Région Bruxelloise | 23.8 | 50.7 | 10.5 | 6.4 | 3.9 | 4.6 | 2326 |
| Région Wallonne | 15.0 | 53.4 | 14.4 | 7.3 | 6.1 | 3.8 | 2873 |
| Belgique | 15.1 | 53.5 | 13.6 | 8.6 | 6.4 | 2.7 | 8101 |
| Personnes âgées de 15 ans et plus | | | | | | | |
| 1 = Ne boit jamais | 2 = Ne boit jamais 6 verres ou plus | | | | | | |
| 3 = < 1x par mois | 4 = 1-3x par mois | | | | | | |
| 5 = 1-2x par semaine | 6 = 3x ou + par semaine | | | | | | |

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : EXCES DE CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | 6 VERRES D'ALCOOL OU PLUS LE MEME JOUR * | | | | | | Total |
|--|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N |
| | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | |
| Homme | 7.7 | 42.7 | 18.6 | 15.8 | 12.0 | 3.1 | 1442 |
| Femme | 19.9 | 65.8 | 8.8 | 3.4 | 1.6 | .5 | 1460 |
| Total | 13.8 | 54.1 | 13.7 | 9.7 | 6.9 | 1.8 | 2902 |
| GROUPES AGE | | | | | | | |
| 15-24 | 13.0 | 48.1 | 18.8 | 9.3 | 9.3 | 1.5 | 414 |
| 25-34 | 11.5 | 51.2 | 16.0 | 13.2 | 6.2 | 1.9 | 578 |
| 35-44 | 7.6 | 52.0 | 18.4 | 10.8 | 8.9 | 2.2 | 524 |
| 45-54 | 9.3 | 55.1 | 12.4 | 12.1 | 8.4 | 2.7 | 456 |
| 55-64 | 18.4 | 63.2 | 7.7 | 5.8 | 4.4 | .4 | 398 |
| 65-74 | 28.5 | 61.9 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 351 |
| 75 + | 38.9 | 55.7 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | .0 | 181 |
| Total | 13.8 | 54.1 | 13.7 | 9.7 | 6.9 | 1.8 | 2902 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 28.9 | 66.2 | 2.8 | 2.1 | .0 | .0 | 54 |
| Primaire | 28.7 | 52.6 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 2.0 | 393 |
| Secondaire inférieur | 17.2 | 51.8 | 10.4 | 10.3 | 8.7 | 1.7 | 526 |
| Secondaire supérieur | 14.9 | 53.7 | 13.2 | 9.3 | 6.5 | 2.3 | 961 |
| Supérieur | 5.2 | 55.1 | 19.8 | 12.2 | 6.1 | 1.6 | 860 |
| Total | 14.0 | 53.9 | 13.6 | 9.8 | 6.7 | 1.9 | 2794 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | |
| < 20.000 | 28.7 | 47.2 | 14.9 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 95 |
| 20.000-30.000 | 21.5 | 53.5 | 10.4 | 5.1 | 7.8 | 1.8 | 518 |
| 30.000-40.000 | 16.1 | 54.0 | 10.3 | 8.8 | 8.8 | 2.1 | 713 |
| 40.000-60.000 | 11.1 | 55.9 | 14.5 | 10.7 | 6.3 | 1.6 | 1023 |
| >60.000 | 5.2 | 52.3 | 19.9 | 15.6 | 4.6 | 2.4 | 389 |
| Total | 13.8 | 54.1 | 13.6 | 9.8 | 6.7 | 1.9 | 2738 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 10.6 | 54.2 | 15.2 | 11.3 | 7.2 | 1.6 | 2265 |
| Très mauvaise à moyenne | 26.7 | 54.1 | 8.0 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 565 |
| Total | 13.5 | 54.2 | 13.9 | 9.9 | 6.7 | 1.8 | 2830 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | |
| Jamais | 17.0 | 61.1 | 11.4 | 7.0 | 2.8 | .6 | 1369 |
| Dans le passé | 10.1 | 55.8 | 16.8 | 9.6 | 6.7 | 1.0 | 698 |
| Modéré (< 20) | 10.2 | 42.6 | 16.7 | 14.1 | 12.7 | 3.8 | 558 |
| Gros fumeur | 12.0 | 37.1 | 13.8 | 14.3 | 16.6 | 6.0 | 239 |
| Total | 13.5 | 53.9 | 13.9 | 9.7 | 7.0 | 1.9 | 2864 |
| Personnes âgées de 15 ans et plus | | | | | | | |
| 1 = Ne boit jamais | 2 = Ne boit jamais 6 verres ou plus | | | | | | |
| 3 = < 1x par mois | 4 = 1-3x par mois | | | | | | |
| 5 = 1-2x par semaine | 6 = 3x ou + par semaine | | | | | | |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : EXCES DE CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | 6 VERRES D'ALCOOL OU PLUS LE MEME JOUR * | | | | | | Total |
|-------------------------------|--|------|------|------|-----|------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N |
| | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | |
| Homme | 21.0 | 43.4 | 12.7 | 9.5 | 6.5 | 6.9 | 1122 |
| Femme | 26.4 | 57.5 | 8.4 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | 1204 |
| Total | 23.8 | 50.7 | 10.5 | 6.4 | 3.9 | 4.6 | 2326 |
| GROUPES AGE | | | | | | | |
| 15-24 | 34.3 | 35.5 | 16.4 | 7.9 | 2.5 | 3.4 | 278 |
| 25-34 | 24.9 | 46.1 | 14.1 | 7.3 | 3.9 | 3.7 | 453 |
| 35-44 | 18.2 | 50.4 | 11.9 | 10.0 | 3.9 | 5.7 | 451 |
| 45-54 | 14.9 | 54.6 | 8.5 | 6.3 | 6.3 | 9.4 | 358 |
| 55-64 | 23.0 | 56.8 | 6.1 | 2.9 | 7.0 | 4.2 | 290 |
| 65-74 | 29.5 | 62.2 | 2.5 | 3.4 | .7 | 1.6 | 294 |
| 75 + | 26.4 | 67.4 | 4.2 | .4 | .6 | 1.1 | 202 |
| Total | 23.8 | 50.7 | 10.5 | 6.4 | 3.9 | 4.6 | 2326 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 70.9 | 23.6 | 2.8 | .0 | .4 | 2.3 | 107 |
| Primaire | 48.8 | 32.3 | 3.0 | 4.2 | 5.7 | 6.0 | 292 |
| Secondaire inférieur | 31.3 | 42.6 | 10.2 | 6.2 | 3.3 | 6.4 | 331 |
| Secondaire supérieur | 17.0 | 56.5 | 10.9 | 5.9 | 4.5 | 5.0 | 529 |
| Supérieur | 9.7 | 59.7 | 14.0 | 8.7 | 4.1 | 3.8 | 948 |
| Total | 23.3 | 50.8 | 10.6 | 6.6 | 4.1 | 4.7 | 2207 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | |
| < 20.000 | 53.3 | 30.8 | 6.1 | 2.8 | 2.6 | 4.4 | 240 |
| 20.000-30.000 | 41.5 | 39.2 | 8.0 | 4.3 | 2.4 | 4.7 | 448 |
| 30.000-40.000 | 23.0 | 51.0 | 9.1 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 481 |
| 40.000-60.000 | 8.4 | 63.4 | 11.5 | 8.1 | 3.7 | 4.8 | 637 |
| >60.000 | 5.2 | 59.9 | 16.5 | 9.1 | 4.8 | 4.4 | 414 |
| Total | 23.5 | 50.9 | 10.5 | 6.4 | 3.9 | 4.7 | 2220 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 18.5 | 53.4 | 12.0 | 7.2 | 4.8 | 4.1 | 1631 |
| Très mauvaise à moyenne | 34.6 | 45.4 | 7.3 | 4.4 | 2.0 | 6.4 | 593 |
| Total | 22.5 | 51.4 | 10.8 | 6.5 | 4.1 | 4.7 | 2224 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | |
| Jamais | 33.9 | 51.9 | 6.3 | 4.4 | 1.9 | 1.6 | 981 |
| Dans le passé | 16.1 | 58.6 | 11.1 | 5.9 | 3.4 | 4.9 | 553 |
| Modéré (< 20) | 17.2 | 47.3 | 13.4 | 9.2 | 5.9 | 7.0 | 453 |
| Gros fumeur | 14.7 | 37.0 | 17.3 | 10.9 | 9.0 | 11.0 | 272 |
| Total | 24.1 | 50.5 | 10.2 | 6.6 | 4.0 | 4.6 | 2259 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

1 = Ne boit jamais
 3 = < 1x par mois
 5 = 1-2x par semaine

2 = Ne boit jamais 6 verres ou plus
 4 = 1-3x par mois
 6 = 3x ou + par semaine

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : EXCES DE CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | 6 VERRES D'ALCOOL OU PLUS LE MEME JOUR * | | | | | | Total |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N |
| | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | |
| Homme | 10.0 | 43.6 | 18.8 | 11.1 | 10.2 | 6.4 | 1370 |
| Femme | 19.9 | 63.0 | 10.1 | 3.5 | 2.2 | 1.3 | 1503 |
| Total | 15.0 | 53.4 | 14.4 | 7.3 | 6.1 | 3.8 | 2873 |
| GROUPES AGE | | | | | | | |
| 15-24 | 18.9 | 46.2 | 17.5 | 9.2 | 6.9 | 1.1 | 391 |
| 25-34 | 12.0 | 52.5 | 17.4 | 8.4 | 6.7 | 3.0 | 534 |
| 35-44 | 11.7 | 48.6 | 17.3 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | 571 |
| 45-54 | 11.6 | 54.9 | 13.9 | 7.1 | 7.6 | 4.9 | 424 |
| 55-64 | 18.5 | 53.9 | 12.4 | 6.2 | 4.6 | 4.3 | 365 |
| 65-74 | 21.5 | 68.6 | 4.1 | 2.6 | 2.4 | .9 | 366 |
| 75 + | 21.2 | 68.2 | 3.2 | .7 | 3.1 | 3.7 | 222 |
| Total | 15.0 | 53.4 | 14.4 | 7.3 | 6.1 | 3.8 | 2873 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 38.7 | 45.2 | 2.9 | 3.6 | 5.7 | 3.9 | 96 |
| Primaire | 29.9 | 51.1 | 8.2 | 3.0 | 5.1 | 2.7 | 444 |
| Secondaire inférieur | 19.4 | 51.7 | 9.4 | 8.1 | 6.6 | 4.8 | 522 |
| Secondaire supérieur | 12.1 | 55.3 | 13.3 | 7.5 | 7.5 | 4.3 | 822 |
| Supérieur | 8.2 | 54.0 | 20.8 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 889 |
| Total | 15.1 | 53.3 | 14.4 | 7.2 | 6.2 | 3.8 | 2773 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | |
| < 20.000 | 25.7 | 46.3 | 5.3 | 7.8 | 6.9 | 8.0 | 228 |
| 20.000-30.000 | 23.9 | 48.6 | 13.3 | 4.8 | 5.5 | 3.9 | 622 |
| 30.000-40.000 | 13.4 | 60.2 | 11.1 | 4.9 | 7.5 | 2.9 | 703 |
| 40.000-60.000 | 9.1 | 53.5 | 17.3 | 10.0 | 6.1 | 3.9 | 947 |
| >60.000 | 10.6 | 49.0 | 24.3 | 8.4 | 4.8 | 2.9 | 280 |
| Total | 14.9 | 53.1 | 14.6 | 7.3 | 6.2 | 3.9 | 2780 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 12.2 | 54.4 | 16.0 | 7.5 | 6.4 | 3.4 | 1929 |
| Très mauvaise à moyenne | 20.7 | 51.0 | 11.1 | 6.9 | 5.5 | 4.7 | 816 |
| Total | 14.5 | 53.5 | 14.7 | 7.3 | 6.2 | 3.8 | 2745 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | |
| Jamais | 19.6 | 59.6 | 11.3 | 4.5 | 3.1 | 1.9 | 1313 |
| Dans le passé | 10.2 | 53.3 | 19.0 | 8.6 | 5.5 | 3.4 | 655 |
| Modéré (< 20) | 12.3 | 45.7 | 19.1 | 8.4 | 9.6 | 4.9 | 544 |
| Gros fumeur | 12.1 | 41.8 | 9.7 | 13.8 | 12.0 | 10.6 | 311 |
| Total | 15.2 | 53.2 | 14.4 | 7.3 | 6.1 | 3.9 | 2823 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

1 = Ne boit jamais
 3 = < 1x par mois
 5 = 1-2x par semaine

2 = Ne boit jamais 6 verres ou plus
 4 = 1-3x par mois
 6 = 3x ou + par semaine

STYLE DE VIE : QUANTITE CONSOMMEE D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | NOMBRES DE VERRES PAR SEMAINE | | | | N |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------|------|
| | Moyenne | 25ème Percentile | Mediane | 75ème Percentile | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 8.5 | .0 | 4.5 | 12.0 | 3869 |
| Femme | 3.0 | .0 | .0 | 4.0 | 4084 |
| Total | 5.8 | .0 | 2.0 | 7.0 | 7953 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 4.8 | .0 | 1.0 | 5.0 | 1074 |
| 25-34 | 4.8 | .0 | 2.0 | 6.0 | 1541 |
| 35-44 | 7.0 | .0 | 3.0 | 9.0 | 1537 |
| 45-54 | 7.6 | .0 | 4.0 | 11.0 | 1217 |
| 55-64 | 5.8 | .0 | 2.0 | 7.0 | 1029 |
| 65-74 | 4.2 | .0 | .0 | 5.0 | 971 |
| 75 + | 3.4 | .0 | .0 | 4.0 | 584 |
| Total | 5.8 | .0 | 2.0 | 7.0 | 7953 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 3.0 | .0 | .0 | 1.0 | 262 |
| Primaire | 5.4 | .0 | .0 | 6.0 | 1096 |
| Secondaire inférieur | 6.5 | .0 | 1.0 | 7.0 | 1325 |
| Secondaire supérieur | 5.3 | .0 | 2.0 | 6.0 | 2287 |
| Supérieur | 6.1 | .0 | 3.0 | 9.0 | 2657 |
| Total | 5.8 | .0 | 2.0 | 7.0 | 7627 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 4.9 | .0 | .0 | 4.0 | 557 |
| 20.000-30.000 | 5.2 | .0 | .0 | 5.0 | 1543 |
| 30.000-40.000 | 5.4 | .0 | 2.0 | 6.0 | 1861 |
| 40.000-60.000 | 6.2 | .0 | 2.0 | 8.5 | 2570 |
| >60.000 | 6.5 | .0 | 4.0 | 9.0 | 1066 |
| Total | 5.8 | .0 | 2.0 | 7.0 | 7597 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 6.0 | .0 | 2.0 | 8.0 | 5744 |
| Très mauvaise à moyenne | 4.9 | .0 | .0 | 6.0 | 1927 |
| Total | 5.8 | .0 | 2.0 | 7.0 | 7671 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 3.5 | .0 | .0 | 4.0 | 3611 |
| Dans le passé | 6.7 | .0 | 3.0 | 9.0 | 1871 |
| Modéré (< 20) | 7.7 | .0 | 3.0 | 10.0 | 1528 |
| Gros fumeur | 10.3 | .0 | 4.5 | 14.0 | 807 |
| Total | 5.8 | .0 | 2.0 | 7.0 | 7817 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | |
| Région Flamande | 6.2 | .0 | 3.0 | 8.5 | 2851 |
| Région Bruxelloise | 5.1 | .0 | .0 | 6.0 | 2283 |
| Région Wallonne | 5.2 | .0 | 1.0 | 6.0 | 2819 |
| Belgique | 5.8 | .0 | 2.0 | 7.0 | 7953 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | NOMBRES DE VERRES PAR SEMAINE | | | | N |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------|------|
| | Moyenne | 25ème Percentile | Mediane | 75ème Percentile | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 9.1 | 1.0 | 4.5 | 12.0 | 1419 |
| Femme | 3.2 | .0 | 1.0 | 4.0 | 1432 |
| Total | 6.2 | .0 | 3.0 | 8.5 | 2851 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 5.9 | .0 | 3.0 | 8.0 | 407 |
| 25-34 | 5.5 | .0 | 2.0 | 8.0 | 573 |
| 35-44 | 6.8 | .0 | 3.0 | 9.0 | 521 |
| 45-54 | 8.2 | .0 | 4.0 | 12.0 | 447 |
| 55-64 | 6.1 | .0 | 2.0 | 7.0 | 386 |
| 65-74 | 4.0 | .0 | .0 | 4.5 | 342 |
| 75 + | 2.9 | .0 | .0 | 4.0 | 175 |
| Total | 6.2 | .0 | 3.0 | 8.5 | 2851 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 4.1 | .0 | .0 | 6.0 | 55 |
| Primaire | 6.8 | .0 | 1.0 | 7.0 | 381 |
| Secondaire inférieur | 7.0 | .0 | 2.0 | 8.0 | 513 |
| Secondaire supérieur | 5.4 | .0 | 2.0 | 6.5 | 945 |
| Supérieur | 6.4 | .0 | 4.0 | 9.0 | 851 |
| Total | 6.2 | .0 | 3.0 | 8.0 | 2745 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 3.5 | .0 | .0 | 4.5 | 93 |
| 20.000-30.000 | 6.2 | .0 | 2.0 | 6.0 | 503 |
| 30.000-40.000 | 6.3 | .0 | 3.0 | 8.0 | 702 |
| 40.000-60.000 | 6.3 | .0 | 3.0 | 9.0 | 1012 |
| >60.000 | 6.5 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 385 |
| Total | 6.2 | .0 | 3.0 | 8.5 | 2695 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 6.4 | .0 | 3.0 | 9.0 | 2231 |
| Très mauvaise à moyenne | 5.0 | .0 | 1.0 | 6.0 | 553 |
| Total | 6.2 | .0 | 3.0 | 8.0 | 2784 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 3.7 | .0 | 1.0 | 4.5 | 1350 |
| Dans le passé | 7.2 | .0 | 4.0 | 9.0 | 691 |
| Modéré (< 20) | 8.4 | .0 | 4.5 | 12.0 | 548 |
| Gros fumeur | 11.5 | .0 | 5.0 | 18.0 | 235 |
| Total | 6.2 | .0 | 3.0 | 8.5 | 2824 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : QUANTITE CONSOMMEE D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|------|
| NOMBRES DE VERRES PAR SEMAINE | | | | | |
| | Moyenne | 25ème Percentile | Mediane | 75ème Percentile | N |
| ----- | | | | | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 6.8 | .0 | 2.0 | 9.0 | 1106 |
| Femme | 3.4 | .0 | .0 | 4.0 | 1177 |
| Total | 5.1 | .0 | .0 | 6.0 | 2283 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 3.5 | .0 | .0 | 2.0 | 282 |
| 25-34 | 3.4 | .0 | .0 | 4.5 | 447 |
| 35-44 | 6.3 | .0 | 2.0 | 9.0 | 451 |
| 45-54 | 8.2 | .0 | 2.0 | 12.0 | 351 |
| 55-64 | 4.6 | .0 | .0 | 5.0 | 286 |
| 65-74 | 5.0 | .0 | .0 | 6.0 | 279 |
| 75 + | 3.9 | .0 | .0 | 4.0 | 187 |
| Total | 5.1 | .0 | .0 | 6.0 | 2283 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 1.5 | .0 | .0 | .0 | 112 |
| Primaire | 3.1 | .0 | .0 | 1.0 | 278 |
| Secondaire inférieur | 4.7 | .0 | .0 | 4.5 | 311 |
| Secondaire supérieur | 5.4 | .0 | .0 | 6.0 | 533 |
| Supérieur | 6.2 | .0 | 2.0 | 8.0 | 928 |
| Total | 5.1 | .0 | 1.0 | 6.0 | 2162 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 2.6 | .0 | .0 | .0 | 241 |
| 20.000-30.000 | 3.6 | .0 | .0 | 3.0 | 434 |
| 30.000-40.000 | 4.9 | .0 | .0 | 4.0 | 466 |
| 40.000-60.000 | 5.4 | .0 | 2.0 | 7.0 | 628 |
| >60.000 | 8.3 | .0 | 4.5 | 12.0 | 405 |
| Total | 5.1 | .0 | .0 | 6.0 | 2174 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 5.4 | .0 | 1.0 | 7.0 | 1618 |
| Très mauvaise à moyenne | 4.2 | .0 | .0 | 3.0 | 572 |
| Total | 5.1 | .0 | 1.0 | 6.0 | 2190 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 2.5 | .0 | .0 | 2.0 | 967 |
| Dans le passé | 6.7 | .0 | 2.0 | 9.0 | 542 |
| Modéré (< 20) | 6.6 | .0 | 2.0 | 8.5 | 446 |
| Gros fumeur | 9.2 | .0 | 2.0 | 12.0 | 266 |
| Total | 5.1 | .0 | .0 | 6.0 | 2221 |
| ----- | | | | | |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : QUANTITE CONSOMMEE D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|------|
| NOMBRES DE VERRES PAR SEMAINE | | | | | |
| | Moyenne | 25ème Percentile | Mediane | 75ème Percentile | N |
| ----- | | | | | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 7.8 | .0 | 3.0 | 10.0 | 1344 |
| Femme | 2.6 | .0 | .0 | 2.0 | 1475 |
| Total | 5.2 | .0 | 1.0 | 6.0 | 2819 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 3.2 | .0 | .0 | 4.0 | 385 |
| 25-34 | 4.0 | .0 | .0 | 4.0 | 521 |
| 35-44 | 7.6 | .0 | 2.0 | 9.0 | 565 |
| 45-54 | 6.4 | .0 | 3.0 | 9.0 | 419 |
| 55-64 | 5.4 | .0 | 1.0 | 7.0 | 357 |
| 65-74 | 4.2 | .0 | .0 | 6.0 | 350 |
| 75 + | 3.8 | .0 | 1.0 | 7.0 | 222 |
| Total | 5.2 | .0 | 1.0 | 6.0 | 2819 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 3.0 | .0 | .0 | .0 | 95 |
| Primaire | 3.6 | .0 | .0 | 4.0 | 437 |
| Secondaire inférieur | 6.0 | .0 | .0 | 6.0 | 501 |
| Secondaire supérieur | 5.1 | .0 | 1.0 | 6.0 | 809 |
| Supérieur | 5.7 | .0 | 2.0 | 8.0 | 878 |
| Total | 5.2 | .0 | 1.0 | 6.0 | 2720 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 6.9 | .0 | .0 | 4.5 | 223 |
| 20.000-30.000 | 4.3 | .0 | .0 | 4.5 | 606 |
| 30.000-40.000 | 4.1 | .0 | .0 | 4.0 | 693 |
| 40.000-60.000 | 6.1 | .0 | 2.0 | 8.5 | 930 |
| >60.000 | 5.5 | .0 | 2.0 | 8.0 | 276 |
| Total | 5.2 | .0 | 1.0 | 6.0 | 2728 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 5.3 | .0 | 1.0 | 6.0 | 1895 |
| Très mauvaise à moyenne | 5.0 | .0 | 1.0 | 6.0 | 802 |
| Total | 5.2 | .0 | 1.0 | 6.0 | 2697 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 3.3 | .0 | .0 | 4.0 | 1294 |
| Dans le passé | 5.8 | .0 | 2.0 | 9.0 | 638 |
| Modéré (< 20) | 6.7 | .0 | 2.0 | 7.0 | 534 |
| Gros fumeur | 9.0 | .0 | 3.0 | 12.0 | 306 |
| Total | 5.2 | .0 | 1.0 | 6.0 | 2772 |
| ----- | | | | | |

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATION D'ALCOOL (en %) | | | | Total |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| | Ne boit pas habituellement | 1-7 verres par semaine | 8-14 verres par semaine | >= 15 verres par semaine | N |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 30.0 | 35.1 | 17.1 | 17.8 | 3888 |
| Femme | 52.7 | 33.7 | 9.7 | 3.9 | 4112 |
| Total | 41.3 | 34.4 | 13.4 | 10.8 | 8000 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 47.5 | 33.7 | 10.3 | 8.6 | 1078 |
| 25-34 | 42.2 | 35.9 | 13.1 | 8.8 | 1551 |
| 35-44 | 34.1 | 36.9 | 15.1 | 13.9 | 1542 |
| 45-54 | 30.1 | 36.8 | 17.9 | 15.2 | 1224 |
| 55-64 | 44.9 | 33.0 | 12.1 | 10.0 | 1037 |
| 65-74 | 57.1 | 24.7 | 10.9 | 7.3 | 981 |
| 75 + | 55.8 | 30.4 | 7.8 | 6.0 | 587 |
| Total | 41.3 | 34.4 | 13.4 | 10.8 | 8000 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 74.2 | 13.8 | 5.7 | 6.3 | 264 |
| Primaire | 55.2 | 25.9 | 9.1 | 9.8 | 1113 |
| Secondaire inférieur | 45.3 | 31.2 | 10.4 | 13.1 | 1339 |
| Secondaire supérieur | 43.3 | 34.4 | 11.7 | 10.6 | 2292 |
| Supérieur | 30.4 | 40.7 | 18.3 | 10.5 | 2665 |
| Total | 41.4 | 34.5 | 13.3 | 10.8 | 7673 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 61.5 | 22.7 | 7.2 | 8.5 | 565 |
| 20.000-30.000 | 52.3 | 28.9 | 9.8 | 9.0 | 1562 |
| 30.000-40.000 | 43.6 | 34.5 | 11.8 | 10.2 | 1870 |
| 40.000-60.000 | 36.3 | 36.2 | 15.3 | 12.3 | 2574 |
| >60.000 | 27.4 | 41.5 | 19.2 | 11.9 | 1071 |
| Total | 41.4 | 34.3 | 13.5 | 10.9 | 7642 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 37.9 | 36.6 | 14.2 | 11.3 | 5763 |
| Très mauvaise à moyenne | 51.5 | 28.9 | 10.4 | 9.3 | 1949 |
| Total | 40.8 | 34.9 | 13.4 | 10.9 | 7712 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 50.4 | 35.2 | 8.9 | 5.5 | 3634 |
| Dans le passé | 32.7 | 37.1 | 19.0 | 11.2 | 1879 |
| Modéré (< 20) | 32.9 | 34.7 | 16.3 | 16.1 | 1534 |
| Gros fumeur | 34.8 | 25.5 | 15.4 | 24.3 | 810 |
| Total | 41.2 | 34.5 | 13.4 | 10.9 | 7857 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | |
| Région Flamande | 36.2 | 37.3 | 14.4 | 12.2 | 2861 |
| Région Bruxelloise | 50.8 | 28.4 | 11.2 | 9.6 | 2307 |
| Région Wallonne | 47.8 | 31.1 | 12.3 | 8.8 | 2832 |
| Belgique | 41.3 | 34.4 | 13.4 | 10.8 | 8000 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATION D'ALCOOL | | | | Total |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| | Ne boit pas habituellement | 1-7 verres par semaine | 8-14 verres par semaine | >= 15 verres par semaine | N |
| | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 24.3 | 37.6 | 18.3 | 19.9 | 1424 |
| Femme | 48.3 | 36.9 | 10.5 | 4.3 | 1437 |
| Total | 36.2 | 37.3 | 14.4 | 12.2 | 2861 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 35.4 | 39.5 | 13.6 | 11.5 | 408 |
| 25-34 | 35.4 | 39.2 | 15.0 | 10.4 | 575 |
| 35-44 | 30.0 | 39.7 | 16.2 | 14.1 | 521 |
| 45-54 | 26.3 | 38.4 | 18.2 | 17.1 | 448 |
| 55-64 | 42.7 | 35.8 | 11.2 | 10.4 | 390 |
| 65-74 | 57.4 | 24.5 | 10.8 | 7.3 | 342 |
| 75 + | 60.9 | 28.2 | 3.8 | 7.1 | 177 |
| Total | 36.2 | 37.3 | 14.4 | 12.2 | 2861 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 60.0 | 23.2 | 5.9 | 10.9 | 55 |
| Primaire | 48.3 | 28.4 | 9.9 | 13.4 | 384 |
| Secondaire inférieur | 39.3 | 35.6 | 10.2 | 14.9 | 515 |
| Secondaire supérieur | 39.7 | 36.4 | 13.2 | 10.7 | 949 |
| Supérieur | 25.9 | 43.1 | 19.4 | 11.7 | 852 |
| Total | 36.5 | 37.3 | 14.2 | 12.1 | 2755 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 58.6 | 25.1 | 11.2 | 5.1 | 93 |
| 20.000-30.000 | 45.5 | 33.7 | 9.0 | 11.8 | 506 |
| 30.000-40.000 | 35.9 | 37.3 | 14.5 | 12.4 | 705 |
| 40.000-60.000 | 35.2 | 36.9 | 14.4 | 13.4 | 1014 |
| >60.000 | 22.8 | 44.8 | 21.3 | 11.1 | 386 |
| Total | 36.1 | 37.3 | 14.4 | 12.3 | 2704 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 32.9 | 39.3 | 15.3 | 12.5 | 2235 |
| Très mauvaise à moyenne | 49.5 | 29.8 | 10.2 | 10.5 | 558 |
| Total | 35.9 | 37.6 | 14.4 | 12.1 | 2793 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 43.7 | 40.8 | 9.5 | 6.1 | 1353 |
| Dans le passé | 28.8 | 39.0 | 20.7 | 11.5 | 692 |
| Modéré (< 20) | 26.6 | 35.1 | 19.5 | 18.9 | 550 |
| Gros fumeur | 34.5 | 21.6 | 12.5 | 31.4 | 235 |
| Total | 35.9 | 37.4 | 14.4 | 12.3 | 2830 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATION D'ALCOOL | | | | Total |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| | Ne boit pas habituellement | 1-7 verres par semaine | 8-14 verres par semaine | >= 15 verres par semaine | N |
| | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 43.4 | 28.1 | 14.8 | 13.7 | 1117 |
| Femme | 57.7 | 28.7 | 7.8 | 5.8 | 1190 |
| Total | 50.8 | 28.4 | 11.2 | 9.6 | 2307 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 61.6 | 27.8 | 7.2 | 3.4 | 284 |
| 25-34 | 52.1 | 32.1 | 10.5 | 5.3 | 453 |
| 35-44 | 43.5 | 28.5 | 15.1 | 12.9 | 455 |
| 45-54 | 36.4 | 29.8 | 13.6 | 20.2 | 353 |
| 55-64 | 55.9 | 24.4 | 11.1 | 8.6 | 289 |
| 65-74 | 58.2 | 24.4 | 9.2 | 8.1 | 285 |
| 75 + | 57.1 | 25.7 | 8.6 | 8.6 | 188 |
| Total | 50.8 | 28.4 | 11.2 | 9.6 | 2307 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 87.4 | 4.4 | 6.1 | 2.2 | 113 |
| Primaire | 74.5 | 13.2 | 6.4 | 5.9 | 288 |
| Secondaire inférieur | 57.4 | 23.7 | 10.8 | 8.1 | 317 |
| Secondaire supérieur | 50.8 | 28.5 | 9.5 | 11.3 | 534 |
| Supérieur | 34.6 | 39.1 | 15.1 | 11.3 | 934 |
| Total | 50.2 | 28.8 | 11.4 | 9.6 | 2186 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 76.0 | 15.1 | 3.8 | 5.1 | 249 |
| 20.000-30.000 | 64.4 | 19.0 | 10.3 | 6.3 | 444 |
| 30.000-40.000 | 54.7 | 29.4 | 7.0 | 8.9 | 470 |
| 40.000-60.000 | 40.5 | 35.5 | 14.5 | 9.5 | 629 |
| >60.000 | 26.5 | 38.2 | 17.5 | 17.7 | 405 |
| Total | 50.7 | 28.4 | 11.3 | 9.6 | 2197 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 45.3 | 31.9 | 12.7 | 10.1 | 1627 |
| Très mauvaise à moyenne | 65.3 | 19.7 | 6.0 | 9.0 | 583 |
| Total | 50.2 | 28.9 | 11.0 | 9.9 | 2210 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 65.4 | 23.6 | 7.2 | 3.8 | 979 |
| Dans le passé | 38.4 | 33.0 | 15.9 | 12.7 | 546 |
| Modéré (< 20) | 38.4 | 34.8 | 14.4 | 12.5 | 449 |
| Gros fumeur | 39.0 | 27.2 | 12.2 | 21.6 | 268 |
| Total | 50.6 | 28.5 | 11.2 | 9.7 | 2242 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATION D'ALCOOL | | | | Total |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| | Ne boit pas habituellement | 1-7 verres par semaine | 8-14 verres par semaine | >= 15 verres par semaine | N |
| | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 36.6 | 32.7 | 15.6 | 15.1 | 1347 |
| Femme | 58.8 | 29.5 | 9.0 | 2.6 | 1485 |
| Total | 47.8 | 31.1 | 12.3 | 8.8 | 2832 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 63.7 | 25.6 | 5.6 | 5.1 | 386 |
| 25-34 | 52.2 | 30.6 | 10.4 | 6.9 | 523 |
| 35-44 | 38.8 | 34.1 | 13.1 | 14.0 | 566 |
| 45-54 | 35.3 | 35.8 | 18.6 | 10.2 | 423 |
| 55-64 | 45.8 | 30.0 | 14.6 | 9.6 | 358 |
| 65-74 | 56.3 | 25.0 | 11.8 | 6.9 | 354 |
| 75 + | 48.3 | 35.5 | 12.9 | 3.4 | 222 |
| Total | 47.8 | 31.1 | 12.3 | 8.8 | 2832 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 78.9 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 96 |
| Primaire | 61.0 | 25.8 | 8.6 | 4.7 | 441 |
| Secondaire inférieur | 53.0 | 25.2 | 10.8 | 11.0 | 507 |
| Secondaire supérieur | 49.1 | 31.6 | 9.1 | 10.2 | 809 |
| Supérieur | 36.4 | 37.5 | 17.9 | 8.3 | 879 |
| Total | 47.6 | 31.2 | 12.4 | 8.8 | 2732 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 56.3 | 24.9 | 6.2 | 12.6 | 223 |
| 20.000-30.000 | 58.7 | 24.7 | 10.8 | 5.8 | 612 |
| 30.000-40.000 | 53.4 | 31.1 | 8.7 | 6.8 | 695 |
| 40.000-60.000 | 37.3 | 35.0 | 17.2 | 10.6 | 931 |
| >60.000 | 41.0 | 34.0 | 14.3 | 10.8 | 280 |
| Total | 47.9 | 30.8 | 12.5 | 8.8 | 2741 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 45.9 | 32.5 | 12.4 | 9.3 | 1901 |
| Très mauvaise à moyenne | 50.0 | 30.4 | 11.8 | 7.9 | 808 |
| Total | 47.0 | 31.9 | 12.2 | 8.9 | 2709 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 58.4 | 28.4 | 8.4 | 4.8 | 1302 |
| Dans le passé | 38.6 | 34.8 | 16.5 | 10.2 | 641 |
| Modéré (< 20) | 42.3 | 33.9 | 11.4 | 12.4 | 535 |
| Gros fumeur | 33.9 | 30.4 | 20.4 | 15.3 | 307 |
| Total | 47.8 | 31.1 | 12.3 | 8.8 | 2785 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : CONSOMMATEURS JOURNALIERS D'ALCOOL (INDICATEUR : AL05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATEURS JOURNALIERS | | Total |
|-------------------------------|---------------------------|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 11.2 | 88.8 | 3882 |
| Femme | 4.7 | 95.3 | 4095 |
| Total | 8.0 | 92.0 | 7977 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 1.5 | 98.5 | 1077 |
| 25-34 | 4.6 | 95.4 | 1545 |
| 35-44 | 7.7 | 92.3 | 1539 |
| 45-54 | 13.9 | 86.1 | 1220 |
| 55-64 | 8.8 | 91.2 | 1031 |
| 65-74 | 13.8 | 86.2 | 978 |
| 75 + | 12.2 | 87.8 | 587 |
| Total | 8.0 | 92.0 | 7977 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 5.6 | 94.4 | 262 |
| Primaire | 10.6 | 89.4 | 1100 |
| Secondaire inférieur | 6.3 | 93.7 | 1331 |
| Secondaire supérieur | 6.3 | 93.7 | 2294 |
| Supérieur | 9.5 | 90.5 | 2663 |
| Total | 7.9 | 92.1 | 7650 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 6.1 | 93.9 | 558 |
| 20.000-30.000 | 7.8 | 92.2 | 1549 |
| 30.000-40.000 | 6.5 | 93.5 | 1867 |
| 40.000-60.000 | 8.5 | 91.5 | 2577 |
| >60.000 | 10.0 | 90.0 | 1069 |
| Total | 8.0 | 92.0 | 7620 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 7.7 | 92.3 | 5757 |
| Très mauvaise à moyenne | 8.5 | 91.5 | 1934 |
| Total | 7.9 | 92.1 | 7691 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 5.2 | 94.8 | 3621 |
| Dans le passé | 11.0 | 89.0 | 1878 |
| Modéré (< 20) | 8.5 | 91.5 | 1530 |
| Gros fumeur | 12.9 | 87.1 | 811 |
| Total | 8.0 | 92.0 | 7840 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 6.7 | 93.3 | 2859 |
| Région Bruxelloise | 9.1 | 90.9 | 2292 |
| Région Wallonne | 9.9 | 90.1 | 2826 |
| Belgique | 8.0 | 92.0 | 7977 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATEURS JOURNALIERS D'ALCOOL (INDICATEUR : AL05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATEURS JOURNALIERS | | Total |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 10.3 | 89.7 | 1426 |
| Femme | 3.0 | 97.0 | 1433 |
| Total | 6.7 | 93.3 | 2859 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 1.0 | 99.0 | 410 |
| 25-34 | 4.9 | 95.1 | 573 |
| 35-44 | 4.2 | 95.8 | 522 |
| 45-54 | 12.9 | 87.1 | 448 |
| 55-64 | 8.9 | 91.1 | 387 |
| 65-74 | 12.7 | 87.3 | 344 |
| 75 + | 6.0 | 94.0 | 175 |
| Total | 6.7 | 93.3 | 2859 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 6.1 | 93.9 | 55 |
| Primaire | 11.2 | 88.8 | 383 |
| Secondaire inférieur | 4.4 | 95.6 | 513 |
| Secondaire supérieur | 5.0 | 95.0 | 948 |
| Supérieur | 8.1 | 91.9 | 854 |
| Total | 6.6 | 93.4 | 2753 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 2.2 | 97.8 | 93 |
| 20.000-30.000 | 6.3 | 93.7 | 504 |
| 30.000-40.000 | 6.2 | 93.8 | 704 |
| 40.000-60.000 | 6.7 | 93.3 | 1015 |
| >60.000 | 8.6 | 91.4 | 386 |
| Total | 6.7 | 93.3 | 2702 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 6.5 | 93.5 | 2236 |
| Très mauvaise à moyenne | 6.5 | 93.5 | 555 |
| Total | 6.5 | 93.5 | 2791 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 4.2 | 95.8 | 1352 |
| Dans le passé | 9.4 | 90.6 | 694 |
| Modéré (< 20) | 7.4 | 92.6 | 549 |
| Gros fumeur | 11.0 | 89.0 | 237 |
| Total | 6.7 | 93.3 | 2832 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATEURS JOURNALIERS D'ALCOOL (INDICATEUR : AL05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATEURS JOURNALIERS | | Total |
|-------------------------------|---------------------------|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 12.0 | 88.0 | 1108 |
| Femme | 6.5 | 93.5 | 1184 |
| Total | 9.1 | 90.9 | 2292 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 2.2 | 97.8 | 282 |
| 25-34 | 4.0 | 96.0 | 450 |
| 35-44 | 11.4 | 88.6 | 451 |
| 45-54 | 15.3 | 84.7 | 351 |
| 55-64 | 11.8 | 88.2 | 287 |
| 65-74 | 14.7 | 85.3 | 281 |
| 75 + | 9.2 | 90.8 | 190 |
| Total | 9.1 | 90.9 | 2292 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 6.1 | 93.9 | 112 |
| Primaire | 3.4 | 96.6 | 279 |
| Secondaire inférieur | 8.7 | 91.3 | 313 |
| Secondaire supérieur | 8.7 | 91.3 | 536 |
| Supérieur | 11.2 | 88.8 | 930 |
| Total | 8.9 | 91.1 | 2170 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 4.0 | 96.0 | 241 |
| 20.000-30.000 | 6.8 | 93.2 | 436 |
| 30.000-40.000 | 9.3 | 90.7 | 469 |
| 40.000-60.000 | 8.5 | 91.5 | 630 |
| >60.000 | 15.8 | 84.2 | 407 |
| Total | 9.1 | 90.9 | 2183 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 9.4 | 90.6 | 1623 |
| Très mauvaise à moyenne | 7.8 | 92.2 | 575 |
| Total | 9.0 | 91.0 | 2198 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 4.6 | 95.4 | 972 |
| Dans le passé | 14.3 | 85.7 | 543 |
| Modéré (< 20) | 10.8 | 89.2 | 447 |
| Gros fumeur | 13.9 | 86.1 | 267 |
| Total | 9.2 | 90.8 | 2229 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATEURS JOURNALIERS D'ALCOOL (INDICATEUR : AL05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATEURS JOURNALIERS | | Total |
|-------------------------------|---------------------------|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 12.7 | 87.3 | 1348 |
| Femme | 7.1 | 92.9 | 1478 |
| Total | 9.9 | 90.1 | 2826 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 2.0 | 98.0 | 385 |
| 25-34 | 4.2 | 95.8 | 522 |
| 35-44 | 13.0 | 87.0 | 566 |
| 45-54 | 15.6 | 84.4 | 421 |
| 55-64 | 7.6 | 92.4 | 357 |
| 65-74 | 15.5 | 84.5 | 353 |
| 75 + | 21.9 | 78.1 | 222 |
| Total | 9.9 | 90.1 | 2826 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 4.9 | 95.1 | 95 |
| Primaire | 11.7 | 88.3 | 438 |
| Secondaire inférieur | 9.2 | 90.8 | 505 |
| Secondaire supérieur | 8.6 | 91.4 | 810 |
| Supérieur | 11.3 | 88.7 | 879 |
| Total | 9.9 | 90.1 | 2727 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 9.7 | 90.3 | 224 |
| 20.000-30.000 | 10.5 | 89.5 | 609 |
| 30.000-40.000 | 6.3 | 93.7 | 694 |
| 40.000-60.000 | 12.0 | 88.0 | 932 |
| >60.000 | 10.6 | 89.4 | 276 |
| Total | 9.9 | 90.1 | 2735 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 9.7 | 90.3 | 1898 |
| Très mauvaise à moyenne | 11.3 | 88.7 | 804 |
| Total | 10.1 | 89.9 | 2702 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 7.1 | 92.9 | 1297 |
| Dans le passé | 13.2 | 86.8 | 641 |
| Modéré (< 20) | 9.6 | 90.4 | 534 |
| Gros fumeur | 15.3 | 84.7 | 307 |
| Total | 10.0 | 90.0 | 2779 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL EN SEMAINE (INDICATEUR : AL04_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMME HABITUELLEMENT | | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|------|-------|
| | DE L'ALCOOL PENDANT LA SEMAINE | | |
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 38.4 | 61.6 | 3954 |
| Femme | 20.4 | 79.6 | 4183 |
| Total | 29.4 | 70.6 | 8137 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 14.1 | 85.9 | 1090 |
| 25-34 | 23.8 | 76.2 | 1568 |
| 35-44 | 33.5 | 66.5 | 1557 |
| 45-54 | 41.2 | 58.8 | 1244 |
| 55-64 | 33.7 | 66.3 | 1051 |
| 65-74 | 30.8 | 69.2 | 1018 |
| 75 + | 31.3 | 68.7 | 609 |
| Total | 29.4 | 70.6 | 8137 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 14.7 | 85.3 | 267 |
| Primaire | 25.1 | 74.9 | 1125 |
| Secondaire inférieur | 25.3 | 74.7 | 1383 |
| Secondaire supérieur | 26.5 | 73.5 | 2333 |
| Supérieur | 36.5 | 63.5 | 2698 |
| Total | 29.3 | 70.7 | 7806 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 22.0 | 78.0 | 573 |
| 20.000-30.000 | 23.5 | 76.5 | 1597 |
| 30.000-40.000 | 27.2 | 72.8 | 1905 |
| 40.000-60.000 | 31.9 | 68.1 | 2611 |
| >60.000 | 39.1 | 60.9 | 1082 |
| Total | 29.5 | 70.5 | 7768 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 30.0 | 70.0 | 5852 |
| Très mauvaise à moyenne | 27.7 | 72.3 | 1984 |
| Total | 29.5 | 70.5 | 7836 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 21.0 | 79.0 | 3677 |
| Dans le passé | 39.0 | 61.0 | 1912 |
| Modéré (< 20) | 33.8 | 66.2 | 1562 |
| Gros fumeur | 37.7 | 62.3 | 831 |
| Total | 29.5 | 70.5 | 7982 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 29.7 | 70.3 | 2893 |
| Région Bruxelloise | 29.4 | 70.6 | 2353 |
| Région Wallonne | 28.9 | 71.1 | 2891 |
| Belgique | 29.4 | 70.6 | 8137 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL EN SEMAINE (INDICATEUR : AL04_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMME HABITUELLEMENT | | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|------|-------|
| | DE L'ALCOOL PENDANT LA SEMAINE | | |
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 39.3 | 60.7 | 1437 |
| Femme | 19.8 | 80.2 | 1456 |
| Total | 29.7 | 70.3 | 2893 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 14.8 | 85.2 | 414 |
| 25-34 | 24.5 | 75.5 | 576 |
| 35-44 | 32.5 | 67.5 | 525 |
| 45-54 | 41.6 | 58.4 | 455 |
| 55-64 | 35.6 | 64.4 | 395 |
| 65-74 | 29.4 | 70.6 | 349 |
| 75 + | 30.4 | 69.6 | 179 |
| Total | 29.7 | 70.3 | 2893 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 18.5 | 81.5 | 55 |
| Primaire | 29.8 | 70.2 | 389 |
| Secondaire inférieur | 26.0 | 74.0 | 527 |
| Secondaire supérieur | 25.5 | 74.5 | 957 |
| Supérieur | 35.9 | 64.1 | 857 |
| Total | 29.4 | 70.6 | 2785 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 24.4 | 75.6 | 95 |
| 20.000-30.000 | 23.7 | 76.3 | 517 |
| 30.000-40.000 | 30.6 | 69.4 | 712 |
| 40.000-60.000 | 29.8 | 70.2 | 1019 |
| >60.000 | 38.0 | 62.0 | 387 |
| Total | 30.0 | 70.0 | 2730 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 29.9 | 70.1 | 2259 |
| Très mauvaise à moyenne | 28.8 | 71.2 | 563 |
| Total | 29.7 | 70.3 | 2822 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 21.3 | 78.7 | 1365 |
| Dans le passé | 40.2 | 59.8 | 700 |
| Modéré (< 20) | 35.1 | 64.9 | 555 |
| Gros fumeur | 35.7 | 64.3 | 241 |
| Total | 29.9 | 70.1 | 2861 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL EN SEMAINE (INDICATEUR : AL04_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMME HABITUELLEMENT | | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|------|-------|
| | DE L'ALCOOL PENDANT LA SEMAINE | | |
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 35.2 | 64.8 | 1139 |
| Femme | 24.1 | 75.9 | 1214 |
| Total | 29.4 | 70.6 | 2353 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 9.2 | 90.8 | 286 |
| 25-34 | 23.9 | 76.1 | 457 |
| 35-44 | 34.2 | 65.8 | 455 |
| 45-54 | 46.3 | 53.7 | 361 |
| 55-64 | 30.3 | 69.7 | 292 |
| 65-74 | 36.0 | 64.0 | 298 |
| 75 + | 30.7 | 69.3 | 204 |
| Total | 29.4 | 70.6 | 2353 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 9.4 | 90.6 | 113 |
| Primaire | 13.5 | 86.5 | 291 |
| Secondaire inférieur | 26.0 | 74.0 | 331 |
| Secondaire supérieur | 28.5 | 71.5 | 547 |
| Supérieur | 39.4 | 60.6 | 949 |
| Total | 29.6 | 70.4 | 2231 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 12.7 | 87.3 | 249 |
| 20.000-30.000 | 19.7 | 80.3 | 453 |
| 30.000-40.000 | 26.8 | 73.2 | 482 |
| 40.000-60.000 | 33.0 | 67.0 | 641 |
| >60.000 | 49.7 | 50.3 | 415 |
| Total | 29.3 | 70.7 | 2240 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 31.6 | 68.4 | 1653 |
| Très mauvaise à moyenne | 24.2 | 75.8 | 600 |
| Total | 29.8 | 70.2 | 2253 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 20.1 | 79.9 | 991 |
| Dans le passé | 41.9 | 58.1 | 556 |
| Modéré (< 20) | 32.0 | 68.0 | 460 |
| Gros fumeur | 37.5 | 62.5 | 277 |
| Total | 29.4 | 70.6 | 2284 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL EN SEMAINE (INDICATEUR : AL04_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMME HABITUELLEMENT | | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|------|-------|
| | DE L'ALCOOL PENDANT LA SEMAINE | | |
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 37.7 | 62.3 | 1378 |
| Femme | 20.3 | 79.7 | 1513 |
| Total | 28.9 | 71.1 | 2891 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 14.3 | 85.7 | 390 |
| 25-34 | 22.5 | 77.5 | 535 |
| 35-44 | 35.1 | 64.9 | 577 |
| 45-54 | 39.1 | 60.9 | 428 |
| 55-64 | 30.8 | 69.2 | 364 |
| 65-74 | 31.1 | 68.9 | 371 |
| 75 + | 32.8 | 67.2 | 226 |
| Total | 28.9 | 71.1 | 2891 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 14.6 | 85.4 | 99 |
| Primaire | 20.5 | 79.5 | 445 |
| Secondaire inférieur | 24.0 | 76.0 | 525 |
| Secondaire supérieur | 28.2 | 71.8 | 829 |
| Supérieur | 36.4 | 63.6 | 892 |
| Total | 29.0 | 71.0 | 2790 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 24.8 | 75.2 | 229 |
| 20.000-30.000 | 24.4 | 75.6 | 627 |
| 30.000-40.000 | 22.0 | 78.0 | 711 |
| 40.000-60.000 | 35.6 | 64.4 | 951 |
| >60.000 | 36.0 | 64.0 | 280 |
| Total | 28.9 | 71.1 | 2798 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 29.7 | 70.3 | 1940 |
| Très mauvaise à moyenne | 27.5 | 72.5 | 821 |
| Total | 29.1 | 70.9 | 2761 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 20.8 | 79.2 | 1321 |
| Dans le passé | 35.8 | 64.2 | 656 |
| Modéré (< 20) | 32.1 | 67.9 | 547 |
| Gros fumeur | 40.8 | 59.2 | 313 |
| Total | 28.8 | 71.2 | 2837 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL LE WEEK-END (INDICATEUR : AL08_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMME HABITUELLEMENT DE L'ALCOOL PENDANT LE WEEK-END | | Total |
|-----------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 67.2 | 32.8 | 3949 |
| Femme | 46.0 | 54.0 | 4167 |
| Total | 56.7 | 43.3 | 8116 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 51.4 | 48.6 | 1092 |
| 25-34 | 55.5 | 44.5 | 1562 |
| 35-44 | 63.6 | 36.4 | 1558 |
| 45-54 | 67.4 | 32.6 | 1237 |
| 55-64 | 53.0 | 47.0 | 1051 |
| 65-74 | 42.9 | 57.1 | 1009 |
| 75 + | 40.8 | 59.2 | 607 |
| Total | 56.7 | 43.3 | 8116 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 25.7 | 74.3 | 266 |
| Primaire | 42.8 | 57.2 | 1126 |
| Secondaire inférieur | 54.6 | 45.4 | 1362 |
| Secondaire supérieur | 54.3 | 45.7 | 2335 |
| Supérieur | 67.0 | 33.0 | 2696 |
| Total | 56.6 | 43.4 | 7785 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 37.6 | 62.4 | 568 |
| 20.000-30.000 | 46.8 | 53.2 | 1584 |
| 30.000-40.000 | 54.0 | 46.0 | 1901 |
| 40.000-60.000 | 61.6 | 38.4 | 2608 |
| >60.000 | 69.5 | 30.5 | 1088 |
| Total | 56.6 | 43.4 | 7749 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 60.0 | 40.0 | 5850 |
| Très mauvaise à moyenne | 46.0 | 54.0 | 1972 |
| Total | 57.0 | 43.0 | 7822 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 47.8 | 52.2 | 3670 |
| Dans le passé | 64.0 | 36.0 | 1908 |
| Modéré (< 20) | 64.9 | 35.1 | 1560 |
| Gros fumeur | 63.7 | 36.3 | 826 |
| Total | 56.7 | 43.3 | 7964 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 61.6 | 38.4 | 2896 |
| Région Bruxelloise | 47.5 | 52.5 | 2339 |
| Région Wallonne | 50.5 | 49.5 | 2881 |
| Belgique | 56.7 | 43.3 | 8116 |
| Personnes âgées de 15 ans et plus | | | |

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL LE WEEK-END (INDICATEUR : AL08_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMME HABITUELLEMENT | | Total |
|-------------------------------|---------------------------------|------|-------|
| | DE L'ALCOOL PENDANT LE WEEK-END | | |
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 72.5 | 27.5 | 1443 |
| Femme | 50.3 | 49.7 | 1453 |
| Total | 61.6 | 38.4 | 2896 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 63.3 | 36.7 | 416 |
| 25-34 | 62.0 | 38.0 | 576 |
| 35-44 | 67.1 | 32.9 | 527 |
| 45-54 | 71.2 | 28.8 | 454 |
| 55-64 | 55.1 | 44.9 | 395 |
| 65-74 | 42.6 | 57.4 | 350 |
| 75 + | 35.3 | 64.7 | 178 |
| Total | 61.6 | 38.4 | 2896 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 40.0 | 60.0 | 55 |
| Primaire | 48.0 | 52.0 | 388 |
| Secondaire inférieur | 60.4 | 39.6 | 524 |
| Secondaire supérieur | 57.9 | 42.1 | 960 |
| Supérieur | 71.5 | 28.5 | 860 |
| Total | 61.3 | 38.7 | 2787 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 40.7 | 59.3 | 95 |
| 20.000-30.000 | 53.7 | 46.3 | 514 |
| 30.000-40.000 | 61.2 | 38.8 | 713 |
| 40.000-60.000 | 62.5 | 37.5 | 1021 |
| >60.000 | 74.0 | 26.0 | 391 |
| Total | 61.7 | 38.3 | 2734 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 64.6 | 35.4 | 2269 |
| Très mauvaise à moyenne | 48.0 | 52.0 | 559 |
| Total | 61.6 | 38.4 | 2828 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 54.1 | 45.9 | 1369 |
| Dans le passé | 67.5 | 32.5 | 700 |
| Modéré (< 20) | 71.2 | 28.8 | 557 |
| Gros fumeur | 64.3 | 35.7 | 239 |
| Total | 61.6 | 38.4 | 2865 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL LE WEEK-END (INDICATEUR : AL08_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMME HABITUELLEMENT | | Total |
|-------------------------------|---------------------------------|------|-------|
| | DE L'ALCOOL PENDANT LE WEEK-END | | |
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 54.0 | 46.0 | 1127 |
| Femme | 41.6 | 58.4 | 1212 |
| Total | 47.5 | 52.5 | 2339 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 38.8 | 61.2 | 286 |
| 25-34 | 47.5 | 52.5 | 454 |
| 35-44 | 54.2 | 45.8 | 456 |
| 45-54 | 60.6 | 39.4 | 359 |
| 55-64 | 41.7 | 58.3 | 291 |
| 65-74 | 39.4 | 60.6 | 291 |
| 75 + | 40.2 | 59.8 | 202 |
| Total | 47.5 | 52.5 | 2339 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 13.3 | 86.7 | 113 |
| Primaire | 26.7 | 73.3 | 288 |
| Secondaire inférieur | 41.0 | 59.0 | 322 |
| Secondaire supérieur | 46.8 | 53.2 | 548 |
| Supérieur | 63.1 | 36.9 | 946 |
| Total | 48.3 | 51.7 | 2217 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 25.3 | 74.7 | 247 |
| 20.000-30.000 | 35.3 | 64.7 | 447 |
| 30.000-40.000 | 42.5 | 57.5 | 477 |
| 40.000-60.000 | 57.8 | 42.2 | 639 |
| >60.000 | 69.1 | 30.9 | 417 |
| Total | 47.7 | 52.3 | 2227 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 52.6 | 47.4 | 1645 |
| Très mauvaise à moyenne | 33.9 | 66.1 | 596 |
| Total | 48.0 | 52.0 | 2241 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 33.3 | 66.7 | 985 |
| Dans le passé | 59.4 | 40.6 | 554 |
| Modéré (< 20) | 58.5 | 41.5 | 456 |
| Gros fumeur | 59.8 | 40.2 | 274 |
| Total | 47.5 | 52.5 | 2269 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL LE WEEK-END (INDICATEUR : AL08_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMME HABITUELLEMENT DE L'ALCOOL PENDANT LE WEEK-END | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 61.5 | 38.5 | 1379 |
| Femme | 39.7 | 60.3 | 1502 |
| Total | 50.5 | 49.5 | 2881 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 34.8 | 65.2 | 390 |
| 25-34 | 45.6 | 54.4 | 532 |
| 35-44 | 60.1 | 39.9 | 575 |
| 45-54 | 62.2 | 37.8 | 424 |
| 55-64 | 52.4 | 47.6 | 365 |
| 65-74 | 44.5 | 55.5 | 368 |
| 75 + | 48.6 | 51.4 | 227 |
| Total | 50.5 | 49.5 | 2881 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 20.5 | 79.5 | 98 |
| Primaire | 38.7 | 61.3 | 450 |
| Secondaire inférieur | 47.5 | 52.5 | 516 |
| Secondaire supérieur | 48.3 | 51.7 | 827 |
| Supérieur | 61.1 | 38.9 | 890 |
| Total | 50.7 | 49.3 | 2781 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 41.5 | 58.5 | 226 |
| 20.000-30.000 | 40.0 | 60.0 | 623 |
| 30.000-40.000 | 45.3 | 54.7 | 711 |
| 40.000-60.000 | 60.7 | 39.3 | 948 |
| >60.000 | 56.5 | 43.5 | 280 |
| Total | 50.4 | 49.6 | 2788 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 52.7 | 47.3 | 1936 |
| Très mauvaise à moyenne | 47.1 | 52.9 | 817 |
| Total | 51.3 | 48.7 | 2753 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 40.5 | 59.5 | 1316 |
| Dans le passé | 58.5 | 41.5 | 654 |
| Modéré (< 20) | 55.9 | 44.1 | 547 |
| Gros fumeur | 64.0 | 36.0 | 313 |
| Total | 50.5 | 49.5 | 2830 |

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LA SEMAINE (en %) | | | | | | Total N |
|-------------------------------|--|--------|------------------|-----------------|------|-------|------------|
| | Faible | Bière* | Vin/* liqueur | Bière et vin | Fort | Autre | |
| SEXE | | | | | | | |
| Homme | 1.2 | 59.9 | 22.3 | 6.9 | 9.5 | .1 | 1577 |
| Femme | 1.4 | 35.5 | 52.3 | 6.7 | 4.1 | .0 | 916 |
| Total | 1.3 | 51.3 | 32.8 | 6.9 | 7.6 | .1 | 2493 |
| GROUPE AGE | | | | | | | |
| 15-24 | .4 | 72.7 | 11.8 | 6.9 | 8.2 | .0 | 131 |
| 25-34 | 1.3 | 55.5 | 28.0 | 10.4 | 4.8 | .0 | 375 |
| 35-44 | .7 | 52.0 | 35.8 | 7.3 | 4.2 | .0 | 548 |
| 45-54 | 2.4 | 45.5 | 38.4 | 7.2 | 6.2 | .4 | 499 |
| 55-64 | .9 | 47.1 | 37.0 | 3.8 | 11.1 | .0 | 392 |
| 65-74 | 1.5 | 44.1 | 31.4 | 4.8 | 18.2 | .0 | 347 |
| 75 + | .8 | 55.7 | 31.2 | 2.0 | 10.3 | .0 | 201 |
| Total | 1.3 | 51.3 | 32.8 | 6.9 | 7.6 | .1 | 2493 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 1.2 | 71.5 | 17.0 | .5 | 9.8 | .0 | 46 |
| Primaire | 6.9 | 54.8 | 22.4 | 4.3 | 10.7 | .8 | 261 |
| Secondaire inférieur | .7 | 62.8 | 18.8 | 5.3 | 12.4 | .0 | 384 |
| Secondaire supérieur | .4 | 53.9 | 33.9 | 7.1 | 4.6 | .0 | 668 |
| Supérieur | .8 | 44.3 | 39.5 | 8.2 | 7.2 | .0 | 1033 |
| Total | 1.3 | 51.5 | 32.6 | 6.9 | 7.6 | .1 | 2392 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | |
| < 20.000 | 1.1 | 62.1 | 25.0 | 4.1 | 7.7 | .0 | 126 |
| 20.000-30.000 | 1.2 | 59.2 | 27.6 | 5.7 | 6.3 | .0 | 373 |
| 30.000-40.000 | 3.7 | 53.4 | 28.6 | 6.7 | 7.0 | .4 | 531 |
| 40.000-60.000 | .7 | 51.5 | 31.9 | 7.6 | 8.2 | .0 | 879 |
| >60.000 | .1 | 43.3 | 42.9 | 6.8 | 6.9 | .0 | 478 |
| Total | 1.4 | 52.1 | 32.2 | 6.8 | 7.4 | .1 | 2387 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | .7 | 52.8 | 32.5 | 7.7 | 6.3 | .0 | 1849 |
| Très mauvaise à moyenne | 3.6 | 48.4 | 32.8 | 2.9 | 11.9 | .5 | 561 |
| Total | 1.3 | 51.9 | 32.5 | 6.7 | 7.4 | .1 | 2410 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | |
| Jamais | 2.5 | 51.0 | 36.2 | 5.8 | 4.2 | .3 | 805 |
| Dans le passé | .5 | 48.1 | 34.8 | 7.3 | 9.2 | .0 | 779 |
| Modéré (< 20) | .2 | 53.6 | 31.4 | 8.7 | 6.1 | .0 | 541 |
| Gros fumeur | 2.1 | 55.2 | 22.1 | 5.6 | 15.0 | .0 | 312 |
| Total | 1.3 | 51.3 | 32.7 | 6.9 | 7.6 | .1 | 2437 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | | |
| Région Flamande | 1.3 | 55.8 | 26.2 | 7.4 | 9.3 | .0 | 892 |
| Région Bruxelloise | .7 | 35.8 | 52.4 | 8.0 | 2.9 | .1 | 757 |
| Région Wallonne | 1.4 | 48.1 | 38.7 | 5.6 | 5.9 | .3 | 844 |
| Belgique | 1.3 | 51.3 | 32.8 | 6.9 | 7.6 | .1 | 2493 |

 Consommateurs d'alcool âgés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LA SEMAINE | | | | | Total |
|-------------------------------|---|--------|------------------|-----------------|------|-------|
| | Faible | Bière* | Vin/* liqueur | Bière et vin | Fort | N |
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 1.2 | 65.5 | 14.7 | 6.8 | 11.7 | 591 |
| Femme | 1.6 | 35.9 | 49.6 | 8.4 | 4.5 | 301 |
| Total | 1.3 | 55.8 | 26.2 | 7.4 | 9.3 | 892 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 15-24 | .0 | 74.8 | 7.2 | 4.5 | 13.5 | 58 |
| 25-34 | 1.5 | 59.0 | 23.1 | 12.8 | 3.6 | 146 |
| 35-44 | .5 | 58.6 | 28.4 | 6.9 | 5.6 | 189 |
| 45-54 | 3.0 | 50.3 | 30.5 | 8.8 | 7.5 | 175 |
| 55-64 | .9 | 49.8 | 33.6 | 2.8 | 12.9 | 154 |
| 65-74 | .6 | 44.5 | 22.5 | 5.8 | 26.6 | 119 |
| 75 + | .9 | 67.0 | 18.5 | .8 | 12.8 | 51 |
| Total | 1.3 | 55.8 | 26.2 | 7.4 | 9.3 | 892 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | .0 | 72.5 | 9.5 | .0 | 18.0 | 12 |
| Primaire | 7.3 | 53.2 | 20.4 | 4.9 | 14.2 | 107 |
| Secondaire inférieur | .8 | 66.2 | 13.6 | 3.1 | 16.3 | 154 |
| Secondaire supérieur | .0 | 58.4 | 28.4 | 7.1 | 6.0 | 260 |
| Supérieur | 1.0 | 50.7 | 30.4 | 10.2 | 7.7 | 315 |
| Total | 1.4 | 56.1 | 25.7 | 7.4 | 9.4 | 848 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | .0 | 59.9 | 25.9 | .0 | 14.2 | 27 |
| 20.000-30.000 | .8 | 61.5 | 20.1 | 7.2 | 10.5 | 127 |
| 30.000-40.000 | 3.6 | 55.4 | 24.1 | 8.6 | 8.3 | 209 |
| 40.000-60.000 | 1.2 | 57.8 | 24.3 | 7.7 | 9.0 | 327 |
| >60.000 | .0 | 54.3 | 30.3 | 6.8 | 8.6 | 156 |
| Total | 1.4 | 57.1 | 24.9 | 7.5 | 9.1 | 846 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | .6 | 57.7 | 26.5 | 8.3 | 6.9 | 714 |
| Très mauvaise à moyenne | 5.0 | 50.9 | 24.4 | 1.4 | 18.3 | 159 |
| Total | 1.4 | 56.5 | 26.2 | 7.1 | 8.9 | 873 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 3.6 | 53.3 | 33.0 | 5.0 | 5.1 | 306 |
| Dans le passé | .0 | 54.0 | 27.6 | 7.0 | 11.4 | 291 |
| Modéré (< 20) | .1 | 58.3 | 22.5 | 11.1 | 7.9 | 205 |
| Gros fumeur | 1.0 | 62.7 | 9.5 | 8.2 | 18.5 | 80 |
| Total | 1.4 | 55.7 | 26.2 | 7.4 | 9.3 | 882 |

Consommateurs d'alcool âgés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LA SEMAINE | | | | | | Total |
|-------------------------------|---|--------|------------------|-----------------|------|-------|-------|
| | Faible | Bière* | Vin/* liqueur | Bière et vin | Fort | Autre | N |
| | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | |
| Homme | .8 | 43.9 | 43.7 | 7.7 | 3.7 | .2 | 441 |
| Femme | .6 | 25.4 | 63.7 | 8.5 | 1.8 | .0 | 316 |
| Total | .7 | 35.8 | 52.4 | 8.0 | 2.9 | .1 | 757 |
| GROUPES AGE | | | | | | | |
| 15-24 | .0 | 65.0 | 27.2 | 7.8 | .0 | .0 | 26 |
| 25-34 | 1.1 | 41.9 | 42.1 | 11.9 | 3.0 | .0 | 111 |
| 35-44 | .0 | 32.9 | 53.6 | 10.1 | 3.3 | .0 | 153 |
| 45-54 | .4 | 37.2 | 55.1 | 5.0 | 2.0 | .4 | 167 |
| 55-64 | 2.2 | 31.9 | 56.6 | 6.2 | 3.2 | .0 | 108 |
| 65-74 | 1.3 | 24.1 | 62.6 | 9.1 | 2.8 | .0 | 112 |
| 75 + | .5 | 31.0 | 58.8 | 4.1 | 5.6 | .0 | 80 |
| Total | .7 | 35.8 | 52.4 | 8.0 | 2.9 | .1 | 757 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 9.7 | 43.0 | 41.0 | 4.4 | 1.9 | .0 | 13 |
| Primaire | 1.4 | 47.6 | 39.8 | 1.7 | 9.5 | .0 | 51 |
| Secondaire inférieur | 2.4 | 46.1 | 36.9 | 12.5 | 2.2 | .0 | 95 |
| Secondaire supérieur | .0 | 38.8 | 50.3 | 8.0 | 2.8 | .0 | 176 |
| Supérieur | .4 | 32.1 | 57.7 | 7.8 | 1.9 | .2 | 389 |
| Total | .8 | 36.3 | 52.3 | 8.0 | 2.5 | .1 | 724 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | |
| < 20.000 | .9 | 42.1 | 34.4 | 15.8 | 6.8 | .0 | 42 |
| 20.000-30.000 | 2.0 | 42.3 | 47.8 | 5.4 | 2.4 | .0 | 100 |
| 30.000-40.000 | 1.8 | 50.5 | 41.4 | 2.6 | 3.2 | .5 | 135 |
| 40.000-60.000 | .1 | 38.6 | 51.1 | 8.5 | 1.6 | .0 | 222 |
| >60.000 | .1 | 24.1 | 64.2 | 8.5 | 3.1 | .0 | 221 |
| Total | .8 | 36.9 | 52.1 | 7.4 | 2.8 | .1 | 720 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | .6 | 36.6 | 50.8 | 9.4 | 2.6 | .0 | 560 |
| Très mauvaise à moyenne | 1.5 | 34.2 | 56.3 | 3.2 | 4.4 | .4 | 172 |
| Total | .8 | 36.1 | 52.0 | 8.1 | 3.0 | .1 | 732 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | |
| Jamais | .2 | 32.1 | 54.1 | 10.9 | 2.8 | .0 | 223 |
| Dans le passé | 1.7 | 35.3 | 54.1 | 7.1 | 1.8 | .0 | 242 |
| Modéré (< 20) | .0 | 35.2 | 52.4 | 7.0 | 5.0 | .4 | 162 |
| Gros fumeur | .0 | 50.7 | 43.4 | 3.9 | 2.1 | .0 | 104 |
| Total | .6 | 36.6 | 52.1 | 7.8 | 2.9 | .1 | 731 |

Consommateurs d'alcool âgés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LA SEMAINE | | | | | | Total |
|-------------------------------|---|--------|------------------|-----------------|------|-------|-------|
| | Faible | Bière* | Vin/* liqueur | Bière et vin | Fort | Autre | N |
| | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | |
| Homme | 1.4 | 53.5 | 30.9 | 6.9 | 6.8 | .4 | 545 |
| Femme | 1.4 | 38.7 | 52.4 | 3.2 | 4.3 | .0 | 299 |
| Total | 1.4 | 48.1 | 38.7 | 5.6 | 5.9 | .3 | 844 |
| GROUPES AGE | | | | | | | |
| 15-24 | 1.4 | 70.2 | 17.3 | 11.1 | .0 | .0 | 47 |
| 25-34 | 1.0 | 52.7 | 33.5 | 4.7 | 8.1 | .0 | 118 |
| 35-44 | 1.2 | 46.6 | 42.7 | 7.3 | 2.2 | .0 | 206 |
| 45-54 | 1.8 | 38.5 | 48.9 | 4.8 | 4.9 | 1.1 | 157 |
| 55-64 | .5 | 45.9 | 38.8 | 5.4 | 9.5 | .0 | 130 |
| 65-74 | 2.7 | 50.2 | 32.5 | 2.2 | 12.3 | .0 | 116 |
| 75 + | .8 | 52.5 | 35.0 | 2.5 | 9.2 | .0 | 70 |
| Total | 1.4 | 48.1 | 38.7 | 5.6 | 5.9 | .3 | 844 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | |
| Pas de diplôme | .0 | 77.2 | 16.5 | .0 | 6.3 | .0 | 21 |
| Primaire | 7.1 | 59.9 | 24.0 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 103 |
| Secondaire inférieur | .0 | 60.4 | 24.3 | 7.6 | 7.7 | .0 | 135 |
| Secondaire supérieur | 1.4 | 48.9 | 40.7 | 6.7 | 2.3 | .0 | 232 |
| Supérieur | .7 | 39.0 | 46.6 | 5.2 | 8.4 | .0 | 329 |
| Total | 1.4 | 48.0 | 38.7 | 5.7 | 6.0 | .3 | 820 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | |
| < 20.000 | 1.8 | 68.5 | 22.1 | 3.9 | 3.6 | .0 | 57 |
| 20.000-30.000 | 1.6 | 60.5 | 33.1 | 3.6 | 1.2 | .0 | 146 |
| 30.000-40.000 | 4.6 | 50.1 | 34.4 | 4.0 | 5.5 | 1.3 | 187 |
| 40.000-60.000 | .2 | 43.9 | 40.5 | 7.2 | 8.3 | .0 | 330 |
| >60.000 | .2 | 25.9 | 63.1 | 5.5 | 5.2 | .0 | 101 |
| Total | 1.4 | 47.8 | 39.3 | 5.5 | 5.7 | .3 | 821 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1.0 | 48.2 | 38.7 | 6.0 | 6.1 | .0 | 575 |
| Très mauvaise à moyenne | 2.4 | 49.0 | 37.0 | 4.8 | 5.8 | 1.0 | 230 |
| Total | 1.3 | 48.4 | 38.2 | 5.7 | 6.0 | .3 | 805 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | |
| Jamais | .9 | 52.5 | 36.8 | 6.0 | 2.9 | .8 | 276 |
| Dans le passé | 1.3 | 39.6 | 43.8 | 8.1 | 7.1 | .0 | 246 |
| Modéré (< 20) | .4 | 50.3 | 41.7 | 4.6 | 2.9 | .0 | 174 |
| Gros fumeur | 3.9 | 47.5 | 31.3 | 2.9 | 14.3 | .0 | 128 |
| Total | 1.4 | 47.6 | 38.9 | 5.7 | 6.1 | .3 | 824 |

Consommateurs d'alcool agés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL11_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LE WEEK-END (en %) | | | | | Total |
|-------------------------------|---|--------|------------------|-----------------|------|-------|
| | Faible | Bière* | Vin/* liqueur | Bière et vin | Fort | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | .5 | 55.0 | 25.3 | 9.5 | 9.8 | 2515 |
| Femme | 1.1 | 26.9 | 51.9 | 10.4 | 9.7 | 1791 |
| Total | .7 | 43.6 | 36.0 | 9.8 | 9.8 | 4306 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 15-24 | .9 | 57.9 | 14.8 | 5.6 | 20.8 | 494 |
| 25-34 | .8 | 44.1 | 34.7 | 11.6 | 8.8 | 828 |
| 35-44 | .4 | 43.9 | 37.4 | 13.1 | 5.2 | 933 |
| 45-54 | .6 | 39.9 | 43.4 | 8.9 | 7.1 | 780 |
| 55-64 | .6 | 39.4 | 42.5 | 8.3 | 9.2 | 566 |
| 65-74 | 1.9 | 34.6 | 39.9 | 9.1 | 14.6 | 451 |
| 75 + | .4 | 31.2 | 52.2 | 6.7 | 9.5 | 254 |
| Total | .7 | 43.6 | 36.0 | 9.8 | 9.8 | 4306 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 1.3 | 59.3 | 17.7 | 10.2 | 11.5 | 70 |
| Primaire | 2.3 | 54.2 | 23.5 | 7.2 | 12.8 | 432 |
| Secondaire inférieur | .5 | 53.8 | 24.2 | 11.6 | 9.9 | 698 |
| Secondaire supérieur | .6 | 46.4 | 34.9 | 7.7 | 10.5 | 1211 |
| Supérieur | .6 | 34.3 | 45.1 | 11.4 | 8.5 | 1720 |
| Total | .8 | 43.6 | 36.0 | 9.9 | 9.8 | 4131 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | .9 | 46.2 | 34.2 | 9.7 | 9.0 | 202 |
| 20.000-30.000 | 1.5 | 49.2 | 27.6 | 11.2 | 10.6 | 667 |
| 30.000-40.000 | 1.0 | 49.3 | 31.0 | 9.5 | 9.1 | 952 |
| 40.000-60.000 | .6 | 44.4 | 36.6 | 8.5 | 9.8 | 1551 |
| >60.000 | .1 | 31.0 | 49.2 | 10.3 | 9.4 | 742 |
| Total | .8 | 44.0 | 36.0 | 9.5 | 9.7 | 4114 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | .6 | 44.0 | 36.2 | 9.8 | 9.3 | 3334 |
| Très mauvaise à moyenne | 1.5 | 42.9 | 36.3 | 8.4 | 10.9 | 839 |
| Total | .7 | 43.8 | 36.2 | 9.6 | 9.6 | 4173 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | .9 | 39.9 | 39.7 | 10.5 | 8.9 | 1602 |
| Dans le passé | .5 | 36.7 | 43.5 | 10.1 | 9.3 | 1173 |
| Modéré (< 20) | .8 | 51.7 | 27.8 | 10.3 | 9.5 | 940 |
| Gros fumeur | .6 | 55.0 | 22.5 | 7.2 | 14.7 | 508 |
| Total | .7 | 43.6 | 35.9 | 9.9 | 9.9 | 4223 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | |
| Région Flamande | .6 | 48.1 | 30.0 | 10.8 | 10.5 | 1733 |
| Région Bruxelloise | 1.2 | 29.0 | 53.4 | 8.8 | 7.5 | 1139 |
| Région Wallonne | .9 | 37.9 | 44.4 | 7.9 | 8.9 | 1434 |
| Belgique | .7 | 43.6 | 36.0 | 9.8 | 9.8 | 4306 |

Consommateurs d'alcool âgés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL11_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LE WEEK-END | | | | | Total |
|-------------------------------|--|--------|-------|-------|------|-------|
| | Faible | Bière* | Vin/* | Bière | Fort | N |
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | .3 | 61.5 | 18.9 | 9.6 | 9.7 | 1031 |
| Femme | 1.1 | 27.8 | 46.7 | 12.6 | 11.7 | 702 |
| Total | .6 | 48.1 | 30.0 | 10.8 | 10.5 | 1733 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 15-24 | .5 | 60.2 | 10.4 | 5.7 | 23.2 | 261 |
| 25-34 | .6 | 46.2 | 31.5 | 13.0 | 8.6 | 362 |
| 35-44 | .2 | 48.8 | 31.0 | 14.9 | 5.1 | 348 |
| 45-54 | .4 | 45.5 | 37.5 | 9.2 | 7.4 | 309 |
| 55-64 | .7 | 40.5 | 41.4 | 9.1 | 8.3 | 232 |
| 65-74 | 3.1 | 42.6 | 26.1 | 10.2 | 18.0 | 160 |
| 75 + | .0 | 46.3 | 30.6 | 10.3 | 12.8 | 61 |
| Total | .6 | 48.1 | 30.0 | 10.8 | 10.5 | 1733 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | .0 | 54.6 | 11.7 | 16.2 | 17.5 | 24 |
| Primaire | 1.7 | 57.9 | 14.8 | 8.3 | 17.3 | 173 |
| Secondaire inférieur | .5 | 59.8 | 18.5 | 11.1 | 10.1 | 300 |
| Secondaire supérieur | .4 | 47.9 | 32.3 | 8.2 | 11.2 | 554 |
| Supérieur | .6 | 40.3 | 37.2 | 13.6 | 8.2 | 606 |
| Total | .6 | 48.1 | 29.9 | 10.8 | 10.5 | 1657 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | .0 | 59.3 | 21.5 | 7.2 | 12.0 | 41 |
| 20.000-30.000 | 1.9 | 49.4 | 21.2 | 14.4 | 13.0 | 255 |
| 30.000-40.000 | .4 | 53.8 | 24.7 | 10.1 | 10.9 | 411 |
| 40.000-60.000 | .6 | 50.9 | 30.4 | 8.8 | 9.3 | 641 |
| >60.000 | .0 | 36.2 | 42.1 | 12.1 | 9.6 | 289 |
| Total | .6 | 48.7 | 29.7 | 10.6 | 10.4 | 1637 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | .5 | 48.4 | 30.9 | 10.5 | 9.6 | 1450 |
| Très mauvaise à moyenne | 1.2 | 47.4 | 26.4 | 11.3 | 13.7 | 243 |
| Total | .6 | 48.3 | 30.3 | 10.6 | 10.2 | 1693 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | .8 | 41.0 | 35.5 | 11.5 | 11.2 | 707 |
| Dans le passé | .0 | 43.9 | 37.4 | 10.1 | 8.6 | 465 |
| Modéré (< 20) | 1.0 | 58.4 | 19.5 | 11.9 | 9.2 | 389 |
| Gros fumeur | .5 | 64.9 | 10.6 | 8.6 | 15.4 | 151 |
| Total | .6 | 48.1 | 29.8 | 10.9 | 10.5 | 1712 |

Consommateurs d'alcool âgés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL11_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LE WEEK-END | | | | | Total |
|-------------------------------|--|--------|------------------|-----------------|------|-------|
| | Faible | Bière* | Vin/* liqueur | Bière et vin | Fort | N |
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 1.8 | 37.1 | 43.2 | 8.8 | 9.2 | 633 |
| Femme | .6 | 19.7 | 65.3 | 8.9 | 5.5 | 506 |
| Total | 1.2 | 29.0 | 53.4 | 8.8 | 7.5 | 1139 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 15-24 | .7 | 45.2 | 33.0 | 5.8 | 15.3 | 97 |
| 25-34 | 2.9 | 33.7 | 46.9 | 10.6 | 6.0 | 225 |
| 35-44 | .9 | 25.5 | 59.1 | 8.7 | 5.8 | 235 |
| 45-54 | .8 | 24.3 | 59.8 | 8.6 | 6.6 | 219 |
| 55-64 | 1.1 | 30.8 | 51.0 | 7.5 | 9.5 | 141 |
| 65-74 | .7 | 16.2 | 64.4 | 11.2 | 7.5 | 130 |
| 75 + | .0 | 23.8 | 64.1 | 8.1 | 4.0 | 92 |
| Total | 1.2 | 29.0 | 53.4 | 8.8 | 7.5 | 1139 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 7.1 | 42.4 | 34.6 | 10.9 | 4.9 | 16 |
| Primaire | 3.2 | 54.4 | 29.6 | 2.6 | 10.2 | 88 |
| Secondaire inférieur | 1.5 | 34.6 | 43.2 | 10.7 | 10.0 | 141 |
| Secondaire supérieur | .0 | 30.4 | 50.3 | 10.2 | 9.2 | 243 |
| Supérieur | 1.3 | 24.4 | 59.7 | 8.9 | 5.8 | 600 |
| Total | 1.2 | 29.3 | 53.2 | 9.0 | 7.3 | 1088 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | .0 | 33.9 | 42.2 | 8.4 | 15.5 | 73 |
| 20.000-30.000 | 1.3 | 39.4 | 45.7 | 6.9 | 6.7 | 158 |
| 30.000-40.000 | 2.2 | 38.1 | 44.8 | 8.4 | 6.5 | 202 |
| 40.000-60.000 | 1.6 | 26.4 | 53.3 | 9.5 | 9.1 | 360 |
| >60.000 | .6 | 19.5 | 66.6 | 8.6 | 4.7 | 295 |
| Total | 1.3 | 29.3 | 53.4 | 8.6 | 7.4 | 1088 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | .8 | 29.5 | 52.5 | 9.5 | 7.7 | 869 |
| Très mauvaise à moyenne | 2.4 | 30.1 | 53.7 | 7.0 | 6.7 | 230 |
| Total | 1.1 | 29.6 | 52.7 | 9.0 | 7.5 | 1099 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | .9 | 22.5 | 58.1 | 11.6 | 6.9 | 350 |
| Dans le passé | 2.5 | 23.1 | 59.8 | 8.3 | 6.2 | 340 |
| Modéré (< 20) | .7 | 36.7 | 47.8 | 6.0 | 8.8 | 256 |
| Gros fumeur | .2 | 40.7 | 40.5 | 8.7 | 9.9 | 156 |
| Total | 1.2 | 29.1 | 53.2 | 8.8 | 7.7 | 1102 |

Consommateurs d'alcool âgés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL11_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LE WEEK-END | | | | | Total |
|-------------------------------|--|--------|------------------|-----------------|------|-------|
| | Faible | Bière* | Vin/* liqueur | Bière et vin | Fort | N |
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | .6 | 45.0 | 34.8 | 9.2 | 10.4 | 851 |
| Femme | 1.3 | 27.2 | 59.0 | 5.9 | 6.6 | 583 |
| Total | .9 | 37.9 | 44.4 | 7.9 | 8.9 | 1434 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 15-24 | 2.3 | 54.2 | 22.9 | 5.4 | 15.1 | 136 |
| 25-34 | .4 | 42.1 | 39.2 | 8.0 | 10.3 | 241 |
| 35-44 | .7 | 38.8 | 44.9 | 10.5 | 5.1 | 350 |
| 45-54 | 1.2 | 32.0 | 51.8 | 8.3 | 6.7 | 252 |
| 55-64 | .3 | 39.4 | 42.6 | 6.6 | 11.1 | 193 |
| 65-74 | .5 | 28.2 | 52.8 | 6.8 | 11.7 | 161 |
| 75 + | 1.1 | 18.7 | 69.6 | 2.4 | 8.2 | 101 |
| Total | .9 | 37.9 | 44.4 | 7.9 | 8.9 | 1434 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 1.2 | 69.1 | 20.5 | 3.0 | 6.2 | 30 |
| Primaire | 3.4 | 45.9 | 41.5 | 5.9 | 3.2 | 171 |
| Secondaire inférieur | .4 | 44.2 | 33.3 | 12.9 | 9.3 | 257 |
| Secondaire supérieur | 1.1 | 46.0 | 38.3 | 5.8 | 8.9 | 414 |
| Supérieur | .4 | 26.3 | 55.0 | 8.1 | 10.2 | 514 |
| Total | .9 | 37.7 | 44.5 | 7.9 | 8.9 | 1386 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 1.9 | 40.4 | 40.8 | 11.8 | 5.2 | 88 |
| 20.000-30.000 | .8 | 51.4 | 35.7 | 5.6 | 6.5 | 254 |
| 30.000-40.000 | 1.9 | 42.3 | 41.4 | 8.5 | 5.9 | 339 |
| 40.000-60.000 | .5 | 35.2 | 45.6 | 7.7 | 11.1 | 550 |
| >60.000 | .3 | 18.7 | 64.4 | 4.6 | 12.1 | 158 |
| Total | .9 | 38.3 | 44.6 | 7.5 | 8.8 | 1389 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | .6 | 37.4 | 44.7 | 8.1 | 9.2 | 1015 |
| Très mauvaise à moyenne | 1.5 | 39.9 | 45.1 | 5.2 | 8.3 | 366 |
| Total | .9 | 38.0 | 44.8 | 7.4 | 9.0 | 1381 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 1.2 | 41.5 | 45.9 | 7.7 | 3.7 | 545 |
| Dans le passé | .9 | 24.2 | 52.4 | 10.5 | 12.0 | 368 |
| Modéré (< 20) | .4 | 41.3 | 40.0 | 7.8 | 10.4 | 295 |
| Gros fumeur | .9 | 44.6 | 35.0 | 4.5 | 15.0 | 201 |
| Total | .9 | 37.5 | 44.5 | 8.0 | 9.1 | 1409 |

Consommateurs d'alcool âgés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin