

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH38_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	UTILISE ACTUELLEMENT UNE METHODE DE PLANNING FAMILIAL		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Femme	56,5	43,5	2554
Total	56,5	43,5	2554
GROUPES AGE			
15-19	39,7	60,3	207
20-24	68,9	31,1	259
25-29	66,9	33,1	375
30-34	67,0	33,0	404
35-39	62,9	37,1	383
40-44	55,1	44,9	359
45-49	51,5	48,5	321
50-54	25,4	74,6	246
Total	56,5	43,5	2554
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	46,7	53,3	58
Primaire	41,9	58,1	188
Secondaire inférieur	49,2	50,8	369
Secondaire supérieur	58,7	41,3	838
Supérieur	61,7	38,3	993
Total	57,0	43,0	2446
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	50,4	49,6	206
20.000-30.000	54,3	45,7	503
30.000-40.000	52,3	47,7	515
40.000-60.000	59,5	40,5	854
>60.000	61,1	38,9	378
Total	56,5	43,5	2456
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	58,8	41,2	1972
Très mauvaise à moyenne	46,9	53,1	482
Total	56,6	43,4	2454
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	57,1	42,9	1249
Dans le passé	58,1	41,9	460
Modéré (< 20)	56,7	43,3	498
Gros fumeur	52,6	47,4	258
Total	56,8	43,2	2465
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	56,7	43,3	926
Région Bruxelloise	54,9	45,1	714
Région Wallonne	56,4	43,6	914
Belgique	56,5	43,5	2554

Femmes âgées de 15 à 54 ans

REGIO: 1 Région Flamande

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH38_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	UTILISE ACTUELLEMENT UNE METHODE DE PLANNING FAMILIAL		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Femme	56,7	43,3	926
Total	56,7	43,3	926
GROUPES AGE			
15-19	40,1	59,9	77
20-24	72,5	27,5	89
25-29	66,6	33,4	139
30-34	64,9	35,1	157
35-39	62,3	37,7	133
40-44	57,1	42,9	118
45-49	52,2	47,8	117
50-54	26,5	73,5	96
Total	56,7	43,3	926
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	57,6	42,4	11
Primaire	38,0	62,0	54
Secondaire inférieur	51,7	48,3	139
Secondaire supérieur	59,5	40,5	352
Supérieur	61,1	38,9	333
Total	57,4	42,6	889
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	58,6	41,4	24
20.000-30.000	58,6	41,4	140
30.000-40.000	48,8	51,2	201
40.000-60.000	58,5	41,5	356
>60.000	61,5	38,5	148
Total	56,9	43,1	869
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	59,0	41,0	768
Très mauvaise à moyenne	44,3	55,7	136
Total	56,7	43,3	904
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	58,4	41,6	480
Dans le passé	58,9	41,1	189
Modéré (< 20)	52,2	47,8	170
Gros fumeur	53,2	46,8	70
Total	56,9	43,1	909

Femmes âgées de 15 à 54 ans

REGIO: 2 Région Bruxelloise

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH38_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	UTILISE ACTUELLEMENT UNE METHODE DE PLANNING FAMILIAL		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Femme	54,9	45,1	714
Total	54,9	45,1	714
GROUPES AGE			
15-19	30,1	69,9	45
20-24	60,8	39,2	74
25-29	64,8	35,2	98
30-34	74,0	26,0	116
35-39	57,3	42,7	113
40-44	47,1	52,9	102
45-49	55,3	44,7	95
50-54	23,5	76,5	71
Total	54,9	45,1	714
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	33,4	66,6	30
Primaire	39,2	60,8	70
Secondaire inférieur	46,9	53,1	87
Secondaire supérieur	64,0	36,0	170
Supérieur	58,8	41,2	322
Total	55,5	44,5	679
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	47,2	52,8	94
20.000-30.000	48,4	51,6	148
30.000-40.000	60,1	39,9	118
40.000-60.000	59,8	40,2	201
>60.000	58,4	41,6	135
Total	55,0	45,0	696
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	56,8	43,2	520
Très mauvaise à moyenne	52,7	47,3	159
Total	55,9	44,1	679
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	53,8	46,2	319
Dans le passé	57,0	43,0	111
Modéré (< 20)	55,7	44,3	155
Gros fumeur	60,6	39,4	80
Total	55,7	44,3	665

Femmes âgées de 15 à 54 ans

REGIO: 3 Région Wallonne

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH38_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	UTILISE ACTUELLEMENT UNE METHODE DE PLANNING FAMILIAL		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Femme	56,4	43,6	914
Total	56,4	43,6	914
GROUPES AGE			
15-19	41,4	58,6	85
20-24	65,3	34,7	96
25-29	68,0	32,0	138
30-34	69,1	30,9	131
35-39	65,7	34,3	137
40-44	53,7	46,3	139
45-49	49,4	50,6	109
50-54	23,4	76,6	79
Total	56,4	43,6	914
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	45,8	54,2	17
Primaire	50,1	49,9	64
Secondaire inférieur	45,6	54,4	143
Secondaire supérieur	56,0	44,0	316
Supérieur	63,9	36,1	338
Total	56,6	43,4	878
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	48,2	51,8	88
20.000-30.000	51,1	48,9	215
30.000-40.000	56,4	43,6	196
40.000-60.000	61,5	38,5	297
>60.000	61,2	38,8	95
Total	56,3	43,7	891
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	58,9	41,1	684
Très mauvaise à moyenne	48,6	51,4	187
Total	56,5	43,5	871
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	55,5	44,5	450
Dans le passé	56,9	43,1	160
Modéré (< 20)	65,0	35,0	173
Gros fumeur	49,3	50,7	108
Total	56,8	43,2	891

Femmes âgées de 15 à 54 ans

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE DE METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE					Total
	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérili- sation	Méthodes naturelles ou autres	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Femme	67,2	9,3	6,2	14,5	2,8	1473
Total	67,2	9,3	6,2	14,5	2,8	1473
GROUPES AGE						
15-19	94,1	,0	5,6	,0	,3	88
20-24	89,7	2,9	5,1	,0	2,2	177
25-29	80,8	6,1	8,7	1,6	2,9	256
30-34	71,3	11,2	7,0	8,9	1,7	285
35-39	63,1	12,6	7,2	13,3	3,7	255
40-44	45,3	13,6	6,0	33,4	1,7	198
45-49	49,6	12,9	3,2	29,6	4,8	156
50-54	22,8	10,0	3,8	57,7	5,7	58
Total	67,2	9,3	6,2	14,5	2,8	1473
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	76,6	3,7	8,8	7,7	3,2	27
Primaire	54,2	16,9	,0	27,4	1,5	77
Secondaire inférieur	72,3	5,7	1,3	17,6	3,2	183
Secondaire supérieur	73,1	7,2	4,9	13,4	1,4	497
Supérieur	61,9	11,5	9,4	13,0	4,2	636
Total	67,5	9,2	6,1	14,4	2,8	1420
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	76,8	8,7	4,5	8,4	1,6	108
20.000-30.000	66,7	8,7	5,0	16,7	2,9	271
30.000-40.000	67,5	11,5	3,5	14,2	3,3	290
40.000-60.000	66,7	10,1	5,8	15,7	1,8	518
>60.000	63,6	7,8	12,1	13,8	2,7	236
Total	66,9	9,6	6,2	14,9	2,5	1423
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	68,2	8,7	6,3	14,5	2,4	1189
Très mauvaise à moyenne	59,8	12,0	6,8	17,3	4,0	234
Total	66,9	9,2	6,4	14,9	2,7	1423
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	67,6	11,0	5,4	12,7	3,3	714
Dans le passé	62,8	7,9	7,4	19,2	2,7	284
Modéré (< 20)	71,2	8,3	7,8	11,2	1,5	297
Gros fumeur	70,2	6,4	5,5	14,9	3,0	139
Total	67,5	9,4	6,3	14,0	2,8	1434
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	67,2	6,0	6,7	18,7	1,6	516
Région Bruxelloise	73,2	10,2	7,0	6,0	3,6	419
Région Wallonne	65,6	15,1	5,2	9,3	4,7	538
Belgique	67,2	9,3	6,2	14,5	2,8	1473

Femmes âgées de 15 à 54 ans utilisant une méthode de planning familial

REGIO: 1 Région Flamande

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE DE METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE					Total
	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérili- sation	Méthodes naturelles ou autres	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Femme	67,2	6,0	6,7	18,7	1,6	516
Total	67,2	6,0	6,7	18,7	1,6	516
GROUPE AGE						
15-19	96,7	,0	3,3	,0	,0	28
20-24	88,6	4,3	6,4	,0	,7	63
25-29	82,0	4,0	9,3	2,8	1,9	94
30-34	68,9	9,8	9,0	12,3	,0	105
35-39	69,1	7,7	5,3	17,0	,9	88
40-44	45,6	7,2	6,5	39,7	,9	63
45-49	49,7	4,1	5,1	35,5	5,6	54
50-54	10,8	5,1	3,0	76,6	4,5	21
Total	67,2	6,0	6,7	18,7	1,6	516
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	65,1	,0	20,1	14,8	,0	6
Primaire	47,1	7,8	,0	45,0	,0	19
Secondaire inférieur	71,8	4,4	,0	21,9	1,9	64
Secondaire supérieur	74,1	3,9	5,1	16,2	,7	211
Supérieur	61,4	8,3	10,6	17,0	2,7	200
Total	67,7	5,8	6,4	18,5	1,6	500
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	70,2	4,7	5,5	19,6	,0	13
20.000-30.000	66,2	4,8	5,2	22,3	1,5	79
30.000-40.000	67,3	5,9	5,9	19,6	1,3	101
40.000-60.000	66,1	7,9	5,7	19,8	,5	205
>60.000	67,2	5,0	10,5	15,6	1,7	89
Total	66,7	6,3	6,6	19,4	1,0	487
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	67,2	6,0	7,1	18,5	1,2	446
Très mauvaise à moyenne	60,8	5,4	4,9	24,4	4,6	58
Total	66,4	5,9	6,9	19,2	1,6	504
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	67,9	7,4	6,2	16,6	2,0	267
Dans le passé	62,8	4,4	7,3	24,0	1,5	114
Modéré (< 20)	71,4	4,6	8,1	14,5	1,4	91
Gros fumeur	71,9	5,1	6,4	16,6	,0	37
Total	67,6	6,1	6,8	17,9	1,6	509

Femmes âgées de 15 à 54 ans utilisant une méthode de planning familial

REGIO: 2 Région Bruxelloise

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE DE METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE					Total
	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérili- sation	Méthodes naturelles ou autres	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Femme	73,2	10,2	7,0	6,0	3,6	419
Total	73,2	10,2	7,0	6,0	3,6	419
GROUPES AGE						
15-19	76,9	,0	18,2	,0	4,9	20
20-24	94,0	,7	1,8	,0	3,6	48
25-29	86,1	6,2	6,1	,0	1,7	66
30-34	73,7	11,3	10,1	2,4	2,6	88
35-39	64,2	15,5	9,8	3,0	7,5	75
40-44	52,7	16,5	6,2	21,3	3,4	55
45-49	62,2	17,3	1,5	14,8	4,2	49
50-54	53,6	6,8	11,8	27,8	,0	18
Total	73,2	10,2	7,0	6,0	3,6	419
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	71,3	4,5	,0	6,6	17,5	13
Primaire	76,1	2,7	,0	8,7	12,5	31
Secondaire inférieur	85,5	4,9	2,0	7,7	,0	49
Secondaire supérieur	72,4	16,7	3,6	3,4	3,8	108
Supérieur	71,2	8,2	11,5	6,6	2,5	199
Total	73,6	9,7	7,1	6,0	3,6	400
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	76,1	10,1	5,3	6,9	1,6	51
20.000-30.000	71,6	11,3	3,2	3,7	10,2	82
30.000-40.000	79,7	9,0	1,0	7,3	3,0	70
40.000-60.000	77,0	9,5	8,8	2,4	2,3	125
>60.000	62,2	11,0	14,7	11,4	,8	84
Total	73,2	10,2	7,0	5,9	3,7	412
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	74,2	10,1	6,6	5,2	3,8	320
Très mauvaise à moyenne	71,5	10,7	8,7	8,0	1,2	82
Total	73,7	10,3	7,1	5,8	3,3	402
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	74,6	10,8	4,0	4,7	5,9	183
Dans le passé	69,2	11,1	8,5	9,1	2,1	68
Modéré (< 20)	73,5	8,6	10,7	5,0	2,1	96
Gros fumeur	79,2	12,8	5,2	2,8	,0	50
Total	74,1	10,6	6,6	5,3	3,5	397

Femmes âgées de 15 à 54 ans utilisant une méthode de planning familial

REGIO: 3 Région Wallonne

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE DE METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE					Total
	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérili- sation	Méthodes naturelles ou autres	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Femme	65,6	15,1	5,2	9,3	4,7	538
Total	65,6	15,1	5,2	9,3	4,7	538
GROUPES AGE						
15-19	92,9	,0	7,1	,0	,0	40
20-24	90,5	1,1	3,7	,0	4,8	66
25-29	77,1	9,5	8,5	,0	4,9	96
30-34	75,2	14,1	1,8	4,3	4,7	92
35-39	51,5	20,9	10,2	9,5	7,9	92
40-44	43,1	24,1	5,0	24,9	2,8	80
45-49	45,4	27,5	,4	23,2	3,5	53
50-54	42,0	23,2	3,0	21,3	10,5	19
Total	65,6	15,1	5,2	9,3	4,7	538
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	92,5	7,5	,0	,0	,0	8
Primaire	57,0	33,7	,0	9,3	,0	27
Secondaire inférieur	69,9	8,6	3,6	11,6	6,4	70
Secondaire supérieur	71,0	12,1	4,9	9,7	2,4	178
Supérieur	59,5	17,8	6,7	8,7	7,2	237
Total	65,4	15,2	5,2	9,4	4,9	520
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	80,6	10,2	3,6	3,1	2,5	44
20.000-30.000	66,1	13,3	5,2	12,6	2,8	110
30.000-40.000	65,4	19,8	,6	7,9	6,2	119
40.000-60.000	65,4	14,8	5,2	10,1	4,5	188
>60.000	52,7	15,4	15,9	8,9	7,1	63
Total	65,4	15,4	5,1	9,5	4,6	524
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	68,5	13,7	4,4	8,9	4,6	423
Très mauvaise à moyenne	55,0	20,4	8,6	11,7	4,3	94
Total	65,8	15,0	5,2	9,4	4,5	517
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	65,3	18,2	4,3	7,0	5,2	264
Dans le passé	61,1	14,9	7,4	10,9	5,7	102
Modéré (< 20)	70,1	13,5	6,3	8,5	1,5	110
Gros fumeur	64,5	5,9	4,3	17,1	8,2	52
Total	65,5	15,3	5,3	9,1	4,8	528

Femmes âgées de 15 à 54 ans utilisant une méthode de planning familial

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE ACTUELLEMENT						Total
	Pas de méthode	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérilisation	Autres	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Femme	43,7	37,9	5,2	3,5	8,2	1,6	2552
Total	43,7	37,9	5,2	3,5	8,2	1,6	2552
GROUPES AGE							
15-19	61,5	36,2	,0	2,2	,0	,1	205
20-24	31,3	61,6	2,0	3,5	,0	1,5	257
25-29	33,0	54,1	4,1	5,8	1,1	1,9	376
30-34	32,9	47,8	7,5	4,7	5,9	1,1	406
35-39	37,6	39,4	7,9	4,5	8,3	2,3	381
40-44	44,9	24,9	7,5	3,3	18,4	1,0	360
45-49	48,4	25,6	6,6	1,7	15,2	2,5	321
50-54	74,6	5,8	2,5	1,0	14,6	1,4	246
Total	43,7	37,9	5,2	3,5	8,2	1,6	2552
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	53,3	35,8	1,7	4,1	3,6	1,5	58
Primaire	58,1	22,7	7,1	,0	11,5	,6	188
Secondaire inférieur	51,1	35,4	2,8	,6	8,6	1,5	370
Secondaire supérieur	41,3	42,9	4,2	2,9	7,9	,8	840
Supérieur	38,6	38,0	7,0	5,8	8,0	2,6	989
Total	43,1	38,4	5,2	3,5	8,2	1,6	2445
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	50,0	38,4	4,4	2,2	4,2	,8	204
20.000-30.000	45,7	36,2	4,7	2,7	9,1	1,6	507
30.000-40.000	47,7	35,4	6,0	1,8	7,4	1,7	516
40.000-60.000	40,8	39,5	5,9	3,4	9,3	1,1	850
>60.000	39,0	38,8	4,8	7,4	8,4	1,6	378
Total	43,6	37,7	5,4	3,5	8,4	1,4	2455
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	41,3	40,0	5,1	3,7	8,5	1,4	1970
Très mauvaise à moyenne	53,5	27,8	5,6	3,2	8,0	1,9	481
Total	43,6	37,7	5,2	3,6	8,4	1,5	2451
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	43,2	38,4	6,2	3,1	7,2	1,9	1246
Dans le passé	41,9	36,5	4,6	4,3	11,2	1,6	460
Modéré (< 20)	43,4	40,3	4,7	4,4	6,4	,9	497
Gros fumeur	47,3	37,0	3,4	2,9	7,9	1,6	259
Total	43,4	38,2	5,3	3,6	7,9	1,6	2462
REGION DE RESIDENCE							
Région Flamande	43,4	38,0	3,4	3,8	10,6	,9	923
Région Bruxelloise	45,0	40,2	5,6	3,9	3,3	2,0	715
Région Wallonne	43,7	36,9	8,5	2,9	5,2	2,7	914
Belgique	43,7	37,9	5,2	3,5	8,2	1,6	2552

Femmes âgées de 15 à 54 ans

REGIO: 1 Région Flamande

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE ACTUELLEMENT						Total
	Pas de méthode	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérilisation	Autres	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Femme	43,4	38,0	3,4	3,8	10,6	,9	923
Total	43,4	38,0	3,4	3,8	10,6	,9	923
GROUPES AGE							
15-19	62,4	36,4	,0	1,2	,0	,0	74
20-24	27,7	64,1	3,1	4,6	,0	,5	88
25-29	33,2	54,7	2,7	6,2	1,9	1,3	140
30-34	35,1	44,8	6,3	5,8	8,0	,0	157
35-39	37,7	43,1	4,8	3,3	10,6	,5	133
40-44	42,9	26,0	4,1	3,7	22,7	,5	118
45-49	47,8	25,9	2,1	2,7	18,5	2,9	117
50-54	73,5	2,9	1,3	,8	20,3	1,2	96
Total	43,4	38,0	3,4	3,8	10,6	,9	923
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	42,4	37,5	,0	11,6	8,5	,0	11
Primaire	62,0	17,9	3,0	,0	17,1	,0	54
Secondaire inférieur	48,3	37,1	2,3	,0	11,3	1,0	139
Secondaire supérieur	40,5	44,1	2,3	3,0	9,6	,4	353
Supérieur	39,4	37,2	5,0	6,4	10,3	1,7	329
Total	42,7	38,7	3,3	3,7	10,6	,9	886
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	41,4	41,1	2,8	3,2	11,5	,0	24
20.000-30.000	41,4	38,8	2,8	3,0	13,1	,9	140
30.000-40.000	51,0	32,9	2,9	2,9	9,6	,6	202
40.000-60.000	41,8	38,5	4,6	3,3	11,5	,3	354
>60.000	38,6	41,3	3,1	6,5	9,6	1,0	147
Total	43,2	37,9	3,6	3,7	11,0	,6	867
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	41,2	39,5	3,5	4,2	10,9	,7	765
Très mauvaise à moyenne	55,7	26,9	2,4	2,2	10,8	2,0	136
Total	43,5	37,5	3,4	3,9	10,9	,9	901
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	42,0	39,4	4,3	3,6	9,6	1,1	476
Dans le passé	41,1	37,0	2,6	4,3	14,1	,9	189
Modéré (< 20)	47,8	37,3	2,4	4,3	7,6	,7	170
Gros fumeur	46,5	38,5	2,7	3,4	8,9	,0	71
Total	43,2	38,4	3,4	3,9	10,2	,9	906

Femmes âgées de 15 à 54 ans

REGIO: 2 Région Bruxelloise

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE ACTUELLEMENT						Total
	Pas de méthode	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérilisation	Autres	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Femme	45,0	40,2	5,6	3,9	3,3	2,0	715
Total	45,0	40,2	5,6	3,9	3,3	2,0	715
GROUPES AGE							
15-19	69,9	23,1	,0	5,5	,0	1,5	45
20-24	39,2	57,1	,4	1,1	,0	2,2	74
25-29	35,2	55,8	4,0	3,9	,0	1,1	98
30-34	25,8	54,7	8,4	7,5	1,8	1,9	117
35-39	42,7	36,7	8,9	5,6	1,7	4,3	113
40-44	52,9	24,8	7,8	2,9	10,0	1,6	102
45-49	44,7	34,4	9,6	,8	8,2	2,3	95
50-54	76,5	12,6	1,6	2,8	6,5	,0	71
Total	45,0	40,2	5,6	3,9	3,3	2,0	715
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	66,6	23,8	1,5	,0	2,2	5,9	30
Primaire	60,8	29,8	1,1	,0	3,4	4,9	70
Secondaire inférieur	53,1	40,1	2,3	,9	3,6	,0	87
Secondaire supérieur	36,0	46,3	10,7	2,3	2,2	2,5	170
Supérieur	41,1	41,9	4,8	6,8	3,9	1,5	323
Total	44,5	40,9	5,4	4,0	3,3	2,0	680
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	52,8	36,0	4,8	2,5	3,3	,8	94
20.000-30.000	51,6	34,7	5,4	1,5	1,8	5,0	148
30.000-40.000	39,9	47,9	5,4	,6	4,4	1,8	118
40.000-60.000	40,2	46,1	5,7	5,2	1,5	1,4	201
>60.000	41,4	36,5	6,4	8,6	6,7	,5	136
Total	44,9	40,3	5,6	3,9	3,3	2,0	697
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	43,1	42,2	5,8	3,8	2,9	2,2	521
Très mauvaise à moyenne	47,3	37,7	5,6	4,6	4,2	,6	159
Total	44,0	41,2	5,7	3,9	3,2	1,8	680
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	46,2	40,2	5,8	2,2	2,5	3,2	319
Dans le passé	42,7	39,6	6,4	4,9	5,2	1,2	112
Modéré (< 20)	44,3	41,0	4,8	5,9	2,8	1,2	155
Gros fumeur	39,4	48,0	7,7	3,1	1,7	,0	80
Total	44,3	41,3	5,9	3,7	2,9	2,0	666

Femmes âgées de 15 à 54 ans

REGIO: 3 Région Wallonne

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE ACTUELLEMENT						Total
	Pas de méthode	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérilisation	Autres	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Femme	43,7	36,9	8,5	2,9	5,2	2,7	914
Total	43,7	36,9	8,5	2,9	5,2	2,7	914
GROUPES AGE							
15-19	58,1	39,0	,0	3,0	,0	,0	86
20-24	35,0	58,8	,7	2,4	,0	3,1	95
25-29	32,0	52,4	6,4	5,8	,0	3,4	138
30-34	30,7	52,1	9,7	1,3	3,0	3,2	132
35-39	35,6	33,1	13,5	6,6	6,1	5,1	135
40-44	46,3	23,2	13,0	2,7	13,4	1,5	140
45-49	50,5	22,5	13,6	,2	11,5	1,7	109
50-54	76,6	9,8	5,4	,7	5,0	2,5	79
Total	43,7	36,9	8,5	2,9	5,2	2,7	914
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	54,2	42,3	3,4	,0	,0	,0	17
Primaire	49,9	28,6	16,9	,0	4,6	,0	64
Secondaire inférieur	55,3	31,3	3,8	1,6	5,2	2,9	144
Secondaire supérieur	43,9	39,8	6,8	2,7	5,4	1,3	317
Supérieur	36,3	37,9	11,3	4,3	5,6	4,6	337
Total	43,5	36,9	8,6	2,9	5,3	2,7	879
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	52,4	38,4	4,9	1,7	1,5	1,2	86
20.000-30.000	49,0	33,7	6,8	2,7	6,4	1,4	219
30.000-40.000	43,6	36,9	11,2	,3	4,5	3,5	196
40.000-60.000	38,8	40,0	9,0	3,2	6,2	2,8	295
>60.000	38,8	32,3	9,4	9,7	5,4	4,4	95
Total	43,9	36,7	8,6	2,9	5,3	2,6	891
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	41,1	40,3	8,1	2,6	5,2	2,7	684
Très mauvaise à moyenne	52,6	26,1	9,7	4,1	5,5	2,0	186
Total	43,7	37,0	8,4	2,9	5,3	2,5	870
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	44,8	36,0	10,0	2,4	3,9	2,9	451
Dans le passé	43,3	34,7	8,4	4,2	6,2	3,2	159
Modéré (< 20)	35,2	45,4	8,7	4,1	5,5	1,0	172
Gros fumeur	50,7	31,8	2,9	2,1	8,4	4,0	108
Total	43,4	37,1	8,7	3,0	5,1	2,7	890

Femmes âgées de 15 à 54 ans