

## UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH38\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	UTILISE ACTUELLEMENT UNE METHODE DE PLANNING FAMILIAL		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Femme	56,5	43,5	2554
Total	56,5	43,5	2554
<b>GROUPE AGE</b>			
15-19	39,7	60,3	207
20-24	68,9	31,1	259
25-29	66,9	33,1	375
30-34	67,0	33,0	404
35-39	62,9	37,1	383
40-44	55,1	44,9	359
45-49	51,5	48,5	321
50-54	25,4	74,6	246
Total	56,5	43,5	2554
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	46,7	53,3	58
Primaire	41,9	58,1	188
Secondaire inférieur	49,2	50,8	369
Secondaire supérieur	58,7	41,3	838
Supérieur	61,7	38,3	993
Total	57,0	43,0	2446
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	50,4	49,6	206
20.000-30.000	54,3	45,7	503
30.000-40.000	52,3	47,7	515
40.000-60.000	59,5	40,5	854
>60.000	61,1	38,9	378
Total	56,5	43,5	2456
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	58,8	41,2	1972
Très mauvaise à moyenne	46,9	53,1	482
Total	56,6	43,4	2454
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	57,1	42,9	1249
Dans le passé	58,1	41,9	460
Modéré (< 20)	56,7	43,3	498
Gros fumeur	52,6	47,4	258
Total	56,8	43,2	2465
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	56,7	43,3	926
Région Bruxelloise	54,9	45,1	714
Région Wallonne	56,4	43,6	914
Belgique	56,5	43,5	2554

Femmes âgées de 15 à 54 ans



REGIO: 1 Région Flamande

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH38\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	UTILISE ACTUELLEMENT UNE METHODE DE PLANNING FAMILIAL		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Femme	56,7	43,3	926
Total	56,7	43,3	926
<b>GROUPES AGE</b>			
15-19	40,1	59,9	77
20-24	72,5	27,5	89
25-29	66,6	33,4	139
30-34	64,9	35,1	157
35-39	62,3	37,7	133
40-44	57,1	42,9	118
45-49	52,2	47,8	117
50-54	26,5	73,5	96
Total	56,7	43,3	926
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	57,6	42,4	11
Primaire	38,0	62,0	54
Secondaire inférieur	51,7	48,3	139
Secondaire supérieur	59,5	40,5	352
Supérieur	61,1	38,9	333
Total	57,4	42,6	889
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	58,6	41,4	24
20.000-30.000	58,6	41,4	140
30.000-40.000	48,8	51,2	201
40.000-60.000	58,5	41,5	356
>60.000	61,5	38,5	148
Total	56,9	43,1	869
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	59,0	41,0	768
Très mauvaise à moyenne	44,3	55,7	136
Total	56,7	43,3	904
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	58,4	41,6	480
Dans le passé	58,9	41,1	189
Modéré (< 20)	52,2	47,8	170
Gros fumeur	53,2	46,8	70
Total	56,9	43,1	909

Femmes âgées de 15 à 54 ans

REGIO: 2 Région Bruxelloise

UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH38\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	UTILISE ACTUELLEMENT UNE METHODE DE PLANNING FAMILIAL		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Femme	54,9	45,1	714
Total	54,9	45,1	714
<b>GROUPES AGE</b>			
15-19	30,1	69,9	45
20-24	60,8	39,2	74
25-29	64,8	35,2	98
30-34	74,0	26,0	116
35-39	57,3	42,7	113
40-44	47,1	52,9	102
45-49	55,3	44,7	95
50-54	23,5	76,5	71
Total	54,9	45,1	714
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	33,4	66,6	30
Primaire	39,2	60,8	70
Secondaire inférieur	46,9	53,1	87
Secondaire supérieur	64,0	36,0	170
Supérieur	58,8	41,2	322
Total	55,5	44,5	679
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	47,2	52,8	94
20.000-30.000	48,4	51,6	148
30.000-40.000	60,1	39,9	118
40.000-60.000	59,8	40,2	201
>60.000	58,4	41,6	135
Total	55,0	45,0	696
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	56,8	43,2	520
Très mauvaise à moyenne	52,7	47,3	159
Total	55,9	44,1	679
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	53,8	46,2	319
Dans le passé	57,0	43,0	111
Modéré (< 20)	55,7	44,3	155
Gros fumeur	60,6	39,4	80
Total	55,7	44,3	665

Femmes âgées de 15 à 54 ans

REGIO: 3 Région Wallonne

## UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH38\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	UTILISE ACTUELLEMENT UNE METHODE DE PLANNING FAMILIAL		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Femme	56,4	43,6	914
Total	56,4	43,6	914
<b>GROUPES AGE</b>			
15-19	41,4	58,6	85
20-24	65,3	34,7	96
25-29	68,0	32,0	138
30-34	69,1	30,9	131
35-39	65,7	34,3	137
40-44	53,7	46,3	139
45-49	49,4	50,6	109
50-54	23,4	76,6	79
Total	56,4	43,6	914
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	45,8	54,2	17
Primaire	50,1	49,9	64
Secondaire inférieur	45,6	54,4	143
Secondaire supérieur	56,0	44,0	316
Supérieur	63,9	36,1	338
Total	56,6	43,4	878
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	48,2	51,8	88
20.000-30.000	51,1	48,9	215
30.000-40.000	56,4	43,6	196
40.000-60.000	61,5	38,5	297
>60.000	61,2	38,8	95
Total	56,3	43,7	891
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	58,9	41,1	684
Très mauvaise à moyenne	48,6	51,4	187
Total	56,5	43,5	871
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	55,5	44,5	450
Dans le passé	56,9	43,1	160
Modéré (< 20)	65,0	35,0	173
Gros fumeur	49,3	50,7	108
Total	56,8	43,2	891

Femmes âgées de 15 à 54 ans

## UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE DE METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE					Total
	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérili- sation	Méthodes naturelles ou autres	N
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Femme	67,2	9,3	6,2	14,5	2,8	1473
Total	67,2	9,3	6,2	14,5	2,8	1473
<b>GROUPES AGE</b>						
15-19	94,1	,0	5,6	,0	,3	88
20-24	89,7	2,9	5,1	,0	2,2	177
25-29	80,8	6,1	8,7	1,6	2,9	256
30-34	71,3	11,2	7,0	8,9	1,7	285
35-39	63,1	12,6	7,2	13,3	3,7	255
40-44	45,3	13,6	6,0	33,4	1,7	198
45-49	49,6	12,9	3,2	29,6	4,8	156
50-54	22,8	10,0	3,8	57,7	5,7	58
Total	67,2	9,3	6,2	14,5	2,8	1473
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	76,6	3,7	8,8	7,7	3,2	27
Primaire	54,2	16,9	,0	27,4	1,5	77
Secondaire inférieur	72,3	5,7	1,3	17,6	3,2	183
Secondaire supérieur	73,1	7,2	4,9	13,4	1,4	497
Supérieur	61,9	11,5	9,4	13,0	4,2	636
Total	67,5	9,2	6,1	14,4	2,8	1420
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	76,8	8,7	4,5	8,4	1,6	108
20.000-30.000	66,7	8,7	5,0	16,7	2,9	271
30.000-40.000	67,5	11,5	3,5	14,2	3,3	290
40.000-60.000	66,7	10,1	5,8	15,7	1,8	518
>60.000	63,6	7,8	12,1	13,8	2,7	236
Total	66,9	9,6	6,2	14,9	2,5	1423
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	68,2	8,7	6,3	14,5	2,4	1189
Très mauvaise à moyenne	59,8	12,0	6,8	17,3	4,0	234
Total	66,9	9,2	6,4	14,9	2,7	1423
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>						
Jamais	67,6	11,0	5,4	12,7	3,3	714
Dans le passé	62,8	7,9	7,4	19,2	2,7	284
Modéré (< 20)	71,2	8,3	7,8	11,2	1,5	297
Gros fumeur	70,2	6,4	5,5	14,9	3,0	139
Total	67,5	9,4	6,3	14,0	2,8	1434
<b>REGION DE RESIDENCE</b>						
Région Flamande	67,2	6,0	6,7	18,7	1,6	516
Région Bruxelloise	73,2	10,2	7,0	6,0	3,6	419
Région Wallonne	65,6	15,1	5,2	9,3	4,7	538
Belgique	67,2	9,3	6,2	14,5	2,8	1473

Femmes âgées de 15 à 54 ans utilisant une méthode de planning familial



REGIO: 1 Région Flamande

## UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE DE METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE					Total
	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérili- sation	Méthodes naturelles ou autres	N
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Femme	67,2	6,0	6,7	18,7	1,6	516
Total	67,2	6,0	6,7	18,7	1,6	516
<b>GROUPES AGE</b>						
15-19	96,7	,0	3,3	,0	,0	28
20-24	88,6	4,3	6,4	,0	,7	63
25-29	82,0	4,0	9,3	2,8	1,9	94
30-34	68,9	9,8	9,0	12,3	,0	105
35-39	69,1	7,7	5,3	17,0	,9	88
40-44	45,6	7,2	6,5	39,7	,9	63
45-49	49,7	4,1	5,1	35,5	5,6	54
50-54	10,8	5,1	3,0	76,6	4,5	21
Total	67,2	6,0	6,7	18,7	1,6	516
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	65,1	,0	20,1	14,8	,0	6
Primaire	47,1	7,8	,0	45,0	,0	19
Secondaire inférieur	71,8	4,4	,0	21,9	1,9	64
Secondaire supérieur	74,1	3,9	5,1	16,2	,7	211
Supérieur	61,4	8,3	10,6	17,0	2,7	200
Total	67,7	5,8	6,4	18,5	1,6	500
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	70,2	4,7	5,5	19,6	,0	13
20.000-30.000	66,2	4,8	5,2	22,3	1,5	79
30.000-40.000	67,3	5,9	5,9	19,6	1,3	101
40.000-60.000	66,1	7,9	5,7	19,8	,5	205
>60.000	67,2	5,0	10,5	15,6	1,7	89
Total	66,7	6,3	6,6	19,4	1,0	487
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	67,2	6,0	7,1	18,5	1,2	446
Très mauvaise à moyenne	60,8	5,4	4,9	24,4	4,6	58
Total	66,4	5,9	6,9	19,2	1,6	504
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>						
Jamais	67,9	7,4	6,2	16,6	2,0	267
Dans le passé	62,8	4,4	7,3	24,0	1,5	114
Modéré (< 20)	71,4	4,6	8,1	14,5	1,4	91
Gros fumeur	71,9	5,1	6,4	16,6	,0	37
Total	67,6	6,1	6,8	17,9	1,6	509

Femmes âgées de 15 à 54 ans utilisant une méthode de planning familial



REGIO: 2 Région Bruxelloise

## UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE DE METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE					Total
	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérili- sation	Méthodes naturelles ou autres	N
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Femme	73,2	10,2	7,0	6,0	3,6	419
Total	73,2	10,2	7,0	6,0	3,6	419
<b>GROUPES AGE</b>						
15-19	76,9	,0	18,2	,0	4,9	20
20-24	94,0	,7	1,8	,0	3,6	48
25-29	86,1	6,2	6,1	,0	1,7	66
30-34	73,7	11,3	10,1	2,4	2,6	88
35-39	64,2	15,5	9,8	3,0	7,5	75
40-44	52,7	16,5	6,2	21,3	3,4	55
45-49	62,2	17,3	1,5	14,8	4,2	49
50-54	53,6	6,8	11,8	27,8	,0	18
Total	73,2	10,2	7,0	6,0	3,6	419
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	71,3	4,5	,0	6,6	17,5	13
Primaire	76,1	2,7	,0	8,7	12,5	31
Secondaire inférieur	85,5	4,9	2,0	7,7	,0	49
Secondaire supérieur	72,4	16,7	3,6	3,4	3,8	108
Supérieur	71,2	8,2	11,5	6,6	2,5	199
Total	73,6	9,7	7,1	6,0	3,6	400
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	76,1	10,1	5,3	6,9	1,6	51
20.000-30.000	71,6	11,3	3,2	3,7	10,2	82
30.000-40.000	79,7	9,0	1,0	7,3	3,0	70
40.000-60.000	77,0	9,5	8,8	2,4	2,3	125
>60.000	62,2	11,0	14,7	11,4	,8	84
Total	73,2	10,2	7,0	5,9	3,7	412
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	74,2	10,1	6,6	5,2	3,8	320
Très mauvaise à moyenne	71,5	10,7	8,7	8,0	1,2	82
Total	73,7	10,3	7,1	5,8	3,3	402
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>						
Jamais	74,6	10,8	4,0	4,7	5,9	183
Dans le passé	69,2	11,1	8,5	9,1	2,1	68
Modéré (< 20)	73,5	8,6	10,7	5,0	2,1	96
Gros fumeur	79,2	12,8	5,2	2,8	,0	50
Total	74,1	10,6	6,6	5,3	3,5	397

Femmes âgées de 15 à 54 ans utilisant une méthode de planning familial

REGIO: 3 Région Wallonne

## UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE DE METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE					Total
	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérili- sation	Méthodes naturelles ou autres	N
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Femme	65,6	15,1	5,2	9,3	4,7	538
Total	65,6	15,1	5,2	9,3	4,7	538
<b>GROUPES AGE</b>						
15-19	92,9	,0	7,1	,0	,0	40
20-24	90,5	1,1	3,7	,0	4,8	66
25-29	77,1	9,5	8,5	,0	4,9	96
30-34	75,2	14,1	1,8	4,3	4,7	92
35-39	51,5	20,9	10,2	9,5	7,9	92
40-44	43,1	24,1	5,0	24,9	2,8	80
45-49	45,4	27,5	,4	23,2	3,5	53
50-54	42,0	23,2	3,0	21,3	10,5	19
Total	65,6	15,1	5,2	9,3	4,7	538
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	92,5	7,5	,0	,0	,0	8
Primaire	57,0	33,7	,0	9,3	,0	27
Secondaire inférieur	69,9	8,6	3,6	11,6	6,4	70
Secondaire supérieur	71,0	12,1	4,9	9,7	2,4	178
Supérieur	59,5	17,8	6,7	8,7	7,2	237
Total	65,4	15,2	5,2	9,4	4,9	520
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	80,6	10,2	3,6	3,1	2,5	44
20.000-30.000	66,1	13,3	5,2	12,6	2,8	110
30.000-40.000	65,4	19,8	,6	7,9	6,2	119
40.000-60.000	65,4	14,8	5,2	10,1	4,5	188
>60.000	52,7	15,4	15,9	8,9	7,1	63
Total	65,4	15,4	5,1	9,5	4,6	524
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	68,5	13,7	4,4	8,9	4,6	423
Très mauvaise à moyenne	55,0	20,4	8,6	11,7	4,3	94
Total	65,8	15,0	5,2	9,4	4,5	517
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>						
Jamais	65,3	18,2	4,3	7,0	5,2	264
Dans le passé	61,1	14,9	7,4	10,9	5,7	102
Modéré (< 20)	70,1	13,5	6,3	8,5	1,5	110
Gros fumeur	64,5	5,9	4,3	17,1	8,2	52
Total	65,5	15,3	5,3	9,1	4,8	528

Femmes âgées de 15 à 54 ans utilisant une méthode de planning familial

## UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE ACTUELLEMENT						Total
	Pas de méthode	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérilisation	Autres	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Femme	43,7	37,9	5,2	3,5	8,2	1,6	2552
Total	43,7	37,9	5,2	3,5	8,2	1,6	2552
<b>GROUPES AGE</b>							
15-19	61,5	36,2	,0	2,2	,0	,1	205
20-24	31,3	61,6	2,0	3,5	,0	1,5	257
25-29	33,0	54,1	4,1	5,8	1,1	1,9	376
30-34	32,9	47,8	7,5	4,7	5,9	1,1	406
35-39	37,6	39,4	7,9	4,5	8,3	2,3	381
40-44	44,9	24,9	7,5	3,3	18,4	1,0	360
45-49	48,4	25,6	6,6	1,7	15,2	2,5	321
50-54	74,6	5,8	2,5	1,0	14,6	1,4	246
Total	43,7	37,9	5,2	3,5	8,2	1,6	2552
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	53,3	35,8	1,7	4,1	3,6	1,5	58
Primaire	58,1	22,7	7,1	,0	11,5	,6	188
Secondaire inférieur	51,1	35,4	2,8	,6	8,6	1,5	370
Secondaire supérieur	41,3	42,9	4,2	2,9	7,9	,8	840
Supérieur	38,6	38,0	7,0	5,8	8,0	2,6	989
Total	43,1	38,4	5,2	3,5	8,2	1,6	2445
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	50,0	38,4	4,4	2,2	4,2	,8	204
20.000-30.000	45,7	36,2	4,7	2,7	9,1	1,6	507
30.000-40.000	47,7	35,4	6,0	1,8	7,4	1,7	516
40.000-60.000	40,8	39,5	5,9	3,4	9,3	1,1	850
>60.000	39,0	38,8	4,8	7,4	8,4	1,6	378
Total	43,6	37,7	5,4	3,5	8,4	1,4	2455
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	41,3	40,0	5,1	3,7	8,5	1,4	1970
Très mauvaise à moyenne	53,5	27,8	5,6	3,2	8,0	1,9	481
Total	43,6	37,7	5,2	3,6	8,4	1,5	2451
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	43,2	38,4	6,2	3,1	7,2	1,9	1246
Dans le passé	41,9	36,5	4,6	4,3	11,2	1,6	460
Modéré (< 20)	43,4	40,3	4,7	4,4	6,4	,9	497
Gros fumeur	47,3	37,0	3,4	2,9	7,9	1,6	259
Total	43,4	38,2	5,3	3,6	7,9	1,6	2462
<b>REGION DE RESIDENCE</b>							
Région Flamande	43,4	38,0	3,4	3,8	10,6	,9	923
Région Bruxelloise	45,0	40,2	5,6	3,9	3,3	2,0	715
Région Wallonne	43,7	36,9	8,5	2,9	5,2	2,7	914
Belgique	43,7	37,9	5,2	3,5	8,2	1,6	2552

Femmes âgées de 15 à 54 ans

REGIO: 1 Région Flamande

## UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE ACTUELLEMENT						Total
	Pas de méthode	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérilisation	Autres	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Femme	43,4	38,0	3,4	3,8	10,6	,9	923
Total	43,4	38,0	3,4	3,8	10,6	,9	923
<b>GROUPES AGE</b>							
15-19	62,4	36,4	,0	1,2	,0	,0	74
20-24	27,7	64,1	3,1	4,6	,0	,5	88
25-29	33,2	54,7	2,7	6,2	1,9	1,3	140
30-34	35,1	44,8	6,3	5,8	8,0	,0	157
35-39	37,7	43,1	4,8	3,3	10,6	,5	133
40-44	42,9	26,0	4,1	3,7	22,7	,5	118
45-49	47,8	25,9	2,1	2,7	18,5	2,9	117
50-54	73,5	2,9	1,3	,8	20,3	1,2	96
Total	43,4	38,0	3,4	3,8	10,6	,9	923
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	42,4	37,5	,0	11,6	8,5	,0	11
Primaire	62,0	17,9	3,0	,0	17,1	,0	54
Secondaire inférieur	48,3	37,1	2,3	,0	11,3	1,0	139
Secondaire supérieur	40,5	44,1	2,3	3,0	9,6	,4	353
Supérieur	39,4	37,2	5,0	6,4	10,3	1,7	329
Total	42,7	38,7	3,3	3,7	10,6	,9	886
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	41,4	41,1	2,8	3,2	11,5	,0	24
20.000-30.000	41,4	38,8	2,8	3,0	13,1	,9	140
30.000-40.000	51,0	32,9	2,9	2,9	9,6	,6	202
40.000-60.000	41,8	38,5	4,6	3,3	11,5	,3	354
>60.000	38,6	41,3	3,1	6,5	9,6	1,0	147
Total	43,2	37,9	3,6	3,7	11,0	,6	867
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	41,2	39,5	3,5	4,2	10,9	,7	765
Très mauvaise à moyenne	55,7	26,9	2,4	2,2	10,8	2,0	136
Total	43,5	37,5	3,4	3,9	10,9	,9	901
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	42,0	39,4	4,3	3,6	9,6	1,1	476
Dans le passé	41,1	37,0	2,6	4,3	14,1	,9	189
Modéré (< 20)	47,8	37,3	2,4	4,3	7,6	,7	170
Gros fumeur	46,5	38,5	2,7	3,4	8,9	,0	71
Total	43,2	38,4	3,4	3,9	10,2	,9	906

Femmes âgées de 15 à 54 ans

REGIO: 2 Région Bruxelloise

## UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE ACTUELLEMENT						Total
	Pas de méthode	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérilisation	Autres	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Femme	45,0	40,2	5,6	3,9	3,3	2,0	715
Total	45,0	40,2	5,6	3,9	3,3	2,0	715
<b>GROUPES AGE</b>							
15-19	69,9	23,1	,0	5,5	,0	1,5	45
20-24	39,2	57,1	,4	1,1	,0	2,2	74
25-29	35,2	55,8	4,0	3,9	,0	1,1	98
30-34	25,8	54,7	8,4	7,5	1,8	1,9	117
35-39	42,7	36,7	8,9	5,6	1,7	4,3	113
40-44	52,9	24,8	7,8	2,9	10,0	1,6	102
45-49	44,7	34,4	9,6	,8	8,2	2,3	95
50-54	76,5	12,6	1,6	2,8	6,5	,0	71
Total	45,0	40,2	5,6	3,9	3,3	2,0	715
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	66,6	23,8	1,5	,0	2,2	5,9	30
Primaire	60,8	29,8	1,1	,0	3,4	4,9	70
Secondaire inférieur	53,1	40,1	2,3	,9	3,6	,0	87
Secondaire supérieur	36,0	46,3	10,7	2,3	2,2	2,5	170
Supérieur	41,1	41,9	4,8	6,8	3,9	1,5	323
Total	44,5	40,9	5,4	4,0	3,3	2,0	680
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	52,8	36,0	4,8	2,5	3,3	,8	94
20.000-30.000	51,6	34,7	5,4	1,5	1,8	5,0	148
30.000-40.000	39,9	47,9	5,4	,6	4,4	1,8	118
40.000-60.000	40,2	46,1	5,7	5,2	1,5	1,4	201
>60.000	41,4	36,5	6,4	8,6	6,7	,5	136
Total	44,9	40,3	5,6	3,9	3,3	2,0	697
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	43,1	42,2	5,8	3,8	2,9	2,2	521
Très mauvaise à moyenne	47,3	37,7	5,6	4,6	4,2	,6	159
Total	44,0	41,2	5,7	3,9	3,2	1,8	680
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	46,2	40,2	5,8	2,2	2,5	3,2	319
Dans le passé	42,7	39,6	6,4	4,9	5,2	1,2	112
Modéré (< 20)	44,3	41,0	4,8	5,9	2,8	1,2	155
Gros fumeur	39,4	48,0	7,7	3,1	1,7	,0	80
Total	44,3	41,3	5,9	3,7	2,9	2,0	666

Femmes âgées de 15 à 54 ans

REGIO: 3 Région Wallonne

## UTILISATION DE METHODES DE CONTRACEPTION (INDICATEUR : MCH39\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	METHODE DE PLANNING FAMILIAL UTILISEE ACTUELLEMENT						Total
	Pas de méthode	Pillule	Stérilet	Méthodes de barrière	Stérilisation	Autres	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Femme	43,7	36,9	8,5	2,9	5,2	2,7	914
Total	43,7	36,9	8,5	2,9	5,2	2,7	914
<b>GROUPES AGE</b>							
15-19	58,1	39,0	,0	3,0	,0	,0	86
20-24	35,0	58,8	,7	2,4	,0	3,1	95
25-29	32,0	52,4	6,4	5,8	,0	3,4	138
30-34	30,7	52,1	9,7	1,3	3,0	3,2	132
35-39	35,6	33,1	13,5	6,6	6,1	5,1	135
40-44	46,3	23,2	13,0	2,7	13,4	1,5	140
45-49	50,5	22,5	13,6	,2	11,5	1,7	109
50-54	76,6	9,8	5,4	,7	5,0	2,5	79
Total	43,7	36,9	8,5	2,9	5,2	2,7	914
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	54,2	42,3	3,4	,0	,0	,0	17
Primaire	49,9	28,6	16,9	,0	4,6	,0	64
Secondaire inférieur	55,3	31,3	3,8	1,6	5,2	2,9	144
Secondaire supérieur	43,9	39,8	6,8	2,7	5,4	1,3	317
Supérieur	36,3	37,9	11,3	4,3	5,6	4,6	337
Total	43,5	36,9	8,6	2,9	5,3	2,7	879
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	52,4	38,4	4,9	1,7	1,5	1,2	86
20.000-30.000	49,0	33,7	6,8	2,7	6,4	1,4	219
30.000-40.000	43,6	36,9	11,2	,3	4,5	3,5	196
40.000-60.000	38,8	40,0	9,0	3,2	6,2	2,8	295
>60.000	38,8	32,3	9,4	9,7	5,4	4,4	95
Total	43,9	36,7	8,6	2,9	5,3	2,6	891
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	41,1	40,3	8,1	2,6	5,2	2,7	684
Très mauvaise à moyenne	52,6	26,1	9,7	4,1	5,5	2,0	186
Total	43,7	37,0	8,4	2,9	5,3	2,5	870
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	44,8	36,0	10,0	2,4	3,9	2,9	451
Dans le passé	43,3	34,7	8,4	4,2	6,2	3,2	159
Modéré (< 20)	35,2	45,4	8,7	4,1	5,5	1,0	172
Gros fumeur	50,7	31,8	2,9	2,1	8,4	4,0	108
Total	43,4	37,1	8,7	3,0	5,1	2,7	890

Femmes âgées de 15 à 54 ans