

5.2. Etat de Santé

5.2.1. Hygiène dentaire

5.2.1.1. Résumé

Dans l'Enquête de Santé, dans le but d'évaluer à long terme les conséquences des caries dentaires et des pathologies des gencives, on a étudié le fait de ne plus posséder ses propres dents d'une part, et l'emploi d'un dentier (prothèse dentaire complète supérieure et inférieure) ou d'une prothèse partielle d'autre part.

- En Belgique, 11% de la population déclare ne plus avoir aucune dent, 9% de la population a une prothèse dentaire complète (supérieure et inférieure) et 24% a une prothèse dentaire partielle.
- En ce qui concerne le fait de posséder sa dentition, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Les femmes ont cependant plus souvent une prothèse dentaire partielle que les hommes.
- Les personnes édentées sont nombreuses surtout à partir de l'âge de 55 ans : 23% parmi le groupe d'âge de 55 à 64 ans, 40% parmi le groupe d'âge 65-74 ans et 52% et parmi les 75 ans et plus. Les personnes qui ont une prothèse dentaire complète (supérieure et inférieure) sont surtout nombreuses parmi le groupe d'âge 65-74 ans (37%) et parmi les 75 ans et plus (49%). Parmi le groupe d'âge 35-44 ans, il y a déjà 24 % de personnes ayant une prothèse dentaire partielle.
- Les personnes ayant un niveau d'instruction et/ou un revenu bas ont généralement plus de risque de ne plus avoir aucune dent que les autres. Dans la classe socio-économique la plus basse (pas de diplôme, revenu équivalent du ménage inférieur à 20.000 BF), la proportion de personnes édentées est cependant plus faible que dans la classe supérieure. On n'observe pas de différence socio-économique entre les gens qui portent une prothèse dentaire (partielle ou complète) ou non.
- Les gros fumeurs ont plus souvent perdu toutes leurs dents et ont plus souvent un dentier ou une prothèse partielle que les non-fumeurs.
- On n'observe pas de différences importantes entre les trois régions en ce qui concerne la prévalence des personnes édentées et celle des personnes qui portent un dentier ou une prothèse dentaire partielle.