

## **7.2. Etat de Santé**

### **7.2.6. Hygiène dentaire**

#### **7.2.6.1. Résumé**

Dans l'Enquête de Santé, dans le but d'évaluer à long terme les conséquences des caries dentaires et des pathologies des gencives, on a utilisé comme indicateur le fait de ne plus posséder aucune de ses propres dents d'une part, et l'emploi d'un dentier ou d'une prothèse partielle d'autre part.

En région bruxelloise, 10% de la population déclare ne plus avoir aucune dent, 7% ont une prothèse dentaire complète (supérieure et inférieure) et 25% a une prothèse dentaire partielle. Il n'y a pas de différence entre les sexes.

En région bruxelloise, la proportion de personnes édentées augmente avec l'âge, surtout à partir de 55 ans : 10% entre 55 et 64 ans, 31% entre 65 et 74ans et 45% à partir de 75 ans. Il y a 23% de porteurs d'une prothèse dentaire totale entre 65 et 74 ans et 39% parmi les 75 ans et plus. Entre 35 et 44ans, 23% de la population bruxelloise a déjà une prothèse dentaire partielle.

En région bruxelloise, la proportion de personnes édentées est plus faible dans la catégorie d'instruction la plus élevée : 4% contre plus de 13% dans les autres groupes de niveau d'instruction. Les différences concernant les groupes de revenu ne sont pas claires.

Fumer a une influence néfaste sur la dentition : les gros fumeurs ont plus souvent perdu toutes leurs dents et ont plus souvent un dentier ou une prothèse partielle que les non-fumeurs.