

## 7.4. Consommation de Soins

### 7.4.4. Consommation de médicaments

#### 7.4.4.1. Résumé

La consommation de médicaments est une composante importante de la consommation médicale et des dépenses de santé. L'Enquête de Santé fournit une information intégrée sur tous les médicaments consommés – remboursé ou pas, prescrits ou pas - , en fonction d'un grand nombre de variables telles que l'état de santé, le style de vie, le niveau socio-économique, etc... Le désavantage le plus important de la méthode choisie dans l'Enquête de Santé pour récolter l'information touche à la validité de l'information rapportée quant à la nature des médicaments consommés. Les personnes ne sont pas toujours informés du type précis des médicament qu'ils prennent et de la véritable raison de leur prescription.

- 64% de la population en région bruxelloise déclare avoir consommé un ou des médicaments au cours des 2 semaines précédentes (en dehors d'une pilule contraceptive). Pour les médicaments prescrits, le pourcentage est de 42% et pour les médicaments non prescrits de 40%. Les analgésiques sont les médicaments les plus fréquemment consommés : 29% de la population en région bruxelloise en a pris au cours des 2 semaines précédentes (70% d'entre eux ont pris un analgésique non prescrit). La consommation de médicaments pour les systèmes respiratoire et cardio-vasculaire au cours des 2 semaines précédentes est en région bruxelloise de 20% et 15% respectivement. A Bruxelles, 11% de la population a pris un médicament pour le système nerveux au cours des 2 semaines précédentes : 6% de la population déclarent avoir pris un somnifère. Au cours des 2 semaines précédentes, la consommation moyenne rapportée est de 2 sortes de médicaments.
- Les femmes prennent plus de médicaments que les hommes. Cela est vrai pour la plupart des catégories de médicaments, tant pour les médicaments prescrits que non prescrits.
- La consommation de médicaments prescrits augmente avec l'âge : avant 15 ans, 29% de la population en région bruxelloise a pris un médicament prescrit au cours des 2 semaines précédentes. A partir de 65 ans, la proportion monte au delà de 80%. La consommation de médicaments non prescrits ne varie pas en fonction de l'âge.
- La consommation de médicaments prescrits ne varie pas en fonction du niveau d'instruction ou du revenu équivalent. La consommation de médicaments non prescrits est cependant supérieure dans les groupes de revenu équivalent plus élevés. La consommation d'analgésique est inversement proportionnelle au niveau de diplôme. La consommation de médicaments pour le système nerveux est plus élevée dans les groupes d'instruction et de revenu équivalent inférieures.
- Les maladies chroniques qui sont fortement associées à la consommation de médicaments sont les maladies cardio-vasculaires. Pour le diabète, les maladies pulmonaires chroniques et les maladies de l'appareil locomoteur, cette relation n'apparaît pas.
- Les gros fumeurs et les anciens fumeurs consomment significativement plus de médicaments que les personnes n'ayant jamais fumé.