

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR07)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	52,5	47,5	4940
Femme	67,7	32,3	5194
Total	60,1	39,9	10134
GROUPES AGE			
0-14	44,7	55,3	1638
15-24	52,3	47,7	1138
25-34	51,5	48,5	1631
35-44	57,8	42,2	1600
45-54	64,7	35,3	1283
55-64	76,3	23,7	1088
65-74	87,3	12,7	1075
75 +	88,7	11,3	681
Total	60,1	39,9	10134
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	67,4	32,6	351
Ecole primaire	68,1	31,9	1285
Secondaire inférieur	62,9	37,1	1660
Secondaire supérieur	57,6	42,4	2928
Supérieur	58,0	42,0	3487
Total	60,1	39,9	9711
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	54,5	45,5	782
20.000-30.000	60,5	39,5	2014
30.000-40.000	63,1	36,9	2366
40.000-60.000	58,8	41,2	3234
>60.000	61,0	39,0	1275
Total	60,2	39,8	9671
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	56,2	43,8	5879
Très mauvaise à moyenne	86,3	13,7	2013
Total	62,7	37,3	7892
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	61,5	38,5	3703
Dans le passé	69,1	30,9	1909
Modéré (<20)	58,0	42,0	1560
Gros fumeur	63,7	36,3	829
Total	62,8	37,2	8001
REGION DE RESIDENCE			
Région flamande	57,9	42,1	3523
Région bruxelloise	64,3	35,7	3007
Région wallonne	62,6	37,4	3604
Belgique	60,1	39,9	10134

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	49,2	50,8	1747
Femme	66,7	33,3	1776
Total	57,9	42,1	3523
GROUPES AGE			
0-14	45,6	54,4	545
15-24	52,0	48,0	428
25-34	49,4	50,6	590
35-44	55,0	45,0	532
45-54	58,5	41,5	464
55-64	74,9	25,1	406
65-74	86,0	14,0	363
75 +	85,5	14,5	195
Total	57,9	42,1	3523
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	67,2	32,8	65
Ecole primaire	68,4	31,6	424
Secondaire inférieur	62,3	37,7	606
Secondaire supérieur	56,8	43,2	1170
Supérieur	53,4	46,6	1136
Total	58,0	42,0	3401
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	56,7	43,3	118
20.000-30.000	60,3	39,7	602
30.000-40.000	61,7	38,3	858
40.000-60.000	55,5	44,5	1292
>60.000	56,0	44,0	460
Total	58,0	42,0	3330
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	53,5	46,5	2274
Très mauvaise à moyenne	87,9	12,1	567
Total	59,8	40,2	2841
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	58,7	41,3	1375
Dans le passé	66,2	33,8	700
Modéré (<20)	54,8	45,2	559
Gros fumeur	60,0	40,0	239
Total	59,8	40,2	2873

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	58,2	41,8	1453
Femme	69,9	30,1	1554
Total	64,3	35,7	3007
GROUPES AGE			
0-14	49,1	50,9	472
15-24	58,7	41,3	312
25-34	53,1	46,9	492
35-44	61,7	38,3	482
45-54	73,2	26,8	380
55-64	77,2	22,8	308
65-74	85,2	14,8	323
75 +	83,3	16,7	238
Total	64,3	35,7	3007
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	55,5	44,5	166
Ecole primaire	61,9	38,1	366
Secondaire inférieur	64,5	35,5	426
Secondaire supérieur	66,5	33,5	697
Supérieur	65,1	34,9	1187
Total	64,2	35,8	2842
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	51,0	49,0	365
20.000-30.000	63,2	36,8	616
30.000-40.000	69,0	31,0	608
40.000-60.000	66,2	33,8	780
>60.000	70,3	29,7	488
Total	64,6	35,4	2857
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	60,9	39,1	1667
Très mauvaise à moyenne	86,1	13,9	615
Total	67,2	32,8	2282
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	64,4	35,6	1008
Dans le passé	75,5	24,5	554
Modéré (<20)	66,1	33,9	453
Gros fumeur	65,6	34,4	278
Total	67,2	32,8	2293

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	56,4	43,6	1740
Femme	68,8	31,2	1864
Total	62,6	37,4	3604
GROUPES AGE			
0-14	42,0	58,0	621
15-24	50,9	49,1	398
25-34	55,2	44,8	549
35-44	61,5	38,5	586
45-54	73,7	26,3	439
55-64	78,9	21,1	374
65-74	89,9	10,1	389
75 +	96,4	3,6	248
Total	62,6	37,4	3604
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	75,6	24,4	120
Ecole primaire	69,8	30,2	495
Secondaire inférieur	63,5	36,5	628
Secondaire supérieur	56,9	43,1	1061
Supérieur	63,1	36,9	1164
Total	62,4	37,6	3468
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	54,9	45,1	299
20.000-30.000	59,7	40,3	796
30.000-40.000	63,7	36,3	900
40.000-60.000	63,6	36,4	1162
>60.000	70,2	29,8	327
Total	62,6	37,4	3484
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	60,3	39,7	1938
Très mauvaise à moyenne	84,3	15,7	831
Total	66,8	33,2	2769
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	65,8	34,2	1320
Dans le passé	73,0	27,0	655
Modéré (<20)	60,9	39,1	548
Gros fumeur	68,3	31,7	312
Total	66,7	33,3	2835

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_GEN)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (PRESCRITS OU NON) AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES			Total
	Prescrit	Non prescrit	Pas de consommation	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	35,1	28,6	47,5	4940
Femme	46,7	37,9	32,3	5194
Total	40,9	33,2	39,9	10134
GROUPE AGE				
0-14	25,5	27,9	55,3	1638
15-24	26,9	34,4	47,7	1138
25-34	24,9	36,3	48,5	1631
35-44	35,1	36,1	42,2	1600
45-54	48,4	36,1	35,3	1283
55-64	64,2	32,5	23,7	1088
65-74	81,1	29,3	12,7	1075
75 +	85,8	23,5	11,3	681
Total	40,9	33,2	39,9	10134
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	53,8	33,3	32,6	351
Ecole primaire	56,7	25,1	31,9	1285
Secondaire inférieur	43,8	32,3	37,1	1660
Secondaire supérieur	39,4	31,5	42,4	2928
Supérieur	35,4	37,5	42,0	3487
Total	41,0	33,1	39,9	9711
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	39,9	26,6	45,5	782
20.000-30.000	44,0	29,8	39,5	2014
30.000-40.000	45,1	34,4	36,9	2366
40.000-60.000	38,7	32,7	41,2	3234
>60.000	36,7	41,0	39,0	1275
Total	41,1	33,3	39,8	9671
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	34,3	33,2	43,8	5879
Très mauvaise à moyenne	75,5	40,1	13,7	2013
Total	43,2	34,7	37,3	7892
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	42,8	33,2	38,5	3703
Dans le passé	50,7	35,7	30,9	1909
Modéré (<20)	35,6	34,6	42,0	1560
Gros fumeur	44,4	38,0	36,3	829
Total	43,4	34,5	37,2	8001
REGION DE RESIDENCE				
Région flamande	37,3	32,7	42,1	3523
Région bruxelloise	42,2	39,6	35,7	3007
Région wallonne	47,1	32,1	37,4	3604
Belgique	40,9	33,2	39,9	10134

Total des pourcentages excède 100% à cause de ceux qui prennent des médicaments prescrits et non prescrits et même temps

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_GEN)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (PRESCRITS OU NON) AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES			Total N
	Prescrit	Non prescrit	Pas de consommation	
	%	%	%	
SEXE				
Homme	31,6	26,5	50,8	1747
Femme	43,0	39,0	33,3	1776
Total	37,3	32,7	42,1	3523
GROUPE AGE				
0-14	22,2	31,7	54,4	545
15-24	26,5	33,7	48,0	428
25-34	22,3	35,3	50,6	590
35-44	30,7	35,6	45,0	532
45-54	42,7	33,2	41,5	464
55-64	61,2	29,8	25,1	406
65-74	77,3	26,9	14,0	363
75 +	81,2	23,6	14,5	195
Total	37,3	32,7	42,1	3523
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	44,7	40,6	32,8	65
Ecole primaire	55,4	25,1	31,6	424
Secondaire inférieur	41,4	31,9	37,7	606
Secondaire supérieur	37,5	31,4	43,2	1170
Supérieur	29,8	36,1	46,6	1136
Total	37,5	32,6	42,0	3401
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	44,2	22,0	43,3	118
20.000-30.000	41,8	30,3	39,7	602
30.000-40.000	42,6	34,2	38,3	858
40.000-60.000	34,1	31,2	44,5	1292
>60.000	32,2	38,7	44,0	460
Total	37,5	32,6	42,0	3330
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	31,5	31,2	46,5	2274
Très mauvaise à moyenne	75,1	42,5	12,1	567
Total	39,4	33,3	40,2	2841
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	39,0	32,4	41,3	1375
Dans le passé	46,0	33,5	33,8	700
Modéré (<20)	31,3	33,8	45,2	559
Gros fumeur	43,5	35,2	40,0	239
Total	39,5	33,2	40,2	2873

Total des pourcentages excède 100% à cause de ceux qui prennent des médicaments prescrits et non prescrits et même temps

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_GEN)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (PRESCRITS OU NON) AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES			Total N
	Prescrit	Non prescrit	Pas de consommation	
	%	%	%	
SEXE				
Homme	35,2	38,2	41,8	1453
Femme	48,6	40,9	30,1	1554
Total	42,2	39,6	35,7	3007
GROUPES AGE				
0-14	29,3	28,8	50,9	472
15-24	23,4	46,7	41,3	312
25-34	24,5	40,4	46,9	492
35-44	35,2	43,5	38,3	482
45-54	51,4	44,5	26,8	380
55-64	62,5	47,3	22,8	308
65-74	77,7	30,3	14,8	323
75 +	81,0	28,4	16,7	238
Total	42,2	39,6	35,7	3007
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	44,7	22,2	44,5	166
Ecole primaire	46,4	32,8	38,1	366
Secondaire inférieur	45,2	35,0	35,5	426
Secondaire supérieur	45,8	40,6	33,5	697
Supérieur	35,7	46,4	34,9	1187
Total	41,7	39,8	35,8	2842
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	32,5	30,3	49,0	365
20.000-30.000	43,9	36,5	36,8	616
30.000-40.000	48,6	41,8	31,0	608
40.000-60.000	40,2	43,0	33,8	780
>60.000	43,7	45,5	29,7	488
Total	42,3	39,8	35,4	2857
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	33,8	42,0	39,1	1667
Très mauvaise à moyenne	75,2	43,5	13,9	615
Total	44,2	42,4	32,8	2282
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	43,2	40,3	35,6	1008
Dans le passé	54,4	42,8	24,5	554
Modéré (<20)	39,0	45,6	33,9	453
Gros fumeur	38,6	47,4	34,4	278
Total	44,1	42,8	32,8	2293

Total des pourcentages excède 100% à cause de ceux qui prennent des médicaments prescrits et non prescrits et même temps

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_GEN)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (PRESCRITS OU NON) AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES			Total N
	Prescrit	Non prescrit	Pas de consommation	
	%	%	%	
SEXE				
Homme	41,4	29,4	43,6	1740
Femme	52,7	34,9	31,2	1864
Total	47,1	32,1	37,4	3604
GROUPES AGE				
0-14	29,8	21,7	58,0	621
15-24	28,7	31,6	49,1	398
25-34	30,3	36,9	44,8	549
35-44	42,9	34,8	38,5	586
45-54	58,3	39,1	26,3	439
55-64	71,1	33,0	21,1	374
65-74	87,9	32,5	10,1	389
75 +	95,3	20,5	3,6	248
Total	47,1	32,1	37,4	3604
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	68,2	34,0	24,4	120
Ecole primaire	62,5	22,4	30,2	495
Secondaire inférieur	47,5	32,3	36,5	628
Secondaire supérieur	41,6	29,4	43,1	1061
Supérieur	44,6	36,7	36,9	1164
Total	47,0	32,0	37,6	3468
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	41,1	27,6	45,1	299
20.000-30.000	47,3	26,9	40,3	796
30.000-40.000	48,0	32,9	36,3	900
40.000-60.000	47,2	33,5	36,4	1162
>60.000	46,0	45,2	29,8	327
Total	46,8	32,4	37,4	3484
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	40,3	34,5	39,7	1938
Très mauvaise à moyenne	76,0	36,0	15,7	831
Total	50,0	34,9	33,2	2769
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	50,1	32,4	34,2	1320
Dans le passé	58,7	37,7	27,0	655
Modéré (<20)	42,3	32,4	39,1	548
Gros fumeur	47,3	39,1	31,7	312
Total	50,1	34,4	33,3	2835

Total des pourcentages excède 100% à cause de ceux qui prennent des médicaments prescrits et non prescrits et même temps

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_T_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments cardiovasculaires	Médicaments pour le système nerveux	Vitamines, minéraux, tonidans	Médi sy
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	20,9	17,6	11,8	6,6	5,9	
Femme	29,4	20,4	16,2	11,8	10,4	
Total	25,2	19,0	14,0	9,2	8,2	
GROUPE AGE						
0-14	12,3	24,7	,3	,9	9,0	
15-24	24,1	18,6	1,6	1,9	7,1	
25-34	24,4	18,6	2,4	4,0	6,6	
35-44	26,8	17,3	8,3	9,2	8,5	
45-54	31,1	16,5	14,1	11,1	6,8	
55-64	28,4	18,4	35,6	14,9	9,5	
65-74	31,8	19,3	51,7	26,3	9,3	
75 +	34,3	16,6	62,0	37,2	13,6	
Total	25,2	19,0	14,0	9,2	8,2	
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	34,5	20,8	24,2	13,9	10,0	
Ecole primaire	30,2	18,5	27,7	18,4	7,5	
Secondaire inférieur	28,0	19,1	18,5	12,9	8,6	
Secondaire supérieur	22,5	20,3	11,4	7,1	6,0	
Supérieur	23,7	17,5	9,3	6,3	9,9	
Total	25,0	18,9	14,0	9,2	8,1	
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	25,3	15,4	16,8	11,9	5,9	
20.000-30.000	24,9	18,5	16,7	11,7	7,8	
30.000-40.000	27,1	20,3	15,6	10,8	7,8	
40.000-60.000	24,0	19,4	11,9	7,1	8,1	
>60.000	25,4	17,7	11,0	6,4	9,9	
Total	25,2	19,0	13,9	9,1	8,1	
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	23,4	16,5	10,1	4,8	6,2	
Très mauvaise à moyenne	43,5	24,1	37,8	29,0	14,0	
Total	27,8	18,1	16,2	10,1	7,9	
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	26,1	16,8	16,2	10,0	7,1	
Dans le passé	27,5	20,1	21,8	11,0	7,8	
Modéré (<20)	29,3	18,2	10,1	8,2	8,6	
Gros fumeur	32,3	19,8	14,5	13,9	9,2	
Total	27,7	18,1	16,1	10,3	7,8	
REGION DE RESIDENCE						
Région flamande	23,0	19,4	12,1	7,3	6,6	
Région bruxelloise	29,3	20,2	15,3	11,4	14,4	
Région wallonne	27,7	17,9	16,8	11,9	8,9	

Belgique	25,2	19,0	14,0	9,2	8,2
----------	------	------	------	-----	-----

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_T_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						
	Médec. et relation avec le système hormonal (*)	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments	Pas
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	2,1	3,4	2,8	1,8	3,3	
Femme	6,0	3,3	3,8	2,7	4,4	
Total	4,1	3,3	3,3	2,3	3,9	
GROUPES AGE						
0-14	,0	2,8	3,5	,7	3,9	
15-24	,3	5,3	4,8	,7	3,9	
25-34	,7	3,1	3,0	,7	3,3	
35-44	1,3	3,5	3,7	2,0	3,5	
45-54	8,6	2,7	2,6	1,8	4,8	
55-64	13,1	2,6	2,6	4,2	5,6	
65-74	10,7	3,7	2,8	6,1	2,9	
75 +	8,6	2,4	1,5	11,4	1,8	
Total	4,1	3,3	3,3	2,3	3,9	
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	6,4	4,0	2,5	6,8	1,9	
Ecole primaire	8,5	2,2	3,1	2,3	2,8	
Secondaire inférieur	5,0	3,1	2,9	2,3	3,6	
Secondaire supérieur	2,7	3,2	3,5	2,2	4,1	
Supérieur	3,4	3,6	3,5	1,9	4,4	
Total	4,1	3,3	3,3	2,3	3,9	
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	3,8	3,2	3,8	2,5	2,7	
20.000-30.000	4,8	3,5	3,1	3,3	3,7	
30.000-40.000	4,9	2,7	3,5	1,7	3,7	
40.000-60.000	3,7	3,4	3,3	2,0	3,6	
>60.000	3,4	4,5	3,1	2,5	5,1	
Total	4,2	3,4	3,3	2,3	3,8	
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	3,4	3,2	2,9	1,9	4,0	
Très mauvaise à moyenne	9,7	4,6	4,7	4,5	3,5	
Total	4,8	3,5	3,3	2,5	3,9	
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	5,1	3,2	3,6	2,7	4,4	
Dans le passé	6,3	3,5	3,0	3,3	4,5	
Modéré (<20)	2,7	4,0	3,4	2,1	2,7	
Gros fumeur	3,8	3,3	2,2	1,6	3,0	
Total	4,7	3,4	3,3	2,6	3,9	
REGION DE RESIDENCE						
Région flamande	3,0	2,8	3,1	1,7	4,1	
Région bruxelloise	5,6	4,0	3,7	4,1	3,0	
Région wallonne	5,5	4,0	3,4	2,7	3,7	

Belgique	4,1	3,3	3,3	2,3	3,9

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques					

REGIO: 1 Région flamande

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_T_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)				
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments cardiovasculaires	Médicaments pour le système nerveux	Vitamines, minéraux, toniques
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	18,9	16,8	10,8	4,7	4,7
Femme	27,1	22,0	13,5	9,9	8,5
Total	23,0	19,4	12,1	7,3	6,6
GROUPES AGE					
0-14	13,0	26,4	,4	,9	6,9
15-24	24,3	19,1	1,5	2,1	5,8
25-34	21,8	19,1	1,9	3,1	6,0
35-44	25,0	17,7	7,2	7,4	7,7
45-54	27,5	16,3	9,5	7,5	4,6
55-64	23,7	19,3	34,7	9,6	7,5
65-74	28,1	17,7	48,0	25,4	6,5
75 +	26,4	16,2	55,6	32,7	12,1
Total	23,0	19,4	12,1	7,3	6,6
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	33,3	18,7	29,0	12,6	8,0
Ecole primaire	28,6	20,3	25,1	15,5	4,7
Secondaire inférieur	25,0	18,7	16,8	11,0	7,5
Secondaire supérieur	21,6	21,8	10,9	5,7	4,6
Supérieur	20,9	17,0	6,4	4,5	8,4
Total	22,9	19,4	12,2	7,4	6,5
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	20,7	15,7	28,6	15,9	2,2
20.000-30.000	23,0	17,2	18,6	10,7	5,5
30.000-40.000	25,2	21,9	13,1	8,8	5,6
40.000-60.000	21,4	19,7	8,7	4,8	6,9
>60.000	23,1	17,9	8,3	3,8	8,3
Total	22,8	19,3	12,2	7,0	6,4
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	21,0	16,9	9,0	3,4	5,2
Très mauvaise à moyenne	42,1	24,7	35,3	27,2	12,5
Total	24,8	18,4	13,8	7,8	6,6
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	23,1	17,4	13,3	8,1	5,9
Dans le passé	22,8	21,3	18,9	8,1	7,4
Modéré (<20)	30,7	17,4	8,0	6,1	7,4
Gros fumeur	26,1	18,4	16,0	10,5	5,8
Total	24,8	18,4	13,8	7,9	6,5

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 1 Région flamande

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_T_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						
	Médec. et relation avec le système hormonal (*)	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments	Pas
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	1,9	3,0	2,6	1,5	3,6	
Femme	4,1	2,7	3,7	2,0	4,6	
Total	3,0	2,8	3,1	1,7	4,1	
GROUPE AGE						
0-14	,0	2,0	3,2	1,2	3,7	
15-24	,4	4,7	4,5	,3	3,3	
25-34	,6	3,1	3,1	,7	3,4	
35-44	,8	3,6	3,9	1,8	3,0	
45-54	7,3	2,3	2,9	1,2	5,9	
55-64	7,9	,6	2,0	2,5	7,5	
65-74	6,7	3,4	2,1	5,3	2,5	
75 +	8,0	1,7	,6	7,2	2,5	
Total	3,0	2,8	3,1	1,7	4,1	
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	4,8	5,4	2,0	5,1	1,7	
Ecole primaire	7,8	2,0	4,0	2,0	3,6	
Secondaire inférieur	4,3	2,7	2,8	1,7	4,5	
Secondaire supérieur	2,1	2,9	3,2	1,8	4,0	
Supérieur	1,6	3,0	3,3	1,5	4,5	
Total	3,0	2,8	3,2	1,7	4,2	
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	5,8	1,7	3,3	5,4	3,2	
20.000-30.000	4,2	2,7	2,0	2,2	3,4	
30.000-40.000	4,5	2,4	4,3	1,1	4,5	
40.000-60.000	2,0	2,9	3,3	1,6	3,6	
>60.000	1,7	4,0	2,9	1,9	5,6	
Total	3,1	2,9	3,2	1,7	4,1	
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	2,5	2,8	3,1	1,4	4,0	
Très mauvaise à moyenne	8,2	3,8	3,2	4,1	5,0	
Total	3,6	3,0	3,1	1,9	4,2	
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	3,7	2,8	3,7	1,7	4,7	
Dans le passé	4,7	2,2	2,9	3,0	5,1	
Modéré (<20)	2,1	4,4	3,3	1,3	1,9	
Gros fumeur	2,4	3,0	1,0	1,1	3,8	

Total	3,5	3,0	3,2	1,8	4,2
-------	-----	-----	-----	-----	-----

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 2 Région bruxelloise

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_T_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments cardiovasculaires	Médicaments pour le système nerveux	Vitamines, minéraux, tonidans	Médi sy
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	24,2	20,1	12,5	8,7	13,4	
Femme	34,0	20,4	17,9	13,8	15,3	
Total	29,3	20,2	15,3	11,4	14,4	
GROUPES AGE						
0-14	11,7	23,4	,2	2,3	15,8	
15-24	31,3	19,9	2,1	3,0	13,4	
25-34	29,1	19,7	3,1	5,9	12,8	
35-44	31,8	19,9	8,7	9,4	13,0	
45-54	37,1	24,1	19,1	17,5	10,7	
55-64	34,8	18,4	25,4	16,8	18,5	
65-74	26,6	15,3	49,8	21,0	16,7	
75 +	37,8	17,8	58,7	35,9	19,6	
Total	29,3	20,2	15,3	11,4	14,4	
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	20,7	22,1	15,6	7,9	6,4	
Ecole primaire	30,7	19,4	19,6	15,3	12,2	
Secondaire inférieur	28,9	16,7	20,2	16,7	14,9	
Secondaire supérieur	27,3	22,7	16,7	12,0	15,4	
Supérieur	30,8	18,4	10,8	7,3	15,8	
Total	28,9	19,7	15,1	10,9	14,4	
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	23,7	19,7	7,6	8,5	10,7	
20.000-30.000	31,2	20,7	14,6	11,4	13,9	
30.000-40.000	28,2	25,6	19,6	15,0	18,9	
40.000-60.000	28,8	18,8	14,5	10,6	14,5	
>60.000	32,6	17,6	18,8	10,5	13,3	
Total	29,2	20,6	15,3	11,4	14,5	
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	28,6	17,2	11,6	5,9	12,5	
Très mauvaise à moyenne	45,1	29,2	36,1	30,3	19,2	
Total	32,7	20,2	17,7	12,1	14,2	
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	29,9	17,2	17,7	9,8	13,0	
Dans le passé	35,4	20,6	30,0	14,5	17,4	
Modéré (<20)	32,1	24,3	11,7	11,4	15,6	
Gros fumeur	39,0	21,7	11,5	17,0	13,9	
Total	32,6	20,0	18,2	12,0	14,6	

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 2 Région bruxelloise

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_T_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						
	Médec. et relation avec le système hormonal (*)	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments	Pas
	%	%	%	%	%	%
SEXE						
Homme	2,5	3,1	3,7	3,1	2,4	
Femme	8,4	4,8	3,7	5,1	3,5	
Total	5,6	4,0	3,7	4,1	3,0	
GROUPE AGE						
0-14	,0	4,9	3,2	,2	3,1	
15-24	,8	4,6	5,9	,6	2,4	
25-34	,4	4,2	2,5	1,0	1,8	
35-44	1,3	4,2	3,1	2,0	3,5	
45-54	13,8	3,1	3,4	1,6	4,0	
55-64	15,2	3,8	7,2	6,0	3,5	
65-74	17,1	2,5	3,1	9,8	4,2	
75 +	7,6	3,4	,8	27,8	1,7	
Total	5,6	4,0	3,7	4,1	3,0	
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	7,9	2,7	4,7	3,1	3,2	
Ecole primaire	4,8	2,7	3,0	4,1	3,4	
Secondaire inférieur	8,4	2,8	3,7	3,2	2,6	
Secondaire supérieur	5,2	4,9	3,5	5,9	2,4	
Supérieur	4,5	4,6	3,3	2,9	3,4	
Total	5,5	4,0	3,5	3,9	3,0	
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	2,1	3,3	3,4	,8	2,1	
20.000-30.000	5,1	4,7	4,6	5,5	3,0	
30.000-40.000	6,9	3,2	3,1	4,5	1,7	
40.000-60.000	6,8	4,4	4,9	3,7	3,5	
>60.000	5,8	3,9	1,8	5,6	4,1	
Total	5,6	4,0	3,7	4,2	2,9	
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	5,1	3,4	2,9	3,5	3,3	
Très mauvaise à moyenne	10,3	6,1	6,9	8,3	2,5	
Total	6,4	4,1	3,9	4,7	3,1	
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	6,5	2,6	2,9	5,8	3,6	
Dans le passé	9,4	5,0	5,4	6,0	2,5	
Modéré (<20)	3,5	4,7	5,0	2,6	3,1	
Gros fumeur	4,0	5,9	3,6	3,0	2,6	

Total	6,1	3,9	4,0	4,8	3,1
-------	-----	-----	-----	-----	-----

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 3 Région wallonne

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_T_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments cardiovasculaires	Médicaments pour le système nerveux	Vitamines, minéraux, tonidans	Médi sy
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	23,4	18,3	13,3	9,4	5,6	
Femme	32,0	17,5	20,3	14,5	12,3	
Total	27,7	17,9	16,8	11,9	8,9	
GROUPE AGE						
0-14	11,3	22,4	,1	,4	10,4	
15-24	21,4	17,4	1,7	1,4	7,2	
25-34	27,8	17,1	3,1	5,0	5,4	
35-44	28,6	15,9	10,1	12,4	8,7	
45-54	36,2	14,5	21,4	16,0	9,9	
55-64	36,0	16,6	41,0	25,4	10,6	
65-74	39,2	22,9	58,1	29,6	11,2	
75 +	44,2	16,5	73,1	44,6	12,5	
Total	27,7	17,9	16,8	11,9	8,9	
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	44,8	21,9	25,5	19,2	14,2	
Ecole primaire	32,5	15,3	35,0	24,3	10,5	
Secondaire inférieur	32,9	20,4	21,0	15,2	9,0	
Secondaire supérieur	23,1	16,6	10,9	8,6	6,5	
Supérieur	25,7	18,0	13,7	8,8	10,3	
Total	27,6	17,8	16,9	12,0	9,1	
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	29,3	12,8	14,0	11,1	5,8	
20.000-30.000	25,5	19,6	14,7	13,0	8,9	
30.000-40.000	29,8	16,6	18,4	12,7	8,4	
40.000-60.000	27,9	19,1	17,5	10,9	9,0	
>60.000	27,7	17,0	14,2	11,8	12,7	
Total	28,0	17,9	16,5	11,9	8,9	
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	26,8	15,2	12,1	7,3	6,1	
Très mauvaise à moyenne	44,8	21,9	41,5	30,8	14,4	
Total	31,7	17,0	20,0	13,6	8,3	
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	30,6	15,5	21,3	13,7	7,6	
Dans le passé	34,5	17,4	25,1	15,8	6,0	
Modéré (<20)	25,7	17,5	13,2	11,0	8,4	
Gros fumeur	39,0	21,1	13,4	17,8	12,6	
Total	31,5	17,0	19,5	14,1	8,0	

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 3 Région wallonne

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_T_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						
	Médec. et relation avec le système hormonal (*)	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments	Pas
	%	%	%	%	%	%
SEXE						
Homme	2,4	4,1	2,8	2,1	3,0	
Femme	8,7	3,9	4,0	3,3	4,4	
Total	5,5	4,0	3,4	2,7	3,7	
GROUPE AGE						
0-14	,0	3,4	4,0	,1	4,3	
15-24	,0	6,6	4,9	1,5	5,3	
25-34	1,0	2,6	3,0	,5	3,7	
35-44	2,2	3,1	3,6	2,6	4,3	
45-54	9,6	3,4	1,9	3,1	3,0	
55-64	23,6	6,5	2,2	7,3	2,2	
65-74	14,6	4,6	3,7	6,1	3,0	
75 +	10,1	2,9	3,2	9,0	,9	
Total	5,5	4,0	3,4	2,7	3,7	
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	6,8	3,6	1,4	10,7	1,2	
Ecole primaire	10,9	2,5	1,7	2,0	1,1	
Secondaire inférieur	5,3	3,8	2,8	3,1	2,4	
Secondaire supérieur	3,3	3,5	4,1	2,3	4,8	
Supérieur	6,0	4,4	3,8	2,3	4,4	
Total	5,6	3,8	3,4	2,7	3,7	
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	3,4	4,1	4,4	1,5	2,8	
20.000-30.000	5,4	4,2	4,1	4,2	4,5	
30.000-40.000	5,1	2,9	2,4	1,9	3,2	
40.000-60.000	6,2	4,2	3,0	2,5	3,6	
>60.000	7,2	6,5	4,5	2,5	4,4	
Total	5,6	4,1	3,3	2,7	3,7	
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	4,7	3,9	2,5	2,6	4,2	
Très mauvaise à moyenne	11,3	5,2	6,0	4,0	1,8	
Total	6,5	4,2	3,4	3,0	3,6	
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	7,2	4,2	3,7	3,6	3,9	
Dans le passé	8,7	5,6	2,5	3,0	4,0	
Modéré (<20)	3,5	3,2	2,8	3,3	3,8	
Gros fumeur	5,7	2,9	3,4	2,0	2,0	

Total	6,6	4,2	3,2	3,2	3,7
-------	-----	-----	-----	-----	-----

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_P_2)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEG				
	Médicaments cardiovasculaires	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments pour le système nerveux	Médicaments pour le système digestif
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	11,4	9,4	9,2	5,9	4,3
Femme	15,6	12,0	9,9	11,1	6,3
Total	13,5	10,7	9,5	8,5	5,3
GROUPES AGE					
0-14	,2	3,8	14,5	,7	1,7
15-24	1,3	7,2	7,7	1,3	2,3
25-34	1,8	6,0	6,6	3,4	3,0
35-44	7,9	9,1	7,9	8,5	4,5
45-54	13,4	13,9	9,2	9,8	6,4
55-64	35,0	17,4	9,7	13,8	9,5
65-74	51,2	22,4	12,0	26,0	13,7
75 +	61,8	28,0	11,8	36,6	13,3
Total	13,5	10,7	9,5	8,5	5,3
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	23,7	18,3	15,0	13,7	15,7
Ecole primaire	27,6	19,6	11,1	17,1	8,1
Secondaire inférieur	17,9	13,2	8,7	12,2	6,3
Secondaire supérieur	11,1	9,2	10,3	6,7	4,5
Supérieur	8,7	7,6	8,2	5,5	3,8
Total	13,6	10,7	9,5	8,5	5,3
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	16,5	13,5	8,6	11,2	6,4
20.000-30.000	15,8	11,7	9,6	10,6	6,7
30.000-40.000	15,2	12,5	10,3	10,0	6,2
40.000-60.000	11,6	9,7	10,1	6,8	4,6
>60.000	10,5	8,0	7,4	5,8	3,8
Total	13,4	10,8	9,6	8,5	5,4
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	9,7	7,8	6,3	4,1	3,3
Très mauvaise à moyenne	36,9	27,3	17,1	27,6	15,4
Total	15,6	12,1	8,7	9,2	5,9
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	15,8	11,5	8,0	9,3	5,2
Dans le passé	21,0	13,4	10,7	10,6	7,8
Modéré (<20)	9,5	11,1	7,8	6,9	4,7
Gros fumeur	14,0	13,3	9,0	12,8	6,5
Total	15,5	12,0	8,7	9,5	5,8
REGION DE RESIDENCE					
Région flamande	11,7	9,1	9,2	6,6	3,7
Région bruxelloise	14,9	12,2	9,4	10,3	7,0
Région wallonne	16,2	13,0	10,2	11,3	7,5

Belgique	13,5	10,7	9,5	8,5	5,3
----------	------	------	-----	-----	-----

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_P_2)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour la peau	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments prescrits	Pas
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	2,5	2,4	2,5	1,6	2,1	
Femme	5,4	3,1	2,5	2,3	3,9	
Total	4,0	2,8	2,5	2,0	3,0	
GROUPE AGE						
0-14	3,2	3,3	2,0	,4	1,8	
15-24	3,0	3,8	4,2	,7	2,3	
25-34	1,8	2,3	1,6	,6	2,7	
35-44	3,9	2,9	2,9	1,3	2,5	
45-54	4,2	2,2	1,6	1,4	4,4	
55-64	4,7	2,6	2,5	4,2	5,6	
65-74	6,8	2,5	3,2	5,8	3,4	
75 +	12,4	1,5	2,3	10,8	2,1	
Total	4,0	2,8	2,5	2,0	3,0	
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	7,0	2,3	3,9	6,4	2,4	
Ecole primaire	5,7	3,0	1,9	2,1	2,2	
Secondaire inférieur	4,5	2,4	2,9	1,9	2,9	
Secondaire supérieur	3,3	3,0	2,3	2,1	3,0	
Supérieur	3,5	2,7	2,4	1,5	3,4	
Total	3,9	2,8	2,4	2,0	3,0	
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	2,8	3,4	2,3	1,7	1,3	
20.000-30.000	4,4	2,9	2,7	3,2	3,2	
30.000-40.000	4,2	2,7	2,2	1,4	3,0	
40.000-60.000	4,0	2,7	2,5	1,6	2,9	
>60.000	2,9	2,4	2,9	2,0	3,9	
Total	3,9	2,8	2,5	2,0	3,0	
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	2,2	2,3	2,2	1,6	3,2	
Très mauvaise à moyenne	10,1	4,5	3,9	4,2	3,9	
Total	3,9	2,7	2,6	2,1	3,4	
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	3,9	2,9	2,4	2,5	3,3	
Dans le passé	3,3	2,7	2,7	2,7	4,2	
Modéré (<20)	3,8	2,6	2,5	1,7	2,9	
Gros fumeur	4,7	1,8	2,8	1,2	2,6	
Total	3,8	2,7	2,6	2,2	3,3	
REGION DE RESIDENCE						
Région flamande	2,8	2,6	1,9	1,4	3,1	
Région bruxelloise	6,5	3,0	3,1	3,6	2,6	
Région wallonne	5,1	3,0	3,3	2,4	3,0	
Belgique	4,0	2,8	2,5	2,0	3,0	

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_P_2)
Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEG						
	Médicaments cardiovasculaires	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments pour le système nerveux	Médicaments pour le système digestif	À
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	10,5	8,8	8,7	4,0	3,1	
Femme	13,0	9,4	9,7	9,3	4,4	
Total	11,7	9,1	9,2	6,6	3,7	
GROUPE AGE						
0-14	,2	2,8	13,5	,7	1,4	
15-24	1,3	7,6	8,2	1,3	2,2	
25-34	1,0	4,8	6,0	2,6	2,3	
35-44	7,1	7,2	7,4	7,3	3,2	
45-54	8,9	13,6	9,4	5,9	4,4	
55-64	34,6	15,1	10,3	8,6	6,0	
65-74	47,4	19,1	11,6	24,7	9,3	
75 +	55,6	19,3	10,5	31,8	10,2	
Total	11,7	9,1	9,2	6,6	3,7	
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	29,0	14,0	12,2	12,6	7,2	
Ecole primaire	25,1	18,8	11,0	13,8	5,2	
Secondaire inférieur	16,5	10,8	7,6	10,6	5,5	
Secondaire supérieur	10,7	8,8	10,6	5,5	3,2	
Supérieur	5,7	5,8	7,9	3,5	2,5	
Total	11,8	9,3	9,2	6,7	3,7	
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	28,4	12,0	10,6	15,2	8,4	
20.000-30.000	17,5	9,4	7,6	9,5	5,3	
30.000-40.000	13,0	11,7	10,6	7,8	4,0	
40.000-60.000	8,4	8,0	9,9	4,6	3,3	
>60.000	8,1	7,6	7,8	3,6	2,2	
Total	11,8	9,2	9,3	6,5	3,8	
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	8,6	6,9	6,5	2,8	2,0	
Très mauvaise à moyenne	34,3	26,0	17,8	25,6	14,3	
Total	13,3	10,4	8,6	7,0	4,2	
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	12,9	9,2	7,8	7,5	3,1	
Dans le passé	18,3	11,0	11,1	7,9	6,7	
Modéré (<20)	7,4	11,5	7,4	4,3	3,1	
Gros fumeur	15,5	11,2	8,9	9,6	4,7	

Total	13,3	10,3	8,6	7,2	4,1
-------	------	------	-----	-----	-----

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 1 Région flamande

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_P_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour la peau	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments prescrits	Pas
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	1,7	2,2	2,1	1,2	2,2	
Femme	4,0	3,0	1,7	1,6	4,1	
Total	2,8	2,6	1,9	1,4	3,1	
GROUPE AGE						
0-14	1,9	2,8	,9	,7	1,5	
15-24	2,7	3,5	3,3	,3	1,4	
25-34	1,4	2,5	1,5	,6	2,8	
35-44	3,2	3,1	3,1	,9	1,9	
45-54	2,9	2,3	1,4	1,1	5,3	
55-64	3,2	2,1	,5	2,5	7,2	
65-74	3,3	1,8	2,7	4,9	3,3	
75 +	11,2	,6	1,5	6,7	3,1	
Total	2,8	2,6	1,9	1,4	3,1	
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	5,6	2,0	5,0	4,3	3,6	
Ecole primaire	2,6	4,0	1,7	2,0	3,1	
Secondaire inférieur	3,0	2,6	2,4	1,4	4,0	
Secondaire supérieur	2,5	2,5	1,9	1,6	2,8	
Supérieur	3,0	2,5	1,6	1,0	3,1	
Total	2,8	2,7	2,0	1,5	3,1	
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	2,1	2,7	1,4	4,1	,6	
20.000-30.000	2,0	2,0	1,7	2,2	3,7	
30.000-40.000	2,4	3,3	1,8	1,1	3,7	
40.000-60.000	3,8	2,8	1,9	1,1	2,5	
>60.000	1,6	2,1	2,3	1,2	3,5	
Total	2,8	2,6	1,9	1,4	3,1	
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,8	2,5	1,7	1,1	3,1	
Très mauvaise à moyenne	8,4	3,1	3,6	3,8	5,8	
Total	3,0	2,6	2,1	1,6	3,6	
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	3,0	2,9	1,9	1,5	3,4	
Dans le passé	3,1	2,7	1,6	2,4	4,4	
Modéré (<20)	3,3	2,5	2,7	1,2	2,3	
Gros fumeur	1,1	1,0	2,5	,7	3,6	
Total	2,9	2,6	2,1	1,6	3,4	

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 2 Région bruxelloise

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_P_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEG					
	Médicaments cardiovasculaires	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments pour le système nerveux	Médicaments pour le système digestif
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	12,2	9,6	8,7	7,9	5,7
Femme	17,4	14,6	10,0	12,6	8,2
Total	14,9	12,2	9,4	10,3	7,0
GROUPE AGE					
0-14	,0	4,6	13,8	1,7	2,6
15-24	2,1	7,2	6,5	1,7	1,7
25-34	2,7	8,4	6,6	4,1	3,7
35-44	8,0	11,9	7,8	8,9	5,5
45-54	18,3	14,9	10,4	16,3	11,5
55-64	25,0	17,5	9,8	15,6	9,8
65-74	49,4	17,6	10,6	21,0	14,9
75 +	58,3	30,9	13,4	34,9	16,7
Total	14,9	12,2	9,4	10,3	7,0
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	15,6	11,2	15,9	7,2	10,9
Ecole primaire	19,1	18,0	8,9	14,5	8,7
Secondaire inférieur	19,7	14,0	9,9	15,6	8,0
Secondaire supérieur	16,1	12,0	10,7	10,8	6,6
Supérieur	10,3	8,9	5,7	6,4	5,0
Total	14,6	11,7	8,8	9,9	6,7
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	7,0	11,2	9,9	7,3	5,8
20.000-30.000	14,3	15,1	10,1	10,7	9,2
30.000-40.000	19,4	13,9	15,1	14,0	9,3
40.000-60.000	14,0	11,0	7,0	9,6	4,0
>60.000	17,9	9,0	5,1	9,1	6,6
Total	14,8	12,3	9,5	10,3	7,0
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	11,0	7,8	5,3	5,1	4,4
Très mauvaise à moyenne	35,8	30,2	17,9	28,9	17,2
Total	17,3	13,4	8,4	11,1	7,6
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	17,4	13,1	7,7	8,7	8,9
Dans le passé	29,0	16,3	9,6	13,9	7,5
Modéré (<20)	11,4	11,3	9,9	10,2	5,7
Gros fumeur	10,7	11,9	7,3	16,3	6,1

Total	17,7	13,2	8,5	11,1	7,6
-------	------	------	-----	------	-----

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 2 Région bruxelloise

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_P_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour la peau	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments prescrits	Pas
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	5,6	3,1	2,3	2,6	2,4	
Femme	7,5	2,8	3,8	4,6	2,8	
Total	6,5	3,0	3,1	3,6	2,6	
GROUPE AGE						
0-14	7,9	3,0	4,2	,2	1,1	
15-24	2,3	4,7	3,6	,0	1,7	
25-34	3,6	1,5	2,4	,5	2,1	
35-44	4,8	2,0	2,6	1,1	2,8	
45-54	6,3	2,8	2,5	1,3	3,4	
55-64	7,4	7,0	3,6	5,8	4,2	
65-74	12,8	2,7	2,5	9,8	5,2	
75 +	16,4	,8	3,4	26,4	1,7	
Total	6,5	3,0	3,1	3,6	2,6	
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	1,6	4,7	2,7	3,1	2,7	
Ecole primaire	9,9	2,3	1,9	3,5	2,5	
Secondaire inférieur	8,0	3,4	2,6	2,6	2,3	
Secondaire supérieur	7,8	2,3	3,7	5,7	1,9	
Supérieur	4,8	2,7	3,4	2,3	3,5	
Total	6,4	2,8	3,1	3,4	2,7	
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	3,4	2,7	2,5	,7	1,2	
20.000-30.000	9,5	4,1	3,9	5,1	2,4	
30.000-40.000	9,4	2,5	2,1	3,7	1,5	
40.000-60.000	5,0	3,6	3,4	3,2	3,4	
>60.000	4,5	1,5	3,0	5,1	4,2	
Total	6,7	3,0	3,1	3,7	2,6	
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	3,7	2,1	2,5	3,0	3,3	
Très mauvaise à moyenne	14,3	6,0	4,5	7,4	2,0	
Total	6,3	3,1	3,0	4,1	3,0	
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	5,6	2,4	2,0	5,4	3,1	
Dans le passé	8,9	4,9	4,4	5,1	2,4	
Modéré (<20)	4,7	3,4	2,2	2,3	3,7	
Gros fumeur	8,7	2,2	5,0	2,3	2,9	
Total	6,5	3,1	2,9	4,3	3,1	

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 3 Région wallonne

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_P_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEG					
	Médicaments cardiovasculaires	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments pour le système nerveux	Médicaments pour le système digestif
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	12,9	10,4	10,3	8,8	6,1
Femme	19,5	15,5	10,1	13,8	8,9
Total	16,2	13,0	10,2	11,3	7,5
GROUPE AGE					
0-14	,1	5,1	16,2	,4	2,1
15-24	,9	6,6	7,4	1,1	2,6
25-34	3,0	7,4	7,6	4,7	4,3
35-44	9,3	11,7	8,8	10,6	6,4
45-54	20,5	14,3	8,5	15,4	8,9
55-64	39,4	22,5	8,5	24,1	16,8
65-74	57,6	29,0	13,2	29,6	20,0
75 +	72,9	39,5	13,0	44,5	16,1
Total	16,2	13,0	10,2	11,3	7,5
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	24,2	26,9	16,9	19,2	26,8
Ecole primaire	34,9	21,4	11,9	23,4	12,5
Secondaire inférieur	19,8	17,1	10,3	14,0	7,3
Secondaire supérieur	10,6	9,3	9,6	8,2	6,5
Supérieur	13,2	10,1	9,6	8,4	5,5
Total	16,4	12,9	10,2	11,4	7,6
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	13,9	15,8	6,5	10,8	5,5
20.000-30.000	13,9	13,7	12,2	12,0	7,8
30.000-40.000	17,7	13,5	8,8	12,3	8,8
40.000-60.000	17,1	12,9	11,1	10,5	7,2
>60.000	13,1	8,4	7,5	10,4	6,7
Total	15,9	13,1	10,1	11,3	7,6
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	11,4	9,9	6,2	6,6	5,7
Très mauvaise à moyenne	40,5	28,1	16,1	29,7	16,4
Total	19,3	14,8	8,9	12,8	8,6
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	20,7	15,4	8,2	13,0	8,1
Dans le passé	23,7	17,2	10,4	14,9	10,1
Modéré (<20)	12,7	10,2	8,0	10,5	7,1
Gros fumeur	12,9	16,8	9,7	16,4	9,3

Total	18,8	14,9	8,8	13,3	8,5
-------	------	------	-----	------	-----

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_P_2)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour la peau	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments prescrits	Pas
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	3,1	2,6	3,2	1,8	2,0	
Femme	7,2	3,3	3,3	3,0	3,9	
Total	5,1	3,0	3,3	2,4	3,0	
GROUPE AGE						
0-14	4,0	4,0	3,2	,1	2,4	
15-24	3,7	4,1	6,1	1,4	3,9	
25-34	1,9	2,1	1,3	,5	2,8	
35-44	4,9	2,9	2,4	2,0	3,6	
45-54	5,9	1,8	1,8	2,0	2,9	
55-64	6,9	2,2	6,4	7,1	2,8	
65-74	10,0	3,5	4,1	6,0	2,9	
75 +	12,1	3,2	2,9	8,7	,9	
Total	5,1	3,0	3,3	2,4	3,0	
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	12,0	1,1	3,6	10,6	1,2	
Ecole primaire	9,4	1,5	2,2	1,9	,8	
Secondaire inférieur	6,2	2,0	3,6	2,6	1,3	
Secondaire supérieur	3,7	4,1	2,7	2,0	3,8	
Supérieur	4,0	3,0	3,2	2,1	3,8	
Total	5,2	2,9	3,0	2,4	2,9	
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	2,8	4,3	2,7	,7	1,7	
20.000-30.000	6,2	3,8	3,7	4,0	2,8	
30.000-40.000	5,6	1,9	2,8	1,4	2,2	
40.000-60.000	4,1	2,4	3,4	2,3	3,5	
>60.000	5,6	4,0	4,4	2,4	5,2	
Total	5,0	2,9	3,4	2,4	3,0	
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	2,7	1,9	3,0	2,1	3,5	
Très mauvaise à moyenne	11,1	5,7	4,1	3,7	2,2	
Total	4,9	2,9	3,3	2,6	3,1	
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	5,1	3,1	3,5	3,4	3,1	
Dans le passé	2,2	2,1	4,5	2,6	4,4	
Modéré (<20)	4,3	2,4	2,3	2,5	3,6	
Gros fumeur	8,5	2,8	2,5	1,6	1,0	
Total	4,7	2,7	3,3	2,8	3,2	

(*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_N_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)				
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Vitamines, minéraux, toniques	Médicaments pour le système digestif	Médicaments système nerveux
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	13,9	10,2	3,8	2,2	1,0
Femme	20,9	12,7	6,0	3,3	1,4
Total	17,4	11,5	4,9	2,7	1,2
GROUPES AGE					
0-14	9,5	12,7	6,6	1,0	,2
15-24	18,4	12,2	4,6	2,3	,7
25-34	21,0	13,8	5,1	2,9	,9
35-44	21,1	10,7	5,5	2,8	1,0
45-54	22,1	10,2	3,0	3,3	2,2
55-64	15,3	10,4	5,9	4,1	2,5
65-74	12,2	10,5	3,9	3,9	1,1
75 +	11,7	5,5	2,6	2,5	2,2
Total	17,4	11,5	4,9	2,7	1,2
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	21,4	8,7	3,3	4,4	2,1
Ecole primaire	15,2	9,5	2,3	2,0	2,0
Secondaire inférieur	17,6	11,5	4,7	2,9	1,3
Secondaire supérieur	16,2	11,9	3,4	2,2	,6
Supérieur	18,5	11,7	7,4	3,1	1,4
Total	17,3	11,4	4,9	2,7	1,2
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	15,5	8,1	3,1	1,6	1,4
20.000-30.000	16,4	10,7	4,1	2,4	1,4
30.000-40.000	17,9	12,0	4,3	3,0	1,6
40.000-60.000	16,6	11,4	4,7	2,9	,5
>60.000	21,4	12,7	8,1	2,8	1,2
Total	17,4	11,4	4,8	2,7	1,1
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	17,4	11,6	4,4	2,7	,8
Très mauvaise à moyenne	24,8	10,7	5,7	4,5	3,4
Total	19,0	11,4	4,7	3,1	1,4
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	17,7	10,8	4,0	3,1	1,1
Dans le passé	17,2	11,7	5,3	3,3	1,4
Modéré (<20)	20,9	11,8	5,3	2,7	1,7
Gros fumeur	24,4	12,2	5,0	3,5	1,8
Total	19,0	11,4	4,7	3,1	1,3
REGION DE RESIDENCE					
Région flamande	16,4	12,1	4,2	2,3	1,1
Région bruxelloise	20,9	12,5	9,7	3,9	1,5

Région wallonne	18,1	9,9	4,7	3,1	1,2
Belgique	17,4	11,5	4,9	2,7	1,2

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_N_2)
Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments non prescrits	Pas de médicaments prescrits
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	1,0	,4	,4	1,0	71,4
Femme	1,0	,9	,5	1,8	61,9
Total	1,0	,6	,4	1,4	66,6
GROUPES AGE					
0-14	,8	,3	,3	1,6	72,0
15-24	1,2	1,2	,2	1,3	65,4
25-34	1,6	,8	,2	,6	63,5
35-44	,7	,9	,8	1,4	63,9
45-54	1,2	,6	,5	1,6	63,8
55-64	1,0	,2	,2	2,1	67,4
65-74	,6	,4	,6	2,1	70,7
75 +	,3	,0	1,0	1,0	76,2
Total	1,0	,6	,4	1,4	66,6
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	,2	,1	,5	,6	66,7
Ecole primaire	,4	,3	,2	,8	74,9
Secondaire inférieur	,6	,4	,5	1,4	67,4
Secondaire supérieur	1,0	,7	,3	1,2	68,3
Supérieur	1,5	,9	,5	1,9	62,4
Total	1,0	,6	,4	1,4	66,7
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	1,1	,4	,9	1,3	73,2
20.000-30.000	,9	,3	,2	1,0	70,0
30.000-40.000	,7	,9	,5	1,5	65,3
40.000-60.000	1,1	,7	,4	1,7	67,2
>60.000	1,7	,8	,7	1,5	59,0
Total	1,1	,7	,4	1,4	66,6
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,2	,7	,5	1,1	66,7
Très mauvaise à moyenne	1,0	,6	,6	2,3	59,8
Total	1,1	,7	,5	1,4	65,2
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	,9	,8	,4	1,7	66,7
Dans le passé	1,3	,4	,6	1,6	64,4
Modéré (<20)	1,6	1,0	,4	,7	65,2
Gros fumeur	,5	,4	,6	1,0	61,7
Total	1,1	,7	,5	1,4	65,4
REGION DE RESIDENCE					
Région flamande	,9	,6	,3	1,5	67,2
Région bruxelloise	1,0	1,0	,9	1,3	60,2
Région wallonne	1,2	,7	,5	1,3	67,7

Belgique	1,0	,6	,4	1,4	66,6

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_N_2)
Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour le système digestif	Médicaments système n
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	12,3	10,0	3,2	2,0	,8
Femme	20,5	14,2	5,2	2,6	1,4
Total	16,4	12,1	4,2	2,3	1,1
GROUPES AGE					
0-14	10,8	15,8	5,5	1,2	,2
15-24	18,1	12,5	3,4	2,0	,9
25-34	19,3	14,6	4,9	2,1	,7
35-44	21,0	11,3	4,7	2,6	,5
45-54	18,9	9,7	1,8	2,5	2,4
55-64	11,4	10,8	5,6	2,6	2,1
65-74	10,1	9,1	3,9	4,1	1,2
75 +	12,0	6,5	1,3	1,9	2,7
Total	16,4	12,1	4,2	2,3	1,1
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	25,3	9,1	2,5	8,5	5,0
Ecole primaire	14,9	10,4	2,3	1,5	2,3
Secondaire inférieur	15,7	11,5	4,8	3,0	,9
Secondaire supérieur	15,6	13,5	2,3	1,6	,4
Supérieur	17,1	11,8	6,3	2,4	1,5
Total	16,2	12,1	4,1	2,2	1,2
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	10,7	6,8	,1	,8	2,5
20.000-30.000	15,4	11,1	3,8	2,0	1,5
30.000-40.000	16,6	12,9	3,4	2,8	1,7
40.000-60.000	15,5	11,8	3,5	1,9	,1
>60.000	20,3	12,9	7,2	2,7	,9
Total	16,3	11,9	4,0	2,2	,9
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	15,6	11,9	3,6	2,2	,6
Très mauvaise à moyenne	25,4	10,5	6,0	4,1	4,2
Total	17,4	11,6	4,0	2,5	1,3
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	16,5	11,4	3,2	2,7	1,0
Dans le passé	14,2	12,5	5,1	2,9	1,3
Modéré (<20)	21,9	11,2	4,5	1,9	2,0
Gros fumeur	21,1	11,3	4,8	2,4	1,1
Total	17,4	11,6	4,0	2,6	1,2

REGIO: 1 Région flamande

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_N_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments non prescrits	Pas de médicaments prescrits
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	,9	,4	,2	1,0	73,5
Femme	1,0	,7	,4	2,0	60,9
Total	,9	,6	,3	1,5	67,2
GROUPES AGE					
0-14	1,1	,5	,5	1,6	68,4
15-24	1,4	1,0	,0	1,0	66,3
25-34	1,5	,6	,1	,5	64,7
35-44	,4	,8	,8	1,4	64,4
45-54	,9	,5	,1	2,2	66,6
55-64	,2	,0	,0	2,7	70,2
65-74	,7	,3	,5	2,5	73,1
75 +	,5	,0	,5	,4	75,5
Total	,9	,6	,3	1,5	67,2
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	,5	,0	,9	,0	59,4
Ecole primaire	,4	,0	,0	,7	74,9
Secondaire inférieur	,3	,2	,3	1,4	68,1
Secondaire supérieur	,9	,7	,1	1,1	68,5
Supérieur	1,3	,8	,5	2,5	63,8
Total	,9	,6	,3	1,6	67,3
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	,3	,6	1,4	2,4	77,8
20.000-30.000	,9	,0	,0	,8	69,7
30.000-40.000	,7	1,1	,0	1,3	65,7
40.000-60.000	,9	,5	,4	1,9	68,8
>60.000	1,6	,8	,7	1,7	61,4
Total	1,0	,6	,3	1,6	67,4
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,1	,6	,3	1,1	68,8
Très mauvaise à moyenne	,3	,1	,3	3,5	57,3
Total	,9	,5	,3	1,6	66,7
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	,8	,8	,2	1,9	67,6
Dans le passé	,6	,2	,6	1,7	66,6
Modéré (<20)	1,7	,8	,1	,6	66,0
Gros fumeur	,5	,0	,4	1,2	64,8
Total	,9	,6	,3	1,5	66,8

REGIO: 2 Région bruxelloise

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_N_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)				
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour le système digestif	Médicaments système r
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	17,8	12,6	9,7	4,0	1,2
Femme	23,8	12,5	9,7	3,9	1,8
Total	20,9	12,5	9,7	3,9	1,5
GROUPES AGE					
0-14	8,3	10,6	12,0	,9	,5
15-24	27,0	14,3	11,1	5,6	1,3
25-34	24,3	14,4	10,1	3,9	1,9
35-44	24,0	15,0	9,2	3,1	1,1
45-54	26,5	16,9	5,9	3,8	2,0
55-64	25,6	10,6	12,5	3,4	1,9
65-74	12,3	6,2	6,4	8,1	1,3
75 +	12,6	4,6	9,5	4,7	2,1
Total	20,9	12,5	9,7	3,9	1,5
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	11,2	8,3	4,8	2,1	1,2
Ecole primaire	18,3	11,8	5,2	3,0	1,4
Secondaire inférieur	20,3	9,5	7,8	2,3	1,4
Secondaire supérieur	18,0	13,5	11,7	4,9	1,5
Supérieur	25,0	13,8	11,8	4,4	1,3
Total	20,6	12,5	9,9	3,9	1,4
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	16,7	11,2	7,2	1,4	1,9
20.000-30.000	21,3	11,9	6,8	2,7	,8
30.000-40.000	19,2	12,9	14,3	4,5	2,5
40.000-60.000	21,1	13,7	10,5	6,2	1,3
>60.000	24,5	13,7	9,7	4,1	1,4
Total	20,7	12,8	9,7	4,0	1,5
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	23,0	13,2	9,6	4,2	1,1
Très mauvaise à moyenne	25,8	15,3	9,0	5,7	2,8
Total	23,7	13,7	9,5	4,6	1,5
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	21,2	11,6	9,7	4,7	1,7
Dans le passé	23,2	12,7	9,7	4,4	1,1
Modéré (<20)	24,5	16,7	11,4	4,8	1,8
Gros fumeur	31,5	16,3	6,6	4,5	1,4
Total	23,6	13,5	9,7	4,6	1,6

REGIO: 2 Région bruxelloise

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_N_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments non prescrits	Pas de médicaments prescrits
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	,8	,6	1,0	,9	61,6
Femme	1,1	1,3	,9	1,7	58,9
Total	1,0	1,0	,9	1,3	60,2
GROUPES AGE					
0-14	,8	,2	,0	1,0	71,0
15-24	1,0	1,4	,6	,7	52,5
25-34	1,9	1,0	,6	,4	59,2
35-44	1,6	1,1	1,1	2,4	56,3
45-54	,6	,8	,6	2,0	55,5
55-64	,3	2,2	,8	2,3	53,0
65-74	,0	,8	2,1	,6	69,7
75 +	,0	,0	3,6	1,0	71,6
Total	1,0	1,0	,9	1,3	60,2
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	,0	,0	,5	1,6	77,4
Ecole primaire	,8	1,5	1,6	1,7	67,3
Secondaire inférieur	,4	,3	,7	1,0	64,9
Secondaire supérieur	1,3	1,2	,5	1,0	58,5
Supérieur	1,2	1,1	1,1	1,4	53,7
Total	1,0	1,0	,9	1,3	60,0
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	,8	,6	,5	,9	68,9
20.000-30.000	,8	1,1	,6	1,0	63,3
30.000-40.000	1,2	1,3	2,1	1,5	58,1
40.000-60.000	1,1	1,3	,9	1,1	56,4
>60.000	1,1	,5	,8	1,8	54,9
Total	1,0	1,0	1,0	1,3	60,0
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,0	1,1	,9	1,1	57,5
Très mauvaise à moyenne	1,7	1,6	1,9	1,7	56,6
Total	1,1	1,2	1,2	1,3	57,3
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	,6	,9	1,1	1,0	59,7
Dans le passé	,7	1,2	1,4	1,1	56,9
Modéré (<20)	2,4	1,9	,7	2,2	53,9
Gros fumeur	,9	1,5	,9	1,2	52,5
Total	1,1	1,2	1,0	1,3	57,0

REGIO: 3 Région wallonne

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_N_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)				
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour le système digestif	Médicaments système r
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	15,6	9,8	3,1	1,9	1,2
Femme	20,6	10,0	6,3	4,2	1,2
Total	18,1	9,9	4,7	3,1	1,2
GROUPES AGE					
0-14	7,7	8,5	6,8	,7	,0
15-24	16,0	11,1	4,5	1,8	,3
25-34	23,3	12,1	3,6	4,0	,8
35-44	20,5	8,4	5,9	2,9	2,0
45-54	26,7	9,2	4,4	4,6	1,8
55-64	19,9	9,6	4,0	7,4	3,6
65-74	15,2	14,2	3,1	2,2	,8
75 +	10,7	4,6	,9	2,2	1,6
Total	18,1	9,9	4,7	3,1	1,2
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	24,7	8,5	2,9	2,2	,0
Ecole primaire	14,6	7,1	1,2	2,4	1,9
Secondaire inférieur	20,2	11,9	3,7	2,8	2,1
Secondaire supérieur	16,8	8,3	3,6	2,8	,6
Supérieur	18,5	10,9	7,6	3,8	1,3
Total	18,1	9,8	4,8	3,1	1,2
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	17,9	7,3	2,9	2,2	,4
20.000-30.000	16,2	9,5	3,6	2,7	1,6
30.000-40.000	19,6	10,4	3,1	2,8	1,0
40.000-60.000	17,6	10,3	5,8	4,1	1,1
>60.000	22,9	11,4	9,6	2,5	1,9
Total	18,3	10,0	4,7	3,2	1,2
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	19,4	10,5	4,3	3,2	1,2
Très mauvaise à moyenne	23,9	9,7	4,4	4,8	2,5
Total	20,6	10,3	4,3	3,7	1,6
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	19,1	9,3	3,8	3,4	1,1
Dans le passé	21,5	10,0	4,3	3,7	1,8
Modéré (<20)	17,9	11,3	4,5	3,3	1,1
Gros fumeur	26,8	12,3	4,9	4,7	2,8
Total	20,3	10,2	4,2	3,6	1,4

REGIO: 3 Région wallonne

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR_N_2)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)				
	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments non prescrits	Pas de médicaments prescrits
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	1,3	,3	,4	1,1	70,6
Femme	1,1	1,0	,5	1,5	64,7
Total	1,2	,7	,5	1,3	67,7
GROUPES AGE					
0-14	,3	,1	,0	1,9	77,9
15-24	1,0	1,6	,5	2,1	68,0
25-34	1,6	1,1	,3	,9	62,8
35-44	1,0	,9	,5	1,0	65,3
45-54	1,9	,6	1,3	,2	60,9
55-64	2,9	,0	,5	,8	66,5
65-74	,8	,3	,2	1,9	67,5
75 +	,1	,0	,3	2,0	79,5
Total	1,2	,7	,5	1,3	67,7
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	,0	,4	,1	,5	66,0
Ecole primaire	,4	,2	,1	,5	77,6
Secondaire inférieur	1,1	,8	,8	1,5	66,9
Secondaire supérieur	1,2	,4	,5	1,2	70,5
Supérieur	1,7	1,0	,2	1,2	63,2
Total	1,2	,7	,4	1,2	67,8
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	1,9	,1	,8	,9	72,6
20.000-30.000	1,0	,4	,3	1,2	72,8
30.000-40.000	,5	,6	,8	1,6	66,6
40.000-60.000	1,5	1,0	,3	1,3	66,5
>60.000	2,5	1,2	,4	,8	54,6
Total	1,2	,7	,5	1,3	67,4
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,4	,8	,6	1,1	65,3
Très mauvaise à moyenne	1,8	1,0	,5	,8	63,9
Total	1,5	,8	,6	1,1	64,9
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	1,2	,8	,5	1,6	67,4
Dans le passé	2,7	,8	,5	1,4	62,4
Modéré (<20)	1,2	1,0	,8	,4	67,4
Gros fumeur	,4	,6	,9	,6	60,3
Total	1,4	,8	,6	1,2	65,4

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR_PSY)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PSYCHOTROPES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES				Total N
	1	2	3	4	
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	2,8	2,6	2,1	94,5	4956
Femme	5,7	4,3	4,5	89,5	5200
Total	4,3	3,4	3,3	92,0	10156
GROUPE AGE					
0-14	,1	,3	,3	99,6	1646
15-24	,4	,6	1,0	98,8	1142
25-34	,9	1,4	1,9	97,1	1637
35-44	2,8	4,0	4,7	92,2	1602
45-54	4,3	4,4	5,4	90,4	1289
55-64	8,7	6,4	4,0	86,3	1085
65-74	14,8	9,6	7,5	75,6	1075
75 +	24,8	10,8	5,5	66,2	680
Total	4,3	3,4	3,3	92,0	10156
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	10,1	8,1	2,4	86,3	352
Ecole primaire	8,6	8,5	6,0	84,1	1285
Secondaire inférieur	6,8	4,8	4,9	88,2	1659
Secondaire supérieur	2,4	2,9	3,0	93,9	2940
Supérieur	3,0	1,5	1,9	94,9	3496
Total	4,2	3,5	3,2	92,0	9732
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	5,1	5,2	2,6	89,6	787
20.000-30.000	5,8	4,5	5,4	89,6	2022
30.000-40.000	5,0	3,8	3,6	90,9	2373
40.000-60.000	3,1	3,1	2,7	93,6	3235
>60.000	3,1	2,1	1,5	94,5	1275
Total	4,2	3,5	3,3	92,0	9692
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	2,1	1,5	1,4	95,9	5892
Très mauvaise à moyenne	14,9	11,9	11,9	73,2	2014
Total	4,9	3,8	3,7	91,0	7906
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	4,6	3,6	3,4	91,1	3706
Dans le passé	6,9	3,3	3,7	89,6	1912
Modéré (<20)	3,1	3,9	2,9	93,1	1563
Gros fumeur	5,4	6,7	7,7	88,4	835
Total	4,9	3,9	3,9	90,8	8016
REGION DE RESIDENCE					
Région flamande	2,9	2,2	2,4	94,1	3524
Région bruxelloise	6,1	4,7	4,4	90,1	3012
Région wallonne	6,1	5,2	4,5	89,1	3620
Belgique	4,3	3,4	3,3	92,0	10156

1 Somnifères

2 Tranquillisants, autres médicaments pour les nerfs

3 Médicaments pour la dépression

4 Pas de consommation de médicaments psychotropes

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR_PSY)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PSYCHOTROPES AU				Total
	COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES				
	1	2	3	4	
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	1,5	1,3	1,5	96,5	1752
Femme	4,3	3,2	3,3	91,5	1772
Total	2,9	2,2	2,4	94,1	3524
GROUPES AGE					
0-14	,1	,4	,3	99,6	547
15-24	,6	,6	1,2	98,7	428
25-34	,8	1,0	1,5	97,7	589
35-44	2,1	2,2	3,7	93,7	532
45-54	2,1	1,9	3,0	94,5	467
55-64	4,9	2,8	2,7	91,5	403
65-74	11,6	9,3	6,2	77,9	363
75 +	20,4	8,4	2,6	72,5	195
Total	2,9	2,2	2,4	94,1	3524
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	9,5	5,0	1,4	87,4	65
Ecole primaire	6,3	5,5	3,8	88,2	424
Secondaire inférieur	5,4	3,7	4,1	89,6	603
Secondaire supérieur	1,4	2,3	2,6	95,1	1174
Supérieur	1,8	,5	,8	97,1	1136
Total	2,9	2,3	2,3	94,0	3402
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	8,0	6,6	,7	85,6	119
20.000-30.000	4,8	3,0	5,2	90,6	601
30.000-40.000	3,8	2,1	2,7	93,2	860
40.000-60.000	1,1	2,3	1,7	96,0	1291
>60.000	2,1	,8	,5	96,9	459
Total	2,8	2,3	2,4	94,1	3330
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,1	1,2	1,1	97,2	2272
Très mauvaise à moyenne	13,8	7,5	10,5	75,3	568
Total	3,4	2,4	2,8	93,2	2840
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	3,5	2,4	3,0	92,9	1373
Dans le passé	5,2	1,8	2,3	92,2	699
Modéré (<20)	1,4	2,3	1,6	95,7	561
Gros fumeur	2,7	3,6	5,0	92,4	241
Total	3,4	2,4	2,8	93,3	2874

(1) Somnifères

(2) Tranquillisants, autres médicaments psychotropes

(3) Antidépresseurs

(4) Pas de consommation de médicaments psychotropes

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR_PSY)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PSYCHOTROPES AU				Total
	COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES				
	1	2	3	4	
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	3,9	3,8	2,6	92,8	1458
Femme	8,1	5,4	6,0	87,6	1554
Total	6,1	4,7	4,4	90,1	3012
GROUPES AGE					
0-14	,2	,3	,0	99,6	474
15-24	,6	,9	,8	98,6	313
25-34	1,9	2,3	3,0	95,9	496
35-44	3,6	4,6	5,4	91,3	481
45-54	8,0	9,1	8,5	83,7	380
55-64	9,4	7,0	4,5	84,8	308
65-74	15,1	8,6	5,2	79,4	323
75 +	27,8	11,8	13,3	66,4	237
Total	6,1	4,7	4,4	90,1	3012
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	4,0	2,3	2,7	92,8	167
Ecole primaire	8,1	7,2	6,0	85,8	365
Secondaire inférieur	10,2	9,0	8,9	84,9	425
Secondaire supérieur	5,9	4,9	4,2	90,3	699
Supérieur	3,7	2,2	2,5	93,7	1190
Total	5,8	4,5	4,3	90,5	2846
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	3,8	3,6	3,5	92,8	368
20.000-30.000	6,9	4,9	4,2	89,4	618
30.000-40.000	7,7	6,1	5,3	87,6	607
40.000-60.000	5,8	5,5	4,4	90,6	780
>60.000	4,7	3,1	4,5	91,1	489
Total	6,0	4,8	4,4	90,1	2862
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	3,1	1,8	2,2	94,9	1670
Très mauvaise à moyenne	17,3	14,7	13,1	71,7	615
Total	6,7	5,1	5,0	89,1	2285
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	6,2	2,6	3,0	91,4	1009
Dans le passé	9,1	6,5	5,4	86,3	556
Modéré (<20)	4,0	5,7	4,9	89,9	452
Gros fumeur	8,6	9,8	10,3	84,1	278
Total	6,6	5,0	4,8	89,1	2295

(1) Somnifères

(2) Tranquillisants, autres médicaments psychotropes

(3) Antidépresseurs

(4) Pas de consommation de médicaments psychotropes

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR_PSY)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PSYCHOTROPES AU				Total
	COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES				
	1	2	3	4	
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	4,8	4,4	3,0	91,4	1746
Femme	7,4	5,9	6,0	86,7	1874
Total	6,1	5,2	4,5	89,1	3620
GROUPES AGE					
0-14	,0	,0	,3	99,7	625
15-24	,2	,5	,6	99,0	401
25-34	,9	1,7	2,3	96,2	552
35-44	3,7	6,8	6,2	89,9	589
45-54	7,3	7,6	9,0	84,6	442
55-64	16,5	13,5	6,8	75,9	374
65-74	19,7	10,4	10,2	70,7	389
75 +	29,8	14,0	5,8	56,8	248
Total	6,1	5,2	4,5	89,1	3620
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	14,7	15,0	3,1	80,8	120
Ecole primaire	12,5	14,0	9,6	76,7	496
Secondaire inférieur	8,2	5,7	5,2	86,8	631
Secondaire supérieur	3,5	3,4	3,5	92,3	1067
Supérieur	4,6	3,0	3,5	91,8	1170
Total	6,1	5,3	4,5	89,0	3484
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	3,9	5,1	3,3	90,5	300
20.000-30.000	6,8	6,4	6,1	88,2	803
30.000-40.000	6,1	5,8	4,6	88,2	906
40.000-60.000	6,5	4,1	4,3	89,6	1164
>60.000	5,0	5,3	2,8	89,7	327
Total	6,1	5,2	4,6	89,0	3500
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	3,7	2,0	2,0	93,6	1950
Très mauvaise à moyenne	15,5	16,4	13,3	70,9	831
Total	6,9	5,9	5,1	87,5	2781
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	6,2	6,1	4,3	87,5	1324
Dans le passé	9,5	5,1	6,0	85,3	657
Modéré (<20)	5,9	6,2	4,6	89,5	550
Gros fumeur	8,1	10,1	10,9	84,0	316
Total	7,1	6,4	5,6	87,0	2847

(1) Somnifères

(2) Tranquillisants, autres médicaments psychotropes

(3) Antidépresseurs

(4) Pas de consommation de médicaments psychotropes

CONSUMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR08)
Enquête de santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE TYPES DE MEDICAMENTS DIFFERENTS CONSOMMES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES					
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
SEXE					
Homme	1,9	1	1	2	2748
Femme	2,1	1	2	2	3546
Total	2,0	1	1	2	6294
GROUPES AGE					
0-14	1,5	1	1	2	706
15-24	1,6	1	1	2	587
25-34	1,6	1	1	2	870
35-44	1,9	1	1	2	919
45-54	2,0	1	2	2	850
55-64	2,3	1	2	3	831
65-74	2,6	1	2	3	914
75 +	2,9	2	2	3	617
Total	2,0	1	1	2	6294
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	2,6	1	2	3	239
Ecole primaire	2,4	1	2	3	907
Secondaire inférieur	2,2	1	2	2	1083
Secondaire supérieur	1,8	1	1	2	1716
Supérieur	1,8	1	1	2	2077
Total	2,0	1	1	2	6022
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	2,2	1	2	3	433
20.000-30.000	2,1	1	2	2	1269
30.000-40.000	2,0	1	2	2	1532
40.000-60.000	1,9	1	1	2	1960
>60.000	1,8	1	1	2	814
Total	2,0	1	1	2	6008
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,7	1	1	2	3424
Très mauvaise à moyenne	2,9	1	2	3	1770
Total	2,0	1	2	2	5194
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	2,0	1	1	2	2405
Dans le passé	2,1	1	2	2	1370
Modéré (<20)	2,0	1	2	2	951
Gros fumeur	2,2	1	2	3	529
Total	2,0	1	2	2	5255
REGION DE RESIDENCE					
Région flamande	1,8	1	1	2	2039
Région bruxelloise	2,3	1	2	3	1973
Région wallonne	2,2	1	2	3	2282
Belgique	2,0	1	1	2	6294

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR08)

Enquête de santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE TYPES DE MEDICAMENTS DIFFERENTS CONSOMMES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES					
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
SEXE					
Homme	1,7	1	1	2	872
Femme	1,9	1	1	2	1167
Total	1,8	1	1	2	2039
GROUPES AGE					
0-14	1,5	1	1	2	233
15-24	1,5	1	1	2	217
25-34	1,6	1	1	2	292
35-44	1,8	1	1	2	274
45-54	1,8	1	1	2	265
55-64	1,9	1	1	2	294
65-74	2,4	1	2	3	297
75 +	2,5	1	2	3	167
Total	1,8	1	1	2	2039
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	2,4	1	2	2	47
Ecole primaire	2,1	1	2	2	290
Secondaire inférieur	2,0	1	1	2	387
Secondaire supérieur	1,7	1	1	2	651
Supérieur	1,6	1	1	2	592
Total	1,8	1	1	2	1967
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	2,5	1	2	3	67
20.000-30.000	1,9	1	2	2	376
30.000-40.000	1,9	1	1	2	532
40.000-60.000	1,7	1	1	2	703
>60.000	1,6	1	1	2	253
Total	1,8	1	1	2	1931
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,5	1	1	2	1223
Très mauvaise à moyenne	2,7	1	2	3	495
Total	1,8	1	1	2	1718
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	1,8	1	1	2	828
Dans le passé	1,9	1	1	2	464
Modéré (<20)	1,8	1	2	2	312
Gros fumeur	1,9	1	1	2	136
Total	1,8	1	1	2	1740

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR08)

Enquête de santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE TYPES DE MEDICAMENTS DIFFERENTS CONSOMMES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES					
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
SEXE					
Homme	2,1	1	2	2	876
Femme	2,4	1	2	3	1097
Total	2,3	1	2	3	1973
GROUPES AGE					
0-14	1,6	1	1	2	212
15-24	1,7	1	1	2	172
25-34	1,9	1	1	2	278
35-44	2,1	1	2	2	297
45-54	2,5	1	2	3	274
55-64	2,6	1	2	3	242
65-74	2,7	1	2	3	284
75 +	3,7	2	3	5	214
Total	2,3	1	2	3	1973
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	2,3	1	2	2	103
Ecole primaire	2,5	1	2	3	242
Secondaire inférieur	2,6	1	2	3	288
Secondaire supérieur	2,3	1	2	3	452
Supérieur	2,0	1	1	2	777
Total	2,2	1	2	2	1862
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	2,0	1	1	2	197
20.000-30.000	2,5	1	2	3	406
30.000-40.000	2,5	1	2	3	415
40.000-60.000	2,1	1	2	2	517
>60.000	2,1	1	2	2	335
Total	2,3	1	2	3	1870
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,9	1	1	2	1052
Très mauvaise à moyenne	3,3	2	3	4	542
Total	2,4	1	2	3	1594
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	2,3	1	2	2	686
Dans le passé	2,5	1	2	3	432
Modéré (<20)	2,3	1	2	3	291
Gros fumeur	2,5	1	2	3	185
Total	2,4	1	2	3	1594

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR08)

Enquête de santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE TYPES DE MEDICAMENTS DIFFERENTS CONSOMMES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES					
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
SEXE					
Homme	2,0	1	1	2	1000
Femme	2,4	1	2	3	1282
Total	2,2	1	2	3	2282
GROUPES AGE					
0-14	1,6	1	1	2	261
15-24	1,6	1	1	2	198
25-34	1,6	1	1	2	300
35-44	2,0	1	1	2	348
45-54	2,2	1	2	3	311
55-64	3,1	2	3	4	295
65-74	3,0	1	3	3	333
75 +	3,1	2	3	3	236
Total	2,2	1	2	3	2282
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	2,9	1	2	3	89
Ecole primaire	2,7	1	2	3	375
Secondaire inférieur	2,4	1	2	3	408
Secondaire supérieur	2,0	1	1	2	613
Supérieur	2,1	1	2	2	708
Total	2,2	1	2	3	2193
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	2,1	1	2	3	169
20.000-30.000	2,4	1	2	3	487
30.000-40.000	2,2	1	2	3	585
40.000-60.000	2,2	1	2	3	740
>60.000	2,0	1	2	2	226
Total	2,2	1	2	3	2207
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,8	1	1	2	1149
Très mauvaise à moyenne	3,1	2	3	4	733
Total	2,3	1	2	3	1882
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	2,2	1	2	3	891
Dans le passé	2,3	1	2	3	474
Modéré (<20)	2,1	1	2	2	348
Gros fumeur	2,5	1	2	3	208
Total	2,3	1	2	3	1921