

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR07)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	52,5	47,5	4940
Femme	67,7	32,3	5194
Total	60,1	39,9	10134
<b>GROUPE AGE</b>			
0-14	44,7	55,3	1638
15-24	52,3	47,7	1138
25-34	51,5	48,5	1631
35-44	57,8	42,2	1600
45-54	64,7	35,3	1283
55-64	76,3	23,7	1088
65-74	87,3	12,7	1075
75 +	88,7	11,3	681
Total	60,1	39,9	10134
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	67,4	32,6	351
Ecole primaire	68,1	31,9	1285
Secondaire inférieur	62,9	37,1	1660
Secondaire supérieur	57,6	42,4	2928
Supérieur	58,0	42,0	3487
Total	60,1	39,9	9711
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	54,5	45,5	782
20.000-30.000	60,5	39,5	2014
30.000-40.000	63,1	36,9	2366
40.000-60.000	58,8	41,2	3234
>60.000	61,0	39,0	1275
Total	60,2	39,8	9671
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	56,2	43,8	5879
Très mauvaise à moyenne	86,3	13,7	2013
Total	62,7	37,3	7892
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	61,5	38,5	3703
Dans le passé	69,1	30,9	1909
Modéré (<20)	58,0	42,0	1560
Gros fumeur	63,7	36,3	829
Total	62,8	37,2	8001
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région flamande	57,9	42,1	3523
Région bruxelloise	64,3	35,7	3007
Région wallonne	62,6	37,4	3604
Belgique	60,1	39,9	10134

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	49,2	50,8	1747
Femme	66,7	33,3	1776
Total	57,9	42,1	3523
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	45,6	54,4	545
15-24	52,0	48,0	428
25-34	49,4	50,6	590
35-44	55,0	45,0	532
45-54	58,5	41,5	464
55-64	74,9	25,1	406
65-74	86,0	14,0	363
75 +	85,5	14,5	195
Total	57,9	42,1	3523
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	67,2	32,8	65
Ecole primaire	68,4	31,6	424
Secondaire inférieur	62,3	37,7	606
Secondaire supérieur	56,8	43,2	1170
Supérieur	53,4	46,6	1136
Total	58,0	42,0	3401
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	56,7	43,3	118
20.000-30.000	60,3	39,7	602
30.000-40.000	61,7	38,3	858
40.000-60.000	55,5	44,5	1292
>60.000	56,0	44,0	460
Total	58,0	42,0	3330
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	53,5	46,5	2274
Très mauvaise à moyenne	87,9	12,1	567
Total	59,8	40,2	2841
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	58,7	41,3	1375
Dans le passé	66,2	33,8	700
Modéré (<20)	54,8	45,2	559
Gros fumeur	60,0	40,0	239
Total	59,8	40,2	2873

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	58,2	41,8	1453
Femme	69,9	30,1	1554
Total	64,3	35,7	3007
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	49,1	50,9	472
15-24	58,7	41,3	312
25-34	53,1	46,9	492
35-44	61,7	38,3	482
45-54	73,2	26,8	380
55-64	77,2	22,8	308
65-74	85,2	14,8	323
75 +	83,3	16,7	238
Total	64,3	35,7	3007
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	55,5	44,5	166
Ecole primaire	61,9	38,1	366
Secondaire inférieur	64,5	35,5	426
Secondaire supérieur	66,5	33,5	697
Supérieur	65,1	34,9	1187
Total	64,2	35,8	2842
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	51,0	49,0	365
20.000-30.000	63,2	36,8	616
30.000-40.000	69,0	31,0	608
40.000-60.000	66,2	33,8	780
>60.000	70,3	29,7	488
Total	64,6	35,4	2857
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	60,9	39,1	1667
Très mauvaise à moyenne	86,1	13,9	615
Total	67,2	32,8	2282
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	64,4	35,6	1008
Dans le passé	75,5	24,5	554
Modéré (<20)	66,1	33,9	453
Gros fumeur	65,6	34,4	278
Total	67,2	32,8	2293

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	56,4	43,6	1740
Femme	68,8	31,2	1864
Total	62,6	37,4	3604
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	42,0	58,0	621
15-24	50,9	49,1	398
25-34	55,2	44,8	549
35-44	61,5	38,5	586
45-54	73,7	26,3	439
55-64	78,9	21,1	374
65-74	89,9	10,1	389
75 +	96,4	3,6	248
Total	62,6	37,4	3604
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	75,6	24,4	120
Ecole primaire	69,8	30,2	495
Secondaire inférieur	63,5	36,5	628
Secondaire supérieur	56,9	43,1	1061
Supérieur	63,1	36,9	1164
Total	62,4	37,6	3468
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	54,9	45,1	299
20.000-30.000	59,7	40,3	796
30.000-40.000	63,7	36,3	900
40.000-60.000	63,6	36,4	1162
>60.000	70,2	29,8	327
Total	62,6	37,4	3484
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	60,3	39,7	1938
Très mauvaise à moyenne	84,3	15,7	831
Total	66,8	33,2	2769
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	65,8	34,2	1320
Dans le passé	73,0	27,0	655
Modéré (<20)	60,9	39,1	548
Gros fumeur	68,3	31,7	312
Total	66,7	33,3	2835

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_GEN)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (PRESCRITS OU NON) AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES			Total N
	Prescrit	Non prescrit	Pas de consommation	
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	35,1	28,6	47,5	4940
Femme	46,7	37,9	32,3	5194
Total	40,9	33,2	39,9	10134
<b>GROUPES AGE</b>				
0-14	25,5	27,9	55,3	1638
15-24	26,9	34,4	47,7	1138
25-34	24,9	36,3	48,5	1631
35-44	35,1	36,1	42,2	1600
45-54	48,4	36,1	35,3	1283
55-64	64,2	32,5	23,7	1088
65-74	81,1	29,3	12,7	1075
75 +	85,8	23,5	11,3	681
Total	40,9	33,2	39,9	10134
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	53,8	33,3	32,6	351
Ecole primaire	56,7	25,1	31,9	1285
Secondaire inférieur	43,8	32,3	37,1	1660
Secondaire supérieur	39,4	31,5	42,4	2928
Supérieur	35,4	37,5	42,0	3487
Total	41,0	33,1	39,9	9711
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	39,9	26,6	45,5	782
20.000-30.000	44,0	29,8	39,5	2014
30.000-40.000	45,1	34,4	36,9	2366
40.000-60.000	38,7	32,7	41,2	3234
>60.000	36,7	41,0	39,0	1275
Total	41,1	33,3	39,8	9671
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	34,3	33,2	43,8	5879
Très mauvaise à moyenne	75,5	40,1	13,7	2013
Total	43,2	34,7	37,3	7892
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	42,8	33,2	38,5	3703
Dans le passé	50,7	35,7	30,9	1909
Modéré (<20)	35,6	34,6	42,0	1560
Gros fumeur	44,4	38,0	36,3	829
Total	43,4	34,5	37,2	8001
<b>REGION DE RESIDENCE</b>				
Région flamande	37,3	32,7	42,1	3523
Région bruxelloise	42,2	39,6	35,7	3007
Région wallonne	47,1	32,1	37,4	3604
Belgique	40,9	33,2	39,9	10134

Total des pourcentages excède 100% à cause de ceux qui prennent des médicaments prescrits et non prescrits et même temps

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_GEN)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (PRESCRITS OU NON) AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES			Total
	Prescrit	Non prescrit	Pas de consommation	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	31,6	26,5	50,8	1747
Femme	43,0	39,0	33,3	1776
Total	37,3	32,7	42,1	3523
<b>GROUPES AGE</b>				
0-14	22,2	31,7	54,4	545
15-24	26,5	33,7	48,0	428
25-34	22,3	35,3	50,6	590
35-44	30,7	35,6	45,0	532
45-54	42,7	33,2	41,5	464
55-64	61,2	29,8	25,1	406
65-74	77,3	26,9	14,0	363
75 +	81,2	23,6	14,5	195
Total	37,3	32,7	42,1	3523
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	44,7	40,6	32,8	65
Ecole primaire	55,4	25,1	31,6	424
Secondaire inférieur	41,4	31,9	37,7	606
Secondaire supérieur	37,5	31,4	43,2	1170
Supérieur	29,8	36,1	46,6	1136
Total	37,5	32,6	42,0	3401
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	44,2	22,0	43,3	118
20.000-30.000	41,8	30,3	39,7	602
30.000-40.000	42,6	34,2	38,3	858
40.000-60.000	34,1	31,2	44,5	1292
>60.000	32,2	38,7	44,0	460
Total	37,5	32,6	42,0	3330
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	31,5	31,2	46,5	2274
Très mauvaise à moyenne	75,1	42,5	12,1	567
Total	39,4	33,3	40,2	2841
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	39,0	32,4	41,3	1375
Dans le passé	46,0	33,5	33,8	700
Modéré (<20)	31,3	33,8	45,2	559
Gros fumeur	43,5	35,2	40,0	239
Total	39,5	33,2	40,2	2873

Total des pourcentages excède 100% à cause de ceux qui prennent des médicaments prescrits et non prescrits et même temps

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_GEN)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (PRESCRITS OU NON) AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES			Total
	Prescrit	Non prescrit	Pas de consommation	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	35,2	38,2	41,8	1453
Femme	48,6	40,9	30,1	1554
Total	42,2	39,6	35,7	3007
<b>GROUPES AGE</b>				
0-14	29,3	28,8	50,9	472
15-24	23,4	46,7	41,3	312
25-34	24,5	40,4	46,9	492
35-44	35,2	43,5	38,3	482
45-54	51,4	44,5	26,8	380
55-64	62,5	47,3	22,8	308
65-74	77,7	30,3	14,8	323
75 +	81,0	28,4	16,7	238
Total	42,2	39,6	35,7	3007
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	44,7	22,2	44,5	166
Ecole primaire	46,4	32,8	38,1	366
Secondaire inférieur	45,2	35,0	35,5	426
Secondaire supérieur	45,8	40,6	33,5	697
Supérieur	35,7	46,4	34,9	1187
Total	41,7	39,8	35,8	2842
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	32,5	30,3	49,0	365
20.000-30.000	43,9	36,5	36,8	616
30.000-40.000	48,6	41,8	31,0	608
40.000-60.000	40,2	43,0	33,8	780
>60.000	43,7	45,5	29,7	488
Total	42,3	39,8	35,4	2857
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	33,8	42,0	39,1	1667
Très mauvaise à moyenne	75,2	43,5	13,9	615
Total	44,2	42,4	32,8	2282
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	43,2	40,3	35,6	1008
Dans le passé	54,4	42,8	24,5	554
Modéré (<20)	39,0	45,6	33,9	453
Gros fumeur	38,6	47,4	34,4	278
Total	44,1	42,8	32,8	2293

Total des pourcentages excède 100% à cause de ceux qui prennent des médicaments prescrits et non prescrits et même temps

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_GEN)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (PRESCRITS OU NON) AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES			Total
	Prescrit	Non prescrit	Pas de consommation	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	41,4	29,4	43,6	1740
Femme	52,7	34,9	31,2	1864
Total	47,1	32,1	37,4	3604
<b>GROUPES AGE</b>				
0-14	29,8	21,7	58,0	621
15-24	28,7	31,6	49,1	398
25-34	30,3	36,9	44,8	549
35-44	42,9	34,8	38,5	586
45-54	58,3	39,1	26,3	439
55-64	71,1	33,0	21,1	374
65-74	87,9	32,5	10,1	389
75 +	95,3	20,5	3,6	248
Total	47,1	32,1	37,4	3604
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	68,2	34,0	24,4	120
Ecole primaire	62,5	22,4	30,2	495
Secondaire inférieur	47,5	32,3	36,5	628
Secondaire supérieur	41,6	29,4	43,1	1061
Supérieur	44,6	36,7	36,9	1164
Total	47,0	32,0	37,6	3468
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	41,1	27,6	45,1	299
20.000-30.000	47,3	26,9	40,3	796
30.000-40.000	48,0	32,9	36,3	900
40.000-60.000	47,2	33,5	36,4	1162
>60.000	46,0	45,2	29,8	327
Total	46,8	32,4	37,4	3484
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	40,3	34,5	39,7	1938
Très mauvaise à moyenne	76,0	36,0	15,7	831
Total	50,0	34,9	33,2	2769
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	50,1	32,4	34,2	1320
Dans le passé	58,7	37,7	27,0	655
Modéré (<20)	42,3	32,4	39,1	548
Gros fumeur	47,3	39,1	31,7	312
Total	50,1	34,4	33,3	2835

Total des pourcentages excède 100% à cause de ceux qui prennent des médicaments prescrits et non prescrits et même temps



CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_T\_2)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments cardiovasculaires	Médicaments pour le système nerveux	Vitamines, minéraux, toniques	Médicaments pour le système digestif	Antibiotiques
	%	%	%	%	%	%	%
SEXE							
Homme	20,9	17,6	11,8	6,6	5,9	6,0	4,6
Femme	29,4	20,4	16,2	11,8	10,4	8,8	4,5
Total	25,2	19,0	14,0	9,2	8,2	7,4	4,5
GROUPES AGE							
0-14	12,3	24,7	,3	,9	9,0	2,4	5,7
15-24	24,1	18,6	1,6	1,9	7,1	4,3	3,7
25-34	24,4	18,6	2,4	4,0	6,6	5,4	5,1
35-44	26,8	17,3	8,3	9,2	8,5	6,9	4,2
45-54	31,1	16,5	14,1	11,1	6,8	8,9	4,1
55-64	28,4	18,4	35,6	14,9	9,5	12,1	3,3
65-74	31,8	19,3	51,7	26,3	9,3	16,2	3,9
75 +	34,3	16,6	62,0	37,2	13,6	14,8	7,3
Total	25,2	19,0	14,0	9,2	8,2	7,4	4,5
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	34,5	20,8	24,2	13,9	10,0	19,2	6,6
Ecole primaire	30,2	18,5	27,7	18,4	7,5	9,5	3,3
Secondaire inférieur	28,0	19,1	18,5	12,9	8,6	8,1	4,4
Secondaire supérieur	22,5	20,3	11,4	7,1	6,0	6,3	3,8
Supérieur	23,7	17,5	9,3	6,3	9,9	6,2	5,5
Total	25,0	18,9	14,0	9,2	8,1	7,3	4,5
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	25,3	15,4	16,8	11,9	5,9	7,6	3,6
20.000-30.000	24,9	18,5	16,7	11,7	7,8	8,4	4,8
30.000-40.000	27,1	20,3	15,6	10,8	7,8	8,3	5,2
40.000-60.000	24,0	19,4	11,9	7,1	8,1	6,8	4,7
>60.000	25,4	17,7	11,0	6,4	9,9	6,3	3,5
Total	25,2	19,0	13,9	9,1	8,1	7,5	4,6
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	23,4	16,5	10,1	4,8	6,2	5,6	3,5
Très mauvaise à moyenne	43,5	24,1	37,8	29,0	14,0	18,2	6,8
Total	27,8	18,1	16,2	10,1	7,9	8,3	4,2
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	26,1	16,8	16,2	10,0	7,1	7,6	3,6
Dans le passé	27,5	20,1	21,8	11,0	7,8	10,1	4,3
Modéré (<20)	29,3	18,2	10,1	8,2	8,6	6,9	5,8
Gros fumeur	32,3	19,8	14,5	13,9	9,2	9,5	4,4
Total	27,7	18,1	16,1	10,3	7,8	8,2	4,3
REGION DE RESIDENCE							
Région flamande	23,0	19,4	12,1	7,3	6,6	5,7	3,1
Région bruxelloise	29,3	20,2	15,3	11,4	14,4	9,9	5,6
Région wallonne	27,7	17,9	16,8	11,9	8,9	9,6	6,6
Belgique	25,2	19,0	14,0	9,2	8,2	7,4	4,5

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_T\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						Total
	Médic. et relation avec le système hormonal (*)	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments	Pas de médicaments	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Homme	2,1	3,4	2,8	1,8	3,3	47,5	4947
Femme	6,0	3,3	3,8	2,7	4,4	32,2	5200
<b>Total</b>	<b>4,1</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,9</b>	<b>39,9</b>	<b>10147</b>
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	,0	2,8	3,5	,7	3,9	55,2	1640
15-24	,3	5,3	4,8	,7	3,9	47,6	1140
25-34	,7	3,1	3,0	,7	3,3	48,3	1636
35-44	1,3	3,5	3,7	2,0	3,5	42,2	1602
45-54	8,6	2,7	2,6	1,8	4,8	35,3	1285
55-64	13,1	2,6	2,6	4,2	5,6	23,8	1088
65-74	10,7	3,7	2,8	6,1	2,9	12,7	1075
75 +	8,6	2,4	1,5	11,4	1,8	11,3	681
<b>Total</b>	<b>4,1</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,9</b>	<b>39,9</b>	<b>10147</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	6,4	4,0	2,5	6,8	1,9	32,5	352
Ecole primaire	8,5	2,2	3,1	2,3	2,8	31,9	1285
Secondaire inférieur	5,0	3,1	2,9	2,3	3,6	37,0	1662
Secondaire supérieur	2,7	3,2	3,5	2,2	4,1	42,3	2934
Supérieur	3,4	3,6	3,5	1,9	4,4	42,0	3491
<b>Total</b>	<b>4,1</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,9</b>	<b>39,9</b>	<b>9724</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	3,8	3,2	3,8	2,5	2,7	45,4	784
20.000-30.000	4,8	3,5	3,1	3,3	3,7	39,5	2017
30.000-40.000	4,9	2,7	3,5	1,7	3,7	36,8	2371
40.000-60.000	3,7	3,4	3,3	2,0	3,6	41,2	3237
>60.000	3,4	4,5	3,1	2,5	5,1	39,1	1275
<b>Total</b>	<b>4,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,8</b>	<b>39,8</b>	<b>9684</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	3,4	3,2	2,9	1,9	4,0	43,7	5887
Très mauvaise à moyenne	9,7	4,6	4,7	4,5	3,5	13,7	2016
<b>Total</b>	<b>4,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>3,9</b>	<b>37,2</b>	<b>7903</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	5,1	3,2	3,6	2,7	4,4	38,5	3705
Dans le passé	6,3	3,5	3,0	3,3	4,5	30,9	1912
Modéré (<20)	2,7	4,0	3,4	2,1	2,7	41,9	1564
Gros fumeur	3,8	3,3	2,2	1,6	3,0	36,2	830
<b>Total</b>	<b>4,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>	<b>37,2</b>	<b>8011</b>
<b>REGION DE RESIDENCE</b>							
Région flamande	3,0	2,8	3,1	1,7	4,1	42,1	3524
Région bruxelloise	5,6	4,0	3,7	4,1	3,0	35,6	3015
Région wallonne	5,5	4,0	3,4	2,7	3,7	37,3	3608
<b>Belgique</b>	<b>4,1</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,9</b>	<b>39,9</b>	<b>10147</b>

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_T\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments cardiovasculaires	Médicaments pour le système nerveux	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour le système digestif	Antibiotidans
	%	%	%	%	%	%	%
<b>SEXE</b>							
Homme	18,9	16,8	10,8	4,7	4,7	4,7	2,8
Femme	27,1	22,0	13,5	9,9	8,5	6,6	3,5
<b>Total</b>	<b>23,0</b>	<b>19,4</b>	<b>12,1</b>	<b>7,3</b>	<b>6,6</b>	<b>5,7</b>	<b>3,1</b>
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	13,0	26,4	,4	,9	6,9	2,5	4,1
15-24	24,3	19,1	1,5	2,1	5,8	3,9	2,4
25-34	21,8	19,1	1,9	3,1	6,0	4,1	4,2
35-44	25,0	17,7	7,2	7,4	7,7	5,7	2,7
45-54	27,5	16,3	9,5	7,5	4,6	6,3	2,4
55-64	23,7	19,3	34,7	9,6	7,5	8,5	1,5
65-74	28,1	17,7	48,0	25,4	6,5	12,0	4,0
75 +	26,4	16,2	55,6	32,7	12,1	11,6	4,5
<b>Total</b>	<b>23,0</b>	<b>19,4</b>	<b>12,1</b>	<b>7,3</b>	<b>6,6</b>	<b>5,7</b>	<b>3,1</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	33,3	18,7	29,0	12,6	8,0	15,7	1,4
Ecole primaire	28,6	20,3	25,1	15,5	4,7	6,7	2,5
Secondaire inférieur	25,0	18,7	11,0	11,0	7,5	7,5	3,4
Secondaire supérieur	21,6	21,8	10,9	5,7	4,6	4,6	2,3
Supérieur	20,9	17,0	6,4	4,5	8,4	4,6	4,1
<b>Total</b>	<b>22,9</b>	<b>19,4</b>	<b>12,2</b>	<b>7,4</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>3,1</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	20,7	15,7	28,6	15,9	2,2	9,3	2,3
20.000-30.000	23,0	17,2	18,6	10,7	5,5	7,1	2,2
30.000-40.000	25,2	21,9	13,1	8,8	5,6	6,0	4,1
40.000-60.000	21,4	19,7	8,7	4,8	6,9	5,0	3,4
>60.000	23,1	17,9	8,3	3,8	8,3	4,7	2,7
<b>Total</b>	<b>22,8</b>	<b>19,3</b>	<b>12,2</b>	<b>7,0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,7</b>	<b>3,2</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	21,0	16,9	9,0	3,4	5,2	4,0	2,5
Très mauvaise à moyenne	42,1	24,7	35,3	27,2	12,5	16,9	5,1
<b>Total</b>	<b>24,8</b>	<b>18,4</b>	<b>13,8</b>	<b>7,8</b>	<b>6,6</b>	<b>6,3</b>	<b>3,0</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	23,1	17,4	13,3	8,1	5,9	5,5	2,5
Dans le passé	22,8	21,3	18,9	8,1	7,4	8,8	2,7
Modéré (<20)	30,7	17,4	8,0	6,1	7,4	4,7	4,5
Gros fumeur	26,1	18,4	16,0	10,5	5,8	7,2	3,6
<b>Total</b>	<b>24,8</b>	<b>18,4</b>	<b>13,8</b>	<b>7,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>3,1</b>

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_T\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						Total
	Médic. et relation avec le système hormonal (*)	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments	Pas de médicaments	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Homme	1,9	3,0	2,6	1,5	3,6	50,7	1748
Femme	4,1	2,7	3,7	2,0	4,6	33,3	1776
<b>Total</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>1,7</b>	<b>4,1</b>	<b>42,1</b>	<b>3524</b>
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	,0	2,0	3,2	1,2	3,7	54,4	545
15-24	,4	4,7	4,5	,3	3,3	48,0	428
25-34	,6	3,1	3,1	,7	3,4	50,6	590
35-44	,8	3,6	3,9	1,8	3,0	45,0	532
45-54	7,3	2,3	2,9	1,2	5,9	41,4	465
55-64	7,9	,6	2,0	2,5	7,5	25,1	406
65-74	6,7	3,4	2,1	5,3	2,5	14,0	363
75 +	8,0	1,7	,6	7,2	2,5	14,5	195
<b>Total</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>1,7</b>	<b>4,1</b>	<b>42,1</b>	<b>3524</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	4,8	5,4	2,0	5,1	1,7	32,8	65
Ecole primaire	7,8	2,0	4,0	2,0	3,6	31,6	424
Secondaire inférieur	4,3	2,7	2,8	1,7	4,5	37,7	606
Secondaire supérieur	2,1	2,9	3,2	1,8	4,0	43,1	1171
Supérieur	1,6	3,0	3,3	1,5	4,5	46,6	1136
<b>Total</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>1,7</b>	<b>4,2</b>	<b>42,0</b>	<b>3402</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	5,8	1,7	3,3	5,4	3,2	43,3	118
20.000-30.000	4,2	2,7	2,0	2,2	3,4	39,7	602
30.000-40.000	4,5	2,4	4,3	1,1	4,5	38,2	859
40.000-60.000	2,0	2,9	3,3	1,6	3,6	44,5	1292
>60.000	1,7	4,0	2,9	1,9	5,6	44,0	460
<b>Total</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>1,7</b>	<b>4,1</b>	<b>42,0</b>	<b>3331</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	2,5	2,8	3,1	1,4	4,0	46,5	2274
Très mauvaise à moyenne	8,2	3,8	3,2	4,1	5,0	12,1	568
<b>Total</b>	<b>3,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>1,9</b>	<b>4,2</b>	<b>40,2</b>	<b>2842</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	3,7	2,8	3,7	1,7	4,7	41,3	1375
Dans le passé	4,7	2,2	2,9	3,0	5,1	33,8	700
Modéré (<20)	2,1	4,4	3,3	1,3	1,9	45,1	560
Gros fumeur	2,4	3,0	1,0	1,1	3,8	40,0	239
<b>Total</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1,8</b>	<b>4,2</b>	<b>40,1</b>	<b>2874</b>

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_T\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments cardiovasculaires	Médicaments pour le système nerveux	Vitamines, minéraux, tonifiants	Médicaments pour le système digestif	Antibiotiques
	%	%	%	%	%	%	%
<b>SEXE</b>							
Homme	24,2	20,1	12,5	8,7	13,4	8,5	5,6
Femme	34,0	20,4	17,9	13,8	15,3	11,3	5,6
<b>Total</b>	<b>29,3</b>	<b>20,2</b>	<b>15,3</b>	<b>11,4</b>	<b>14,4</b>	<b>9,9</b>	<b>5,6</b>
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	11,7	23,4	,2	2,3	15,8	3,0	7,6
15-24	31,3	19,9	2,1	3,0	13,4	6,7	2,8
25-34	29,1	19,7	3,1	5,9	12,8	7,5	5,1
35-44	31,8	19,9	8,7	9,4	13,0	7,9	5,9
45-54	37,1	24,1	19,1	17,5	10,7	13,7	5,8
55-64	34,8	18,4	25,4	16,8	18,5	11,8	5,7
65-74	26,6	15,3	49,8	21,0	16,7	21,8	6,4
75 +	37,8	17,8	58,7	35,9	19,6	18,2	6,8
<b>Total</b>	<b>29,3</b>	<b>20,2</b>	<b>15,3</b>	<b>11,4</b>	<b>14,4</b>	<b>9,9</b>	<b>5,6</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	20,7	22,1	15,6	7,9	6,4	12,5	5,9
Ecole primaire	30,7	19,4	19,6	15,3	12,2	10,5	5,8
Secondaire inférieur	28,9	16,7	16,7	20,2	14,9	9,6	5,6
Secondaire supérieur	27,3	22,7	16,7	12,0	15,4	11,0	7,5
Supérieur	30,8	18,4	10,8	7,3	15,8	8,2	4,3
<b>Total</b>	<b>28,9</b>	<b>19,7</b>	<b>15,1</b>	<b>10,9</b>	<b>14,4</b>	<b>9,8</b>	<b>5,6</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	23,7	19,7	7,6	8,5	10,7	6,0	3,3
20.000-30.000	31,2	20,7	14,6	11,4	13,9	10,8	7,6
30.000-40.000	28,2	25,6	19,6	15,0	18,9	12,3	7,1
40.000-60.000	28,8	18,8	14,5	10,6	14,5	9,7	4,7
>60.000	32,6	17,6	18,8	10,5	13,3	10,2	4,0
<b>Total</b>	<b>29,2</b>	<b>20,6</b>	<b>15,3</b>	<b>11,4</b>	<b>14,5</b>	<b>10,1</b>	<b>5,6</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	28,6	17,2	11,6	5,9	12,5	7,9	3,6
Très mauvaise à moyenne	45,1	29,2	36,1	30,3	19,2	20,9	11,1
<b>Total</b>	<b>32,7</b>	<b>20,2</b>	<b>17,7</b>	<b>12,1</b>	<b>14,2</b>	<b>11,2</b>	<b>5,5</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	29,9	17,2	17,7	9,8	13,0	12,5	5,2
Dans le passé	35,4	20,6	30,0	14,5	17,4	10,3	4,0
Modéré (<20)	32,1	24,3	11,7	11,4	15,6	10,1	6,7
Gros fumeur	39,0	21,7	11,5	17,0	13,9	9,5	4,8
<b>Total</b>	<b>32,6</b>	<b>20,0</b>	<b>18,2</b>	<b>12,0</b>	<b>14,6</b>	<b>11,2</b>	<b>5,2</b>

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_T\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						Total
	Médec. et relation avec le système hormonal (*)	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments	Pas de médicaments	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Homme	2,5	3,1	3,7	3,1	2,4	41,5	1458
Femme	8,4	4,8	3,7	5,1	3,5	30,0	1557
<b>Total</b>	<b>5,6</b>	<b>4,0</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>	<b>3,0</b>	<b>35,6</b>	<b>3015</b>
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	,0	4,9	3,2	,2	3,1	50,8	473
15-24	,8	4,6	5,9	,6	2,4	40,9	313
25-34	,4	4,2	2,5	1,0	1,8	46,4	495
35-44	1,3	4,2	3,1	2,0	3,5	38,3	483
45-54	13,8	3,1	3,4	1,6	4,0	26,7	381
55-64	15,2	3,8	7,2	6,0	3,5	22,8	309
65-74	17,1	2,5	3,1	9,8	4,2	14,8	323
75 +	7,6	3,4	,8	27,8	1,7	16,7	238
<b>Total</b>	<b>5,6</b>	<b>4,0</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>	<b>3,0</b>	<b>35,6</b>	<b>3015</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	7,9	2,7	4,7	3,1	3,2	44,2	167
Ecole primaire	4,8	2,7	3,0	4,1	3,4	38,1	366
Secondaire inférieur	8,4	2,8	3,7	3,2	2,6	35,5	426
Secondaire supérieur	5,2	4,9	3,5	5,9	2,4	33,1	700
Supérieur	4,5	4,6	3,3	2,9	3,4	34,8	1191
<b>Total</b>	<b>5,5</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,0</b>	<b>35,6</b>	<b>2850</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	2,1	3,3	3,4	,8	2,1	48,4	367
20.000-30.000	5,1	4,7	4,6	5,5	3,0	36,6	618
30.000-40.000	6,9	3,2	3,1	4,5	1,7	31,0	608
40.000-60.000	6,8	4,4	4,9	3,7	3,5	33,7	782
>60.000	5,8	3,9	1,8	5,6	4,1	29,6	490
<b>Total</b>	<b>5,6</b>	<b>4,0</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>2,9</b>	<b>35,2</b>	<b>2865</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	5,1	3,4	2,9	3,5	3,3	38,9	1672
Très mauvaise à moyenne	10,3	6,1	6,9	8,3	2,5	13,9	617
<b>Total</b>	<b>6,4</b>	<b>4,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,1</b>	<b>32,6</b>	<b>2289</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	6,5	2,6	2,9	5,8	3,6	35,5	1009
Dans le passé	9,4	5,0	5,4	6,0	2,5	24,3	557
Modéré (<20)	3,5	4,7	5,0	2,6	3,1	33,4	455
Gros fumeur	4,0	5,9	3,6	3,0	2,6	34,4	278
<b>Total</b>	<b>6,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>3,1</b>	<b>32,6</b>	<b>2299</b>

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_T\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments cardiovasculaires	Médicaments pour le système nerveux	Vitamines, minéraux, toniques	Médicaments pour le système digestif	Antibiotidans
	%	%	%	%	%	%	%
<b>SEXE</b>							
Homme	23,4	18,3	13,3	9,4	5,6	7,5	7,4
Femme	32,0	17,5	20,3	14,5	12,3	11,7	5,8
<b>Total</b>	<b>27,7</b>	<b>17,9</b>	<b>16,8</b>	<b>11,9</b>	<b>8,9</b>	<b>9,6</b>	<b>6,6</b>
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	11,3	22,4	,1	,4	10,4	2,3	7,7
15-24	21,4	17,4	1,7	1,4	7,2	4,4	6,1
25-34	27,8	17,1	3,1	5,0	5,4	7,2	6,8
35-44	28,6	15,9	10,1	12,4	8,7	8,7	6,4
45-54	36,2	14,5	21,4	16,0	9,9	12,4	6,9
55-64	36,0	16,6	41,0	25,4	10,6	19,7	6,1
65-74	39,2	22,9	58,1	29,6	11,2	20,7	2,9
75 +	44,2	16,5	73,1	44,6	12,5	17,6	11,7
<b>Total</b>	<b>27,7</b>	<b>17,9</b>	<b>16,8</b>	<b>11,9</b>	<b>8,9</b>	<b>9,6</b>	<b>6,6</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	44,8	21,9	25,5	19,2	14,2	26,8	11,9
Ecole primaire	32,5	15,3	35,0	24,3	10,5	13,7	3,9
Secondaire inférieur	32,9	20,4	15,2	15,2	9,0	8,8	5,8
Secondaire supérieur	23,1	16,6	10,9	8,6	6,5	8,7	5,7
Supérieur	25,7	18,0	13,7	8,8	10,3	8,1	8,1
<b>Total</b>	<b>27,6</b>	<b>17,8</b>	<b>16,9</b>	<b>12,0</b>	<b>9,1</b>	<b>9,7</b>	<b>6,6</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	29,3	12,8	14,0	11,1	5,8	7,4	4,6
20.000-30.000	25,5	19,6	14,7	13,0	8,9	9,4	7,6
30.000-40.000	29,8	16,6	18,4	12,7	8,4	10,8	6,4
40.000-60.000	27,9	19,1	17,5	10,9	9,0	9,9	7,3
>60.000	27,7	17,0	14,2	11,8	12,7	8,5	5,5
<b>Total</b>	<b>28,0</b>	<b>17,9</b>	<b>16,5</b>	<b>11,9</b>	<b>8,9</b>	<b>9,7</b>	<b>6,8</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	26,8	15,2	12,1	7,3	6,1	8,2	5,5
Très mauvaise à moyenne	44,8	21,9	41,5	30,8	14,4	19,0	7,6
<b>Total</b>	<b>31,7</b>	<b>17,0</b>	<b>20,0</b>	<b>13,6</b>	<b>8,3</b>	<b>11,1</b>	<b>6,1</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	30,6	15,5	21,3	13,7	7,6	10,2	5,2
Dans le passé	34,5	17,4	25,1	15,8	6,0	12,4	7,6
Modéré (<20)	25,7	17,5	13,2	11,0	8,4	9,8	7,8
Gros fumeur	39,0	21,1	13,4	17,8	12,6	12,9	5,4
<b>Total</b>	<b>31,5</b>	<b>17,0</b>	<b>19,5</b>	<b>14,1</b>	<b>8,0</b>	<b>10,9</b>	<b>6,3</b>

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_T\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						Total
	Médec. et relation avec le système hormonal (*)	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments	Pas de médicaments	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Homme	2,4	4,1	2,8	2,1	3,0	43,5	1741
Femme	8,7	3,9	4,0	3,3	4,4	31,1	1867
Total	5,5	4,0	3,4	2,7	3,7	37,3	3608
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	,0	3,4	4,0	,1	4,3	57,7	622
15-24	,0	6,6	4,9	1,5	5,3	48,9	399
25-34	1,0	2,6	3,0	,5	3,7	44,5	551
35-44	2,2	3,1	3,6	2,6	4,3	38,4	587
45-54	9,6	3,4	1,9	3,1	3,0	26,3	439
55-64	23,6	6,5	2,2	7,3	2,2	21,3	373
65-74	14,6	4,6	3,7	6,1	3,0	10,1	389
75 +	10,1	2,9	3,2	9,0	,9	3,6	248
Total	5,5	4,0	3,4	2,7	3,7	37,3	3608
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	6,8	3,6	1,4	10,7	1,2	24,4	120
Ecole primaire	10,9	2,5	1,7	2,0	1,1	30,2	495
Secondaire inférieur	5,3	3,8	2,8	3,1	2,4	36,2	630
Secondaire supérieur	3,3	3,5	4,1	2,3	4,8	43,1	1063
Supérieur	6,0	4,4	3,8	2,3	4,4	36,9	1164
Total	5,6	3,8	3,4	2,7	3,7	37,5	3472
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	3,4	4,1	4,4	1,5	2,8	45,1	299
20.000-30.000	5,4	4,2	4,1	4,2	4,5	40,1	797
30.000-40.000	5,1	2,9	2,4	1,9	3,2	36,0	904
40.000-60.000	6,2	4,2	3,0	2,5	3,6	36,4	1163
>60.000	7,2	6,5	4,5	2,5	4,4	30,1	325
Total	5,6	4,1	3,3	2,7	3,7	37,3	3488
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	4,7	3,9	2,5	2,6	4,2	39,6	1941
Très mauvaise à moyenne	11,3	5,2	6,0	4,0	1,8	15,7	831
Total	6,5	4,2	3,4	3,0	3,6	33,1	2772
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	7,2	4,2	3,7	3,6	3,9	34,2	1321
Dans le passé	8,7	5,6	2,5	3,0	4,0	27,0	655
Modéré (<20)	3,5	3,2	2,8	3,3	3,8	39,0	549
Gros fumeur	5,7	2,9	3,4	2,0	2,0	31,5	313
Total	6,6	4,2	3,2	3,2	3,7	33,3	2838

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques



CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_P\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)							
	Médicaments cardiovasculaires	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments pour le système nerveux	Médicaments pour le système digestif	Antibiotidans	Médec. et relation avec le système hormonal (*)
	%	%	%	%	%	%	%
SEXE							
Homme	11,4	9,4	9,2	5,9	4,3	4,6	2,1
Femme	15,6	12,0	9,9	11,1	6,3	4,5	6,0
Total	13,5	10,7	9,5	8,5	5,3	4,5	4,1
GROUPES AGE							
0-14	,2	3,8	14,5	,7	1,7	5,7	,0
15-24	1,3	7,2	7,7	1,3	2,3	3,7	,3
25-34	1,8	6,0	6,6	3,4	3,0	5,1	,7
35-44	7,9	9,1	7,9	8,5	4,5	4,2	1,3
45-54	13,4	13,9	9,2	9,8	6,4	4,1	8,6
55-64	35,0	17,4	9,7	13,8	9,5	3,3	13,2
65-74	51,2	22,4	12,0	26,0	13,7	3,9	10,7
75 +	61,8	28,0	11,8	36,6	13,3	7,3	8,6
Total	13,5	10,7	9,5	8,5	5,3	4,5	4,1
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	23,7	18,3	15,0	13,7	15,7	6,6	6,4
Ecole primaire	27,6	19,6	11,1	17,1	8,1	3,3	8,5
Secondaire inférieur	17,9	13,2	8,7	12,2	6,3	4,4	5,0
Secondaire supérieur	11,1	9,2	10,3	6,7	4,5	3,7	2,7
Supérieur	8,7	7,6	8,2	5,5	3,8	5,4	3,4
Total	13,6	10,7	9,5	8,5	5,3	4,5	4,1
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	16,5	13,5	8,6	11,2	6,4	3,6	3,7
20.000-30.000	15,8	11,7	9,6	10,6	6,7	4,8	4,8
30.000-40.000	15,2	12,5	10,3	10,0	6,2	5,2	4,9
40.000-60.000	11,6	9,7	10,1	6,8	4,6	4,7	3,7
>60.000	10,5	8,0	7,4	5,8	3,8	3,5	3,4
Total	13,4	10,8	9,6	8,5	5,4	4,6	4,2
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	9,7	7,8	6,3	4,1	3,3	3,5	3,4
Très mauvaise à moyenne	36,9	27,3	17,1	27,6	15,4	6,8	9,7
Total	15,6	12,1	8,7	9,2	5,9	4,2	4,8
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	15,8	11,5	8,0	9,3	5,2	3,6	5,1
Dans le passé	21,0	13,4	10,7	10,6	7,8	4,3	6,4
Modéré (<20)	9,5	11,1	7,8	6,9	4,7	5,7	2,7
Gros fumeur	14,0	13,3	9,0	12,8	6,5	4,3	3,8
Total	15,5	12,0	8,7	9,5	5,8	4,3	4,7
REGION DE RESIDENCE							
Région flamande	11,7	9,1	9,2	6,6	3,7	3,1	3,0
Région bruxelloise	14,9	12,2	9,4	10,3	7,0	5,6	5,6
Région wallonne	16,2	13,0	10,2	11,3	7,5	6,6	5,5
Belgique	13,5	10,7	9,5	8,5	5,3	4,5	4,1

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_P\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						Total
	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour la peau	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments prescrits	Pas de médicaments prescrits	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	2,5	2,4	2,5	1,6	2,1	65,0	4956
Femme	5,4	3,1	2,5	2,3	3,9	53,3	5200
Total	4,0	2,8	2,5	2,0	3,0	59,2	10156
GROUPES AGE							
0-14	3,2	3,3	2,0	,4	1,8	74,6	1646
15-24	3,0	3,8	4,2	,7	2,3	73,3	1142
25-34	1,8	2,3	1,6	,6	2,7	75,1	1637
35-44	3,9	2,9	2,9	1,3	2,5	65,0	1602
45-54	4,2	2,2	1,6	1,4	4,4	51,9	1289
55-64	4,7	2,6	2,5	4,2	5,6	35,5	1085
65-74	6,8	2,5	3,2	5,8	3,4	18,9	1075
75 +	12,4	1,5	2,3	10,8	2,1	14,1	680
Total	4,0	2,8	2,5	2,0	3,0	59,2	10156
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	7,0	2,3	3,9	6,4	2,4	46,3	352
Ecole primaire	5,7	3,0	1,9	2,1	2,2	43,3	1285
Secondaire inférieur	4,5	2,4	2,9	1,9	2,9	56,2	1659
Secondaire supérieur	3,3	3,0	2,3	2,1	3,0	60,8	2940
Supérieur	3,5	2,7	2,4	1,5	3,4	64,8	3496
Total	3,9	2,8	2,4	2,0	3,0	59,1	9732
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	2,8	3,4	2,3	1,7	1,3	60,4	787
20.000-30.000	4,4	2,9	2,7	3,2	3,2	56,1	2022
30.000-40.000	4,2	2,7	2,2	1,4	3,0	55,1	2373
40.000-60.000	4,0	2,7	2,5	1,6	2,9	61,4	3235
>60.000	2,9	2,4	2,9	2,0	3,9	63,3	1275
Total	3,9	2,8	2,5	2,0	3,0	59,0	9692
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	2,2	2,3	2,2	1,6	3,2	65,8	5892
Très mauvaise à moyenne	10,1	4,5	3,9	4,2	3,9	24,6	2014
Total	3,9	2,7	2,6	2,1	3,4	56,9	7906
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	3,9	2,9	2,4	2,5	3,3	57,2	3706
Dans le passé	3,3	2,7	2,7	2,7	4,2	49,3	1912
Modéré (<20)	3,8	2,6	2,5	1,7	2,9	64,5	1563
Gros fumeur	4,7	1,8	2,8	1,2	2,6	56,4	835
Total	3,8	2,7	2,6	2,2	3,3	56,8	8016
REGION DE RESIDENCE							
Région flamande	2,8	2,6	1,9	1,4	3,1	62,8	3524
Région bruxelloise	6,5	3,0	3,1	3,6	2,6	58,0	3012
Région wallonne	5,1	3,0	3,3	2,4	3,0	53,2	3620
Belgique	4,0	2,8	2,5	2,0	3,0	59,2	10156

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_P\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)							
	Médicaments cardiovasculaires	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments pour le système nerveux	Médicaments pour le système digestif	Antibiotidans	Médec. et relation avec le système hormonal (*)
	%	%	%	%	%	%	%
<b>SEXE</b>							
Homme	10,5	8,8	8,7	4,0	3,1	2,8	1,9
Femme	13,0	9,4	9,7	9,3	4,4	3,5	4,1
Total	11,7	9,1	9,2	6,6	3,7	3,1	3,0
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	,2	2,8	13,5	,7	1,4	4,1	,0
15-24	1,3	7,6	8,2	1,3	2,2	2,4	,4
25-34	1,0	4,8	6,0	2,6	2,3	4,2	,6
35-44	7,1	7,2	7,4	7,3	3,2	2,7	,8
45-54	8,9	13,6	9,4	5,9	4,4	2,4	7,3
55-64	34,6	15,1	10,3	8,6	6,0	1,6	8,0
65-74	47,4	19,1	11,6	24,7	9,3	4,0	6,7
75 +	55,6	19,3	10,5	31,8	10,2	4,5	8,0
Total	11,7	9,1	9,2	6,6	3,7	3,1	3,0
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	29,0	14,0	12,2	12,6	7,2	1,4	4,8
Ecole primaire	25,1	18,8	11,0	13,8	5,2	2,5	7,8
Secondaire inférieur	16,5	10,8	7,6	10,6	5,5	3,4	4,4
Secondaire supérieur	10,7	8,8	10,6	5,5	3,2	2,3	2,1
Supérieur	5,7	5,8	7,9	3,5	2,5	4,1	1,5
Total	11,8	9,3	9,2	6,7	3,7	3,1	3,0
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	28,4	12,0	10,6	15,2	8,4	2,3	5,7
20.000-30.000	17,5	9,4	7,6	9,5	5,3	2,2	4,2
30.000-40.000	13,0	11,7	10,6	7,8	4,0	4,1	4,5
40.000-60.000	8,4	8,0	9,9	4,6	3,3	3,4	2,0
>60.000	8,1	7,6	7,8	3,6	2,2	2,7	1,7
Total	11,8	9,2	9,3	6,5	3,8	3,2	3,1
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	8,6	6,9	6,5	2,8	2,0	2,5	2,5
Très mauvaise à moyenne	34,3	26,0	17,8	25,6	14,3	5,1	8,2
Total	13,3	10,4	8,6	7,0	4,2	3,0	3,6
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	12,9	9,2	7,8	7,5	3,1	2,5	3,7
Dans le passé	18,3	11,0	11,1	7,9	6,7	2,8	4,7
Modéré (<20)	7,4	11,5	7,4	4,3	3,1	4,4	2,1
Gros fumeur	15,5	11,2	8,9	9,6	4,7	3,5	2,4
Total	13,3	10,3	8,6	7,2	4,1	3,1	3,5

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_P\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						Total
	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour la peau	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments prescrits	Pas de médicaments prescrits	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Homme	1,7	2,2	2,1	1,2	2,2	68,5	1752
Femme	4,0	3,0	1,7	1,6	4,1	56,9	1772
<b>Total</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>	<b>3,1</b>	<b>62,8</b>	<b>3524</b>
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	1,9	2,8	,9	,7	1,5	77,9	547
15-24	2,7	3,5	3,3	,3	1,4	73,7	428
25-34	1,4	2,5	1,5	,6	2,8	77,7	589
35-44	3,2	3,1	3,1	,9	1,9	69,3	532
45-54	2,9	2,3	1,4	1,1	5,3	57,5	467
55-64	3,2	2,1	,5	2,5	7,2	38,2	403
65-74	3,3	1,8	2,7	4,9	3,3	22,7	363
75 +	11,2	,6	1,5	6,7	3,1	18,8	195
<b>Total</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>	<b>3,1</b>	<b>62,8</b>	<b>3524</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	5,6	2,0	5,0	4,3	3,6	55,3	65
Ecole primaire	2,6	4,0	1,7	2,0	3,1	44,6	424
Secondaire inférieur	3,0	2,6	2,4	1,4	4,0	58,4	603
Secondaire supérieur	2,5	2,5	1,9	1,6	2,8	62,6	1174
Supérieur	3,0	2,5	1,6	1,0	3,1	70,3	1136
<b>Total</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,1</b>	<b>62,5</b>	<b>3402</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	2,1	2,7	1,4	4,1	,6	56,1	119
20.000-30.000	2,0	2,0	1,7	2,2	3,7	58,2	601
30.000-40.000	2,4	3,3	1,8	1,1	3,7	57,4	860
40.000-60.000	3,8	2,8	1,9	1,1	2,5	65,9	1291
>60.000	1,6	2,1	2,3	1,2	3,5	67,8	459
<b>Total</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>	<b>3,1</b>	<b>62,5</b>	<b>3330</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	1,8	2,5	1,7	1,1	3,1	68,5	2272
Très mauvaise à moyenne	8,4	3,1	3,6	3,8	5,8	25,0	568
<b>Total</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>3,6</b>	<b>60,6</b>	<b>2840</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	3,0	2,9	1,9	1,5	3,4	61,0	1373
Dans le passé	3,1	2,7	1,6	2,4	4,4	53,8	699
Modéré (<20)	3,3	2,5	2,7	1,2	2,3	68,9	561
Gros fumeur	1,1	1,0	2,5	,7	3,6	57,2	241
<b>Total</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>3,4</b>	<b>60,5</b>	<b>2874</b>

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_P\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)							
	Médicaments cardiovasculaires	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments pour le système nerveux	Médicaments pour le système digestif	Antibiotidans	Médec. et relation avec le système hormonal (*)
	%	%	%	%	%	%	%
<b>SEXE</b>							
Homme	12,2	9,6	8,7	7,9	5,7	5,6	2,5
Femme	17,4	14,6	10,0	12,6	8,2	5,6	8,5
Total	14,9	12,2	9,4	10,3	7,0	5,6	5,6
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	,0	4,6	13,8	1,7	2,6	7,6	,0
15-24	2,1	7,2	6,5	1,7	1,7	2,8	,8
25-34	2,7	8,4	6,6	4,1	3,7	5,1	,4
35-44	8,0	11,9	7,8	8,9	5,5	5,9	1,3
45-54	18,3	14,9	10,4	16,3	11,5	5,8	13,9
55-64	25,0	17,5	9,8	15,6	9,8	5,7	15,2
65-74	49,4	17,6	10,6	21,0	14,9	6,4	17,1
75 +	58,3	30,9	13,4	34,9	16,7	6,8	7,6
Total	14,9	12,2	9,4	10,3	7,0	5,6	5,6
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	15,6	11,2	15,9	7,2	10,9	5,9	7,9
Ecole primaire	19,1	18,0	8,9	14,5	8,7	5,8	4,8
Secondaire inférieur	19,7	14,0	9,9	15,6	8,0	5,6	8,4
Secondaire supérieur	16,1	12,0	10,7	10,8	6,6	7,6	5,2
Supérieur	10,3	8,9	5,7	6,4	5,0	4,3	4,5
Total	14,6	11,7	8,8	9,9	6,7	5,7	5,5
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	7,0	11,2	9,9	7,3	5,8	3,3	2,1
20.000-30.000	14,3	15,1	10,1	10,7	9,2	7,7	5,1
30.000-40.000	19,4	13,9	15,1	14,0	9,3	7,1	7,0
40.000-60.000	14,0	11,0	7,0	9,6	4,0	4,7	6,8
>60.000	17,9	9,0	5,1	9,1	6,6	4,0	5,8
Total	14,8	12,3	9,5	10,3	7,0	5,6	5,6
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	11,0	7,8	5,3	5,1	4,4	3,7	5,1
Très mauvaise à moyenne	35,8	30,2	17,9	28,9	17,2	11,1	10,3
Total	17,3	13,4	8,4	11,1	7,6	5,5	6,4
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	17,4	13,1	7,7	8,7	8,9	5,2	6,5
Dans le passé	29,0	16,3	9,6	13,9	7,5	4,0	9,4
Modéré (<20)	11,4	11,3	9,9	10,2	5,7	6,7	3,5
Gros fumeur	10,7	11,9	7,3	16,3	6,1	4,8	4,0
Total	17,7	13,2	8,5	11,1	7,6	5,2	6,2

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_P\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						Total
	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour la peau	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments prescrits	Pas de médicaments prescrits	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Homme	5,6	3,1	2,3	2,6	2,4	65,1	1458
Femme	7,5	2,8	3,8	4,6	2,8	51,4	1554
<b>Total</b>	<b>6,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	<b>58,0</b>	<b>3012</b>
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	7,9	3,0	4,2	,2	1,1	70,8	474
15-24	2,3	4,7	3,6	,0	1,7	76,9	313
25-34	3,6	1,5	2,4	,5	2,1	75,8	496
35-44	4,8	2,0	2,6	1,1	2,8	64,7	481
45-54	6,3	2,8	2,5	1,3	3,4	48,5	380
55-64	7,4	7,0	3,6	5,8	4,2	37,5	308
65-74	12,8	2,7	2,5	9,8	5,2	22,3	323
75 +	16,4	,8	3,4	26,4	1,7	18,6	237
<b>Total</b>	<b>6,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	<b>58,0</b>	<b>3012</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	1,6	4,7	2,7	3,1	2,7	55,6	167
Ecole primaire	9,9	2,3	1,9	3,5	2,5	53,4	365
Secondaire inférieur	8,0	3,4	2,6	2,6	2,3	54,7	425
Secondaire supérieur	7,8	2,3	3,7	5,7	1,9	54,5	699
Supérieur	4,8	2,7	3,4	2,3	3,5	64,4	1190
<b>Total</b>	<b>6,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>	<b>58,5</b>	<b>2846</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	3,4	2,7	2,5	,7	1,2	68,0	368
20.000-30.000	9,5	4,1	3,9	5,1	2,4	56,2	618
30.000-40.000	9,4	2,5	2,1	3,7	1,5	51,3	607
40.000-60.000	5,0	3,6	3,4	3,2	3,4	59,9	780
>60.000	4,5	1,5	3,0	5,1	4,2	56,5	489
<b>Total</b>	<b>6,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>	<b>57,8</b>	<b>2862</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	3,7	2,1	2,5	3,0	3,3	66,4	1670
Très mauvaise à moyenne	14,3	6,0	4,5	7,4	2,0	24,8	615
<b>Total</b>	<b>6,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>4,1</b>	<b>3,0</b>	<b>56,0</b>	<b>2285</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	5,6	2,4	2,0	5,4	3,1	56,8	1009
Dans le passé	8,9	4,9	4,4	5,1	2,4	46,0	556
Modéré (<20)	4,7	3,4	2,2	2,3	3,7	61,1	452
Gros fumeur	8,7	2,2	5,0	2,3	2,9	61,4	278
<b>Total</b>	<b>6,5</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>4,3</b>	<b>3,1</b>	<b>56,0</b>	<b>2295</b>

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_P\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						
	Médicaments cardiovasculaires	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Médicaments pour le système nerveux	Médicaments pour le système digestif	Antibiotidans	Médec. et relation avec le système hormonal (*)
	%	%	%	%	%	%	%
<b>SEXE</b>							
Homme	12,9	10,4	10,3	8,8	6,1	7,4	2,4
Femme	19,5	15,5	10,1	13,8	8,9	5,8	8,6
Total	16,2	13,0	10,2	11,3	7,5	6,6	5,5
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	,1	5,1	16,2	,4	2,1	7,7	,0
15-24	,9	6,6	7,4	1,1	2,6	6,1	,0
25-34	3,0	7,4	7,6	4,7	4,3	6,8	1,0
35-44	9,3	11,7	8,8	10,6	6,4	6,4	2,2
45-54	20,5	14,3	8,5	15,4	8,9	6,8	9,5
55-64	39,4	22,5	8,5	24,1	16,8	6,1	23,4
65-74	57,6	29,0	13,2	29,6	20,0	2,9	14,6
75 +	72,9	39,5	13,0	44,5	16,1	11,7	10,1
Total	16,2	13,0	10,2	11,3	7,5	6,6	5,5
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	24,2	26,9	16,9	19,2	26,8	11,9	6,8
Ecole primaire	34,9	21,4	11,9	23,4	12,5	3,9	10,9
Secondaire inférieur	19,8	17,1	10,3	14,0	7,3	5,8	5,3
Secondaire supérieur	10,6	9,3	9,6	8,2	6,5	5,7	3,2
Supérieur	13,2	10,1	9,6	8,4	5,5	8,0	5,9
Total	16,4	12,9	10,2	11,4	7,6	6,6	5,6
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	13,9	15,8	6,5	10,8	5,5	4,6	3,3
20.000-30.000	13,9	13,7	12,2	12,0	7,8	7,5	5,4
30.000-40.000	17,7	13,5	8,8	12,3	8,8	6,3	5,1
40.000-60.000	17,1	12,9	11,1	10,5	7,2	7,3	6,2
>60.000	13,1	8,4	7,5	10,4	6,7	5,4	7,1
Total	15,9	13,1	10,1	11,3	7,6	6,7	5,6
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	11,4	9,9	6,2	6,6	5,7	5,5	4,7
Très mauvaise à moyenne	40,5	28,1	16,1	29,7	16,4	7,6	11,2
Total	19,3	14,8	8,9	12,8	8,6	6,0	6,5
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	20,7	15,4	8,2	13,0	8,1	5,2	7,1
Dans le passé	23,7	17,2	10,4	14,9	10,1	7,5	8,6
Modéré (<20)	12,7	10,2	8,0	10,5	7,1	7,7	3,4
Gros fumeur	12,9	16,8	9,7	16,4	9,3	5,3	5,6
Total	18,8	14,9	8,8	13,3	8,5	6,2	6,5

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_P\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)						Total
	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour la peau	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments prescrits	Pas de médicaments prescrits	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Homme	3,1	2,6	3,2	1,8	2,0	58,7	1746
Femme	7,2	3,3	3,3	3,0	3,9	47,7	1874
<b>Total</b>	<b>5,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>53,2</b>	<b>3620</b>
<b>GROUPES AGE</b>							
0-14	4,0	4,0	3,2	,1	2,4	70,5	625
15-24	3,7	4,1	6,1	1,4	3,9	71,5	401
25-34	1,9	2,1	1,3	,5	2,8	69,9	552
35-44	4,9	2,9	2,4	2,0	3,6	57,4	589
45-54	5,9	1,8	1,8	2,0	2,9	42,2	442
55-64	6,9	2,2	6,4	7,1	2,8	28,9	374
65-74	10,0	3,5	4,1	6,0	2,9	12,1	389
75 +	12,1	3,2	2,9	8,7	,9	4,7	248
<b>Total</b>	<b>5,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>53,2</b>	<b>3620</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	12,0	1,1	3,6	10,6	1,2	31,8	120
Ecole primaire	9,4	1,5	2,2	1,9	,8	37,6	496
Secondaire inférieur	6,2	2,0	3,6	2,6	1,3	52,9	631
Secondaire supérieur	3,7	4,1	2,7	2,0	3,8	58,7	1067
Supérieur	4,0	3,0	3,2	2,1	3,8	55,8	1170
<b>Total</b>	<b>5,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>53,3</b>	<b>3484</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	2,8	4,3	2,7	,7	1,7	59,2	300
20.000-30.000	6,2	3,8	3,7	4,0	2,8	53,2	803
30.000-40.000	5,6	1,9	2,8	1,4	2,2	52,5	906
40.000-60.000	4,1	2,4	3,4	2,3	3,5	52,9	1164
>60.000	5,6	4,0	4,4	2,4	5,2	54,0	327
<b>Total</b>	<b>5,0</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>53,5</b>	<b>3500</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	2,7	1,9	3,0	2,1	3,5	60,0	1950
Très mauvaise à moyenne	11,1	5,7	4,1	3,7	2,2	24,0	831
<b>Total</b>	<b>4,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>	<b>50,3</b>	<b>2781</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>							
Jamais	5,1	3,1	3,5	3,4	3,1	50,1	1324
Dans le passé	2,2	2,1	4,5	2,6	4,4	41,5	657
Modéré (<20)	4,3	2,4	2,3	2,5	3,6	57,9	550
Gros fumeur	8,5	2,8	2,5	1,6	1,0	53,7	316
<b>Total</b>	<b>4,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>50,2</b>	<b>2847</b>

(\*) Hormones et période post-ménopausale et/ou antidiabétiques



CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_N\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour le système digestif	Médicaments pour le système nerveux	Médicaments cardiovasculaires
	%	%	%	%	%	%
<b>SEXE</b>						
Homme	13,9	10,2	3,8	2,2	1,0	,9
Femme	20,9	12,7	6,0	3,3	1,4	1,0
Total	17,4	11,5	4,9	2,7	1,2	1,0
<b>GROUPES AGE</b>						
0-14	9,5	12,7	6,6	1,0	,2	,1
15-24	18,4	12,2	4,6	2,3	,7	,4
25-34	21,0	13,8	5,1	2,9	,9	,7
35-44	21,1	10,7	5,5	2,8	1,0	,6
45-54	22,1	10,2	3,0	3,3	2,2	1,1
55-64	15,3	10,4	5,9	4,1	2,5	2,2
65-74	12,2	10,5	3,9	3,9	1,1	2,6
75 +	11,7	5,5	2,6	2,5	2,2	3,0
Total	17,4	11,5	4,9	2,7	1,2	1,0
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	21,4	8,7	3,3	4,4	2,1	1,5
Ecole primaire	15,2	9,5	2,3	2,0	2,0	,8
Secondaire inférieur	17,6	11,5	4,7	2,9	1,3	1,7
Secondaire supérieur	16,2	11,9	3,4	2,2	,6	,6
Supérieur	18,5	11,7	7,4	3,1	1,4	,9
Total	17,3	11,4	4,9	2,7	1,2	,9
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	15,5	8,1	3,1	1,6	1,4	,6
20.000-30.000	16,4	10,7	4,1	2,4	1,4	1,4
30.000-40.000	17,9	12,0	4,3	3,0	1,6	1,0
40.000-60.000	16,6	11,4	4,7	2,9	,5	,7
>60.000	21,4	12,7	8,1	2,8	1,2	1,0
Total	17,4	11,4	4,8	2,7	1,1	1,0
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	17,4	11,6	4,4	2,7	,8	,8
Très mauvaise à moyenne	24,8	10,7	5,7	4,5	3,4	2,7
Total	19,0	11,4	4,7	3,1	1,4	1,2
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>						
Jamais	17,7	10,8	4,0	3,1	1,1	1,0
Dans le passé	17,2	11,7	5,3	3,3	1,4	1,8
Modéré (<20)	20,9	11,8	2,7	2,7	1,7	1,0
Gros fumeur	24,4	12,2	5,0	3,5	1,8	,9
Total	19,0	11,4	4,7	3,1	1,3	1,2
<b>REGION DE RESIDENCE</b>						
Région flamande	16,4	12,1	4,2	2,3	1,1	,7
Région bruxelloise	20,9	12,5	9,7	3,9	1,5	1,1
Région wallonne	18,1	9,9	4,7	3,1	1,2	1,5
Belgique	17,4	11,5	4,9	2,7	1,2	1,0

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_N\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					Total
	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments non prescrits	Pas de médicaments non prescrits	N
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Homme	1,0	,4	,4	1,0	71,4	4962
Femme	1,0	,9	,5	1,8	61,9	5207
Total	1,0	,6	,4	1,4	66,6	10169
<b>GROUPES AGE</b>						
0-14	,8	,3	,3	1,6	72,0	1647
15-24	1,2	1,2	,2	1,3	65,4	1145
25-34	1,6	,8	,2	,6	63,5	1639
35-44	,7	,9	,8	1,4	63,9	1610
45-54	1,2	,6	,5	1,6	63,8	1286
55-64	1,0	,2	,2	2,1	67,4	1089
65-74	,6	,4	,6	2,1	70,7	1075
75 +	,3	,0	1,0	1,0	76,2	678
Total	1,0	,6	,4	1,4	66,6	10169
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	,2	,1	,5	,6	66,7	353
Ecole primaire	,4	,3	,2	,8	74,9	1287
Secondaire inférieur	,6	,4	,5	1,4	67,4	1660
Secondaire supérieur	1,0	,7	,3	1,2	68,3	2944
Supérieur	1,5	,9	,5	1,9	62,4	3501
Total	1,0	,6	,4	1,4	66,7	9745
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	1,1	,4	,9	1,3	73,2	787
20.000-30.000	,9	,3	,2	1,0	70,0	2025
30.000-40.000	,7	,9	,5	1,5	65,3	2371
40.000-60.000	1,1	,7	,4	1,7	67,2	3240
>60.000	1,7	,8	,7	1,5	59,0	1284
Total	1,1	,7	,4	1,4	66,6	9707
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	1,2	,7	,5	1,1	66,7	5901
Très mauvaise à moyenne	1,0	,6	,6	2,3	59,8	2017
Total	1,1	,7	,5	1,4	65,2	7918
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>						
Jamais	,9	,8	,4	1,7	66,7	3709
Dans le passé	1,3	,4	,6	1,6	64,4	1917
Modéré (<20)	1,6	1,0	,4	,7	65,2	1569
Gros fumeur	,5	,4	,6	1,0	61,7	832
Total	1,1	,7	,5	1,4	65,4	8027
<b>REGION DE RESIDENCE</b>						
Région flamande	,9	,6	,3	1,5	67,2	3521
Région bruxelloise	1,0	1,0	,9	1,3	60,2	3035
Région wallonne	1,2	,7	,5	1,3	67,7	3613
Belgique	1,0	,6	,4	1,4	66,6	10169

REGIO: 1 Région flamande

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_N\_2)  
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour le système digestif	Médicaments pour le système nerveux	Médicaments cardiovasculaires
	%	%	%	%	%	%
<b>SEXE</b>						
Homme	12,3	10,0	3,2	2,0	,8	,6
Femme	20,5	14,2	5,2	2,6	1,4	,7
Total	16,4	12,1	4,2	2,3	1,1	,7
<b>GROUPES AGE</b>						
0-14	10,8	15,8	5,5	1,2	,2	,2
15-24	18,1	12,5	3,4	2,0	,9	,2
25-34	19,3	14,6	4,9	2,1	,7	,9
35-44	21,0	11,3	4,7	2,6	,5	,1
45-54	18,9	9,7	1,8	2,5	2,4	,6
55-64	11,4	10,8	5,6	2,6	2,1	1,3
65-74	10,1	9,1	3,9	4,1	1,2	1,6
75 +	12,0	6,5	1,3	1,9	2,7	3,1
Total	16,4	12,1	4,2	2,3	1,1	,7
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	25,3	9,1	2,5	8,5	5,0	1,4
Ecole primaire	14,9	10,4	2,3	1,5	2,3	,3
Secondaire inférieur	15,7	11,5	4,8	3,0	,9	,9
Secondaire supérieur	15,6	13,5	2,3	1,6	,4	,4
Supérieur	17,1	11,8	6,3	2,4	1,5	,7
Total	16,2	12,1	4,1	2,2	1,2	,6
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	10,7	6,8	,1	,8	2,5	,5
20.000-30.000	15,4	11,1	3,8	2,0	1,5	1,6
30.000-40.000	16,6	12,9	3,4	2,8	1,7	,5
40.000-60.000	15,5	11,8	3,5	1,9	,1	,5
>60.000	20,3	12,9	7,2	2,7	,9	,4
Total	16,3	11,9	4,0	2,2	,9	,7
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	15,6	11,9	3,6	2,2	,6	,5
Très mauvaise à moyenne	25,4	10,5	6,0	4,1	4,2	2,2
Total	17,4	11,6	4,0	2,5	1,3	,8
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>						
Jamais	16,5	11,4	3,2	2,7	1,0	,9
Dans le passé	14,2	12,5	5,1	2,9	1,3	1,0
Modéré (<20)	21,9	11,2	4,5	1,9	2,0	,7
Gros fumeur	21,1	11,3	4,8	2,4	1,1	,3
Total	17,4	11,6	4,0	2,6	1,2	,8

REGIO: 1 Région flamande

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_N\_2)  
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					Total
	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments non prescrits	Pas de médicaments non prescrits	N (*)
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Homme	,9	,4	,2	1,0	73,5	1749
Femme	1,0	,7	,4	2,0	60,9	1772
Total	,9	,6	,3	1,5	67,2	3521
<b>GROUPES AGE</b>						
0-14	1,1	,5	,5	1,6	68,4	546
15-24	1,4	1,0	,0	1,0	66,3	428
25-34	1,5	,6	,1	,5	64,7	590
35-44	,4	,8	,8	1,4	64,4	533
45-54	,9	,5	,1	2,2	66,6	464
55-64	,2	,0	,0	2,7	70,2	406
65-74	,7	,3	,5	2,5	73,1	362
75 +	,5	,0	,5	,4	75,5	192
Total	,9	,6	,3	1,5	67,2	3521
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	,5	,0	,9	,0	59,4	65
Ecole primaire	,4	,0	,0	,7	74,9	422
Secondaire inférieur	,3	,2	,3	1,4	68,1	606
Secondaire supérieur	,9	,7	,1	1,1	68,5	1171
Supérieur	1,3	,8	,5	2,5	63,8	1135
Total	,9	,6	,3	1,6	67,3	3399
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	,3	,6	1,4	2,4	77,8	117
20.000-30.000	,9	,0	,0	,8	69,7	601
30.000-40.000	,7	1,1	,0	1,3	65,7	859
40.000-60.000	,9	,5	,4	1,9	68,8	1291
>60.000	1,6	,8	,7	1,7	61,4	461
Total	1,0	,6	,3	1,6	67,4	3329
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	1,1	,6	,3	1,1	68,8	2275
Très mauvaise à moyenne	,3	,1	,3	3,5	57,3	565
Total	,9	,5	,3	1,6	66,7	2840
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>						
Jamais	,8	,8	,2	1,9	67,6	1373
Dans le passé	,6	,2	,6	1,7	66,6	701
Modéré (<20)	1,7	,8	,1	,6	66,0	559
Gros fumeur	,5	,0	,4	1,2	64,8	239
Total	,9	,6	,3	1,5	66,8	2872

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_N\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour le système digestif	Médicaments pour le système nerveux	Médicaments cardiovasculaires
	%	%	%	%	%	%
<b>SEXE</b>						
Homme	17,8	12,6	9,7	4,0	1,2	,9
Femme	23,8	12,5	9,7	3,9	1,8	1,3
Total	20,9	12,5	9,7	3,9	1,5	1,1
<b>GROUPES AGE</b>						
0-14	8,3	10,6	12,0	,9	,5	,2
15-24	27,0	14,3	11,1	5,6	1,3	,0
25-34	24,3	14,4	10,1	3,9	1,9	,8
35-44	24,0	15,0	9,2	3,1	1,1	,7
45-54	26,5	16,9	5,9	3,8	2,0	2,0
55-64	25,6	10,6	12,5	3,4	1,9	,8
65-74	12,3	6,2	6,4	8,1	1,3	3,0
75 +	12,6	4,6	9,5	4,7	2,1	3,3
Total	20,9	12,5	9,7	3,9	1,5	1,1
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	11,2	8,3	4,8	2,1	1,2	,0
Ecole primaire	18,3	11,8	5,2	3,0	1,4	1,0
Secondaire inférieur	20,3	9,5	7,8	2,3	1,4	1,2
Secondaire supérieur	18,0	13,5	11,7	4,9	1,5	1,2
Supérieur	25,0	13,8	11,8	4,4	1,3	1,2
Total	20,6	12,5	9,9	3,9	1,4	1,1
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	16,7	11,2	7,2	1,4	1,9	,9
20.000-30.000	21,3	11,9	6,8	2,7	,8	,5
30.000-40.000	19,2	12,9	14,3	4,5	2,5	1,5
40.000-60.000	21,1	13,7	10,5	6,2	1,3	,7
>60.000	24,5	13,7	9,7	4,1	1,4	2,1
Total	20,7	12,8	9,7	4,0	1,5	1,1
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	23,0	13,2	9,6	4,2	1,1	,9
Très mauvaise à moyenne	25,8	15,3	9,0	5,7	2,8	2,6
Total	23,7	13,7	9,5	4,6	1,5	1,3
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>						
Jamais	21,2	11,6	9,7	4,7	1,7	,9
Dans le passé	23,2	12,7	9,7	4,4	1,1	1,6
Modéré (<20)	24,5	16,7	11,4	4,8	1,8	1,1
Gros fumeur	31,5	16,3	6,6	4,5	1,4	2,6
Total	23,6	13,5	9,7	4,6	1,6	1,3

REGIO: 2 Région bruxelloise

 CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_N\_2)  
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					Total
	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments non prescrits	Pas de médicaments non prescrits	N (*)
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	,8	,6	1,0	,9	61,6	1468
Femme	1,1	1,3	,9	1,7	58,9	1567
Total	1,0	1,0	,9	1,3	60,2	3035
GROUPES AGE						
0-14	,8	,2	,0	1,0	71,0	478
15-24	1,0	1,4	,6	,7	52,5	314
25-34	1,9	1,0	,6	,4	59,2	498
35-44	1,6	1,1	1,1	2,4	56,3	488
45-54	,6	,8	,6	2,0	55,5	384
55-64	,3	2,2	,8	2,3	53,0	311
65-74	,0	,8	2,1	,6	69,7	324
75 +	,0	,0	3,6	1,0	71,6	238
Total	1,0	1,0	,9	1,3	60,2	3035
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	,0	,0	,5	1,6	77,4	168
Ecole primaire	,8	1,5	1,6	1,7	67,3	368
Secondaire inférieur	,4	,3	,7	1,0	64,9	425
Secondaire supérieur	1,3	1,2	,5	1,0	58,5	709
Supérieur	1,2	1,1	1,1	1,4	53,7	1199
Total	1,0	1,0	,9	1,3	60,0	2869
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	,8	,6	,5	,9	68,9	369
20.000-30.000	,8	1,1	,6	1,0	63,3	625
30.000-40.000	1,2	1,3	2,1	1,5	58,1	609
40.000-60.000	1,1	1,3	,9	1,1	56,4	786
>60.000	1,1	,5	,8	1,8	54,9	496
Total	1,0	1,0	1,0	1,3	60,0	2885
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,0	1,1	,9	1,1	57,5	1679
Très mauvaise à moyenne	1,7	1,6	1,9	1,7	56,6	622
Total	1,1	1,2	1,2	1,3	57,3	2301
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	,6	,9	1,1	1,0	59,7	1013
Dans le passé	,7	1,2	1,4	1,1	56,9	559
Modéré (<20)	2,4	1,9	,7	2,2	53,9	461
Gros fumeur	,9	1,5	,9	1,2	52,5	279
Total	1,1	1,2	1,0	1,3	57,0	2312

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_N\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					
	Anti-douleurs	Médicaments respiratoires	Vitamines, minéraux, tonidans	Médicaments pour le système digestif	Médicaments pour le système nerveux	Médicaments cardiovasculaires
	%	%	%	%	%	%
<b>SEXE</b>						
Homme	15,6	9,8	3,1	1,9	1,2	1,5
Femme	20,6	10,0	6,3	4,2	1,2	1,5
Total	18,1	9,9	4,7	3,1	1,2	1,5
<b>GROUPES AGE</b>						
0-14	7,7	8,5	6,8	,7	,0	,0
15-24	16,0	11,1	4,5	1,8	,3	,8
25-34	23,3	12,1	3,6	4,0	,8	,2
35-44	20,5	8,4	5,9	2,9	2,0	1,5
45-54	26,7	9,2	4,4	4,6	1,8	1,8
55-64	19,9	9,6	4,0	7,4	3,6	4,7
65-74	15,2	14,2	3,1	2,2	,8	4,1
75 +	10,7	4,6	,9	2,2	1,6	2,6
Total	18,1	9,9	4,7	3,1	1,2	1,5
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	24,7	8,5	2,9	2,2	,0	2,6
Ecole primaire	14,6	7,1	1,2	2,4	1,9	1,4
Secondaire inférieur	20,2	11,9	3,7	2,8	2,1	3,1
Secondaire supérieur	16,8	8,3	3,6	2,8	,6	,6
Supérieur	18,5	10,9	7,6	3,8	1,3	1,1
Total	18,1	9,8	4,8	3,1	1,2	1,4
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	17,9	7,3	2,9	2,2	,4	,5
20.000-30.000	16,2	9,5	3,6	2,7	1,6	1,4
30.000-40.000	19,6	10,4	3,1	2,8	1,0	1,8
40.000-60.000	17,6	10,3	5,8	4,1	1,1	1,1
>60.000	22,9	11,4	9,6	2,5	1,9	2,3
Total	18,3	10,0	4,7	3,2	1,2	1,4
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	19,4	10,5	4,3	3,2	1,2	1,3
Très mauvaise à moyenne	23,9	9,7	4,4	4,8	2,5	3,3
Total	20,6	10,3	4,3	3,7	1,6	1,9
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>						
Jamais	19,1	9,3	3,8	3,4	1,1	1,3
Dans le passé	21,5	10,0	4,3	3,7	1,8	3,4
Modéré (<20)	17,9	11,3	4,5	3,3	1,1	1,6
Gros fumeur	26,8	12,3	4,9	4,7	2,8	1,2
Total	20,3	10,2	4,2	3,6	1,4	1,8

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : \$DR\_N\_2)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES (PAR CATEGORIE)					Total
	Médicaments pour la peau	Médicaments pour l'allergie	Médicaments pour les yeux	Autres médicaments non prescrits	Pas de médicaments non prescrits	N (*)
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Homme	1,3	,3	,4	1,1	70,6	1745
Femme	1,1	1,0	,5	1,5	64,7	1868
Total	1,2	,7	,5	1,3	67,7	3613
<b>GROUPES AGE</b>						
0-14	,3	,1	,0	1,9	77,9	623
15-24	1,0	1,6	,5	2,1	68,0	403
25-34	1,6	1,1	,3	,9	62,8	551
35-44	1,0	,9	,5	1,0	65,3	589
45-54	1,9	,6	1,3	,2	60,9	438
55-64	2,9	,0	,5	,8	66,5	372
65-74	,8	,3	,2	1,9	67,5	389
75 +	,1	,0	,3	2,0	79,5	248
Total	1,2	,7	,5	1,3	67,7	3613
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	,0	,4	,1	,5	66,0	120
Ecole primaire	,4	,2	,1	,5	77,6	497
Secondaire inférieur	1,1	,8	,8	1,5	66,9	629
Secondaire supérieur	1,2	,4	,5	1,2	70,5	1064
Supérieur	1,7	1,0	,2	1,2	63,2	1167
Total	1,2	,7	,4	1,2	67,8	3477
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	1,9	,1	,8	,9	72,6	301
20.000-30.000	1,0	,4	,3	1,2	72,8	799
30.000-40.000	,5	,6	,8	1,6	66,6	903
40.000-60.000	1,5	1,0	,3	1,3	66,5	1163
>60.000	2,5	1,2	,4	,8	54,6	327
Total	1,2	,7	,5	1,3	67,4	3493
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	1,4	,8	,6	1,1	65,3	1947
Très mauvaise à moyenne	1,8	1,0	,5	,8	63,9	830
Total	1,5	,8	,6	1,1	64,9	2777
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>						
Jamais	1,2	,8	,5	1,6	67,4	1323
Dans le passé	2,7	,8	,5	1,4	62,4	657
Modéré (<20)	1,2	1,0	,8	,4	67,4	549
Gros fumeur	,4	,6	,9	,6	60,3	314
Total	1,4	,8	,6	1,2	65,4	2843



CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR\_PSY)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PSYCHOTROPES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES				Total N
	1	2	3	4	
	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>					
Homme	2,8	2,6	2,1	94,5	4956
Femme	5,7	4,3	4,5	89,5	5200
Total	4,3	3,4	3,3	92,0	10156
<b>GROUPE AGE</b>					
0-14	,1	,3	,3	99,6	1646
15-24	,4	,6	1,0	98,8	1142
25-34	,9	1,4	1,9	97,1	1637
35-44	2,8	4,0	4,7	92,2	1602
45-54	4,3	4,4	5,4	90,4	1289
55-64	8,7	6,4	4,0	86,3	1085
65-74	14,8	9,6	7,5	75,6	1075
75 +	24,8	10,8	5,5	66,2	680
Total	4,3	3,4	3,3	92,0	10156
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	10,1	8,1	2,4	86,3	352
Ecole primaire	8,6	8,5	6,0	84,1	1285
Secondaire inférieur	6,8	4,8	4,9	88,2	1659
Secondaire supérieur	2,4	2,9	3,0	93,9	2940
Supérieur	3,0	1,5	1,9	94,9	3496
Total	4,2	3,5	3,2	92,0	9732
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	5,1	5,2	2,6	89,6	787
20.000-30.000	5,8	4,5	5,4	89,6	2022
30.000-40.000	5,0	3,8	3,6	90,9	2373
40.000-60.000	3,1	3,1	2,7	93,6	3235
>60.000	3,1	2,1	1,5	94,5	1275
Total	4,2	3,5	3,3	92,0	9692
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	2,1	1,5	1,4	95,9	5892
Très mauvaise à moyenne	14,9	11,9	11,9	73,2	2014
Total	4,9	3,8	3,7	91,0	7906
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	4,6	3,6	3,4	91,1	3706
Dans le passé	6,9	3,3	3,7	89,6	1912
Modéré (<20)	3,1	3,9	2,9	93,1	1563
Gros fumeur	5,4	6,7	7,7	88,4	835
Total	4,9	3,9	3,9	90,8	8016
<b>REGION DE RESIDENCE</b>					
Région flamande	2,9	2,2	2,4	94,1	3524
Région bruxelloise	6,1	4,7	4,4	90,1	3012
Région wallonne	6,1	5,2	4,5	89,1	3620
Belgique	4,3	3,4	3,3	92,0	10156
-----					
1	Somnifères				
2	Tranquillisants, autres médicaments pour les nerfs				
3	Médicaments pour la dépression				
4	Pas	de	consommation	de	médicaments psychotropes

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR\_PSY)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PSYCHOTROPES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES				Total
	1	2	3	4	N
	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>					
Homme	1,5	1,3	1,5	96,5	1752
Femme	4,3	3,2	3,3	91,5	1772
Total	2,9	2,2	2,4	94,1	3524
<b>GROUPES AGE</b>					
0-14	,1	,4	,3	99,6	547
15-24	,6	,6	1,2	98,7	428
25-34	,8	1,0	1,5	97,7	589
35-44	2,1	2,2	3,7	93,7	532
45-54	2,1	1,9	3,0	94,5	467
55-64	4,9	2,8	2,7	91,5	403
65-74	11,6	9,3	6,2	77,9	363
75 +	20,4	8,4	2,6	72,5	195
Total	2,9	2,2	2,4	94,1	3524
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	9,5	5,0	1,4	87,4	65
Ecole primaire	6,3	5,5	3,8	88,2	424
Secondaire inférieur	5,4	3,7	4,1	89,6	603
Secondaire supérieur	1,4	2,3	2,6	95,1	1174
Supérieur	1,8	,5	,8	97,1	1136
Total	2,9	2,3	2,3	94,0	3402
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	8,0	6,6	,7	85,6	119
20.000-30.000	4,8	3,0	5,2	90,6	601
30.000-40.000	3,8	2,1	2,7	93,2	860
40.000-60.000	1,1	2,3	1,7	96,0	1291
>60.000	2,1	,8	,5	96,9	459
Total	2,8	2,3	2,4	94,1	3330
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	1,1	1,2	1,1	97,2	2272
Très mauvaise à moyenne	13,8	7,5	10,5	75,3	568
Total	3,4	2,4	2,8	93,2	2840
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	3,5	2,4	3,0	92,9	1373
Dans le passé	5,2	1,8	2,3	92,2	699
Modéré (<20)	1,4	2,3	1,6	95,7	561
Gros fumeur	2,7	3,6	5,0	92,4	241
Total	3,4	2,4	2,8	93,3	2874

(1) Somnifères

(2) Tranquillisants, autres médicaments psychotropes

(3) Antidépresseurs

(4) Pas de consommation de médicaments psychotropes

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR\_PSY)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PSYCHOTROPES AU				Total
	COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES				
	1	2	3	4	
	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>					
Homme	3,9	3,8	2,6	92,8	1458
Femme	8,1	5,4	6,0	87,6	1554
Total	6,1	4,7	4,4	90,1	3012
<b>GROUPES AGE</b>					
0-14	,2	,3	,0	99,6	474
15-24	,6	,9	,8	98,6	313
25-34	1,9	2,3	3,0	95,9	496
35-44	3,6	4,6	5,4	91,3	481
45-54	8,0	9,1	8,5	83,7	380
55-64	9,4	7,0	4,5	84,8	308
65-74	15,1	8,6	5,2	79,4	323
75 +	27,8	11,8	13,3	66,4	237
Total	6,1	4,7	4,4	90,1	3012
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	4,0	2,3	2,7	92,8	167
Ecole primaire	8,1	7,2	6,0	85,8	365
Secondaire inférieur	10,2	9,0	8,9	84,9	425
Secondaire supérieur	5,9	4,9	4,2	90,3	699
Supérieur	3,7	2,2	2,5	93,7	1190
Total	5,8	4,5	4,3	90,5	2846
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	3,8	3,6	3,5	92,8	368
20.000-30.000	6,9	4,9	4,2	89,4	618
30.000-40.000	7,7	6,1	5,3	87,6	607
40.000-60.000	5,8	5,5	4,4	90,6	780
>60.000	4,7	3,1	4,5	91,1	489
Total	6,0	4,8	4,4	90,1	2862
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	3,1	1,8	2,2	94,9	1670
Très mauvaise à moyenne	17,3	14,7	13,1	71,7	615
Total	6,7	5,1	5,0	89,1	2285
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	6,2	2,6	3,0	91,4	1009
Dans le passé	9,1	6,5	5,4	86,3	556
Modéré (<20)	4,0	5,7	4,9	89,9	452
Gros fumeur	8,6	9,8	10,3	84,1	278
Total	6,6	5,0	4,8	89,1	2295

(1) Somnifères

(2) Tranquillisants, autres médicaments psychotropes

(3) Antidépresseurs

(4) Pas de consommation de médicaments psychotropes

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR\_PSY)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PSYCHOTROPES AU				Total
	COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES				
	1	2	3	4	
	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>					
Homme	4,8	4,4	3,0	91,4	1746
Femme	7,4	5,9	6,0	86,7	1874
Total	6,1	5,2	4,5	89,1	3620
<b>GROUPES AGE</b>					
0-14	,0	,0	,3	99,7	625
15-24	,2	,5	,6	99,0	401
25-34	,9	1,7	2,3	96,2	552
35-44	3,7	6,8	6,2	89,9	589
45-54	7,3	7,6	9,0	84,6	442
55-64	16,5	13,5	6,8	75,9	374
65-74	19,7	10,4	10,2	70,7	389
75 +	29,8	14,0	5,8	56,8	248
Total	6,1	5,2	4,5	89,1	3620
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	14,7	15,0	3,1	80,8	120
Ecole primaire	12,5	14,0	9,6	76,7	496
Secondaire inférieur	8,2	5,7	5,2	86,8	631
Secondaire supérieur	3,5	3,4	3,5	92,3	1067
Supérieur	4,6	3,0	3,5	91,8	1170
Total	6,1	5,3	4,5	89,0	3484
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	3,9	5,1	3,3	90,5	300
20.000-30.000	6,8	6,4	6,1	88,2	803
30.000-40.000	6,1	5,8	4,6	88,2	906
40.000-60.000	6,5	4,1	4,3	89,6	1164
>60.000	5,0	5,3	2,8	89,7	327
Total	6,1	5,2	4,6	89,0	3500
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	3,7	2,0	2,0	93,6	1950
Très mauvaise à moyenne	15,5	16,4	13,3	70,9	831
Total	6,9	5,9	5,1	87,5	2781
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	6,2	6,1	4,3	87,5	1324
Dans le passé	9,5	5,1	6,0	85,3	657
Modéré (<20)	5,9	6,2	4,6	89,5	550
Gros fumeur	8,1	10,1	10,9	84,0	316
Total	7,1	6,4	5,6	87,0	2847

(1) Somnifères

(2) Tranquillisants, autres médicaments psychotropes

(3) Antidépresseurs

(4) Pas de consommation de médicaments psychotropes

**CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR08)**  
**Enquête de santé, Belgique, 1997**

NOMBRE DE TYPES DE MEDICAMENTS DIFFERENTS CONSOMMES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES					
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
<b>SEXE</b>					
Homme	1,9	1	1	2	2748
Femme	2,1	1	2	2	3546
<b>Total</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6294</b>
<b>GROUPES AGE</b>					
0-14	1,5	1	1	2	706
15-24	1,6	1	1	2	587
25-34	1,6	1	1	2	870
35-44	1,9	1	1	2	919
45-54	2,0	1	2	2	850
55-64	2,3	1	2	3	831
65-74	2,6	1	2	3	914
75 +	2,9	2	2	3	617
<b>Total</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6294</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	2,6	1	2	3	239
Ecole primaire	2,4	1	2	3	907
Secondaire inférieur	2,2	1	2	2	1083
Secondaire supérieur	1,8	1	1	2	1716
Supérieur	1,8	1	1	2	2077
<b>Total</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6022</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	2,2	1	2	3	433
20.000-30.000	2,1	1	2	2	1269
30.000-40.000	2,0	1	2	2	1532
40.000-60.000	1,9	1	1	2	1960
>60.000	1,8	1	1	2	814
<b>Total</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6008</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	1,7	1	1	2	3424
Très mauvaise à moyenne	2,9	1	2	3	1770
<b>Total</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5194</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	2,0	1	1	2	2405
Dans le passé	2,1	1	2	2	1370
Modéré (<20)	2,0	1	2	2	951
Gros fumeur	2,2	1	2	3	529
<b>Total</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5255</b>
<b>REGION DE RESIDENCE</b>					
Région flamande	1,8	1	1	2	2039
Région bruxelloise	2,3	1	2	3	1973
Région wallonne	2,2	1	2	3	2282
<b>Belgique</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6294</b>

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR08)

Enquête de santé, Belgique, 1997

-----					
NOMBRE DE TYPES DE MEDICAMENTS DIFFERENTS CONSOMMES AU					
COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES					
-----					
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
-----					
<b>SEXE</b>					
Homme	1,7	1	1	2	872
Femme	1,9	1	1	2	1167
Total	1,8	1	1	2	2039
<b>GROUPE AGE</b>					
0-14	1,5	1	1	2	233
15-24	1,5	1	1	2	217
25-34	1,6	1	1	2	292
35-44	1,8	1	1	2	274
45-54	1,8	1	1	2	265
55-64	1,9	1	1	2	294
65-74	2,4	1	2	3	297
75 +	2,5	1	2	3	167
Total	1,8	1	1	2	2039
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	2,4	1	2	2	47
Ecole primaire	2,1	1	2	2	290
Secondaire inférieur	2,0	1	1	2	387
Secondaire supérieur	1,7	1	1	2	651
Supérieur	1,6	1	1	2	592
Total	1,8	1	1	2	1967
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	2,5	1	2	3	67
20.000-30.000	1,9	1	2	2	376
30.000-40.000	1,9	1	1	2	532
40.000-60.000	1,7	1	1	2	703
>60.000	1,6	1	1	2	253
Total	1,8	1	1	2	1931
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	1,5	1	1	2	1223
Très mauvaise à moyenne	2,7	1	2	3	495
Total	1,8	1	1	2	1718
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	1,8	1	1	2	828
Dans le passé	1,9	1	1	2	464
Modéré (<20)	1,8	1	2	2	312
Gros fumeur	1,9	1	1	2	136
Total	1,8	1	1	2	1740
-----					

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR08)

Enquête de santé, Belgique, 1997

-----					
NOMBRE DE TYPES DE MEDICAMENTS DIFFERENTS CONSOMMES AU					
COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES					
-----					
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
-----					
<b>SEXE</b>					
Homme	2,1	1	2	2	876
Femme	2,4	1	2	3	1097
Total	2,3	1	2	3	1973
<b>GROUPE AGE</b>					
0-14	1,6	1	1	2	212
15-24	1,7	1	1	2	172
25-34	1,9	1	1	2	278
35-44	2,1	1	2	2	297
45-54	2,5	1	2	3	274
55-64	2,6	1	2	3	242
65-74	2,7	1	2	3	284
75 +	3,7	2	3	5	214
Total	2,3	1	2	3	1973
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	2,3	1	2	2	103
Ecole primaire	2,5	1	2	3	242
Secondaire inférieur	2,6	1	2	3	288
Secondaire supérieur	2,3	1	2	3	452
Supérieur	2,0	1	1	2	777
Total	2,2	1	2	2	1862
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	2,0	1	1	2	197
20.000-30.000	2,5	1	2	3	406
30.000-40.000	2,5	1	2	3	415
40.000-60.000	2,1	1	2	2	517
>60.000	2,1	1	2	2	335
Total	2,3	1	2	3	1870
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	1,9	1	1	2	1052
Très mauvaise à moyenne	3,3	2	3	4	542
Total	2,4	1	2	3	1594
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	2,3	1	2	2	686
Dans le passé	2,5	1	2	3	432
Modéré (<20)	2,3	1	2	3	291
Gros fumeur	2,5	1	2	3	185
Total	2,4	1	2	3	1594
-----					

REGIO: 3 Région wallonne

## CONSOMMATION DE SOINS : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS (INDICATEUR : DR08)

Enquête de santé, Belgique, 1997

-----					
NOMBRE DE TYPES DE MEDICAMENTS DIFFERENTS CONSOMMES AU					
COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES					
-----					
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
-----					
<b>SEXE</b>					
Homme	2,0	1	1	2	1000
Femme	2,4	1	2	3	1282
Total	2,2	1	2	3	2282
<b>GROUPES AGE</b>					
0-14	1,6	1	1	2	261
15-24	1,6	1	1	2	198
25-34	1,6	1	1	2	300
35-44	2,0	1	1	2	348
45-54	2,2	1	2	3	311
55-64	3,1	2	3	4	295
65-74	3,0	1	3	3	333
75 +	3,1	2	3	3	236
Total	2,2	1	2	3	2282
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	2,9	1	2	3	89
Ecole primaire	2,7	1	2	3	375
Secondaire inférieur	2,4	1	2	3	408
Secondaire supérieur	2,0	1	1	2	613
Supérieur	2,1	1	2	2	708
Total	2,2	1	2	3	2193
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	2,1	1	2	3	169
20.000-30.000	2,4	1	2	3	487
30.000-40.000	2,2	1	2	3	585
40.000-60.000	2,2	1	2	3	740
>60.000	2,0	1	2	2	226
Total	2,2	1	2	3	2207
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	1,8	1	1	2	1149
Très mauvaise à moyenne	3,1	2	3	4	733
Total	2,3	1	2	3	1882
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	2,2	1	2	3	891
Dans le passé	2,3	1	2	3	474
Modéré (<20)	2,1	1	2	2	348
Gros fumeur	2,5	1	2	3	208
Total	2,3	1	2	3	1921
-----					