

---



# **Enquête de Santé par Interview Belgique 2001**

---



## **Livre 5 Consommation de Soins**



**Rue de Louvain, 44  
1000 Bruxelles**

**Section d'Epidémiologie  
Rue Juliette Wytzman, 14  
1050 Bruxelles  
Tél : 02/642.57.94  
e-mail [his@iph.fgov.be](mailto:his@iph.fgov.be)  
[http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/  
index4.htm](http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index4.htm)**

**Equipe de recherche :**

**Jamila Buziarsist  
Stefaan Demarest  
Lydia Gisle  
Jean Tafforeau  
Johan Van der Heyden  
Herman Van Oyen**

**Avec la collaboration de :**

**Pieter-Jan Miermans  
Francis Sartor**

**Equipe logistique :**

**Monique Schoonenburg  
Véronique Verhocht**

# Table des Matières

## LIVRE 1 :

*Pages*

<b>Introduction.....</b>	<b>8</b>
--------------------------	----------

### *Objectifs de l'Enquête de Santé*

<b>I. Contenu du Questionnaire .....</b>	<b>8</b>
<b>II. Constitution de l'Echantillon.....</b>	<b>11</b>
<b>III. Présentation des Différents Intervenants .....</b>	<b>17</b>
<b>IV. Organisation du Travail sur le Terrain .....</b>	<b>19</b>
<b>V. Réseau d'Enquêteurs .....</b>	<b>20</b>
<b>VI. Contrôles de Qualité .....</b>	<b>24</b>
<b>VII. Degré de Participation.....</b>	<b>28</b>
<b>VIII. Facteurs de Pondération .....</b>	<b>33</b>
<b>IX. Tableaux de Base .....</b>	<b>34</b>
<b>X. Population de l'Etude .....</b>	<b>39</b>

## LIVRE 2 :

<b>1. Etat de Santé .....</b>	<b>45</b>
<b>1.1. Santé Subjective .....</b>	<b>47</b>
<b>1.2. Santé Physique .....</b>	<b>81</b>
<b>1.2.1. Maladies et Affections Chroniques .....</b>	<b>81</b>
<b>1.2.2. Affections Aiguës .....</b>	<b>237</b>
<b>1.3. Santé Mentale .....</b>	<b>307</b>
<b>1.4. Limitations de l'Activité et Restriction de la Participation .....</b>	<b>419</b>

## LIVRE 3 :

<b>2. Style de Vie .....</b>	<b>627</b>
<b>2.1. Activités Physiques .....</b>	<b>629</b>
<b>2.2. Nutrition .....</b>	<b>699</b>
<b>2.2.1. Etat Nutritionnel .....</b>	<b>699</b>
<b>2.2.2. Habitudes Nutritionnelles .....</b>	<b>769</b>
<b>2.3. Consommation d'Alcool .....</b>	<b>877</b>
<b>2.4. Consommation de Tabac .....</b>	<b>951</b>
<b>2.5. Usage de Drogues Illicites .....</b>	<b>1037</b>
<b>2.6. Santé et Sexualité .....</b>	<b>1081</b>

# Table des Matières

*Pages*

## LIVRE 4 :

<b>3. Prévention .....</b>	<b>1131</b>
3.1. Vaccination chez les Adultes .....	1133
3.2. Prévention Cardiovasculaire .....	1201
3.3. Dépistage du Diabète .....	1277
3.4. Dépistage du Cancer du Sein .....	1319
3.5. Dépistage du Cancer du Col de l'Utérus .....	1375

## LIVRE 5 :

<b>4. Consommation de Soins .....</b>	<b>1401</b>
4.1. Contacts avec des Professionnels de la Santé .....	1403
4.1.1. Contacts avec le Médecin Généraliste .....	1403
4.1.2. Contacts avec le Médecin Spécialiste .....	1533
4.1.3. Contacts avec le Service des Urgences .....	1629
4.1.4. Contacts avec le Dentiste .....	1679
4.1.5. Contacts avec les Professionnels Paramédicaux .....	1733
4.2. Hospitalisation .....	1773
<b>4.3. Consommation de Médicaments .....</b>	<b>1857</b>
4.4. Satisfaction du Patient .....	1985
4.5. Thérapies Non-Conventionnelles .....	2077

## LIVRE 6 :

<b>5. Santé et Société .....</b>	<b>2139</b>
5.1. Accès aux Soins de Santé .....	2141
5.2. Différences Socio-Economiques en Matière de Santé .....	2187
5.3. Santé et Environnement .....	2193
5.4. Accidents, Sécurité Routière et Violence .....	2235
5.5. Santé Sociale .....	2339
5.6. Services Sociaux et Préventifs .....	2407



## **4.3. Consommation de Médicaments**



*Cette enquête a été réalisée à l'initiative de :*

**J. Tavernier**

*Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique  
et de l'Environnement*

**J. Chabert**

*Ministre des Travaux Publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie  
et de l'Aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale*

**T. Detienne**

*Ministre des Affaires Sociales et de la Santé de Région Wallonne*

**D. Gosuin**

*Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature  
et de la Propreté Publique, et du Commerce Extérieur de la Région Bruxelles-Capitale*

**N. Maréchal**

*Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé de la Communauté Française*

**H. Niessen**

*Ministre de la Jeunesse et de la Famille, des Monuments et Sites, de la Santé  
et des Affaires Sociales de la Communauté Germanophone*


**F. Vandenbroucke**

*Ministre des Affaires Sociales et des Pensions*

**M. Vogels**

*Ministre de l'Aide Sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances de la Communauté Flamande*

### 4.3. Consommation de Médicaments



#### I. Résumé

Les médicaments constituent un élément essentiel dans la prise en charge des problèmes de santé. Inversement, l'abus de médicaments mène à des dépenses exagérées et entraîne des effets secondaires non négligeables. Il est donc important de disposer d'une information sur l'importance de la consommation de médicaments afin d'assurer la qualité de leur utilisation.

Il est nécessaire également d'identifier un manque d'utilisation éventuel de certains médicaments importants; cela peut être dû à des problèmes financiers rencontrés par certains groupes de population, par exemple.

Il est utile enfin, d'identifier des groupes d'individus qui utilisent certains médicaments de manière problématique.

L'Enquête de Santé est une source d'information potentielle sur la consommation de médicaments. Elle permet de compléter les sources traditionnelles de données sur ce sujet. L'Enquête de Santé fournit notamment de l'information sur la consommation effective de médicaments et pas seulement sur la prescription de ceux-ci.

L'Enquête de Santé permet de mesurer la consommation de médicaments de comptoir (non soumis à la prescription d'un médecin et non remboursés). L'Enquête de Santé permet enfin d'étudier la consommation de médicaments en fonction des caractéristiques socio-économiques des individus, ou de leur état de santé.

## **Consommation de médicaments soumis à la prescription d'un médecin**

Environ la moitié de la population déclare avoir consommé un médicament sur prescription du médecin au cours des deux dernières semaines. Les femmes consomment plus souvent ce genre de médicaments que les hommes.

Chez les enfants, il s'agit plutôt de médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe et les maux de gorges.

Les hommes de 15-64 ans utilisent surtout des médicaments pour des problèmes cardiovasculaires, pour l'hypertension, et des analgésiques.

Chez les femmes de 15-64, ce sont surtout les contraceptifs et, chez les plus âgées, des traitements hormonaux de substitution, qui sont les médicaments les plus utilisés.

Chez les 65 ans et plus, les médicaments les plus utilisés concernent essentiellement les douleurs articulaires; viennent ensuite les somnifères.

L'utilisation de certains types de médicaments a augmenté de manière sensible de 1997 à 2001; il s'agit essentiellement des somnifères, mais aussi des traitements hormonaux de substitution et des analgésiques.

La consommation d'antibiotiques est restée stable de 1997 à 2001. En Wallonie, elle a même plutôt baissé de manière significative.

On observe une augmentation en Flandre et à Bruxelles des médicaments prescrits pour les enfants (surtout les garçons) contre l'asthme et les allergies.

On remarque que les individus avec un niveau socio-économique plus élevé utilisent moins de médicaments soumis à prescription. Cette différence s'explique toutefois en grande partie par la différence en matière d'état de santé par rapport aux classes socio-économique moins favorisées.

L'utilisation de médicaments soumis à prescription est plus importante en Wallonie qu'en Flandre. On remarque toutefois en Flandre une augmentation de la consommation globale des médicaments entre 1997 et 2001, ce qui n'est pas le cas par contre en Wallonie et à Bruxelles.

La consommation de médicaments chez les 45 – 64 ans a été étudiée plus en détails. Les Beta-bloquants sont les médicaments les plus utilisés dans ce groupe d'âge et ce aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On note aussi une consommation importante (surtout chez les hommes) de médicaments hypolipémiants, de psychotropes (surtout des benzodiazépines), d'anti-inflammatoires, de produits anti-rhumatismaux et de psychoanaleptiques (surtout des déprimeurs) chez les femmes.

Les résultats montrent aussi que les gens (45 – 64 ans) consomment souvent plusieurs types de médicaments de manière simultanée. 40% d'entre eux déclarent avoir consommé un médicament soumis à prescription au cours des dernières 24 heures ; parmi ceux-ci, 13% ont consommé jusqu'à cinq médicaments différents. Ce pourcentage atteint même 20% en Wallonie.



## **Consommation de médicaments de comptoir**

Un peu d'un quart de la population déclare avoir consommé un médicament de comptoir (sans prescription) au cours des deux dernières semaines. Les femmes consomment plus souvent ce genre de médicaments que les hommes.

Chez les enfants, il s'agit plutôt de médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe et les maux de gorges.

Chez les adultes (les hommes aussi bien que les femmes, les jeunes aussi bien que les personnes plus âgées), il s'agit en général d'anti-douleurs et de médicaments contre la fièvre.

On remarque que les individus avec un niveau socio-économique plus élevé utilisent plus de médicaments soumis de comptoir.

L'utilisation de ce type de médicaments est aussi plus fréquente à Bruxelles et Wallonie par rapport à la Flandre.

La consommation de médicaments de comptoir (sans prescription) semble avoir diminué en 2001 par rapport à 1997 ; une telle diminution n'est toutefois pas observée en Wallonie. Cette diminution concerne surtout les produits contre la toux, les refroidissements, la grippe et les maux de gorge.

## **Conclusions**

- On retient, à partir du questionnaire spécifique posé aux 45-64 ans, une consommation trop élevée de benzodiazépines. Il faut donc renforcer les efforts pour faire comprendre aux utilisateurs qu'il y a un risque important d'accoutumance avec ce genre de produit. Il y a certainement toute une série de facteurs qui expliquent la consommation de benzodiazépines, mais il est clair que la consommation de ce genre de produit est trop banalisée.
- L'utilisation d'antidépresseurs est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, mais elle est importante aussi chez les hommes de 65 ans et plus. Il est donc important de surveiller de près la consommation de ce type de médicaments car elle constitue un bon indicateur du bien-être des individus (stress, conditions de travail, vie sociale, qualité de vie,...)
- L'augmentation chez les enfants de la consommation de médicaments contre l'asthme et les allergies (en Flandre et à Bruxelles) pose la question du rôle de la pollution de l'air, des habitudes alimentaires, etc ... Les différences en ce qui concerne la consommation de médicaments entre les régions, les provinces, les villes doivent certainement être étudiées de manière plus approfondie à l'avenir.
- La stabilité de la consommation d'antibiotiques (et même la baisse observée en Wallonie) est peut-être le résultat des campagnes réalisées pour sensibiliser aussi bien les médecins que le grand public afin d'améliorer l'utilisation de ces médicaments. Ces efforts doivent être poursuivis à l'avenir.
- L'utilisation importante des thérapies hormonales chez les femmes cadre bien avec les recommandations actuelles en la matière. Des études récentes ont fait état toutefois de complications cardiovasculaires et de risques de cancer du sein liés à la prise d'hormones de substitution au cours de la ménopause. Il est possible donc que les recommandations dans ce domaine soient modifiées à l'avenir.

- Plus d'un quart de la population déclare avoir pris un médicament qui ne nécessite pas de prescription au cours des deux dernières semaines. Il est possible en effet de décider de manière relativement autonome en Belgique à propos de la consommation de toute une série de médicaments et donc de traiter soi-même les petites douleurs et les problèmes de santé courants. Ce principe est plutôt positif en soi mais cela suppose aussi d'informer correctement le grand public à propos d'un usage correct des médicaments. Ce genre d'information doit déjà commencer dès l'école. Il faut aussi insister sur le rôle prépondérant du pharmacien en tant que prestataire de soins de première ligne.
- On peut attribuer la baisse de la consommation des produits de comptoir à l'augmentation du prix des médicaments. Il ne faut pas oublier en effet qu'il n'y a pas de régulation du prix de ces médicaments en vente libre qui n'interviennent pas dans le budget de l'INAMI. Le prix moyen des médicaments a sérieusement augmenté au cours des années. Comme les produits de comptoir sont utilisés pour des problèmes plus bénins, le prix croissant du coût de la vie risque obliger peut-être les gens à faire des économies dans ce domaine.

## II. Introduction

Les médicaments permettent de prévenir et/ou de soigner les maladies. Ils permettent d'améliorer le bien-être du patient et d'améliorer la qualité de vie de la population. Il y a toutefois des effets négatifs liés à la consommation de médicaments; il s'agit essentiellement des effets secondaires d'une part et du coût de la prise en charge par la sécurité sociale de la consommation de ces médicaments. Ces coûts ont sérieusement augmenté au cours des dernières années et ce en raison de plusieurs facteurs : le vieillissement de la population, l'augmentation des pathologies chroniques (diabète, hypertension, asthme), les progrès scientifiques et l'amélioration de la qualité de vie (1).

Il est important aussi de collecter de l'information au sujet d'une sous utilisation éventuelle de quelques médicaments essentiels. On y trouvera avant des raisons financières au sein de certains groupes de population. Il est clair dans ce domaine qu'une utilisation rationnelle des médicaments est un but primordial en matière de politique de santé. Il faut disposer d'information sur l'ordre de grandeur et les coûts de la consommation de médicaments pour pouvoir en assurer la qualité. Il est nécessaire aussi d'identifier les groupes de population au sein desquels il existe un problème en matière de consommation de médicaments. Le nombre d'utilisateurs d'un médicament est en outre important à connaître pour vérifier la sécurité du produit..

Pour les études sur la consommation de médicaments, il est indispensable de disposer d'un système de classification standardisé et validé. Une telle classification a été développée dans les années 70 par l'"European Pharmaceutical market Research Association" (EPHRA) en Norvège. Il s'agissait de l'"Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification" (2). Cette dernière a été améliorée au cours du temps pour aboutir au système ATC/DDD. DDD est une abréviation de "Defined Daily Dose", une unité de mesure utile dans le domaine de la recherche. Le système ATC/DDD a été recommandé à partir de 1997 par l'OMS (Regional Office for Europe) pour les études internationales. Il a été aussi reconnu en 1996 par l'OMS Genève comme standard international pour les études dans le domaine de l'utilisation des médicaments. Dans ce système de classification, les médicaments sont classés en différents groupes suivant l'organe ou le système sur lequel ils sont actifs d'une part, et en fonction de leurs spécificités chimiques, pharmacologiques et thérapeutiques d'autre part. On retrouve 14 groupes principaux (1<sup>er</sup> niveau) et 2 sous-groupes thérapeutiques ou pharmacologiques (2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> niveau). Le 4<sup>ème</sup> niveau correspond à un sous-groupe chimique, pharmacologique ou thérapeutique et le 5<sup>ème</sup> niveau est une substance chimique.

En Belgique, chaque spécialité pharmaceutique enregistrée dispose d'un code CNK (Code National/Nationale Kode). Ce dernier est mentionné sur chaque emballage ; il est composé de chiffres et permet d'identifier le nom du produit, le conditionnement et le dosage. Le Code CNK ne correspond pas à une classification structurée mais il est possible de le relier au code correspondant dans la classification ATC.

Différentes sources d'information sont disponibles en Belgique sur la consommation de médicaments. Il y a tout d'abord les statistiques de l'INAMI, qui disposent de données le remboursement des médicaments dans le cadre de la sécurité sociale. Les chiffres de vente constituent une autre source importante de données. Ces dernières sont disponibles soit via le Ministère des Affaires Economiques, soit via l'industrie pharmaceutique elle-même (AGIM, IMS). Il ne s'agit ici bine entendu que de données agrégées au niveau de la population.

Un nouveau système de collecte des données a démarré en Belgique en 1996 ; il s'agit du projet Pharmanet (3). Le but poursuivi par ce dernier est de procéder à une évaluation qualitative en matière de prescription de médicaments. Il se base sur le remboursement des produits pharmaceutiques ; les données sont collectées dans les officines. Pharmanet a été mis en place pour offrir des informations aux médecins afin de leur mettre de suivre et d'évaluer leur comportement en matière de prescription de médicaments. Ce système est utilisé aussi comme source de données dans le secteur du médicament ; le secteur public dispose ainsi d'informations sur le volume des médicaments prescrits et sur le profil des médecins prescripteur.

Les données disponibles sur la consommation et le coût des médicaments sont analysées, entre autre, par l'Institut Belge pour l'Economie de la Santé (IBES). L'Institut de Pharmaco-épidémiologie de Belgique (IPhEB) analyse pour sa part surtout le volume de la consommation en utilisant des méthodes épidémiologiques. Les résultats de ces travaux sont mentionnés dans leurs publications. Enfin, la consommation de médicaments est prise en compte dans une série de projets de recherche comme par exemple l'enquête BIRNH (4) et l'étude sur la fidélisation du patient et la consommation de soins de santé (5).

L'Enquête de Santé, à côté de toutes ces bases de données, est une source d'information complémentaire importante. Contrairement aux chiffres de remboursement de Pharmanet qui se limitent à des données de population ou par médecin prescripteur, l'Enquête de Santé permet d'obtenir des informations sur la consommation de médicaments au niveau de l'individu. Cela permet d'étudier les variations de cette consommation en fonction d'un grand nombre de paramètre socio-démographiques. Ceci est intéressant d'un point de vue médical et sociologique. La consommation de médicaments est une des composantes de la manière dont les gens tentent de gérer leurs problèmes de santé ; il s'agit donc d'un indicateur important van de l'attitude des gens par rapport au système de soins de santé. En outre, l'Enquête de Santé permet de comparer entre eux les individus qui consomment des médicaments et ceux qui n'en consomment pas.

Un point important à signaler aussi en ce qui concerne l'Enquête de Santé, est qu'il s'agit bien de l'utilisation effective de médicaments et non pas simplement de leur prescription. Il est possible d'étudier la consommation de médicaments non prescrits, en vente libre et non remboursés. On peut analyser aussi les prescriptions magistrales, les produits homéopathiques et les médicaments à base de plantes. Toutes ces analyses sont impossibles dans le cadre du système Pharmanet.

Pour terminer, l'Enquête de Santé offre la possibilité de réaliser des comparaisons internationales dans la mesure où certains pays utilisent le même genre de questionnaire.

### III. Questions

Il est précisé dans le questionnaire de l'Enquête de Santé que l'on s'intéresse à la consommation de toutes les sortes de médicaments, notamment les préparations homéopathiques, les produits à base de plantes, les préparations magistrales, les vitamines et les minéraux, les somnifères et les calmants, la pilule (contraceptive), les pommades, les injections, les sirops, les cachets pour la gorge, etc ...

Les trois premières questions concernent la consommation de médicaments soumis à prescription médicale.

DR01. Au cours des deux dernières semaines qui se sont terminées hier, avez-vous pris des médicaments prescrits par un médecin ?

DR02. Quand avez-vous pris pour la dernière fois des médicaments prescrits ?

DR03. De quels médicaments s'agissait-il ?

- Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorge, etc.
- Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc.
- Autres antidouleurs et médicaments contre la fièvre
- Fortifiants : vitamines, minéraux, toniques
- Médicaments pour le cœur, la circulation, la tension artérielle
- Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale
- Diurétiques
- Laxatifs
- Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général
- Somnifères
- Médicaments pour la dépression
- Tranquillisants, autres médicaments pour les nerfs
- Antibiotiques
- Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau
- Médicaments pour l'allergie
- Médicaments pour l'asthme
- Contraceptifs (la pilule, contraceptif injectable)
- Hormones au cours de la ménopause
- Comprimés pour le diabète
- Injections pour le diabète
- Médicaments pour l'épilepsie (convulsions)
- Médicaments pour la maladie de Parkinson
- Médicaments pour les yeux (pommade, gouttes)
- Médicaments pour maigrir
- Médicaments homéopathiques
- Médicaments à base de plantes
- Autres médicaments, précisez...
- Médicaments inconnus

Cette liste est basée sur celle qui a été mise au point dans le cadre de Enquête de Santé du CBS (Centrum voor Bevolking Studies) en Hollande. A l'analyse des données, il est apparu que deux catégories importantes de médicaments ne figuraient pas dans la liste: les hypolipémiants et les produits actifs au niveau thyroïdien. Ces deux catégories supplémentaires ont donc été construites après la collecte des données sur base des réponses à la question « autres médicaments ». Il faut toutefois tenir compte de ce problème qui a sans doute engendré une sous estimation dans l'utilisation de ces deux types de médicaments.

Les questions suivantes concernent la consommation de médicaments en vente libre, de comptoir, non soumis à prescription médicale.

DR04. Au cours des deux dernières semaines qui se sont terminées hier, avez-vous pris des médicaments non prescrits par un médecin ?

DR05. Quand avez-vous pris pour la dernière fois des médicaments non prescrits ?

DR06. De quels médicaments s'agissait-il ?

- Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorge, etc.
- Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc.
- Autres antidouleurs et médicaments contre la fièvre
- Fortifiants : vitamines, minéraux, toniques
- Médicaments pour le cœur, la circulation, la tension artérielle
- Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale
- Diurétiques
- Laxatifs
- Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général
- Somnifères
- Tranquillisants, autres médicaments pour les nerfs
- Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau
- Médicaments pour l'allergie
- Médicaments pour l'asthme
- Médicaments pour les yeux (pommade, gouttes)
- Médicaments pour maigrir
- Médicaments homéopathiques
- Médicaments à base de plantes
- Autres médicaments, précisez...
- Médicaments inconnus

Une procédure complémentaire était prévue pour les personnes âgées entre 45 et 64 ans dans l'Enquête de Santé de 2001. Ce nouvel instrument a été élaboré en collaboration avec l'Institut de Pharmaco-épidémiologie de Belgique (IPhEB). Les questions sont basées sur celle de l'Enquête de Santé finlandaise. L'enquêteur demande à la personne interrogée de lui montrer tous les médicaments qu'elle a consommé au cours des dernières 24 heures. Le nom de ces médicaments est noté, si possible avec le code CNK ; en outre deux questions complémentaires sont posées à propos de chaque médicament :

DR0803. Est-ce que le médicament a été prescrit ?

DR0804. Est-ce que vous prenez le médicament... régulièrement, temporairement, si nécessaire.

Cette méthode permet de recueillir aisément un grand nombre d'informations précises sur la consommation de médicaments spécifiques et d'étudier l'utilisation simultanée de plusieurs types de médicaments.

L'objectif poursuivi ici est de tester une nouvelle procédure pour collecter des données sur la consommation de médicaments. Il a donc été décidé, en attendant de pouvoir appliquer ce questionnaire à l'ensemble de la population, de le limiter aux personnes âgées entre 45 et 64 ans (pas trop jeunes pour avoir suffisamment de médicaments pour le test, et pas trop âgé pour ne pas augmenter inutilement la charge de travail). Les indicateurs basés sur cette nouvelle procédure sont donc limités aux personnes du groupe d'âge 45-64 ans.

## **IV. Indicateurs**

Les indicateurs ont été séparés en deux classes : ceux qui concernent la consommation de médicaments soumis à prescription et ceux qui concernent la consommation de médicaments de comptoir, non soumis à prescription. Cette différence est justifiée du point de vue de la santé publique : dans le cas des médicaments soumis à prescription, les initiatives éventuelles doivent s'adresser aussi bien aux prescripteurs qu'aux patients (comme par exemple la campagne en faveur d'une utilisation rationnelle des antibiotiques), dans le cas des médicaments en vente libre, les initiatives doivent veiller à toucher surtout la population directement.

La distinction entre médicaments prescrits et non prescrits n'est toutefois pas aussi stricte. Tout les médicaments prescrits ne sont pas forcément soumis à prescription ; ils ne sont pas non plus forcément plus actifs que les médicaments en vente libre. De nombreux médecins prescrivent des médicaments qui sont en vente libre. Inversement, ce n'est pas parce qu'un médicament est soumis à prescription qu'il sera automatiquement remboursé par l'assurance maladie-invalidité et qu'il sera pris en compte dans le budget de l'INAMI.

### **Médicaments prescrits**

Deux indicateurs sont proposés au niveau de la population :

- Pourcentage de personnes qui ont utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit
- Pourcentage de personnes qui ont utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit, par catégorie

Pour les 45-64 ans, cinq indicateurs supplémentaires ont été mesurés :

- Pourcentage de personnes qui ont utilisé au cours des dernières 24 heures un médicament prescrit
- Nombre moyen de médicaments prescrits utilisés au cours des dernières 24 heures (pour les personnes qui ont pris au moins un médicament)
- Pourcentage de personnes qui ont pris cinq médicaments prescrits ou plus au cours des dernières 24 heures (pour les personnes qui ont pris au moins un médicament)
- Pourcentage de personnes qui ont utilisé au cours des dernières 24 heures un médicament prescrit, par groupe ATC principal
- Pourcentage de personnes qui ont utilisé au cours des dernières 24 heures un médicament prescrit, par sous-groupe ATC

### **Médicaments non prescrits**

Deux indicateurs seulement sont proposés au niveau de la population :

- Pourcentage de personnes qui ont utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit
- Pourcentage de personnes qui ont utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit, par catégorie

## V. Résultats

### V.1. Belgique


#### Médicaments prescrits

##### V.1.1. Utilisateurs de médicaments prescrits au cours des deux dernières semaines (DR01\_1)

Un peu moins de la moitié (47%) des personnes interrogées déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin. Ce pourcentage est significativement plus élevé chez les femmes (55%) que chez les hommes (39%). Cette différence s'explique en partie par la consommation de moyens contraceptifs et de traitements hormonaux de substitution au cours de la ménopause.

Le pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin augmente sensiblement avec l'âge (Figure 4.3.1.1) de 22% chez les 0-14 ans à 89% chez les 75 ans et plus. Chez les hommes, ce taux augmente à partir de 45 ans. Chez les femmes, on observe une première augmentation à partir de l'âge de 15 ans. Cette dernière est à mettre en relation avec la prise de la pilule contraceptive. Un deuxième pic est observé chez les femmes à partir de 45 ans.

Figure 4.3.1.1 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Un niveau d'instruction plus élevé est associé avec une consommation plus faible de médicaments prescrits. Les personnes avec seulement un niveau d'enseignement primaire déclarent dans 70% des cas avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit ; chez les personnes avec un niveau d'instruction élevé, ce taux est de 39% seulement.

Cette différence reste significative après standardisation pour le sexe et l'âge, mais elle ne l'est plus lorsque l'on prend en compte aussi l'état de santé dans un modèle d'analyse multivariée. Cela veut dire donc que le plus grand nombre d'utilisateurs de médicaments prescrits dans les groupes avec un faible niveau d'instruction s'explique par le fait que l'état de santé de ces personnes est en général moins bon que celui des personnes avec un niveau élevé d'instruction.

On n'observe pas ici de différence significative en fonction du niveau d'urbanisation. Après standardisation pour le sexe et l'âge, le pourcentage de consommateurs de médicaments prescrits est légèrement plus élevé en Wallonie qu'en Flandre (Odds ratio = 1.2; IC 95% = 1.0-1.3).

Il n'est pas possible d'effectuer une comparaison directe entre 2001 et 1997 ; en effet, l'utilisation de méthodes de contraception n'avait pas été prise dans la liste des médicaments en 1997. Si dans les données de 2001 on place les femmes qui n'ont utilisé que des contraceptifs parmi les personnes qui n'ont pas consommé de médicaments prescrits, le pourcentage d'utilisateurs de médicaments prescrits en 2001 (45%) est légèrement supérieur à ce qui avait été observé en 1997 (41%). Cette différence n'est toutefois pas significative après standardisation pour le sexe et l'âge. On observe toutefois une différence importante entre les régions à ce sujet : il y a en Flandre une augmentation légère mais significative du pourcentage d'utilisateurs de médicaments prescrits (Odds ratio = 1,2; IC 95% = 1,0-1,4). Ce n'est pas le cas par contre dans les deux autres régions.

### **V.1.2. Utilisateurs au cours des deux dernières semaines de médicaments prescrits, par catégorie (DR03\_1)**

Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

Chez les 0-14 ans, 9% des garçons et 10% des filles ont utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge. On relève aussi 5% de garçons qui ont utilisé un médicament contre l'allergie et 4% des garçons et des filles qui ont pris un antibiotique.

Chez les hommes adultes (entre 15 et 64 ans), 11% ont déclaré avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension. 6% ont déclaré avoir utilisé un médicament contre la douleur ou la fièvre, 5% des médicaments ou des pommades contre les rhumatismes ou les douleurs articulaires et 5% des médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge.

Chez les femmes de 15 à 64 ans, 15% ont déclaré avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin comme méthode de contraception. 10% ont déclaré avoir utilisé un médicament contre la douleur ou la fièvre, 7% des médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 6% la consommation de médicaments ou des pommades contre les rhumatismes ou les douleurs articulaires. La consommation d'hormones de substitution (pendant la ménopause) est aussi assez importante : 18% chez les 45-54 ans et 23% chez les 55-64 ans.

Chez les hommes de 65 ans et plus, 56% déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines des médicaments prescrits par un médecin pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension. Chez les femmes de 65 ans et plus, 58% déclarent avoir pris des médicaments pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension. La consommation de médicaments ou de pommades contre les rhumatismes ou les douleurs articulaires est aussi assez importante (15% chez les hommes et 28% chez les femmes), de même que celle des somnifères (15% chez les hommes et 27% chez les femmes).



Tableau 4.3.1.1 : Comparaison entre les années 1997 et 2001 en ce qui concerne la consommation de médicaments prescrits, par catégories, après standardisation pour le sexe et l'âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

---

**Consommation significativement plus élevée en 2001 par rapport à 1997**

Autres antidouleurs et médicaments contre la fièvre  
 Fortifiants : vitamines, minéraux, toniques  
 Diurétiques  
 Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général  
 Somnifères  
 Thérapie hormonale de substitution (au cours de la ménopause)

**Pas de différence significative entre 2001 et 1997**

Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorge, etc.  
 Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc.  
 Médicaments pour le cœur, la circulation, la tension artérielle  
 Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale  
 Laxatifs  
 Médicaments antidépresseurs  
 Tranquillisants, autres médicaments pour les nerfs  
 Antibiotiques  
 Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau  
 Médicaments contre les problèmes d'allergie  
 Médicaments pour les problèmes d'asthme  
 Médicaments pour le diabète  
 Médicaments pour l'épilepsie  
 Médicaments pour la maladie de Parkinson  
 Médicaments pour les yeux (pommades, gouttes)  
 Médicaments pour maigrir  
 Médicaments homéopathiques

**Pas d'information**

Contraceptifs  
 Hypolipémiants  
 Médicaments pour les problèmes thyroïdiens  
 Médicaments à base de plantes

---

Le Tableau 4.3.1.1 illustre les différences entre 2001 et 1997 en ce qui concerne la consommation de médicaments prescrits par catégorie, après standardisation par sexe et par âge. La consommation observée en 2001 est significativement plus basse pour quelques groupes de médicaments. Pour 7 catégories de médicaments, la consommation est plus élevée.

**Indicateurs complémentaires pour les 45-64 ans**

**V.1.3. Utilisateurs au cours des dernières 24 heures d'un médicament prescrit par un médecin (DR08\_1)**

44% des personnes âgées de 45 à 64 ans déclarent avoir pris au cours des dernières 24 heures un médicament prescrit par un médecin. Les variations de cet indicateur sont les mêmes que pour DR01\_1 : une consommation plus fréquente chez les femmes, chez les personnes âgées, chez les personnes avec un faible niveau d'instruction et en Wallonie.

#### **V.1.4. Nombre de médicaments prescrits utilisés au cours des dernières 24 heures (DR08\_2)**

Le nombre moyen de médicaments que les personnes de 45-64 ans ont pris est de 2,5 (cette moyenne est calculée parmi les personnes qui prennent au moins un médicament). Cette moyenne est la même chez les hommes et chez les femmes. On n'observe pas non plus de différence en fonction de l'âge. Le niveau d'instruction et le niveau d'urbanisation ne constituent pas des déterminants significatifs. Par contre, on observe une différence importante entre la Wallonie (2,9) d'une part, et la Flandre (2,3) et Bruxelles (2,5) d'autre part. Cette différence est significative après standardisation pour le sexe et l'âge.

#### **V.1.5. Utilisateurs de 5 médicaments prescrits ou plus au cours des dernières 24 heures (DR08\_3)**

Parmi les personnes entre 45 et 64 ans qui ont pris au cours des dernières 24 heures un médicament prescrit, 13% ont pris au moins 5 médicaments différents. Ce pourcentage ne varie pas en fonction du sexe ou de l'âge. Le niveau d'instruction et le niveau d'urbanisation ne constituent pas des déterminants significatifs non plus. On observe ici aussi une différence marquée entre la Wallonie (21%) d'une part et la Flandre (10%) et Bruxelles (11%) d'autre part. Cette différence est significative après standardisation pour le sexe et l'âge : Odds ratio 2,4 (IC 95% = 1,5-3,8) et 2,0 (IC 95% = 1,2-2,4).

#### **V.1.6. Utilisation de médicaments prescrits au cours des dernières 24 heures, par catégorie ATC (DR08\_4)**

Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

23% des hommes entre 45 et 64 ans déclarent avoir pris un médicament pour le système cardiovasculaire (groupe ATC C) au cours des dernières 24 heures. 10% déclarent avoir pris un médicament actif sur le système nerveux (groupe ATC N) au cours des dernières 24 heures, 8% un médicament pour le système digestif et métabolique (groupe ATC A), 7% un médicament pour le sang et les organes hématopoïétiques (groupe ATC B), 7% un médicament pour le système locomoteur (groupe ATC M) et 5% un médicament pour le système respiratoire (groupe ATC R).

Chez les femmes, les médicaments pour le système cardiovasculaire (groupe ATC C) se situent en première position (21%). Viennent ensuite les médicaments actifs sur le système nerveux (groupe ATC N; 15%); le système urogénital (groupe ATC G, 14%), le système digestif et métabolique (groupe ATC A; 10%), un médicament pour le système locomoteur (groupe ATC M; 8%) et les préparations hormonales, excepté les hormones sexuelles (groupe ATC H; 5%).

#### **V.1.7. Utilisation au cours des dernières 24 heures d'un médicament prescrit, par sous-groupe ATC (DR08\_5)**

L'analyse en fonction des sous-groupes ATC permet d'étudier un peu plus en détail les produits spécifiques qui sont consommés. Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

Chez les hommes de 45 à 64 ans, ce sont les produits Bêtabloquants qui sont les médicaments les plus utilisés (C07) : 10% des hommes (45-64 ans) en ont pris un au cours des dernières 24 heures. Viennent ensuite les hypolipémiants (C10; 9%), les anti-aggrégants, les anticoagulants et les thrombolytiques (B01; 7%), les psycholeptiques (N05; 6%), les médicaments actifs dans le cadre du système rénine-angiotensine (C09; 5%) et les psychoanaleptiques (N06; 5%).

13% des femmes (45-64 ans) ont pris au cours des dernières 24 heures une hormone sexuelle ou un autre produit en relation avec le système reproducteur (sous-groupe ATC G03). Viennent ensuite les Bêtabloquants (C07; 12%), les psycholeptiques (N05; 9%), les psychoanaleptiques (N06; 6%), les anti-inflammatoires et les produits contre le rhumatisme (M01; 6%) et les médicaments actifs au niveau thyroïdien (C10; 5%).

La grande majorité des psycholeptiques enregistrés sont des benzodiazépines ; la plupart des psychoanaleptiques sont des antidépresseurs.


## **Médicaments non prescrits par un médecin**

### **V.1.8. Utilisateurs au cours des deux dernières semaines de médicaments non prescrit par un médecin (DR04\_1)**

28% des personnes déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin. Ce pourcentage est plus élevé chez les femmes (33%) que chez les hommes (24%).

Le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, est plus bas chez les jeunes et chez les personnes âgées ; le taux le plus élevé se situe chez les 25-34 ans, aussi bien chez les hommes (32%) que chez les femmes (47%).

Figure 4.3.1.2 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.




La consommation de médicaments non prescrits augmente avec le niveau d'instruction. Le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin s'élève de 17% chez les personnes sans diplôme à 33% chez les personnes avec un niveau d'enseignement supérieur. Ces différences sont significatives après standardisation pour le sexe et l'âge.

On n'observe pas de différence à ce sujet en fonction du niveau d'urbanisation. La consommation de médicaments non prescrits est toutefois plus importante à Bruxelles et en Wallonie qu'en Flandre ; cette différence est significative après standardisation pour le sexe et l'âge ( $p=0.0003$ ).

Le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin a baissé de 33% en 1997 à 28% en 2001. Cette différence est significative ( $p<0.0001$ ) ; elle n'est observée toutefois qu'en Flandre et à Bruxelles mais pas en Wallonie. La Figure 4.3.1.3 montre en outre que la baisse est surtout marquée chez les hommes de 75 ans et plus et chez les femmes de 0-14 ans.

Figure 4.3.1.3 : Différence entre 2001 et 1997 en chiffres absolus en ce qui concerne le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



### V.1.9. Utilisateurs au cours des deux dernières semaines de médicaments non prescrits par un médecin, par catégorie (DR06\_1)

Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

Chez les 0-14 ans, 8% des garçons et 10% des filles ont utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge. On relève aussi les analgésiques et les antipyrétiques (7% chez les garçons, 6% chez les filles) et les produits comme les vitamines, minéraux et les tonifiants (4% aussi bien chez les garçons que chez les filles). Il y a à part cela assez peu de médicaments en vente libre qui sont consommés par les jeunes dans cette tranche d'âge.

Chez les hommes adultes de 15 à 64 ans, 12% déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un analgésique ou un antipyrétique en vente libre, 7% un médicament contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 4% des vitamines, minéraux et tonifiants.

Chez les femmes adultes de 15 à 64 ans, un taux élevé, 23%, déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un analgésique ou un antipyrétique en vente libre. 9% déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 6% des vitamines, minéraux et tonifiants.

Chez les hommes de 65 ans et plus, 5% ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 5% un analgésique ou antipyrétique.

Chez les femmes de 65 ans et plus, 11% ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin analgésique ou antipyrétique. 6 % ont pris un médicament contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge.

Le tableau 4.3.1.2 illustre les différences entre 2001 et 1997 en ce qui concerne la consommation de médicaments non prescrits par catégorie, après standardisation par sexe et par âge. La consommation observée en 2001 est significativement plus haute pour quelques groupes de médicaments. Pour 2 catégories de médicaments, la consommation est plus basse.

Tableau 4.3.1.2 : Comparaison entre 2001 et 1997 en ce qui concerne la consommation de médicaments non prescrits, par catégorie, après standardisation pour le sexe et l'âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

---

**Significativement plus bas en 2001 par rapport à 1997**

Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe et les maux de gorge

Médicaments pour le cœur, la circulation, la tension artérielle

**Pas de différence significative entre 2001 et 1997**

Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc.

Autres antidouleurs et médicaments contre la fièvre

Fortifiants : vitamines, minéraux, toniques

Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale

Diurétiques

Laxatifs

Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général

Somnifères

Tranquillisants, autres médicaments pour les nerfs

Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau

Médicaments contre les problèmes d'allergie

Médicaments pour les problèmes d'asthme

Médicaments pour les yeux (pommades, gouttes)

Médicaments pour maigrir

Médicaments homéopathiques

**Pas d'information**

Médicaments à base de plantes

---

Tableau 4.3.1.3 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin (\*), Enquête de Santé, Belgique, 2001.

DR01_1 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	39,3	40,7 (38,5-42,9)	5902
Femme	50,1	50,9 (48,8-53,0)	6160
<b>GROUPES D'AGE</b>			
0-14	21,5	21,5 (18,7-24,5)	1947
15-24	25,2	25,1 (21,8-28,8)	1288
25-34	28,1	28,1 (25,1-31,3)	1731
35-44	35,1	35,2 (32,2-38,3)	1928
45-54	52,1	52,3 (48,7-55,8)	1676
55-64	69,4	69,6 (65,8-73,1)	1362
65-74	82,7	82,7 (79,2-85,7)	1231
75+	88,8	88,4 (84,6-91,4)	899
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	51,3	44,8 (34,4-55,8)	271
Enseignement primaire	68,4	49,6 (44,8-54,4)	1557
Secondaire inférieur	53,8	51,2 (47,1-55,3)	2195
Secondaire supérieur	40,8	45,5 (42,6-48,4)	3522
Enseignement supérieur	35,4	42,6 (39,9-45,3)	4134
<b>NIVEAU D'URBANISATION</b>			
Bruxelles	45,4	46,0 (43,4-48,6)	2990
Zone urbaine	47,3	47,9 (44,3-51,4)	1927
Zone semi-urbaine	45,7	46,9 (44,1-49,7)	3891
Zone rurale	42,1	43,5 (40,7-46,4)	3254
<b>LIEU DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	44,1	44,8 (42,5-47,1)	4088
Région Bruxelloise	45,4	46,0 (43,4-48,7)	2990
Région Wallonne	46,2	48,3 (45,6-50,9)	4984
<b>ANNEE</b>			
1997(*)	40,8	44,6 (42,9-46,4)	10156
2001	44,8	45,9 (44,3-47,5)	12062

(\*) Utilisation de la pilule contraceptive non comprise

Tableau 4.3.1.4 : Pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

DR04_1 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	23,7	22,7 (21,1-24,4)	5847
Femme	32,5	32,2 (30,4-34,1)	6114
<b>GROUPES D'AGE</b>			
0-14	19,4	19,2 (16,5-22,3)	1919
15-24	29,4	29,3 (25,9-33,1)	1274
25-34	39,4	39,5 (36,0-43,1)	1715
35-44	32,8	32,8 (29,7-36,0)	1922
45-54	33,0	32,9 (29,7-36,3)	1669
55-64	23,9	23,7 (20,6-27,0)	1355
65-74	24,0	23,5 (19,8-27,6)	1221
75+	18,3	17,2 (13,7-21,3)	886
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	16,5	16,5 (10,7-24,6)	266
Enseignement primaire	22,6	23,7 (20,3-27,5)	1549
Secondaire inférieur	23,5	23,2 (20,3-26,3)	2176
Secondaire supérieur	28,0	26,7 (24,5-29,0)	3494
Enseignement supérieur	33,4	32,1 (29,6-34,8)	4100
<b>NIVEAU D'URBANISATION</b>			
Bruxelles	29,7	29,0 (26,9-31,3)	2967
Zone urbaine	30,5	29,2 (26,2-32,3)	1905
Zone semi-urbaine	28,4	27,6 (25,4-30,0)	3858
Zone rurale	26,3	25,5 (23,2-28,0)	3231
<b>LIEU DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	26,3	25,3 (23,6-27,1)	4045
Région Bruxelloise	29,7	29,0 (26,9-31,2)	2967
Région Wallonne	32,0	31,3 (28,7-33,9)	4949
<b>ANNEE</b>			
1997	33,2	31,8 (30,3-33,3)	10145
2001	28,2	27,6 (26,3-28,9)	11961

## V.2. Région Flamande


### Médicaments prescrits

#### V.2.1. Utilisateurs de médicaments prescrits au cours des deux dernières semaines (DR01\_1)

Un peu moins de la moitié (46%) des personnes interrogées en Flandre déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin. Ce pourcentage est significativement plus élevé chez les femmes (54%) que chez les hommes (39%). Cette différence s'explique en partie par la consommation de moyens contraceptifs et de traitements hormonaux de substitution au cours de la ménopause.

Le pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin augmente sensiblement avec l'âge (Figure 4.3.2.1) de 22% chez les 0-14 ans à 88% chez les 75 ans et plus. Chez les femmes, on observe une première augmentation à partir de l'âge de 15 ans. Cette dernière est à mettre en relation avec la prise de la pilule contraceptive. Un deuxième pic est observé chez les femmes à partir de 45 ans.

Figure 4.3.2.1 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Un niveau d'instruction plus élevé est associé avec une consommation plus faible de médicaments prescrits. Les personnes avec seulement un niveau d'enseignement primaire déclarent dans 73% des cas avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit ; chez les personnes avec un niveau d'instruction élevé, ce taux est de 36% seulement.


Cette différence reste significative après standardisation pour le sexe et l'âge, mais elle ne l'est plus lorsque l'on prend en compte aussi l'état de santé dans un modèle d'analyse multivariée. Cela veut dire donc que le plus grand nombre d'utilisateurs de médicaments prescrits dans les groupes avec un faible niveau d'instruction s'explique par le fait que l'état de santé de ces personnes est en général moins bon que celui des personnes avec un niveau élevé d'instruction.

On observe ici une différence significative en fonction du niveau d'urbanisation. Après standardisation pour le sexe et l'âge, le pourcentage de consommateurs de médicaments prescrits est plus élevé dans les grandes villes (50%) que dans les zones rurales (42%) : Odds ratio = 1,3; IC 95% = 1,0-1,6.



Il n'est pas possible d'effectuer une comparaison directe entre 2001 et 1997 ; en effet, l'utilisation de méthodes de contraception n'avait pas été prise dans la liste des médicaments en 1997. Si dans les données de 2001 on place les femmes qui n'ont utilisé que des contraceptifs parmi les personnes qui n'ont pas consommé de médicaments prescrits, le pourcentage d'utilisateurs de médicaments prescrits en 2001 (44%) est légèrement supérieur à ce qui avait été observé en 1997 (41%). Cette différence est significative après standardisation pour le sexe et l'âge : Odds ratio = 1,2; IC 95% = 1,0-1,4. La figure 4.3.2.2 montre que l'augmentation est observée surtout chez les hommes entre 45 et 54 ans.

Figure 4.3.2.2. : Différence entre 2001 et 1997 en chiffres absolus en ce qui concerne le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



### V.2.2. Utilisateurs au cours des deux dernières semaines de médicaments prescrits, par catégorie (DR03\_1)

Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

Chez les 0-14 ans, 8% des garçons et 10% des filles ont utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge. On relève aussi 6% de garçons qui ont utilisé un médicament contre l'allergie et 4% des garçons et des filles qui ont pris un antibiotique.

Chez les hommes adultes (entre 15 et 64 ans), 10% ont déclaré avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension. 5% ont déclaré avoir utilisé des médicaments ou des pommades contre les rhumatismes, 5% des médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge ou les douleurs articulaires et 5% un analgésique ou un antipyrétique.

Chez les femmes de 15 à 64 ans, 14% ont déclaré avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin comme méthode de contraception. 11% ont déclaré avoir utilisé un médicament pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension, 9% un analgésique ou un antipyrétique, 7% des médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 6% des médicaments ou des pommades contre les rhumatismes ou les douleurs articulaires. La consommation d'hormones de substitution (pendant la ménopause) est aussi assez importante : 15% chez les 45-54 ans et 19% chez les 55-64 ans.

Chez les hommes de 65 ans et plus, 55% déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines des médicaments prescrits par un médecin pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension.

Chez les femmes de 65 ans et plus, 57% déclarent avoir pris des médicaments pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension.

La consommation de médicaments ou de pommades contre les rhumatismes ou les douleurs articulaires est aussi assez importante (14% chez les hommes et 29% chez les femmes), de même que celle des somnifères (15% chez les hommes et 26% chez les femmes).

Le Tableau 4.3.2.1 illustre les différences entre 2001 et 1997 en ce qui concerne la consommation de médicaments prescrits par catégorie, après standardisation par sexe et par âge. Il n'y a aucune catégorie de médicaments pour laquelle la consommation observée en 2001 est significativement plus basse qu'en 1997.

Tableau 4.3.2.1 : Comparaison entre les années 1997 et 2001 en ce qui concerne la consommation de médicaments prescrits, par catégories, après standardisation pour le sexe et l'âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

---

**Consommation significativement plus élevée en 2001 par rapport à 1997**

Autres antidouleurs et médicaments contre la fièvre  
 Fortifiants : vitamines, minéraux, toniques  
 Somnifères  
 Thérapie hormonale de substitution (au cours de la ménopause)

**Pas de différence significative entre 2001 et 1997**

Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe et les maux de gorge  
 Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc.  
 Médicaments pour le cœur, la circulation, la tension artérielle  
 Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale  
 Diurétiques  
 Laxatifs  
 Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général  
 Tranquillisants, autres médicaments pour les nerfs  
 Médicaments anti-dépresseurs  
 Antibiotiques  
 Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau  
 Médicaments contre les problèmes d'allergie  
 Médicaments pour les problèmes d'asthme  
 Contraceptifs  
 Médicaments pour le diabète  
 Médicaments pour l'épilepsie  
 Médicaments pour la maladie de Parkinson  
 Médicaments pour les yeux (pommades, gouttes)  
 Médicaments pour maigrir  
 Médicaments homéopathiques

**Pas d'information**

Contraceptifs  
 Hypolipémiants  
 Médicaments pour les problèmes thyroïdiens  
 Médicaments à base de plantes

---

## **Indicateurs complémentaires pour les 45-64 ans**

### **V.2.3. Utilisateurs au cours des dernières 24 heures d'un médicament prescrit par un médecin (DR08\_1)**

43% des personnes âgées de 45 à 64 ans déclarent avoir pris au cours des dernières 24 heures un médicament prescrit par un médecin. Les variations de cet indicateur sont les mêmes que pour DR01\_1 : une consommation plus fréquente chez les femmes, chez les personnes âgées et chez les personnes avec un faible niveau d'instruction.

### **V.2.4. Nombre de médicaments prescrits utilisés au cours des dernières 24 heures (DR08\_2)**

Le nombre moyen de médicaments que les personnes de 45-64 ans ont pris est de 2,3 (cette moyenne est calculée parmi les personnes qui prennent au moins un médicament). Cette moyenne est plus élevée chez les femmes (2,4) que chez les hommes (2,2) mais la différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge. On n'observe pas de différence en fonction de l'âge. Le niveau d'instruction et le niveau d'urbanisation ne constituent pas non plus des déterminants significatifs.

### **V.2.5. Utilisateurs de 5 médicaments prescrits ou plus au cours des dernières 24 heures (DR08\_3)**

Parmi les personnes entre 45 et 64 ans qui ont pris au cours des dernières 24 heures un médicament prescrit, 10% ont pris au moins 5 médicaments différents. Ce pourcentage est plus élevé chez les femmes (11%) que chez les hommes (8%) mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge. Le pourcentage ne varie pas en fonction de l'âge. Le niveau d'instruction et le niveau d'urbanisation ne constituent pas des déterminants significatifs on plus.

### **V.2.6. Utilisation de médicaments prescrits au cours des dernières 24 heures, par catégorie ATC (DR08\_4)**

Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

20% des hommes entre 45 et 64 ans déclarent avoir pris un médicament pour le système cardiovasculaire (groupe ATC C) au cours des dernières 24 heures. 8% déclarent avoir pris un médicament actif sur le système nerveux (groupe ATC N) au cours des dernières 24 heures, 6% un médicament pour le système respiratoire (groupe ATC R), 6% un médicament pour le système locomoteur (groupe ATC M), 6% un médicament pour le système digestif et métabolique (groupe ATC A) et 5% un médicament pour le sang et les organes hématopoïétiques (groupe ATC B).

Chez les femmes, les médicaments pour le système cardiovasculaire (groupe ATC C) se situent en première position (22%). Viennent ensuite les médicaments actifs sur le système nerveux (groupe ATC N; 13%); le système urogénital (groupe ATC G, 11%), le système digestif en métabolique (groupe ATC A; 9%), un médicament pour le système locomoteur (groupe ATC M; 7%) et un médicament pour le système respiratoire (groupe ATC R; 5%).

**V.2.7. Utilisation au cours des dernières 24 heures d'un médicament prescrit, par sous-groupe ATC (DR08\_5)**

L'analyse en fonction des sous-groupes ATC permet d'étudier un peu plus en détail les produits spécifiques qui sont consommés. Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

Chez les hommes de 45 à 64 ans, ce sont les produits Bêtabloquants qui sont les médicaments les plus utilisés (C07) : 9% des hommes (45-64 ans) en ont pris un au cours des dernières 24 heures. Viennent ensuite les hypolipémiants (C10; 9%), les anti-agrégants, les anticoagulants et les thrombolytiques (B01; 5%) et les psycholeptiques (N05; 5%).

11% des femmes (45-64 ans) ont pris au cours des dernières 24 heures un Bêtabloquant (C07). 11% également ont pris une hormone sexuelle ou un autre produit en relation avec le système reproducteur (sous-groupe ATC G03). Viennent ensuite les psycholeptiques (N05; 7%), les anti-inflammatoires et les produits contre le rhumatisme (M01; 6%), les hypolipémaints (C10 ; 6%), les diurétiques (C03 ;5%) et les psychoanaleptiques (N06; 5%).

La grande majorité des psycholeptiques enregistrés sont des benzodiazépines ; la plupart des psychoanaleptiques sont des antidépresseurs.


**Médicaments non prescrits par un médecin**

**V.2.8. Utilisateurs au cours des deux dernières semaines de médicaments non prescrit par un médecin (DR04\_1)**

26% des personnes déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin. Ce pourcentage est plus élevé chez les femmes (31%) que chez les hommes (21%).

Le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, est plus bas chez les jeunes et chez les personnes âgées ; le taux le plus élevé se situe chez les 25-34 ans, aussi bien chez les hommes (30%) que chez les femmes (50%).

Figure 4.3.2.3 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.




La consommation de médicaments non prescrits augmente avec le niveau d'instruction. Le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin s'élève de 12% chez les personnes sans diplôme à 32% chez les personnes avec un niveau d'enseignement supérieur. Ces différences sont significatives après standardisation pour le sexe et l'âge.

On n'observe pas de différence à ce sujet en fonction du niveau d'urbanisation.

Le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin a baissé de 33% en 1997 à 26% en 2001. Cette différence est significative ( $p=0.0001$ ). La Figure 4.3.2.4 montre en outre que la baisse est surtout marquée chez les 0-14 ans (surtout chez les filles). Chez les femmes de 25 à 34 ans par contre, on observe une augmentation de la consommation de médicament en vente libre lorsque l'on compare les résultats des enquêtes de 1997 et 2001.

Figure 4.3.2.4 : Différence entre 2001 et 1997 en chiffres absolus en ce qui concerne le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



### V.2.9. Utilisateurs au cours des deux dernières semaines de médicaments non prescrits par un médecin, par catégorie (DR06\_1)

Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

Chez les 0-14 ans, 8% des garçons et 9% des filles ont utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge. On relève aussi les analgésiques et les antipyrétiques (6% chez les garçons, 4% chez les filles) et les produits comme les vitamines, minéraux et les tonifiants (3% chez les garçons et 4% chez les filles). Il y a à part cela assez peu de médicaments en vente libre qui sont consommés par les jeunes dans cette tranche d'âge.

Chez les hommes adultes de 15 à 64 ans, 10% déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un analgésique ou un antipyrétique en vente libre, 6% un médicament contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 4% des vitamines, minéraux et tonifiants.

Chez les femmes adultes de 15 à 64 ans, un pourcentage élevé, 21%, déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un analgésique ou un antipyrétique en vente libre. 9% déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 6% des vitamines, minéraux et tonifiants.

Chez les hommes de 65 ans et plus, 4% ont pris au cours des deux dernières semaines des vitamines, minéraux et tonifiants, 4% médicament non prescrit par un médecin contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 5% un analgésique ou antipyrétique.

Chez les femmes de 65 ans et plus, 9% ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin analgésique ou antipyrétique. 6 % ont pris un médicament contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 4% des vitamines, minéraux et tonifiants.

Le tableau 4.3.2.2 illustre les différences entre 2001 et 1997 en ce qui concerne la consommation de médicaments non prescrits par catégorie, après standardisation par sexe et par âge. La consommation observée en 2001 n'est plus haute dans aucun des groupes de médicaments. Pour 3 catégories de médicaments, la consommation est plus basse en 2001 par rapport à 1997..

Tableau 4.3.2.2 : Comparaison entre 2001 et 1997 en ce qui concerne la consommation de médicaments non prescrits, par catégorie, après standardisation pour le sexe et l'âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

---

**Significativement plus bas en 2001 par rapport à 1997**

Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe et les maux de gorge  
Analgésiques et antipyrétiques  
Médicaments homéopathiques

**Pas de différence significative entre 2001 et 1997**

Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc.  
Fortifiants : vitamines, minéraux, toniques  
Médicaments pour le cœur, la circulation, la tension artérielle  
Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale  
Diurétiques  
Laxatifs  
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général  
Somnifères  
Tranquillisants, autres médicaments pour les nerfs  
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau  
Médicaments contre les problèmes d'allergie  
Médicaments pour les problèmes d'asthme  
Médicaments pour les yeux (pommades, gouttes)  
Médicaments pour maigrir

**Pas d'information**

Médicaments à base de plantes

---

Tableau 4.3.2.3 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

DR01_1 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	38,9	40,1 (37,1-43,1)	2054
Femme	49,1	49,7 (46,8-52,7)	2034
<b>GROUPES D'AGE</b>			
0-14	21,5	21,5 (17,6-26,0)	601
15-24	27,5	27,5 (22,9-32,7)	456
25-34	27,2	27,1 (23,1-31,5)	574
35-44	33,3	33,3 (29,2-37,8)	652
45-54	50,6	50,8 (45,9-55,7)	593
55-64	64,4	64,6 (59,3-69,7)	524
65-74	84,1	84,2 (79,5-87,9)	421
75+	87,5	87,1 (81,2-91,3)	267
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	50,3	41,8 (28,1-56,8)	79
Enseignement primaire	71,8	50,2 (43,0-57,5)	491
Secondaire inférieur	54,3	52,1 (46,4-57,7)	753
Secondaire supérieur	39,4	44,3 (40,4-48,2)	1342
Enseignement supérieur	32,9	40,6 (37,0-44,2)	1365
<b>NIVEAU D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	46,7	47,2 (43,2-51,2)	943
Zone semi-urbaine	45,2	45,8 (42,4-49,2)	2047
Zone rurale	40,2	41,9 (37,7-46,1)	1098
<b>ANNEE</b>			
1997	37,2	40,4 (37,9-43,0)	3524
2001	44,1	44,9 (42,6-47,1)	4088

(\*) Utilisation de la pilule contraceptive non comprise

Tableau 4.3.2.4 : Pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

DR04_1 – Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	20,9	19,9 (17,8-22,2)	2029
Femme	31,4	31,0 (28,6-33,5)	2016
<b>GROUPES D'AGE</b>			
0-14	18,4	18,1 (14,5-22,5)	588
15-24	26,1	25,9 (21,6-30,8)	446
25-34	39,9	39,8 (34,9-44,9)	568
35-44	30,7	30,6 (26,5-35,0)	649
45-54	28,4	28,2 (24,4-32,4)	588
55-64	21,2	20,9 (17,0-25,3)	521
65-74	21,3	20,6 (15,9-26,1)	419
75+	18,5	17,0 (12,3-23,1)	266
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	12,4	12,4 ( 6,7-21,8)	76
Enseignement primaire	20,7	22,1 (17,3-27,6)	489
Secondaire inférieur	21,6	21,3 (17,4-25,8)	744
Secondaire supérieur	26,0	24,5 (21,7-27,6)	1326
Enseignement supérieur	31,8	30,0 (26,7-33,4)	1353
<b>NIVEAU D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	30,5	29,1 (25,7-32,7)	936
Zone semi-urbaine	24,6	23,7 (21,3-26,2)	2025
Zone rurale	25,7	24,8 (21,3-28,6)	1084
<b>ANNEE</b>			
1997	32,7	31,1 (29,0-33,4)	3520
2001	26,3	25,5 (23,8-27,3)	4045



### V.3. Région Bruxelloise


#### Médicaments prescrits

##### V.3.1. Utilisateurs de médicaments prescrits au cours des deux dernières semaines (DR01\_1)

Un peu moins de la moitié (48%) des personnes interrogées en Flandre déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin. Ce pourcentage est significativement plus élevé chez les femmes (57%) que chez les hommes (40%). Cette différence s'explique en partie par la consommation de moyens contraceptifs et de traitements hormonaux de substitution au cours de la ménopause.

Le pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin augmente sensiblement avec l'âge (Figure 4.3.3.1) de 23% chez les 0-14 ans à 89% chez les 75 ans et plus. Chez les femmes, on observe une première augmentation à partir de l'âge de 15 ans. Cette dernière est à mettre en relation avec la prise de la pilule contraceptive. Un deuxième pic est observé chez les femmes à partir de 45 ans.

Figure 4.3.3.1 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.




Il n'y a pas à Bruxelles de relation entre le niveau d'instruction et la consommation de médicaments prescrits.

Les personnes de nationalité non belge non européenne déclarent seulement dans 34% des cas avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin ; ce taux est de 50% pour les personnes de nationalité belge et de 49% pour les personnes de nationalité non belge européenne. La différence entre les deux premiers groupes est significative après standardisation pour le sexe et l'âge (Odds ratio = 1,5; IC 95% = 1,1-2,1).

Il n'est pas possible d'effectuer une comparaison directe entre 2001 et 1997 ; en effet, l'utilisation de méthodes de contraception n'avait pas été prise dans la liste des médicaments en 1997. Si dans les données de 2001 on place les femmes qui n'ont utilisé que des contraceptifs parmi les personnes qui n'ont pas consommé de médicaments prescrits, le pourcentage d'utilisateurs de médicaments prescrits en 2001 (45%) est légèrement supérieur à ce qui avait été observé en 1997 (42%). Cette différence est significative après standardisation pour le sexe et l'âge : Odds ratio = 1,3; IC 95% = 1,1 - 1,5. La figure 4.3.3.2 montre que l'augmentation est observée surtout chez les hommes de 65 ans et plus.

Figure 4.3.3.2 : Différence entre 2001 et 1997 en chiffres absolus en ce qui concerne le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



### V.3.2. Utilisateurs au cours des deux dernières semaines de médicaments prescrits, par catégorie (DR03\_1)

Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

Chez les 0-14 ans, 10% des garçons et des filles ont utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge. On relève aussi 8% des garçons et 5% des filles qui ont pris un antibiotique, 6% des garçons et 5% des filles qui ont pris un analgésique ou un antipyrétique, 6% des garçons qui ont pris un médicament pour des problèmes d'allergie (2% chez les filles) et 5% des garçons pour des problèmes d'asthme (1% chez les filles).

Chez les hommes adultes (entre 15 et 64 ans), 8% ont déclaré avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension. 7% ont déclaré avoir utilisé un analgésique ou un antipyrétique, 6% un médicament pour des problèmes digestifs et 5% des médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge.

Chez les femmes de 15 à 64 ans, 18% ont déclaré avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin comme méthode de contraception. 14% ont déclaré avoir utilisé un analgésique ou un antipyrétique et 12% un médicament pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension. La consommation d'hormones de substitution (pendant la ménopause) est aussi assez importante : 24% chez les 45-54 ans et 34% chez les 55-64 ans.

Chez les hommes de 65 ans et plus, 58% déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines des médicaments prescrits par un médecin pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension.

Chez les femmes de 65 ans et plus, 50% déclarent avoir pris des médicaments pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension.

La consommation de médicaments ou de pommades contre les rhumatismes ou les douleurs articulaires est aussi assez importante (19% chez les hommes et 24% chez les femmes), de même que celle des somnifères (17% chez les hommes et 28% chez les femmes).

Le Tableau 4.3.3.1 illustre les différences entre 2001 et 1997 en ce qui concerne la consommation de médicaments prescrits par catégorie, après standardisation par sexe et par âge. Il n'y a aucune catégorie de médicaments pour laquelle la consommation observée en 2001 est significativement plus basse qu'en 1997.

Tableau 4.3.3.1 : Comparaison entre les années 1997 et 2001 en ce qui concerne la consommation de médicaments prescrits, par catégories, après standardisation pour le sexe et l'âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

---

**Consommation significativement plus élevée en 2001 par rapport à 1997**

Autres antidouleurs et médicaments contre la fièvre  
Thérapie hormonale de substitution (au cours de la ménopause)

**Pas de différence significative entre 2001 et 1997**

Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe et les maux de gorge  
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc.  
Fortifiants : vitamines, minéraux, toniques  
Médicaments pour le cœur, la circulation, la tension artérielle  
Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale  
Diurétiques  
Laxatifs  
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général  
Somnifères  
Tranquillisants, autres médicaments pour les nerfs  
Médicaments anti-dépresseurs  
Antibiotiques  
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau  
Médicaments contre les problèmes d'allergie  
Médicaments pour les problèmes d'asthme  
Contraceptifs  
Médicaments pour le diabète  
Médicaments pour l'épilepsie  
Médicaments pour la maladie de Parkinson  
Médicaments pour les yeux (pommades, gouttes)  
Médicaments pour maigrir  
Médicaments homéopathiques

**Pas d'information**

Contraceptifs  
Hypolipémiants  
Médicaments pour les problèmes thyroïdiens  
Médicaments à base de plantes

---

**Indicateurs complémentaires pour les 45-64 ans**

**V.3.3. Utilisateurs au cours des dernières 24 heures d'un médicament prescrit par un médecin (DR08\_1)**

40% des personnes âgées de 45 à 64 ans déclarent avoir pris au cours des dernières 24 heures un médicament prescrit par un médecin. Les variations de cet indicateur sont les mêmes que pour DR01\_1 : une consommation plus fréquente chez les femmes et chez les personnes âgées. On n'observe pas ici toutefois de différences en fonction du niveau d'instruction.

### **V.3.4. Nombre de médicaments prescrits utilisés au cours des dernières 24 heures (DR08\_2)**

Le nombre moyen de médicaments que les personnes de 45-64 ans ont pris est de 2,5 (cette moyenne est calculée parmi les personnes qui prennent au moins un médicament). Cette moyenne est plus élevée chez les femmes (2,6) que chez les hommes (2,3) mais la différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge. On observe une différence en fonction de l'âge : le nombre moyen de médicaments consommés augmente avec l'âge. Le niveau d'instruction ne constitue pas par contre un déterminant significatif.

### **V.3.5. Utilisateurs de 5 médicaments prescrits ou plus au cours des dernières 24 heures (DR08\_3)**

Parmi les personnes entre 45 et 64 ans qui ont pris au cours des dernières 24 heures un médicament prescrit, 11% ont pris au moins 5 médicaments différents. Ce pourcentage est plus élevé chez les femmes (12%) que chez les hommes (10%) mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge. Le pourcentage ne varie pas en fonction de l'âge. Le nombre moyen de médicaments consommés semble diminuer avec le niveau d'instruction mais ces différences ne sont pas significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Il n'y a pas de variation dans le nombre moyen de médicaments consommés en fonction de la nationalité de la personne interrogée.

### **V.3.6. Utilisation de médicaments prescrits au cours des dernières 24 heures, par catégorie ATC (DR08\_4)**

Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

15% des hommes entre 45 et 64 ans en Région Bruxelloise déclarent avoir pris un médicament pour le système cardiovasculaire (groupe ATC C) au cours des dernières 24 heures. 13% déclarent avoir pris un médicament actif sur le système nerveux (groupe ATC N) au cours des dernières 24 heures, 7% un médicament pour le système digestif et métabolique (groupe ATC A), 7% un médicament pour le système locomoteur (groupe ATC M), 6% un médicament pour le système respiratoire (groupe ATC R) et 4% un médicament pour le sang et les organes hématopoïétiques (groupe ATC B).

Chez les femmes, les médicaments le système urogénital (groupe ATC G) se situent en première position (17%). Viennent ensuite les médicaments actifs sur le système nerveux (groupe ATC N; 15%), le système cardiovasculaire (groupe ATC C; 14%), le système digestif et métabolique (groupe ATC A; 12%), le système locomoteur (groupe ATC M; 8%), le système respiratoire (groupe ATC R; 7%) et les préparations hormonales à l'exclusion des hormones sexuelles (groupe ATC H; 6%).

### **V.3.7. Utilisation au cours des dernières 24 heures d'un médicament prescrit, par sous-groupe ATC (DR08\_5)**

L'analyse en fonction des sous-groupes ATC permet d'étudier un peu plus en détail les produits spécifiques qui sont consommés. Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

Chez les hommes de 45 à 64 ans, ce sont les produits Bêtabloquants qui sont les médicaments les plus utilisés (C07) : 6% des hommes (45-64 ans) en ont pris un au cours des dernières 24 heures. Viennent ensuite les psycholeptiques (N05; 5%), les analgésiques (N02), les anti-inflammatoires et anti rhumatismaux (M01), les hypolipémiants (C10), les antiacides ou les médicaments pour les troubles de l'estomac (A02), les médicaments actifs dans le système rénine-angiotensine (C09) et les psychoanaleptiques (N06) : chacun 4%.

17% des femmes (45-64 ans) en Région Bruxelloise ont pris au cours des dernières 24 heures une hormone sexuelle ou un autre produit en relation avec le système reproducteur (sous-groupe ATC G03). Viennent ensuite les psycholeptiques (N05; 10%), les Bêtabloquants (C07 ; 9%), les psychoanaleptiques (N06; 7%), les anti-inflammatoires et les produits contre le rhumatisme (M01; 7%), les produit actif au niveau thyroïdien (H03 ; 5%), les analgésiques (N02 ; 5%) et les antiacides ou les médicaments pour les troubles de l'estomac (A02 ; 4%).

La grande majorité des psycholeptiques enregistrés sont des benzodiazépines ; la plupart des psychoanaleptiques sont des antidépresseurs.


## **Médicaments non prescrits par un médecin**

### **V.3.8. Utilisateurs au cours des deux dernières semaines de médicaments non prescrit par un médecin (DR04\_1)**

30% des personnes déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin. Ce pourcentage est plus élevé chez les femmes (32%) que chez les hommes (27%).

Le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, est le plus élevé chez les hommes de 15-54 ans et chez les femmes de 25-44 ans (Figure 4.3.3.3).

Figure 4.3.3.3 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001




La consommation de médicaments non prescrits augmente avec le niveau d'instruction. Le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin s'élève de 19% chez les personnes sans diplôme à 35% chez les personnes avec un niveau d'enseignement supérieur. Ces différences sont significatives après standardisation pour le sexe et l'âge.

On n'observe pas de différence à ce sujet en fonction du niveau de la nationalité.

Le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin a baissé de 39% en 1997 à 30% en 2001. Cette différence est significative ( $p < 0.0001$ ). La Figure 4.3.3.4 montre en outre que la baisse est surtout marquée chez les femmes (de 0-14 ans et de 75 ans et plus) et chez les hommes entre de 15 et 24 ans et entre 55 et 64 ans.

Figure 4.3.3.4 : Différence entre 2001 et 1997 en chiffres absolus en ce qui concerne le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



### V.3.9. Utilisateurs au cours des deux dernières semaines de médicaments non prescrits par un médecin, par catégorie (DR06\_1)

Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

Chez les 0-14 ans, 7% des garçons et 5% des filles ont utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge. On relève aussi les analgésiques et les antipyrétiques (5% chez les garçons et les filles) et les produits comme les vitamines, minéraux et les tonifiants (6% chez les garçons et 5% chez les filles). Il y a à part cela assez peu de médicaments en vente libre qui sont consommés par les jeunes dans cette tranche d'âge.

Chez les hommes adultes de 15 à 64 ans, 17% déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un analgésique ou un antipyrétique en vente libre, 9% un médicament contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 7% des vitamines, minéraux et tonifiants.

Chez les femmes adultes de 15 à 64 ans, un pourcentage élevé, 25%, déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un analgésique ou un antipyrétique en vente libre. 9% déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 8% des vitamines, minéraux et tonifiants.

Chez les hommes de 65 ans et plus, 11% ont pris au cours des deux dernières semaines un analgésique ou antipyrétique et 6% médicament non prescrit par un médecin contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge.

Chez les femmes de 65 ans et plus, 13% ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin analgésique ou antipyrétique. 7 % ont pris un médicament contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 4% des vitamines, minéraux et tonifiants.

Le tableau 4.3.3.2 illustre les différences entre 2001 et 1997 en ce qui concerne la consommation de médicaments non prescrits par catégorie, après standardisation par sexe et par âge.

Tableau 4.3.3.2 : Comparaison entre 2001 et 1997 en ce qui concerne la consommation de médicaments non prescrits, par catégorie, après standardisation pour le sexe et l'âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

---

**Consommation significativement plus élevée en 2001 par rapport à 1997**

Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau

Laxatifs

**Significativement plus bas en 2001 par rapport à 1997**

Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe et les maux de gorge

Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale

Fortifiants : vitamines, minéraux, toniques Somnifères

**Pas de différence significative entre 2001 et 1997**

Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc.

Analgésiques et antipyrétiques

Médicaments pour le cœur, la circulation, la tension artérielle

Diurétiques

Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général

Tranquillisants, autres médicaments pour les nerfs

Médicaments contre les problèmes d'allergie

Médicaments pour les problèmes d'asthme

Médicaments pour les yeux (pommades, gouttes)

Médicaments pour maigrir

Médicaments homéopathiques

**Pas d'information**

Médicaments à base de plantes

---

Tableau 4.3.3.3 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

DR01_1 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	39,2	40,4 (37,0-44,0)	1416
Femme	51,4	51,4 (48,1-54,8)	1574
<b>GROUPES D'AGE</b>			
0-14	22,5	22,5 (18,1-27,6)	507
15-24	24,3	24,3 (18,4-31,4)	267
25-34	26,2	26,1 (22,1-30,6)	483
35-44	36,9	36,8 (32,4-41,6)	516
45-54	53,5	53,7 (47,8-59,4)	369
55-64	66,6	66,7 (59,5-73,1)	300
65-74	84,0	84,0 (78,8-88,1)	279
75+	89,1	88,6 (83,8-92,1)	269
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	39,9	40,2 (28,4-53,3)	133
Enseignement primaire	52,5	47,4 (39,0-55,9)	404
Secondaire inférieur	50,3	47,9 (41,0-55,0)	408
Secondaire supérieur	47,6	48,2 (43,0-53,5)	690
Enseignement supérieur	40,7	44,4 (40,4-48,4)	1225
<b>ANNEE</b>			
1997	42,0	43,8 (40,4-47,2)	3012
2001	45,4	45,7 (43,1-48,3)	2990

(\*) Utilisation de la pilule contraceptive non comprise



Tableau 4.3.3.4 : Pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

DR04_1 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	27,3	26,5 (23,8-29,4)	1404
Femme	32,1	31,8 (28,9-34,8)	1563
<b>GROUPES D'AGE</b>			
0-14	17,7	17,7 (13,8-22,5)	503
15-24	31,7	31,8 (25,2-39,3)	266
25-34	36,9	36,9 (32,3-41,8)	479
35-44	36,5	36,5 (32,0-41,3)	515
45-54	36,8	36,9 (31,1-43,0)	368
55-64	26,7	26,5 (21,0-33,0)	297
65-74	27,2	26,9 (21,8-32,7)	276
75+	22,4	21,7 (16,7-27,6)	263
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	18,6	18,8 (11,4-29,6)	132
Enseignement primaire	24,7	25,0 (19,1-32,1)	399
Secondaire inférieur	25,1	25,3 (20,9-30,3)	408
Secondaire supérieur	28,0	27,5 (23,1-32,4)	688
Enseignement supérieur	34,6	33,3 (30,0-36,9)	1211
<b>ANNEE</b>			
1997	39,4	38,3 (35,4-41,3)	3020
2001	29,7	29,3 (27,2-31,5)	2967

## V.4. Région Wallonne


### Médicaments prescrits

#### V.4.1. Utilisateurs de médicaments prescrits au cours des deux dernières semaines (DR01\_1)

Un peu moins de la moitié (49%) des personnes interrogées en Wallonie déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin. Ce pourcentage est significativement plus élevé chez les femmes (57%) que chez les hommes (40%). Cette différence s'explique en partie par la consommation de moyens contraceptifs et de traitements hormonaux de substitution au cours de la ménopause.

Le pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin augmente sensiblement avec l'âge (Figure 4.3.4.1) de 21% chez les 0-14 ans à 92% chez les 75 ans et plus. Chez les femmes, on observe une première augmentation à partir de l'âge de 15 ans. Cette dernière est à mettre en relation avec la prise de la pilule contraceptive. Un deuxième pic est observé chez les femmes à partir de 45 ans.

Figure 4.3.4.1 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.




Un niveau d'instruction plus élevé est associé avec une consommation plus faible de médicaments prescrits. Les personnes avec seulement un niveau d'enseignement primaire déclarent dans 83% des cas avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit ; chez les personnes avec un niveau d'instruction élevé, ce taux est de 43% seulement. Cette différence n'est pas significative après standardisation pour le sexe et l'âge.

On observe ici une différence significative en fonction du niveau d'urbanisation. Après standardisation pour le sexe et l'âge, le pourcentage de consommateurs de médicaments prescrits est plus élevé dans les grandes villes (54%) que dans les zones rurales (47%) : Odds ratio = 1,4; IC 95% = 1,1-1,9.

Il n'est pas possible d'effectuer une comparaison directe entre 2001 et 1997 ; en effet, l'utilisation de méthodes de contraception n'avait pas été prise dans la liste des médicaments en 1997. Si dans les données de 2001 on place les femmes qui n'ont utilisé que des contraceptifs parmi les personnes qui n'ont pas consommé de médicaments prescrits, le pourcentage d'utilisateurs de médicaments prescrits en 2001 est équivalent à ce qui avait été observé en 1997 (46%). La Figure 4.3.4.2 montre malgré tout des différences entre 1997 et 2001 chez les hommes entre 0 et 14 ans (où les taux de 2001 sont plus bas que ceux de 1997) et entre 55 et 64 ans (où les taux de 2001 sont plus bas que ceux de 1997).

Figure 4.3.4.2 : Différence entre 2001 et 1997 en chiffres absolus en ce qui concerne le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



#### V.4.2. Utilisateurs au cours des deux dernières semaines de médicaments prescrits, par catégorie (DR03\_1)

Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

Chez les 0-14 ans, 9% des garçons et des filles ont utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge. On relève aussi 5% des garçons et 4% des filles qui ont utilisé un médicament contre l'allergie et 4% des garçons et des filles qui ont pris un tonifiant (vitamines, ...).

Chez les hommes adultes (entre 15 et 64 ans), 15% ont déclaré avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension. 5% ont déclaré avoir utilisé des médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général, 6% un analgésique ou un antipyrétique, 6% des médicaments ou des pommades contre les rhumatismes et 6% la consommation de tranquillisants ou autres médicaments pour les nerfs.

Chez les femmes de 15 à 64 ans, 18% ont déclaré avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin comme méthode de contraception. 12% ont déclaré avoir utilisé un médicament pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension et 10% un analgésique ou un antipyrétique. La consommation d'hormones de substitution (pendant la ménopause) est aussi assez importante : 15% chez les 45-54 ans et 38% chez les 55-64 ans.

Chez les hommes de 65 ans et plus, 56% déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines des médicaments prescrits par un médecin pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension.

Chez les femmes de 65 ans et plus, 65% déclarent avoir pris des médicaments pour une pathologie cardiovasculaire ou pour une hypertension.

La consommation de médicaments ou de pommades contre les rhumatismes ou les douleurs articulaires est aussi assez importante (16% chez les hommes et 28% chez les femmes), de même que celle des somnifères (14% chez les hommes et 28% chez les femmes).

Le Tableau 4.3.4.1 illustre les différences entre 2001 et 1997 en ce qui concerne la consommation de médicaments prescrits par catégorie, après standardisation par sexe et par âge. Il n'y a aucune catégorie de médicaments pour laquelle la consommation observée en 2001 est significativement plus basse qu'en 1997.

Tableau 4.3.4.1 : Comparaison entre les années 1997 et 2001 en ce qui concerne la consommation de médicaments prescrits, par catégories, après standardisation pour le sexe et l'âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

---

**Consommation significativement plus élevée en 2001 par rapport à 1997**

Diurétiques

**Significativement plus bas en 2001 par rapport à 1997**

Antibiotiques

**Pas de différence significative entre 2001 et 1997**

Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe et les maux de gorge  
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc.

Analgésiques et antipyrétiques

Fortifiants : vitamines, minéraux, toniques

Médicaments pour le cœur, la circulation, la tension artérielle

Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale

Laxatifs

Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général

Somnifères

Tranquillisants, autres médicaments pour les nerfs

Médicaments anti-dépresseurs

Thérapie hormonale de substitution (au cours de la ménopause)

Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau

Médicaments contre les problèmes d'allergie

Médicaments pour les problèmes d'asthme

Contraceptifs

Médicaments pour le diabète

Médicaments pour l'épilepsie

Médicaments pour la maladie de Parkinson

Médicaments pour les yeux (pommades, gouttes)

Médicaments pour maigrir

Médicaments homéopathiques

**Pas d'information**

Contraceptifs

Hypolipémiants

Médicaments pour les problèmes thyroïdiens

Médicaments à base de plantes

---

**Indicateurs complémentaires pour les 45-64 ans**

**V.4.3. Utilisateurs au cours des dernières 24 heures d'un médicament prescrit par un médecin (DR08\_1)**

48% des personnes âgées de 45 à 64 ans déclarent avoir pris au cours des dernières 24 heures un médicament prescrit par un médecin. Les variations de cet indicateur sont les mêmes que pour DR01\_1 avec une augmentation de la consommation chez les personnes âgées. Il n'y a pas de différence par contre en fonction du sexe, du niveau d'instruction ou du niveau d'urbanisation.

#### **V.4.4. Nombre de médicaments prescrits utilisés au cours des dernières 24 heures (DR08\_2)**

Le nombre moyen de médicaments que les personnes de 45-64 ans ont pris est de 2,9 (cette moyenne est calculée parmi les personnes qui prennent au moins un médicament). Cette moyenne est plus élevée chez les femmes (2,4) que chez les hommes (2,2) mais la différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge. On n'observe pas de différence en fonction de l'âge. Le niveau d'instruction et le niveau d'urbanisation ne constituent pas non plus des déterminants significatifs.

#### **V.4.5. Utilisateurs de 5 médicaments prescrits ou plus au cours des dernières 24 heures (DR08\_3)**

Parmi les personnes entre 45 et 64 ans qui ont pris au cours des dernières 24 heures un médicament prescrit, 21% ont pris au moins 5 médicaments différents. Ce pourcentage est plus élevé chez les femmes (23%) que chez les hommes (18%) mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge. Le pourcentage ne varie pas en fonction de l'âge. Le niveau d'instruction et le niveau d'urbanisation ne constituent pas des déterminants significatifs on plus.

#### **V.4.6. Utilisation de médicaments prescrits au cours des dernières 24 heures, par catégorie ATC (DR08\_4)**

Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

31% des hommes entre 45 et 64 ans déclarent avoir pris un médicament pour le système cardiovasculaire (groupe ATC C) au cours des dernières 24 heures. 15% déclarent avoir pris un médicament actif sur le système nerveux (groupe ATC N) au cours des dernières 24 heures, 14% un médicament pour le système digestif et métabolique (groupe ATC A), 11% un médicament pour le sang et les organes hématopoïétiques (groupe ATC B) et 8% un médicament pour le système locomoteur (groupe ATC M).

Chez les femmes, les médicaments pour le système cardiovasculaire (groupe ATC C) se situent en première position (22%). Viennent ensuite les médicaments actifs sur le système nerveux (groupe ATC N; 21,5%), le système urogénital (groupe ATC G, 18%), le système digestif en métabolique (groupe ATC A; 11%), le système locomoteur (groupe ATC M; 7%) et le sang et les organes hématopoïétiques (groupe ATC B; 7%).

#### **V.4.7. Utilisation au cours des dernières 24 heures d'un médicament prescrit, par sous-groupe ATC (DR08\_5)**

L'analyse en fonction des sous-groupes ATC permet d'étudier un peu plus en détail les produits spécifiques qui sont consommés. Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

Chez les hommes de 45 à 64 ans, ce sont les produits Bêtabloquants qui sont les médicaments les plus utilisés (C07) : 15% des hommes (45-64 ans) en ont pris un au cours des dernières 24 heures. Viennent ensuite les anti-aggrégants, les anticoagulants et les thrombolytiques (B01; 11%), les hypolipémiant (C10; 10%), les psycholeptiques (N05; 10%), les médicaments actifs dans le système rénine-angiotensine (C09; 9%) et les psychoanaleptiques (N06, 8%).

18% des femmes (45-64 ans) ont pris au cours des dernières 24 heures une hormone sexuelle ou un autre produit en relation avec le système reproducteur (sous-groupe ATC G03). Viennent ensuite les psycholeptiques (N05; 14%), les Bêtabloquants (C07 ; 13%), les psychoanaleptiques (N06; 9%), les produits actifs au niveau thyroïdien (H03; 8%) et les anti-inflammatoires et les produits contre le rhumatisme (M01; 6%).

La grande majorité des psycholeptiques enregistrés sont des benzodiazépines ; la plupart des psychoanaleptiques sont des antidépresseurs.


### **Médicaments non prescrits par un médecin**

#### **V.4.8. Utilisateurs van médicaments non prescrit par un médecin au cours des deux dernières semaines (DR04\_1)**

32% des personnes déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin. Ce pourcentage est plus élevé chez les femmes (35%) que chez les hommes (29%).

Le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, est plus bas chez les jeunes et chez les personnes âgées ; le taux le plus élevé se situe chez les femmes entre 15 et 54 ans (Figure 4.3.4.3).

Figure 4.3.4.3 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



La consommation de médicaments non prescrits augmente avec le niveau d’instruction. Le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin s’élève de 26% chez les personnes avec un diplôme de l’enseignement primaire à 36% chez les personnes avec un niveau d’enseignement supérieur. Ces différences ne sont pas significatives après standardisation pour le sexe et l’âge.

Le pourcentage de personnes qui ont pris des médicaments en vente libre est plus élevé dans les zones semi-urbaines (39%) que dans les zones urbaines (30%) ou les zones rurales (27%). Ces différences sont significatives après standardisation pour le sexe et l’âge mais elles sont difficiles à interpréter.

Le pourcentage de personnes qui ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin n’a pas changé en 2001 par rapport à 1997.

#### **V.4.9. Utilisateurs van médicaments non prescrit par un médecin au cours des deux dernières semaines, par catégorie (DR06\_1)**

Les principaux résultats sont décrits ici en résumé. Un aperçu plus complet est disponible sous forme de table à la fin du chapitre.

Chez les 0-14 ans, 9% des garçons et des filles ont utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge. On relève aussi les analgésiques et les antipyrétiques (8% chez les garçons, 9% chez les filles) et les produits comme les vitamines, minéraux et les tonifiants (6% chez les garçons et 4% chez les filles). Il y a à part cela assez peu de médicaments en vente libre qui sont consommés par les jeunes dans cette tranche d'âge.

Chez les hommes adultes de 15 à 64 ans, 17% déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un analgésique ou un antipyrétique en vente libre, 8% un médicament contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 5% des vitamines, minéraux et tonifiants.

Chez les femmes adultes de 15 à 64 ans, un pourcentage élevé, 26%, déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un analgésique ou un antipyrétique en vente libre. 10% déclarent avoir pris au cours des deux dernières semaines un médicament contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 7% des vitamines, minéraux et tonifiants.

Chez les hommes de 65 ans et plus, 7% ont pris au cours des deux dernières semaines un analgésique ou antipyrétique, 6% des médicaments pour l'allergie, 6% un médicament non prescrit par un médecin contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge et 6% des vitamines, minéraux et tonifiants.

Chez les femmes de 65 ans et plus, 17% ont pris au cours des deux dernières semaines un médicament non prescrit par un médecin analgésique ou antipyrétique. 4% ont pris un médicament contre les rhumatismes et 3% contre la toux, les refroidissements, la grippe ou les maux de gorge.

Pour les différences entre 2001 et 1997 en ce qui concerne la consommation de médicaments non prescrits par catégorie, après standardisation par sexe et par âge, il n'y a de variation en 2001 par rapport à 1997 dans aucun des groupes de médicaments.

Tableau 4.3.4.2 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

DR01_1 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	40,3	42,5 (38,8-46,2)	2432
Femme	51,9	54,0 (50,7-57,4)	2552
<b>GROUPES D'AGE</b>			
0-14	21,2	21,1 (17,2-25,7)	839
15-24	20,4	20,2 (15,4-26,1)	565
25-34	31,1	31,3 (26,2-36,8)	674
35-44	38,5	38,6 (33,5-44,0)	760
45-54	55,0	55,1 (49,0-61,0)	714
55-64	81,5	81,8 (76,5-86,2)	538
65-74	79,0	78,9 (71,4-84,8)	531
75+	92,2	91,9 (87,8-94,7)	363
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	73,7	68,0 (55,8-78,2)	59
Enseignement primaire	67,3	49,7 (42,4-57,1)	662
Secondaire inférieur	53,5	50,2 (44,9-55,5)	1034
Secondaire supérieur	42,2	48,2 (43,7-52,6)	1490
Enseignement supérieur	38,5	46,7 (41,4-52,1)	1544
<b>NIVEAU D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	50,5	52,9 (46,4-59,4)	984
Zone semi-urbaine	47,2	50,7 (46,0-55,4)	1844
Zone rurale	44,6	45,7 (42,0-49,4)	2156
<b>ANNEE</b>			
1997	46,8	53,1 (50,4-55,7)	3620
2001	46,2	48,6 (45,9-51,3)	4984

(\*) Utilisation de la pilule contraceptive non comprise



Tableau 4.3.4.3 : Pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé au cours des deux dernières semaines un médicament prescrit par un médecin, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

DR04_1 – Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	28,7	27,5 (24,5-30,7)	2414
Femme	35,2	34,8 (31,5-38,3)	2535
<b>GROUPES D'AGE</b>			
0-14	22,0	21,9 (17,2-27,6)	828
15-24	35,7	35,6 (29,0-42,9)	562
25-34	39,3	39,5 (33,9-45,4)	668
35-44	36,0	36,1 (30,5-42,2)	758
45-54	41,6	41,6 (35,0-48,5)	713
55-64	28,9	28,8 (23,0-35,4)	537
65-74	29,2	28,8 (21,7-37,0)	526
75+	16,2	15,4 (10,5-22,1)	357
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	32,2	29,5 (12,7-54,4)	58
Enseignement primaire	25,7	26,4 (20,6-33,1)	661
Secondaire inférieur	27,4	26,9 (22,5-31,9)	1024
Secondaire supérieur	32,8	31,4 (27,6-35,5)	1480
Enseignement supérieur	36,3	35,5 (30,4-40,9)	1536
<b>NIVEAU D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	30,0	28,5 (23,6-33,9)	969
Zone semi-urbaine	39,1	38,8 (34,0-43,8)	1833
Zone rurale	26,9	25,8 (23,0-28,8)	2147
<b>ANNEE</b>			
1997	32,1	30,7 (28,4-33,2)	3605
2001	32,0	31,3 (28,8-33,9)	4949

## VI. Bibliographie

- (1) BIGE. Demografische impact op de Riziv-uitgaven (publieke financiering) voor farmaceutische specialiteiten afgeleverd in de ambulante sector. 1997.
- (2) WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Guidelines for ATC classification and DDD assignment. Oslo: 2000.
- (3) Farmaceutische kengetallen, farmaceutische verstrekkingen ambulante praktijk 1998. 1999. Brussel, Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen.
- (4) BIRNH - The Belgian Interuniversity Research on Nutrition and Health Study group. BIRNH - The Belgian Interuniversity Research on Nutrition and Health Study group. Acta Cardiologica 1989; 64:89-194.
- (5) De Maeseneer J, De Prins L, Heyerick JP, Dhooghe E, Reginster Haneuse G, Gosset C et al. Fidélité du patient au médecin généraliste et consommation de soins de santé: une approche multivariée. Bruxelles : INAMI - RIZIV, 1997.

## VII. Lecteurs

- Dr Bruno Seys, Project Manager, Institut Pharmaco Epidémiologique Belge
- Dr Jean-Marc Feron, Centre Universitaire de Médecine Générale, Université Catholique de Louvain
- Mr O. Ethgen, Département de Santé Publique, Université de Liège
- Mr Frans Gosselinckx, Cabinet Ministère de la Santé Publique

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS  
DES 2 DERNIERES SEMAINES DES MEDICAMENTS\* PRESCRITS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	39,4	5902
	Femme	54,9	6160
Total		47,3	12062
GROUPE D'AGE	0-14	21,5	1947
	15-24	32,1	1288
	25-34	34,1	1731
	35-44	38,8	1928
	45-54	53,7	1676
	55-64	69,6	1362
	65-74	82,8	1231
	75+	88,8	899
Total		47,3	12062
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	52,7	271
	Enseignement primaire	69,5	1557
	Secondaire inférieur	55,8	2195
	Secondaire supérieur	43,1	3522
	Enseignement supérieur	38,8	4134
Total		47,4	11679
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	48,4	2990
	Zone urbaine	50,4	1927
	Zone semi-urbaine	48,2	3891
	Zone rurale	44,2	3254
Total		47,3	12062
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	46,4	4088
	Région Bruxelloise	48,4	2990
	Région Wallonne	49,0	4984
Belgique		47,3	12062
ANNEE	1997*	40,8	10156
	2001	47,3	12062
Total 1997 en 2001		44,3	22218

Indicateur dr01\_1

\* A l'exclusion des moyens contraceptifs

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - GARCONS, 0-14 ANS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	8,7	13,4
Médicaments pour l'allergie	5,2	4,1
Antibiotiques	4,2	6,9
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	3,9	4,1
Médicaments pour l'asthme	2,9	2,1
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	2,3	2,1
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	2,1	4,2
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	1,3	,8

Indicateur dr03\_1

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FILLES, 0-14 ANS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	9,8	12,2
Antibiotiques	4,4	4,4
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	4,1	2,5
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	3,8	2,0
Médicaments pour l'allergie	3,2	2,3
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	2,2	1,9
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	2,1	2,1
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0
Médicaments pour l'asthme	2,0	2,0

Indicateur dr03\_1

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 14-64 ANS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	10,9	8,5
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	5,6	5,0
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	5,2	5,2
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	4,9	5,8
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	4,4	4,1
Antibiotiques	3,3	4,0
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	3,3	2,8
Médicaments pour la dépression	3,3	2,4
Somnifères	2,9	2,2
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	2,8	2,5
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	2,5	1,8
Médicaments pour l'allergie	2,4	2,1
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0
Médicaments pour l'asthme	1,9	1,6
Médicaments pour le cholestérol	1,5	,
Médicaments pour les yeux	1,1	1,3

Indicateur dr03\_1

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 14-64 ANS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Contraceptifs	15,2	,
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	11,1	10,3
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	9,6	5,6
Hormones au cours de la ménopause	7,9	4,9
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	7,2	7,4
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	6,5	6,4
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	6,3	5,0
Somnifères	5,6	3,8
Médicaments pour la dépression	5,5	4,4
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	5,5	4,8
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	4,6	3,4
Antibiotiques	4,5	4,3
Médicaments pour l'allergie	3,8	3,4
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	3,0	2,5
Médicaments pour l'asthme	2,5	2,1
Médicaments pour la glande thyroïde	2,3	,
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0
Médicaments pour les yeux	1,7	1,5
Diurétiques	1,2	1,1
Médicaments pour le cholestérol	1,0	,

Indicateur dr03\_1

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	55,7	49,6
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	14,9	13,3
Somnifères	14,8	12,8
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	10,4	7,9
Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale	9,9	7,7
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	8,8	7,1
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	7,9	5,3
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	7,3	9,1
Médicaments pour les yeux	7,1	5,5
Médicaments pour l'asthme	6,6	7,2
Diurétiques	6,6	5,8
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	6,4	5,6
Médicaments pour la dépression	6,2	3,1
Antibiotiques	4,8	4,6
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	3,6	3,3
Laxatifs	3,3	1,9
Médicaments pour le cholestérol	2,3	,
Médicaments pour le diabète	1,9	1,9
Médicaments pour l'allergie	1,9	2,0
Médicament pour la maladie de Parkinson	1,4	1,3

Indicateur dr03\_1



## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	58,1	52,0
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	28,4	23,0
Somnifères	26,7	21,9
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	17,2	10,8
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	15,8	10,8
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	14,1	9,8
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	14,0	13,2
Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale	12,0	12,4
Diurétiques	11,8	5,1
Médicaments pour les yeux	10,3	8,9
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	9,1	7,1
Médicaments pour la dépression	8,0	9,3
Laxatifs	6,7	5,8
Antibiotiques	5,8	5,4
Hormones au cours de la ménopause	5,3	3,9
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	4,9	2,6
Médicaments pour l'asthme	4,7	3,9
Médicaments pour le cholestérol	4,0	,
Médicaments pour la glande thyroïde	3,1	,
Médicaments pour l'allergie	3,0	2,3
Médicaments pour le diabète	1,9	1,9

Indicateur dr03\_1

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU  
COURS DES DERNIERES 24 HEURES DES MEDICAMENTS  
PRESCRITS (GROUPE D'AGE 45-64 ANS)  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	41,0	1490
	Femme	47,0	1548
Total		44,0	3038
Agegroups	45-49	33,0	856
	50-54	42,2	820
	55-59	50,5	699
	60-64	55,5	663
Total		44,0	3038
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	40,4	55
	Enseignement primaire	54,7	435
	Secondaire inférieur	50,7	669
	Secondaire supérieur	41,4	846
	Enseignement supérieur	37,7	970
Total		44,1	2975
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	39,6	669
	Zone urbaine	49,0	489
	Zone semi-urbaine	41,7	1052
	Zone rurale	46,0	828
Total		44,0	3038
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	42,9	1117
	Région Bruxelloise	39,6	669
	Région Wallonne	48,1	1252
Belgique		44,0	3038

Indicateur dr08\_1

## BELGIQUE

NOMBRE DE MEDICAMENTS PRESCRITS CONSOMMES AU COURS DES 24  
DERNIERES HEURES (GROUPE D'AGE 45-64 ANS) \*  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Moyenne	N
SEXE	Homme	2,5	609
	Femme	2,5	760
Total		2,5	1369
Agegroups	45-49	2,4	298
	50-54	2,5	340
	55-59	2,6	348
	60-64	2,6	383
Total		2,5	1369
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	4,8	20
	Enseignement primaire	2,5	231
	Secondaire inférieur	2,6	345
	Secondaire supérieur	2,5	375
	Enseignement supérieur	2,3	373
Total		2,5	1344
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	2,5	276
	Zone urbaine	2,5	244
	Zone semi-urbaine	2,4	457
	Zone rurale	2,7	392
Total		2,5	1369
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	2,3	475
	Région Bruxelloise	2,5	276
	Région Wallonne	2,9	618
Belgique		2,5	1369

Indicateur dr08\_2

\* Par rapport aux personnes qui ont pris au moins un médicament au cours des dernières  
24 heures

BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME 5  
MÉDICAMENTS PRESCRITS OU PLUS AU COURS DES DERNIÈRES 24  
HEURES (GROUPE D'ÂGE 45-64 ANS)  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	13,3	609
	Femme	13,3	760
Total		13,3	1369
Agegroups	45-49	11,9	298
	50-54	10,1	340
	55-59	15,7	348
	60-64	15,5	383
Total		13,3	1369
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	42,9	20
	Enseignement primaire	12,6	231
	Secondaire inférieur	13,2	345
	Secondaire supérieur	14,5	375
	Enseignement supérieur	10,9	373
Total		13,3	1344
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	11,2	276
	Zone urbaine	14,0	244
	Zone semi-urbaine	12,1	457
	Zone rurale	15,0	392
Total		13,3	1369
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	10,0	475
	Région Bruxelloise	11,2	276
	Région Wallonne	20,6	618
Belgique		13,3	1369

Indicateur dr08\_3

\* Par rapport aux personnes qui ont pris au moins un médicament au cours des dernières 24 heures

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24  
HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR GROUPE ATC) - HOMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Médicaments en relation avec le système cardiovasculaire (C)	22,6
Médicaments en relation avec le système nerveux (N)	10,7
Médicaments en relation avec le système digestif et le métabolisme (A)	8,3
Médicaments en relation avec le sang et les organes hématopoïétiques (B)	6,6
Médicaments en relation avec système locomoteur (M)	6,5
Médicaments en relation avec le système respiratoire (R)	5,1
Médicaments anti-infectieux à usage systémique (J)	2,4
Préparations hormonales à usage systémique, excepté hormones sexuelles (H)	2,4
Médicaments en relation avec organes sensitifs (S)	1,5
Médicaments en relation avec le système urogénital (G)	,9
Médicaments antitumoraux et médicaments en relation avec le système immunitaire (L)	,8
Médicaments dermatologiques (D)	,5
Produits antiparasitaires, insecticides et répulsifs (P)	,2
Autres médicaments (V)	,0

Indicateur dr08\_4

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24 HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR SOUS-GROUPE ATC) - HOMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Bêtabloquants (C07)	10,5
Hypolipémiants (C10)	8,7
Anti-aggrégants, anticoagulants et thrombolytiques (B01)	6,5
Psycholeptiques (N05)	6,3
Médicaments actifs dans le système rénine-angiotensine (C09)	5,2
Psychoanaleptiques (N06)	4,9
Antagonistes calciques (C08)	4,3
Anti-acide, médicaments pour le traitement de l'ulcère peptique et de la flatulence (A02)	4,0
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux (M01)	3,3
Médicaments actifs au niveau cardiaque (C01)	2,8
Analgésiques (N02)	2,7
Médicaments contre la goutte (M04)	2,6
Médicaments actifs dans le cadre de l'asthme (R03)	2,6
Médicaments dans le cadre du diabète (A10)	2,3
Médicaments antibactériens à usage systémique (J01)	2,1
Diurétiques (C03)	2,0
Médicaments à usage ophtalmologique (S01)	1,5
Médicaments actifs au niveau thyroïdien (H03)	1,4
Médicaments pour la toux et les refroidissements (R05)	1,4
Corticostéroïdes à usage systémique (H02)	1,2

Indicateur dr08\_5

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24 HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR SOUS-GROUPE ATC) - FEMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Hormones sexuelles et autres médicaments actifs dans le cadre du système reproducteur (G03)	13,3
Bêtabloquants (C07)	11,5
Psycholeptiques (N05)	9,3
Psychoanaleptiques (N06)	6,2
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux (M01)	6,1
Médicaments actifs au niveau thyroïdien (H03)	4,7
Diurétiques (C03)	4,4
Hypolipémiants (C10)	4,3
Médicaments actifs dans le système rénine-angiotensine (C09)	4,1
Analgésiques (N02)	3,6
Antiacide, médicaments pour le traitement de l'ulcère peptique et de la flatulence (A02)	3,5
Anti-aggrégants, anticoagulants et thrombolytiques (B01)	2,8
Médicaments actifs dans le cadre de l'asthme (R03)	2,6
Antagonistes calciques (C08)	2,4
Suppléments minéraux (A12)	2,1
Médicaments dans le cadre du diabète (A10)	1,9
Vitamines (A11)	1,8
Antihistaminiques à usage systémique (R06)	1,7
Médicaments pour la toux et les refroidissements (R05)	1,7
Antispasmodiques, anticholinergiques et propulsifs (A03)	1,6
Médicaments antibactériens à usage systémique (J01)	1,6
Vasoprotecteurs (C05)	1,6
Médicaments actifs au niveau endocrine (L02)	1,3

Indicateur dr08\_5

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS  
DES 2 DERNIERES SEMAINES DES MEDICAMENTS NON PRESCRITS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	23,7	5847
	Femme	32,5	6114
Total		28,2	11961
GROUPE D'AGE	0-14	19,4	1919
	15-24	29,4	1274
	25-34	39,4	1715
	35-44	32,8	1922
	45-54	33,0	1669
	55-64	23,9	1355
	65-74	24,0	1221
	75+	18,3	886
Total		28,2	11961
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	16,5	266
	Enseignement primaire	22,6	1549
	Secondaire inférieur	23,5	2176
	Secondaire supérieur	28,0	3494
	Enseignement supérieur	33,4	4100
Total		28,2	11585
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	29,7	2967
	Zone urbaine	30,5	1905
	Zone semi-urbaine	28,4	3858
	Zone rurale	26,3	3231
Total		28,2	11961
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	26,3	4045
	Région Bruxelloise	29,7	2967
	Région Wallonne	32,0	4949
Belgique		28,2	11961
ANNEE	1997	33,2	10145
	2001	28,2	11961
Total 1997 en 2001		30,5	22106

Indicateur dr04\_1



## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - GARCONS, 0-14 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	8,2	10,4
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	6,6	6,1
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	4,2	6,8

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage < 1%

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FILLES, 0-14 ANS

Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	8,7	14,4
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	5,6	12,5
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	4,1	6,2

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 15-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	12,3	14,8
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	6,8	9,8
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	4,4	3,3
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	3,1	2,3
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	2,2	1,6
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	1,4	1,1

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage < 1%

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 15-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	23,0	22,1
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	9,4	13,1
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	6,4	6,3
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	2,4	3,1
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	2,0	2,6
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	1,1	1,2

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	5,2	8,2
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	4,5	11,8
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	4,4	2,3
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	2,1	1,6
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	1,8	3,4
Médicaments pour l'allergie	1,8	,2
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	1,6	2,7

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage < 1%

## BELGIQUE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	11,3	10,8
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	5,6	6,7
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	3,4	4,2
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	2,8	4,3
Laxatifs	1,4	1,1
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	,7	1,5
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	,5	2,8

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS  
DES 2 DERNIERES SEMAINES DES MEDICAMENTS\* PRESCRITS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	38,9	2054
	Femme	53,6	2034
Total		46,4	4088
GROUPE D'AGE	0-14	21,5	601
	15-24	32,9	456
	25-34	33,5	574
	35-44	36,6	652
	45-54	52,0	593
	55-64	64,8	524
	65-74	84,3	421
	75+	87,5	267
Total		46,4	4088
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	50,3	79
	Enseignement primaire	73,4	491
	Secondaire inférieur	56,8	753
	Secondaire supérieur	41,7	1342
	Enseignement supérieur	35,5	1365
Total		46,5	4030
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	49,7	943
	Zone semi-urbaine	47,3	2047
	Zone rurale	42,3	1098
Total		46,4	4088
ANNEE	1997*	37,2	3524
	2001	46,4	4088
Total 1997 en 2001		42,3	7612

Indicateur dr01\_1

\* A l'exclusion des moyens contraceptifs

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - GARCONS, 0-14 ANS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	8,4	12,3
Médicaments pour l'allergie	5,8	3,4
Antibiotiques	4,4	4,4
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	2,9	3,2
Médicaments pour l'asthme	2,8	1,3
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	2,0	,9
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	1,0	3,6

Indicateur dr03\_1



## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FILLES, 0-14 ANS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	10,3	12,1
Antibiotiques	4,4	3,7
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	4,2	1,5
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	3,5	,0
Médicaments pour l'allergie	3,2	2,2
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	2,3	1,0
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0
Médicaments pour l'asthme	1,9	2,4
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	1,3	1,8

Indicateur dr03\_1

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 14-64 ANS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	9,7	8,2
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	5,2	3,5
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	5,1	5,9
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	5,1	5,5
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	3,2	3,1
Antibiotiques	2,8	2,3
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	2,7	2,3
Médicaments pour la dépression	2,4	1,8
Médicaments pour l'allergie	2,3	2,0
Somnifères	2,2	,9
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	2,1	1,4
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	2,0	1,1
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0
Médicaments pour l'asthme	1,8	1,6
Médicaments pour le cholestérol	1,6	,
Médicaments pour les yeux	1,2	,9

Indicateur dr03\_1

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 14-64 ANS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Contraceptifs	13,8	,
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	10,6	8,8
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	8,9	3,9
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	7,3	7,7
Hormones au cours de la ménopause	6,5	3,1
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	6,3	6,1
Somnifères	5,2	2,9
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	5,0	4,2
Médicaments pour la dépression	4,4	3,1
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	4,3	3,5
Antibiotiques	3,8	3,3
Médicaments pour l'allergie	3,1	3,4
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	2,7	2,0
Médicaments pour l'asthme	2,4	2,1
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	2,3	1,7
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0
Médicaments pour la glande thyroïde	1,5	,
Médicaments pour le cholestérol	1,3	,

Indicateur dr03\_1

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	55,4	47,4
Somnifères	15,0	9,4
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	13,6	14,9
Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale	9,6	3,9
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	9,3	6,1
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	7,9	9,2
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	7,1	5,1
Médicaments pour l'asthme	6,8	8,9
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	6,4	3,2
Médicaments pour les yeux	6,0	4,5
Médicaments pour la dépression	5,7	1,6
Diurétiques	5,2	3,3
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	4,2	3,7
Antibiotiques	4,0	3,5
Laxatifs	4,0	,5
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	3,4	2,2
Médicaments pour l'allergie	2,2	1,2
Médicaments pour le diabète	1,9	1,9
Médicaments pour le cholestérol	1,3	,
Médicament pour la maladie de Parkinson	1,2	1,8

Indicateur dr03\_1

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	56,6	47,7
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	29,4	16,0
Somnifères	26,0	18,0
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	15,3	7,8
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	15,0	7,4
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	12,1	7,3
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	12,0	13,0
Diurétiques	11,2	5,2
Médicaments pour les yeux	11,1	6,1
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	9,3	7,4
Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale	9,2	9,4
Médicaments pour la dépression	6,6	7,4
Laxatifs	5,7	4,3
Antibiotiques	5,3	4,7
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	5,1	2,4
Médicaments pour le cholestérol	3,5	,
Médicaments pour la glande thyroïde	3,3	,
Médicaments pour l'asthme	3,2	1,5
Hormones au cours de la ménopause	2,6	1,8
Médicaments pour le diabète	1,9	2,0
Médicaments pour l'allergie	1,7	1,6

Indicateur dr03\_1

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU  
COURS DES DERNIERES 24 HEURES DES MEDICAMENTS  
PRESCRITS (GROUPE D'AGE 45-64 ANS)  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	39,6	563
	Femme	46,2	554
Total		42,9	1117
Agegroups	45-49	31,0	298
	50-54	42,9	295
	55-59	49,2	260
	60-64	53,1	264
Total		42,9	1117
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	27,0	17
	Enseignement primaire	55,4	155
	Secondaire inférieur	48,8	268
	Secondaire supérieur	40,3	347
	Enseignement supérieur	36,1	317
Total		43,0	1104
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	47,1	253
	Zone semi-urbaine	39,6	587
	Zone rurale	46,3	277
Total		42,9	1117

Indicateur dr08\_1

## REGION FLAMANDE

NOMBRE DE MEDICAMENTS PRESCRITS CONSOMMES AU COURS DES 24  
DERNIERES HEURES (GROUPE D'AGE 45-64 ANS) \*  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Moyenne	N
SEXE	Homme	2,2	223
	Femme	2,4	252
Total		2,3	475
Agegroups	45-49	2,2	93
	50-54	2,3	117
	55-59	2,4	122
	60-64	2,3	143
Total		2,3	475
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	1,7	5
	Enseignement primaire	2,3	83
	Secondaire inférieur	2,3	128
	Secondaire supérieur	2,2	143
	Enseignement supérieur	2,4	110
Total		2,3	469
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	2,5	119
	Zone semi-urbaine	2,2	231
	Zone rurale	2,3	125
Total		2,3	475

Indicateur dr08\_2

\* Par rapport aux personnes qui ont pris au moins un médicament au cours des dernières 24 heures

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME 5  
MÉDICAMENTS PRESCRITS OU PLUS AU COURS DES DERNIÈRES 24  
HEURES (GROUPE D'ÂGE 45-64 ANS)  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	8,4	223
	Femme	11,3	252
Total		10,0	475
Agegroups	45-49	11,5	93
	50-54	7,7	117
	55-59	10,3	122
	60-64	10,8	143
Total		10,0	475
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	,0	5
	Enseignement primaire	8,2	83
	Secondaire inférieur	11,6	128
	Secondaire supérieur	8,8	143
	Enseignement supérieur	11,6	110
Total		10,1	469
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	14,3	119
	Zone semi-urbaine	6,6	231
	Zone rurale	12,2	125
Total		10,0	475

Indicateur dr08\_3

\* Par rapport aux personnes qui ont pris au moins un médicament au cours des dernières 24 heures



## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24  
HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR GROUPE ATC) - HOMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Médicaments en relation avec le système cardiovasculaire (C)	20,0
Médicaments en relation avec le système nerveux (N)	8,4
Médicaments en relation avec le système respiratoire (R)	6,0
Médicaments en relation avec système locomoteur (M)	5,9
Médicaments en relation avec le système digestif et le métabolisme (A)	5,9
Médicaments en relation avec le sang et les organes hématopoïétiques (B)	5,2
Médicaments anti-infectieux à usage systémique (J)	2,9
Médicaments en relation avec organes sensitifs (S)	2,1
Préparations hormonales à usage systémique, excepté hormones sexuelles (H)	2,1
Médicaments en relation avec le système urogénital (G)	1,1
Médicaments antitumoraux et médicaments en relation avec le système immunitaire (L)	,6
Médicaments dermatologiques (D)	,5
Autres médicaments (V)	,0
Produits antiparasitaires, insecticides et répulsifs (P)	,0

Indicateur dr08\_4

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24  
HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR GROUPE ATC) - FEMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Médicaments en relation avec le système cardiovasculaire (C)	22,0
Médicaments en relation avec le système nerveux (N)	12,6
Médicaments en relation avec le système urogénital (G)	11,1
Médicaments en relation avec le système digestif et le métabolisme (A)	9,4
Médicaments en relation avec système locomoteur (M)	7,2
Préparations hormonales à usage systémique, excepté hormones sexuelles (H)	3,7
Médicaments en relation avec le système respiratoire (R)	4,9
Médicaments en relation avec le sang et les organes hématopoïétiques (B)	2,8
Médicaments antitumoraux et médicaments en relation avec le système immunitaire (L)	2,3
Médicaments anti-infectieux à usage systémique (J)	2,3
Médicaments en relation avec organes sensitifs (S)	,5
Produits antiparasitaires, insecticides et répulsifs (P)	,4
Médicaments dermatologiques (D)	,0
Autres médicaments (V)	,0

Indicateur dr08\_4

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24 HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR SOUS-GROUPE ATC) - HOMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Bêtabloquants (C07)	9,3
Hypolipémiants (C10)	8,8
Anti-aggrégants, anticoagulants et thrombolytiques (B01)	5,2
Psycholeptiques (N05)	5,1
Médicaments actifs dans le système rénine-angiotensine (C09)	3,7
Psychoanaleptiques (N06)	3,5
Antagonistes calciques (C08)	3,5
Médicaments actifs dans le cadre de l'asthme (R03)	3,4
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux (M01)	3,0
Antiacide, médicaments pour le traitement de l'ulcère peptique et de la flatulence (A02)	2,6
Médicaments antibactériens à usage systémique (J01)	2,4
Médicaments contre la goutte (M04)	2,2
Médicaments actifs au niveau cardiaque (C01)	2,1
Médicaments à usage ophtalmologique (S01)	2,0
Analgésiques (N02)	1,9
Médicaments pour la toux et les refroidissements (R05)	1,7
Médicaments dans le cadre du diabète (A10)	1,5
Médicaments actifs au niveau thyroïdien (H03)	1,4
Diurétiques (C03)	1,1
Antihistaminiques à usage systémique (R06)	1,0

Indicateur dr08\_5

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24 HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR SOUS-GROUPE ATC) - FEMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Bêtabloquants (C07)	11,3
Hormones sexuelles et autres médicaments actifs dans le cadre du système reproducteur (G03)	10,9
Psycholeptiques (N05)	6,9
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux (M01)	5,8
Hypolipémiants (C10)	5,6
Diurétiques (C03)	4,8
Psychoanaleptiques (N06)	4,6
Médicaments actifs dans le système rénine-angiotensine (C09)	3,8
Médicaments actifs dans le cadre de l'asthme (R03)	3,6
Analgésiques (N02)	3,5
Médicaments actifs au niveau thyroïdien (H03)	3,2
Antiacide, médicaments pour le traitement de l'ulcère peptique et de la flatulence (A02)	2,8
Anti-aggrégants, anticoagulants et thrombolytiques (B01)	2,5
Antagonistes calciques (C08)	2,4
Suppléments minéraux (A12)	2,1
Médicaments dans le cadre du diabète (A10)	1,9
Antihistaminiques à usage systémique (R06)	1,9
Médicaments antibactériens à usage systémique (J01)	1,8
Vitamines (A11)	1,8
Antispasmodiques, anticholinergiques et propulsifs (A03)	1,7
Médicaments actifs au niveau endocrine (L02)	1,5
Médicaments pour la toux et les refroidissements (R05)	1,3
Médicaments actifs dans le cadre de la maladie de Parkinson (N04)	1,1

Indicateur dr08\_5

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS  
DES 2 DERNIERES SEMAINES DES MEDICAMENTS NON PRESCRITS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	20,9	2029
	Femme	31,4	2016
Total		26,3	4045
GROUPE D'AGE	0-14	18,4	588
	15-24	26,1	446
	25-34	39,9	568
	35-44	30,7	649
	45-54	28,4	588
	55-64	21,2	521
	65-74	21,3	419
	75+	18,5	266
Total		26,3	4045
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	12,4	76
	Enseignement primaire	20,7	489
	Secondaire inférieur	21,6	744
	Secondaire supérieur	26,0	1326
	Enseignement supérieur	31,8	1353
Total		26,2	3988
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	30,5	936
	Zone semi-urbaine	24,6	2025
	Zone rurale	25,7	1084
Total		26,3	4045
ANNEE	1997	32,7	3520
	2001	26,3	4045
Total 1997 en 2001		29,1	7565

Indicateur dr04\_1

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - GARCONS, 0-14 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	8,0	12,4
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	6,3	6,2
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	3,2	6,1

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FILLES, 0-14 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	9,2	18,7
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	4,2	4,9
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	4,0	15,6
Médicaments pour l'allergie	1,5	,5
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	1,0	1,1

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage < 1%

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 15-64 ANS

Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	9,7	13,5
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	5,9	9,5
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	4,0	2,7
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	3,2	2,1
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	1,7	,9
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	1,2	,8

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%



## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 15-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	21,3	21,2
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	9,1	14,2
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	6,0	5,5
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	1,9	2,1
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	1,4	2,1

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	4,1	2,0
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	3,7	9,1
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	3,5	5,9
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	2,0	1,6
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	1,7	,2
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	1,2	1,7

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## REGION FLAMANDE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	8,9	11,3
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	6,3	7,5
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	4,2	3,8
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	2,6	3,8
Laxatifs	1,3	1,2
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	,0	3,4

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage < 1%

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS  
DES 2 DERNIERES SEMAINES DES MEDICAMENTS\* PRESCRITS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	39,5	1416
	Femme	56,9	1574
Total		48,4	2990
GROUPE D'AGE	0-14	22,5	507
	15-24	32,7	267
	25-34	32,5	483
	35-44	41,3	516
	45-54	56,6	369
	55-64	66,6	300
	65-74	84,0	279
	75+	89,1	269
Total		48,4	2990
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	40,5	133
	Enseignement primaire	53,1	404
	Secondaire inférieur	51,8	408
	Secondaire supérieur	50,5	690
	Enseignement supérieur	45,4	1225
Total		48,4	2860
ANNEE	1997*	42,0	3012
	2001	48,4	2990
Total 1997 en 2001		45,4	6002

Indicateur dr01\_1

\* A l'exclusion des moyens contraceptifs

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - GARCONS, 0-14 ANS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	10,3	12,4
Antibiotiques	7,9	11,5
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	6,4	3,5
Médicaments pour l'allergie	6,2	3,9
Médicaments pour l'asthme	5,1	1,7
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	3,9	10,4
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	2,1	1,8
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0

Indicateur dr03\_1

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FILLES, 0-14 ANS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	9,6	13,0
Antibiotiques	5,3	3,5
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	4,9	5,0
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	4,4	5,2
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	3,2	6,7
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	2,4	3,4
Médicaments pour l'allergie	2,2	2,1
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0

Indicateur dr03\_1

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 14-64 ANS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	8,2	8,0
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	7,1	7,7
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	5,6	4,8
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	4,8	6,5
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	4,4	3,7
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	4,1	3,9
Antibiotiques	3,5	4,7
Médicaments pour la dépression	3,5	2,8
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	3,5	2,9
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	3,3	2,3
Médicaments pour l'allergie	3,1	3,2
Médicaments pour l'asthme	3,1	2,4
Somnifères	2,9	3,2
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0
Médicaments pour les yeux	1,2	2,0

Indicateur dr03\_1

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 14-64 ANS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Contraceptifs	17,5	,
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	13,5	8,9
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	11,5	9,0
Hormones au cours de la ménopause	11,2	6,4
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	8,8	6,2
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	7,2	6,3
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	6,8	4,9
Médicaments pour la dépression	6,5	5,8
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	6,2	6,0
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	5,9	6,3
Antibiotiques	5,8	5,4
Somnifères	5,7	5,1
Médicaments pour l'allergie	4,3	3,2
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	3,2	3,5
Médicaments pour les yeux	2,5	,8
Médicaments pour l'asthme	2,0	2,6
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0
Médicaments pour la glande thyroïde	1,9	,
Diurétiques	1,1	1,4
Médicaments pour le cholestérol	,2	,

Indicateur dr03\_1



## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	57,5	40,1
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	18,7	11,5
Somnifères	17,4	13,9
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	15,4	6,5
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	14,7	10,2
Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale	13,7	14,7
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	12,9	15,6
Diurétiques	12,4	14,9
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	10,7	7,6
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	10,7	4,5
Médicaments pour les yeux	10,4	10,1
Médicaments pour la dépression	8,5	4,8
Antibiotiques	7,4	4,1
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	5,2	3,2
Médicaments pour l'asthme	4,3	5,0
Laxatifs	3,7	3,1
Médicaments pour le cholestérol	3,1	,
Médicaments pour l'allergie	2,7	1,3
Médicaments pour le diabète	1,9	1,9
Médicament pour la maladie de Parkinson	1,6	,8

Indicateur dr03\_1

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	50,4	49,0
Somnifères	28,2	24,7
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	24,0	24,9
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	19,2	10,8
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	18,3	11,3
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	17,7	11,4
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	16,1	13,6
Hormones au cours de la ménopause	13,2	8,4
Médicaments pour la dépression	12,8	11,1
Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale	11,9	17,5
Médicaments pour les yeux	11,6	21,3
Diurétiques	10,2	9,7
Laxatifs	11,5	7,5
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	8,3	11,5
Antibiotiques	7,2	8,0
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	5,9	2,7
Médicaments pour l'asthme	5,2	3,3
Médicaments pour le cholestérol	4,3	,
Médicaments pour l'allergie	4,1	2,2
Médicaments pour la glande thyroïde	2,2	,
Médicaments pour le diabète	1,9	1,9

Indicateur dr03\_1

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU  
COURS DES DERNIERES 24 HEURES DES MEDICAMENTS  
PRESCRITS (GROUPE D'AGE 45-64 ANS)  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	32,4	313
	Femme	46,5	356
Total		39,6	669
Agegroups	45-49	34,9	173
	50-54	36,5	196
	55-59	42,7	163
	60-64	47,9	137
Total		39,6	669
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	42,2	28
	Enseignement primaire	31,7	88
	Secondaire inférieur	47,0	99
	Secondaire supérieur	41,3	150
	Enseignement supérieur	38,6	279
Total		39,8	644

Indicateur dr08\_1

REGION BRUXELLOISE

OMBRE DE MEDICAMENTS PRESCRITS CONSOMMES AU COURS DES 24  
DERNIERES HEURES (GROUPE D'AGE 45-64 ANS) \*  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Moyenne	N
SEXE	Homme	2,3	105
	Femme	2,6	171
Total		2,5	276
Agegroups	45-49	2,1	60
	50-54	2,3	72
	55-59	2,6	76
	60-64	2,9	68
Total		2,5	276
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	2,9	12
	Enseignement primaire	3,1	32
	Secondaire inférieur	2,5	48
	Secondaire supérieur	2,5	67
	Enseignement supérieur	2,2	109
Total		2,4	268

Indicateur dr08\_2

\* Par rapport aux personnes qui ont pris au moins un médicament au cours des dernières 24 heures

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME 5  
 MEDICAMENTS PRESCRITS OU PLUS AU COURS DES DERNIERES  
 24 HEURES (GROUPE D'AGE 45-64 ANS)  
 Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	9,9	105
	Femme	12,0	171
Total		11,2	276
Agegroups	45-49	6,4	60
	50-54	7,2	72
	55-59	15,9	76
	60-64	16,3	68
Total		11,2	276
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	19,9	12
	Enseignement primaire	18,1	32
	Secondaire inférieur	11,1	48
	Secondaire supérieur	11,8	67
	Enseignement supérieur	6,9	109
Total		10,6	268

Indicateur dr08\_3

\* Par rapport aux personnes qui ont pris au moins un médicament au cours des  
 dernières 24 heures

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24  
HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR GROUPE ATC) - HOMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Médicaments en relation avec le système cardiovasculaire (C)	15,5
Médicaments en relation avec le système nerveux (N)	12,7
Médicaments en relation avec le système digestif et le métabolisme (A)	6,9
Médicaments en relation avec système locomoteur (M)	6,6
Médicaments en relation avec le système respiratoire (R)	5,7
Médicaments en relation avec le sang et les organes hématopoïétiques (B)	3,6
Préparations hormonales à usage systémique, excepté hormones sexuelles (H)	1,6
Médicaments dermatologiques (D)	1,1
Médicaments antitumoraux et médicaments en relation avec le système immunitaire (L)	1,0
Médicaments anti-infectieux à usage systémique (J)	,8
Médicaments en relation avec le système urogénital (G)	,5
Autres médicaments (V)	,3
Médicaments en relation avec organes sensitifs (S)	,0
Produits antiparasitaires, insecticides et répulsifs (P)	,0

Indicateur dr08\_4

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24  
HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR GROUPE ATC) - FEMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Médicaments en relation avec le système urogénital (G)	17,0
Médicaments en relation avec le système nerveux (N)	15,4
Médicaments en relation avec le système cardiovasculaire (C)	14,4
Médicaments en relation avec le système digestif et le métabolisme (A)	12,0
Médicaments en relation avec système locomoteur (M)	8,2
Médicaments en relation avec le système respiratoire (R)	6,6
Préparations hormonales à usage systémique, excepté hormones sexuelles (H)	5,6
Médicaments anti-infectieux à usage systémique (J)	3,5
Médicaments en relation avec le sang et les organes hématopoïétiques (B)	2,1
Médicaments en relation avec organes sensitifs (S)	1,4
Produits antiparasitaires, insecticides et répulsifs (P)	,6
Médicaments antitumoraux et médicaments en relation avec le système immunitaire (L)	,5
Médicaments dermatologiques (D)	,3
Autres médicaments (V)	,0

Indicateur dr08\_4

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24 HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR SOUS-GROUPE ATC) - HOMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Bêtabloquants (C07)	5,9
Psycholeptiques (N05)	4,8
Analgésiques (N02)	4,5
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux (M01)	4,2
Hypolipémiants (C10)	4,0
Antiacide, médicaments pour le traitement de l'ulcère peptique et de la flatulence (A02)	3,9
Médicaments actifs dans le système rénine-angiotensine (C09)	3,9
Psychoanaleptiques (N06)	3,7
Anti-aggrégants, anticoagulants et thrombolytiques (B01)	3,3
Antagonistes calciques (C08)	2,9
Médicaments contre la goutte (M04)	2,7
Antihistaminiques à usage systémique (R06)	2,1
Médicaments actifs dans le cadre de l'asthme (R03)	1,7
Médicaments actifs au niveau cardiaque (C01)	1,6
Préparations pour le nez (R01)	1,5
Médicaments dans le cadre du diabète (A10)	1,4
Suppléments minéraux (A12)	1,3
Diurétiques (C03)	1,2
Vasoprotecteurs (C05)	1,1
Antiépileptiques (N03)	1,0

Indicateur dr08\_5



## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24 HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR SOUS-GROUPE ATC) - FEMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Hormones sexuelles et autres médicaments actifs dans le cadre du système reproducteur (G03)	16,5
Psycholeptiques (N05)	9,6
Bêtabloquants (C07)	8,7
Psychoanaleptiques (N06)	7,0
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux (M01)	6,6
Médicaments actifs au niveau thyroïdien (H03)	5,0
Analgésiques (N02)	4,6
Médicaments actifs dans le système rénine-angiotensine (C09)	4,1
Antiacide, médicaments pour le traitement de l'ulcère peptique et de la flatulence (A02)	3,2
Vitamines (A11)	3,1
Médicaments antibactériens à usage systémique (J01)	2,9
Suppléments minéraux (A12)	2,7
Médicaments pour la toux et les refroidissements (R05)	2,7
Antagonistes calciques (C08)	2,3
Médicaments actifs dans le cadre de l'asthme (R03)	2,0
Anti-aggrégants, anticoagulants et thrombolytiques (B01)	1,9
Antispasmodiques, anticholinergiques et propulsifs (A03)	1,5
Autres suppléments alimentaires (A16)	1,4
Médicaments actifs au niveau cardiaque (C01)	1,4
Diurétiques (C03)	1,4
Hypolipémiants (C10)	1,3
Médicaments pour le traitement des maladies osseuses (M05)	1,2
Médicaments dans le cadre du diabète (A10)	1,2
Médicaments à usage ophtalmologique (S01)	1,2
Antihistaminiques à usage systémique (R06)	1,2
Antiépileptiques (N03)	1,1
Vasoprotecteurs (C05)	1,1
Corticostéroïdes à usage systémique (H02)	1,1

Indicateur dr08\_5

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS  
DES 2 DERNIERES SEMAINES DES MEDICAMENTS NON PRESCRITS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	27,3	1404
	Femme	32,1	1563
Total		29,7	2967
GROUPE D'AGE	0-14	17,7	503
	15-24	31,7	266
	25-34	36,9	479
	35-44	36,5	515
	45-54	36,8	368
	55-64	26,7	297
	65-74	27,2	276
	75+	22,4	263
Total		29,7	2967
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	18,6	132
	Enseignement primaire	24,7	399
	Secondaire inférieur	25,1	408
	Secondaire supérieur	28,0	688
	Enseignement supérieur	34,6	1211
Total		29,4	2838
ANNEE	1997	39,4	3020
	2001	29,7	2967
Total 1997 en 2001		34,4	5987

Indicateur dr04\_1

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - GARCONS, 0-14 ANS

Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	6,6	18,2
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	6,5	13,3
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	5,0	6,7

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FILLES, 0-14 ANS

Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	5,3	9,3
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	5,3	5,6
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	5,2	6,9

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 15-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	16,5	18,8
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	9,4	12,1
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	6,5	8,8
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	2,7	4,1
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	2,5	2,1
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	1,6	1,0

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage < 1%

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 15-64 ANS

Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	24,6	28,1
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	8,7	15,4
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	8,2	10,5
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	3,3	3,2
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	2,8	4,2
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	1,9	1,4
Laxatifs	1,9	,5
Médicaments pour l'allergie	1,0	1,8
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	1,1	1,3

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	10,5	12,7
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	6,2	8,3
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	3,4	3,3
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	2,5	4,6
Somnifères	2,3	,6
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	1,6	5,0
Médicaments pour l'allergie	1,2	,8
Médicaments pour les yeux	,3	3,6

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	12,6	8,1
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	6,8	3,2
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	3,9	9,4
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	3,0	5,5
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	2,8	,0
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	2,2	4,6
Laxatifs	2,2	1,4
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	2,0	1,1
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	1,7	2,7
Somnifères	1,3	1,9
Médicaments pour les yeux	,5	2,0
Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale	,0	2,5

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%



## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS  
DES 2 DERNIERES SEMAINES DES MEDICAMENTS\* PRESCRITS  
Enquête de Sante par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	40,5	2432
	Femme	57,2	2552
Total		49,0	4984
GROUPE D'AGE	0-14	21,2	839
	15-24	30,3	565
	25-34	36,2	674
	35-44	42,6	760
	45-54	56,7	714
	55-64	81,5	538
	65-74	79,1	531
	75+	92,2	363
Total		49,0	4984
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	83,0	59
	Enseignement primaire	67,5	662
	Secondaire inférieur	54,5	1034
	Secondaire supérieur	44,7	1490
	Enseignement supérieur	42,9	1544
Total		49,1	4789
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	54,2	984
	Zone semi-urbaine	50,7	1844
	Zone rurale	46,7	2156
Total		49,0	4984
ANNEE	1997*	46,8	3620
	2001	49,0	4984
Total 1997 en 2001		47,9	8604

Indicateur dr01\_1

\* A l'exclusion des moyens contraceptifs

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - GARCONS, 0-14 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	8,8	15,5
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	5,1	5,6
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	3,9	3,7
Médicaments pour l'allergie	3,8	5,3
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	3,1	4,2
Antibiotiques	2,7	9,5
Médicaments pour l'asthme	2,2	3,6
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0

Indicateur dr03\_1

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FILLES, 0-14 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	8,9	12,0
Antibiotiques	4,1	5,6
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	4,1	4,4
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	3,8	2,1
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	3,6	3,6
Médicaments pour l'allergie	3,6	2,4
Médicaments pour l'asthme	2,4	1,8
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	1,6	2,0

Indicateur dr03\_1

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 14-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	14,6	9,1
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	6,7	5,7
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	6,0	6,9
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	6,0	4,3
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	5,7	5,1
Médicaments pour la dépression	5,1	3,5
Somnifères	4,5	4,2
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	4,5	6,3
Antibiotiques	4,3	7,0
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	3,3	2,7
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	2,9	2,8
Médicaments pour l'allergie	2,3	1,8
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0
Médicaments pour l'asthme	1,9	1,2
Médicaments pour le cholestérol	1,4	,
Médicaments pour les yeux	1,0	1,7

Indicateur dr03\_1

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 14-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Contraceptifs	17,6	,
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	12,3	13,6
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	10,0	7,7
Hormones au cours de la ménopause	10,0	7,5
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	8,4	6,2
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	7,9	5,6
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	7,8	6,8
Médicaments pour la dépression	7,7	6,2
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	7,2	7,4
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	7,2	6,9
Somnifères	6,7	5,1
Antibiotiques	5,7	5,9
Médicaments pour l'allergie	5,0	3,5
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	4,4	3,7
Médicaments pour la glande thyroïde	4,3	,
Médicaments pour les yeux	3,0	2,6
Médicaments pour l'asthme	2,9	1,9
Diurétiques	2,3	1,4
Médicaments pour le diabète	2,0	2,0

Indicateur dr03\_1

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	55,7	56,7
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	16,3	11,4
Somnifères	13,6	17,8
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	11,4	9,9
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	10,5	7,6
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	10,3	10,4
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	9,4	4,7
Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale	9,3	10,9
Médicaments pour les yeux	8,5	5,4
Diurétiques	7,6	6,3
Médicaments pour l'asthme	7,0	5,2
Médicaments pour la dépression	6,4	4,7
Antibiotiques	6,0	6,4
Médicaments pour le cholestérol	4,5	,
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	4,5	10,7
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	3,4	5,0
Médicaments pour le diabète	1,9	1,9
Médicament pour la maladie de Parkinson	1,8	,8
Laxatifs	1,2	3,5

Indicateur dr03\_1

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS\* PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	64,7	59,6
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	27,7	32,7
Somnifères	27,7	26,5
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	20,9	15,3
Médicaments pour améliorer la circulation cérébrale	18,6	14,7
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	17,6	14,6
Tranquillisants et autres médicaments pour les nerfs	17,1	14,2
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	17,0	12,8
Diurétiques	13,8	3,0
Médicaments pour la dépression	9,4	11,4
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	9,0	4,8
Hormones au cours de la ménopause	8,8	5,0
Médicaments pour l'asthme	7,9	7,5
Médicaments pour les yeux	7,8	7,8
Laxatifs	7,1	7,4
Antibiotiques	6,5	5,4
Médicaments pour l'allergie	5,7	3,4
Médicaments pour le cholestérol	5,2	,
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	4,0	2,9
Médicaments pour la glande thyroïde	2,8	,
Médicaments pour le diabète	1,9	1,9

Indicateur dr03\_1

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU  
COURS DES DERNIERES 24 HEURES DES MEDICAMENTS  
PRESCRITS (GROUPE D'AGE 45-64 ANS)  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	47,2	614
	Femme	48,9	638
Total		48,1	1252
Agegroups	45-49	36,6	385
	50-54	42,9	329
	55-59	56,3	276
	60-64	63,8	262
Total		48,1	1252
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	75,7	10
	Enseignement primaire	60,2	192
	Secondaire inférieur	57,1	302
	Secondaire supérieur	43,9	349
	Enseignement supérieur	40,4	374
Total		48,1	1227
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	57,9	236
	Zone semi-urbaine	48,9	465
	Zone rurale	45,7	551
Total		48,1	1252

Indicateur dr08\_1



## REGION WALLONNE

NOMBRE DE MEDICAMENTS PRESCRITS CONSOMMES AU COURS DES 24  
DERNIERES HEURES (GROUPE D'AGE 45-64 ANS) \*  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Moyenne	N
SEXE	Homme	3,1	281
	Femme	2,8	337
Total		2,9	618
Agegroups	45-49	2,7	145
	50-54	2,9	151
	55-59	3,1	150
	60-64	3,1	172
Total		2,9	618
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	8,8	3
	Enseignement primaire	2,8	116
	Secondaire inférieur	3,1	169
	Secondaire supérieur	3,1	165
	Enseignement supérieur	2,3	154
Total		2,9	607
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	2,4	125
	Zone semi-urbaine	3,0	226
	Zone rurale	3,0	267
Total		2,9	618

Indicateur dr08\_2

\* Par rapport aux personnes qui ont pris au moins un médicament au cours des dernières 24 heures

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME 5  
MÉDICAMENTS PRESCRITS OU PLUS AU COURS DES DERNIÈRES 24  
HEURES (GROUPE D'ÂGE 45-64 ANS)

Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	23,3	281
	Femme	18,0	337
Total		20,6	618
Agegroups	45-49	14,5	145
	50-54	16,6	151
	55-59	25,5	150
	60-64	25,0	172
Total		20,6	618
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	97,8	3
	Enseignement primaire	19,9	116
	Secondaire inférieur	17,4	169
	Secondaire supérieur	27,3	165
	Enseignement supérieur	11,4	154
Total		20,6	607
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	12,7	125
	Zone semi-urbaine	26,9	226
	Zone rurale	18,0	267
Total		20,6	618

Indicateur dr08\_3

\* Par rapport aux personnes qui ont pris au moins un médicament au cours des dernières 24 heures

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24  
HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR GROUPE ATC) - HOMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Médicaments en relation avec le système cardiovasculaire (C)	30,8
Médicaments en relation avec le système nerveux (N)	15,0
Médicaments en relation avec le système digestif et le métabolisme (A)	14,3
Médicaments en relation avec le sang et les organes hématopoïétiques (B)	10,6
Médicaments en relation avec système locomoteur (M)	7,8
Préparations hormonales à usage systémique, excepté hormones sexuelles (H)	3,4
Médicaments en relation avec le système respiratoire (R)	3,0
Médicaments anti-infectieux à usage systémique (J)	1,9
Médicaments antitumoraux et médicaments en relation avec le système immunitaire (L)	1,0
Produits antiparasitaires, insecticides et répulsifs (P)	,7
Médicaments en relation avec organes sensitifs (S)	,7
Médicaments en relation avec le système urogénital (G)	,7
Médicaments dermatologiques (D)	,5
Autres médicaments (V)	,0

Indicateur dr08\_4

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24  
HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR GROUPE ATC) - FEMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Médicaments en relation avec le système cardiovasculaire (C)	22,0
Médicaments en relation avec le système nerveux (N)	21,5
Médicaments en relation avec le système urogénital (G)	17,5
Médicaments en relation avec le système digestif et le métabolisme (A)	11,3
Préparations hormonales à usage systémique, excepté hormones sexuelles (H)	8,5
Médicaments en relation avec système locomoteur (M)	8,0
Médicaments en relation avec le sang et les organes hématopoïétiques (B)	5,9
Médicaments en relation avec le système respiratoire (R)	4,2
Médicaments antitumoraux et médicaments en relation avec le système immunitaire (L)	1,7
Médicaments en relation avec organes sensitifs (S)	1,2
Médicaments anti-infectieux à usage systémique (J)	,6
Produits antiparasitaires, insecticides et répulsifs (P)	,2
Médicaments dermatologiques (D)	,0
Autres médicaments (V)	,0

Indicateur dr08\_4

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24 HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR SOUS-GROUPE ATC) - HOMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Bêtabloquants (C07)	14,8
Anti-aggrégants, anticoagulants et thrombolytiques (B01)	10,4
Hypolipémiants (C10)	10,3
Psycholeptiques (N05)	9,5
Médicaments actifs dans le système rénine-angiotensine (C09)	9,1
Psychoanaleptiques (N06)	8,5
Antiacide, médicaments pour le traitement de l'ulcère peptique et de la flatulence (A02)	7,2
Antagonistes calciques (C08)	6,6
Médicaments actifs au niveau cardiaque (C01)	5,0
Médicaments dans le cadre du diabète (A10)	4,3
Diurétiques (C03)	4,3
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux (M01)	3,8
Analgésiques (N02)	3,7
Médicaments contre la goutte (M04)	3,7
Médicaments antibactériens à usage systémique (J01)	1,9
Corticostéroïdes à usage systémique (H02)	1,7
Médicaments actifs au niveau thyroïdien (H03)	1,7
Antiépileptiques (N03)	1,5
Antispasmodiques, anticholinergiques et propulsifs (A03)	1,3
Médicaments actifs dans le cadre de la maladie de Parkinson (N04)	1,2
Autres suppléments alimentaires (A16)	1,2
Vasodilatateurs périphériques (C04)	1,2
Suppléments minéraux (A12)	1,2
Vitamines (A11)	1,0

Indicateur dr08\_5

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES DERNIERES 24  
HEURES DES MEDICAMENTS PRESCRITS (PAR SOUS-GROUPE ATC) - FEMMES, 45-64 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	%
Hormones sexuelles et autres médicaments actifs dans le cadre du système reproducteur (G03)	17,5
Psycholeptiques (N05)	14,4
Bêtabloquants (C07)	13,1
Psychoanaleptiques (N06)	9,4
Médicaments actifs au niveau thyroïdien (H03)	7,9
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux (M01)	6,5
Antiacide, médicaments pour le traitement de l'ulcère peptique et de la flatulence (A02)	5,1
Médicaments actifs dans le système rénine-angiotensine (C09)	5,0
Diurétiques (C03)	4,7
Analgésiques (N02)	3,6
Anti-aggrégants, anticoagulants et thrombolytiques (B01)	3,6
Vasoprotecteurs (C05)	3,4
Hypolipémiants (C10)	2,6
Antagonistes calciques (C08)	2,6
Préparations anti-anémiques (B03)	2,3
Médicaments dans le cadre du diabète (A10)	2,2
Médicaments pour la toux et les refroidissements (R05)	2,1
Médicaments actifs au niveau cardiaque (C01)	1,9
Suppléments minéraux (A12)	1,9
Médicaments contre la goutte (M04)	1,9
Antispasmodiques, anticholinergiques et propulsifs (A03)	1,5
Vitamines (A11)	1,5
Antihistaminiques à usage systémique (R06)	1,5
Médicaments actifs au niveau endocrine (L02)	1,3
Médicaments à usage ophtalmologique (S01)	1,2
Antiépileptiques (N03)	1,1

Indicateur dr08\_5

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS  
DES 2 DERNIERES SEMAINES DES MEDICAMENTS NON PRESCRITS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	28,7	2414
	Femme	35,2	2535
Total		32,0	4949
GROUPE D'AGE	0-14	22,0	828
	15-24	35,7	562
	25-34	39,3	668
	35-44	36,0	758
	45-54	41,6	713
	55-64	28,9	537
	65-74	29,2	526
	75+	16,2	357
Total		32,0	4949
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	32,2	58
	Enseignement primaire	25,7	661
	Secondaire inférieur	27,4	1024
	Secondaire supérieur	32,8	1480
	Enseignement supérieur	36,3	1536
Total		32,3	4759
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	30,0	969
	Zone semi-urbaine	39,1	1833
	Zone rurale	26,9	2147
Total		32,0	4949
ANNEE	1997	32,1	3605
	2001	32,0	4949
Total 1997 en 2001		32,0	8554

Indicateur dr04\_1

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - GARCONS, 0-14 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	9,3	6,5
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	7,6	5,7
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	5,5	4,9

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%



## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FILLES, 0-14 ANS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	9,3	8,4
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	8,7	9,5
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	3,7	8,4
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	1,1	,6
Médicaments pour l'allergie	,3	,0

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage < 1%

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 15-64 ANS

Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	16,7	16,0
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	7,8	9,6
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	4,7	2,7
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	3,2	2,1
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	3,2	2,7
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	1,6	1,6

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 15-64 ANS

Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	26,3	21,8
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	10,2	10,2
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	6,7	6,4
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	3,2	4,8
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	2,8	2,9
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	1,5	1,5
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	1,2	1,4
Médicaments pour l'allergie	,7	1,5

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - HOMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	7,1	10,0
Médicaments pour l'allergie	6,6	,2
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	5,8	17,2
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	5,7	1,9
Médicaments pour le traitement local des problèmes de la peau	3,3	,6
Médicaments pour l'asthme	3,3	,2
Médicaments pour l'estomac, les intestins, le système digestif en général	2,7	3,2
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	2,4	3,1
Somnifères	1,8	,0
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	1,8	7,0

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage &lt; 1%

## REGION WALLONNE

POURCENTAGE (%) DE LA POPULATION QUI A CONSOMME AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES DES  
MÉDICAMENTS NON PRESCRITS (PAR CATEGORIE) - FEMMES, 65 ANS ET PLUS  
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

	2001	1997
	%	%
Antidouleurs et médicaments contre la fièvre autre que mentionnés dans (*)	16,6	11,2
Médicaments ou pommades contre les rhumatismes, les douleurs articulaires, etc. (*)	3,6	4,9
Médicaments contre la toux, les refroidissements, la grippe, les maux de gorges, etc. (*)	3,3	6,9
Médicaments pour le coeur, la circulation, la tension artérielle	2,0	1,2
Laxatifs	1,4	,8
Fortifiants: vitamines, minéraux, toniques	1,3	2,7

Indicateur dr06\_1

Catégorie pas mentionnée si pourcentage < 1%