

## 9.4. Consommation des Soins

### 9.4.4. Consommation de médicaments

#### 9.4.4.1. Résumé

La consommation de médicaments est une composante importante de la consommation médicale et des dépenses de santé. L'Enquête de santé fournit une information intégrée sur tous les médicaments consommés – remboursés ou non, prescrits ou non -, en fonction d'un grand nombre de variables telles que l'état de santé, le style de vie, le niveau socio-économique, etc.... Le désavantage le plus important de la méthode choisie dans l'enquête de santé pour récolter l'information touche à la validité de l'information rapportée quant à la nature des médicaments consommés. Les personnes ne sont pas toujours informés du type précis des médicament qu'ils prennent et de la véritable raison de leur prescription.

63% de la population en Wallonie déclare avoir consommé un ou des médicaments au cours des 2 semaines précédentes. Pour les médicaments prescrits, le pourcentage est de 48% et pour les médicaments non prescrits, 32%. Les analgésiques représentent la classe de médicaments la plus consommée : 28% de la population en Wallonie déclare en avoir pris au cours des 2 semaines précédentes, parmi lesquels 70% ont consommé un analgésique non prescrit. La consommation de médicaments pour les systèmes respiratoire et cardio-vasculaire s'élève respectivement à 18% et 17% au cours des 2 semaines précédentes. En Wallonie, 12% de la population a consommé un médicament pour le système nerveux au cours des 2 semaines précédentes : 6% de la population a pris un somnifère. La consommation est en moyenne de 2 sortes de médicaments au cours des 2 semaines précédentes.

Les femmes prennent plus de médicaments que les hommes. Cela est vrai pour la plupart des catégories de médicaments, qu'ils soient prescrits ou non.

La consommation de médicaments prescrits augmente avec l'âge : en Wallonie, 30% des moins de quinze ans ont consommé un médicament prescrit au cours des 2 semaines précédentes. Cette proportion monte à plus de 80% à partir de 65 ans. La consommation de médicaments non prescrits ne varie pas en fonction de l'âge.

La consommation de médicaments prescrits ne varie pas en fonction l'instruction ou du revenu équivalent. Au contraire, celle de médicaments non prescrits est supérieure dans les groupes de revenu équivalent plus élevé. Les personnes ayant un niveau d'instruction inférieur consomment plus d'analgésiques que celles dont le niveau d'instruction est plus élevé. La consommation de médicaments en rapport avec le système nerveux est plus élevée dans les groupes d'instruction et de revenu équivalent inférieures.

Les maladies cardio-vasculaires et le diabète sont fortement associées à une consommation de médicaments plus élevée. Pour les maladies pulmonaires chroniques et celles de l'appareil locomoteur, cette association n'apparaît pas. La présence de 2 maladies chroniques ou plus est un déterminant important de la consommation de médicaments.