

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP01_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	MEDECIN ATTITRE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	91,9	8,1	4973
Femme	94,0	6,0	5212
Total	93,0	7,0	10185
GROUPES AGE			
0-14	91,4	8,6	1653
15-24	92,1	7,9	1141
25-34	91,1	8,9	1641
35-44	91,5	8,5	1609
45-54	94,7	5,3	1289
55-64	96,2	3,8	1092
65-74	95,8	4,2	1077
75 +	97,1	2,9	683
Total	93,0	7,0	10185
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	93,6	6,4	353
Ecole primaire	95,0	5,0	1292
Secondaire inférieur	92,7	7,3	1663
Secondaire supérieur	95,4	4,6	2949
Supérieur	90,7	9,3	3504
Total	93,1	6,9	9761
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	86,5	13,5	791
20.000-30.000	90,2	9,8	2035
30.000-40.000	96,0	4,0	2368
40.000-60.000	94,2	5,8	3242
>60.000	91,4	8,6	1284
Total	92,9	7,1	9720
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	92,9	7,1	5902
Très mauvaise à moyenne	95,4	4,6	2019
Total	93,4	6,6	7921
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	93,9	6,1	3708
Dans le passé	95,1	4,9	1918
Modéré (<20)	91,0	9,0	1571
Gros fumeur	90,7	9,3	837
Total	93,2	6,8	8034
REGION DE RESIDENCE			
Région flamande	95,4	4,6	3523
Région bruxelloise	77,6	22,4	3036
Région wallonne	93,7	6,3	3626
Belgique	93,0	7,0	10185

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP01_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	MEDECIN ATTITRE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	94,6	5,4	1751
Femme	96,2	3,8	1772
Total	95,4	4,6	3523
GROUPES AGE			
0-14	94,9	5,1	547
15-24	95,7	4,3	428
25-34	94,3	5,7	590
35-44	93,6	6,4	531
45-54	96,1	3,9	465
55-64	98,2	1,8	405
65-74	95,8	4,2	363
75 +	98,4	1,6	194
Total	95,4	4,6	3523
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	100,0	,0	65
Ecole primaire	96,8	3,2	424
Secondaire inférieur	96,7	3,3	605
Secondaire supérieur	97,4	2,6	1172
Supérieur	92,5	7,5	1135
Total	95,6	4,4	3401
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	93,1	6,9	119
20.000-30.000	94,3	5,7	603
30.000-40.000	97,8	2,2	855
40.000-60.000	95,4	4,6	1291
>60.000	93,6	6,4	460
Total	95,4	4,6	3328
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	95,0	5,0	2273
Très mauvaise à moyenne	96,9	3,1	565
Total	95,4	4,6	2838
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	95,5	4,5	1370
Dans le passé	96,7	3,3	700
Modéré (<20)	94,5	5,5	561
Gros fumeur	92,1	7,9	241
Total	95,3	4,7	2872

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP01_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	MEDECIN ATTITRE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	73,3	26,7	1470
Femme	81,6	18,4	1566
Total	77,6	22,4	3036
GROUPES AGE			
0-14	73,6	26,4	479
15-24	69,7	30,3	310
25-34	71,6	28,4	498
35-44	74,8	25,2	488
45-54	83,7	16,3	383
55-64	84,5	15,5	313
65-74	87,9	12,1	325
75 +	90,3	9,7	240
Total	77,6	22,4	3036
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	75,6	24,4	168
Ecole primaire	80,4	19,6	371
Secondaire inférieur	77,5	22,5	426
Secondaire supérieur	80,2	19,8	708
Supérieur	75,2	24,8	1197
Total	77,5	22,5	2870
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	70,5	29,5	370
20.000-30.000	72,0	28,0	626
30.000-40.000	85,5	14,5	608
40.000-60.000	80,4	19,6	787
>60.000	78,8	21,2	495
Total	77,7	22,3	2886
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	77,3	22,7	1676
Très mauvaise à moyenne	83,0	17,0	622
Total	78,8	21,2	2298
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	78,7	21,3	1013
Dans le passé	83,4	16,6	560
Modéré (<20)	71,9	28,1	459
Gros fumeur	77,4	22,6	279
Total	78,1	21,9	2311

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP01_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	MEDECIN ATTITRE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	92,9	7,1	1752
Femme	94,4	5,6	1874
Total	93,7	6,3	3626
GROUPES AGE			
0-14	90,6	9,4	627
15-24	93,0	7,0	403
25-34	92,1	7,9	553
35-44	92,7	7,3	590
45-54	95,3	4,7	441
55-64	96,4	3,6	374
65-74	98,3	1,7	389
75 +	98,8	1,2	249
Total	93,7	6,3	3626
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	100,0	,0	120
Ecole primaire	97,3	2,7	497
Secondaire inférieur	89,4	10,6	632
Secondaire supérieur	95,2	4,8	1069
Supérieur	92,9	7,1	1172
Total	93,7	6,3	3490
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	90,8	9,2	302
20.000-30.000	90,6	9,4	806
30.000-40.000	95,7	4,3	905
40.000-60.000	95,0	5,0	1164
>60.000	92,4	7,6	329
Total	93,6	6,4	3506
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	93,4	6,6	1953
Très mauvaise à moyenne	97,4	2,6	832
Total	94,5	5,5	2785
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	95,5	4,5	1325
Dans le passé	95,2	4,8	658
Modéré (<20)	91,2	8,8	551
Gros fumeur	92,7	7,3	317
Total	94,2	5,8	2851

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP02_1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIER CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	74,4	23,9	1,7	4724
Femme	82,7	16,1	1,3	5000
Total	78,6	20,0	1,5	9724
GROUPES AGE				
0-14	78,4	15,5	6,0	1564
15-24	76,6	22,5	,8	1062
25-34	74,7	24,8	,5	1563
35-44	75,2	24,2	,6	1521
45-54	77,3	22,0	,7	1231
55-64	82,4	17,2	,4	1060
65-74	88,5	10,5	,9	1051
75 +	92,4	7,5	,2	672
Total	78,6	20,0	1,5	9724
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	79,4	19,0	1,6	335
Ecole primaire	84,7	14,8	,5	1223
Secondaire inférieur	80,8	17,9	1,3	1583
Secondaire supérieur	78,4	20,2	1,3	2826
Supérieur	75,8	22,1	2,1	3347
Total	78,6	19,9	1,5	9314
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	74,3	24,0	1,7	735
20.000-30.000	80,7	17,5	1,8	1945
30.000-40.000	80,1	18,5	1,4	2295
40.000-60.000	79,0	19,4	1,6	3083
>60.000	74,7	24,2	1,1	1241
Total	78,8	19,7	1,5	9299
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	74,4	24,9	,7	5606
Très mauvaise à moyenne	91,8	7,8	,4	1981
Total	78,3	21,1	,6	7587
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	79,1	20,2	,6	3543
Dans le passé	79,5	20,0	,5	1861
Modéré (<20)	75,8	23,6	,6	1496
Gros fumeur	77,0	22,4	,6	797
Total	78,3	21,1	,6	7697
REGION DE RESIDENCE				
Région flamande	79,7	19,3	1,0	3361
Région bruxelloise	71,8	23,9	4,3	2907
Région wallonne	78,7	19,8	1,4	3456
Belgique	78,6	20,0	1,5	9724

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP02_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIER CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	76,1	22,8	1,1	1661
Femme	83,4	15,8	,9	1700
Total	79,7	19,3	1,0	3361
GROUPES AGE				
0-14	80,9	14,6	4,5	514
15-24	79,8	19,6	,6	395
25-34	78,4	21,6	,0	558
35-44	75,8	24,0	,2	502
45-54	77,7	21,7	,6	447
55-64	82,9	17,1	,0	396
65-74	84,6	14,2	1,1	358
75 +	89,1	10,6	,3	191
Total	79,7	19,3	1,0	3361
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	78,9	21,1	,0	62
Ecole primaire	86,2	13,5	,4	407
Secondaire inférieur	81,2	18,2	,6	585
Secondaire supérieur	80,5	18,6	,9	1124
Supérieur	76,6	21,7	1,7	1065
Total	79,9	19,1	1,0	3243
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	71,7	28,3	,0	114
20.000-30.000	85,9	13,6	,6	570
30.000-40.000	82,6	16,7	,8	832
40.000-60.000	78,8	19,4	1,7	1229
>60.000	75,4	24,1	,5	443
Total	80,2	18,7	1,0	3188
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	75,9	23,6	,4	2156
Très mauvaise à moyenne	93,7	6,3	,0	562
Total	79,3	20,4	,4	2718
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	79,7	20,1	,2	1305
Dans le passé	80,6	19,1	,2	679
Modéré (<20)	77,8	21,7	,4	534
Gros fumeur	77,5	21,4	1,1	232
Total	79,3	20,3	,3	2750

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP02_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIER CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	65,4	29,2	5,4	1403
Femme	77,7	19,0	3,3	1504
Total	71,8	23,9	4,3	2907
GROUPES AGE				
0-14	65,1	16,8	18,1	450
15-24	67,9	27,8	4,3	300
25-34	65,1	32,8	2,1	477
35-44	66,4	32,1	1,5	464
45-54	74,4	24,2	1,4	370
55-64	73,9	24,2	2,0	302
65-74	89,7	8,4	1,9	310
75 +	93,6	6,2	,1	234
Total	71,8	23,9	4,3	2907
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	80,0	15,1	4,8	163
Ecole primaire	77,5	20,6	2,0	345
Secondaire inférieur	75,1	21,6	3,3	402
Secondaire supérieur	71,2	24,6	4,2	679
Supérieur	67,0	27,5	5,5	1157
Total	71,5	24,1	4,4	2746
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	71,3	24,3	4,4	342
20.000-30.000	71,1	22,9	6,0	604
30.000-40.000	76,1	21,5	2,4	585
40.000-60.000	69,4	26,8	3,8	757
>60.000	69,9	25,2	4,9	480
Total	71,5	24,2	4,3	2768
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	67,2	30,7	2,1	1610
Très mauvaise à moyenne	85,1	13,3	1,7	604
Total	71,8	26,2	2,0	2214
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	73,8	24,0	2,2	976
Dans le passé	71,9	27,0	1,2	543
Modéré (<20)	68,3	28,6	3,1	441
Gros fumeur	71,9	27,2	,8	264
Total	72,0	26,0	2,0	2224

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP02_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIER CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	74,3	24,1	1,6	1660
Femme	83,2	15,6	1,2	1796
Total	78,7	19,8	1,4	3456
GROUPES AGE				
0-14	78,1	16,7	5,2	600
15-24	74,1	25,8	,1	367
25-34	71,1	28,2	,8	528
35-44	76,6	22,4	1,0	555
45-54	77,4	21,9	,7	414
55-64	84,5	14,9	,5	362
65-74	94,0	5,7	,3	383
75 +	96,3	3,6	,1	247
Total	78,7	19,8	1,4	3456
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	79,6	19,6	,8	110
Ecole primaire	84,8	15,2	,0	471
Secondaire inférieur	81,5	16,4	2,1	596
Secondaire supérieur	76,2	22,3	1,5	1023
Supérieur	77,6	20,8	1,5	1125
Total	78,7	19,9	1,4	3325
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	77,9	20,8	1,3	279
20.000-30.000	76,9	21,1	2,0	771
30.000-40.000	77,4	20,6	2,0	878
40.000-60.000	81,5	17,7	,9	1097
>60.000	75,9	23,7	,4	318
Total	78,6	20,0	1,4	3343
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	73,7	25,7	,6	1840
Très mauvaise à moyenne	91,4	8,0	,6	815
Total	78,6	20,8	,6	2655
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	79,8	19,3	,8	1262
Dans le passé	79,5	19,6	,9	639
Modéré (<20)	74,6	25,3	,1	521
Gros fumeur	77,7	22,3	,0	301
Total	78,5	20,9	,6	2723

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GPCOUNT1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE GENERALISTE PAR AN PAR PERSONNE	N
SEXE		
Homme	4,8	4724
Femme	7,0	5000
Total	5,9	9724
GROUPES AGE		
0-14	4,6	1564
15-24	4,4	1062
25-34	3,9	1563
35-44	5,0	1521
45-54	5,8	1231
55-64	8,1	1060
65-74	9,9	1051
75 +	15,1	672
Total	5,9	9724
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	7,9	335
Ecole primaire	8,6	1223
Secondaire inférieur	6,9	1583
Secondaire supérieur	5,0	2826
Supérieur	5,3	3347
Total	5,9	9314
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	5,3	735
20.000-30.000	6,1	1945
30.000-40.000	6,2	2295
40.000-60.000	6,0	3083
>60.000	5,0	1241
Total	5,9	9299
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	4,3	5606
Très mauvaise à moyenne	12,0	1981
Total	6,1	7587
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	6,3	3543
Dans le passé	6,4	1861
Modéré (<20)	4,7	1496
Gros fumeur	6,2	797
Total	6,0	7697
REGION DE RESIDENCE		
Région flamande	6,0	3361
Région bruxelloise	4,2	2907
Région wallonne	6,1	3456
Belgique	5,9	9724

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GPCOUNT1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE GENERALISTE PAR AN PAR PERSONNE	N
SEXE		
Homme	5,0	1661
Femme	7,1	1700
Total	6,0	3361
GROUPES AGE		
0-14	5,2	514
15-24	4,3	395
25-34	4,4	558
35-44	4,8	502
45-54	5,8	447
55-64	9,0	396
65-74	9,4	358
75 +	15,5	191
Total	6,0	3361
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	6,1	62
Ecole primaire	9,3	407
Secondaire inférieur	7,6	585
Secondaire supérieur	4,8	1124
Supérieur	5,7	1065
Total	6,1	3243
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	6,4	114
20.000-30.000	6,7	570
30.000-40.000	6,4	832
40.000-60.000	5,9	1229
>60.000	5,2	443
Total	6,1	3188
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	4,4	2156
Très mauvaise à moyenne	13,3	562
Total	6,1	2718
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	6,6	1305
Dans le passé	6,5	679
Modéré (<20)	4,1	534
Gros fumeur	6,3	232
Total	6,0	2750

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GPCOUNT1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE GENERALISTE PAR AN PAR PERSONNE	N
SEXE		
Homme	3,4	1403
Femme	4,9	1504
Total	4,2	2907
GROUPES AGE		
0-14	2,7	450
15-24	3,7	300
25-34	2,5	477
35-44	3,8	464
45-54	4,8	370
55-64	4,5	302
65-74	6,7	310
75 +	9,1	234
Total	4,2	2907
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	5,5	163
Ecole primaire	4,3	345
Secondaire inférieur	5,5	402
Secondaire supérieur	3,9	679
Supérieur	3,6	1157
Total	4,2	2746
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	4,1	342
20.000-30.000	4,8	604
30.000-40.000	4,2	585
40.000-60.000	3,7	757
>60.000	4,1	480
Total	4,2	2768
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	3,0	1610
Très mauvaise à moyenne	7,9	604
Total	4,3	2214
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	3,8	976
Dans le passé	5,2	543
Modéré (<20)	4,3	441
Gros fumeur	3,3	264
Total	4,2	2224

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GPCOUNT1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE GENERALISTE PAR AN PAR PERSONNE	N
SEXE		
Homme	4,8	1660
Femme	7,5	1796
Total	6,1	3456
GROUPES AGE		
0-14	4,2	600
15-24	4,6	367
25-34	3,6	528
35-44	5,6	555
45-54	6,2	414
55-64	7,3	362
65-74	11,5	383
75 +	17,5	247
Total	6,1	3456
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	11,4	110
Ecole primaire	9,1	471
Secondaire inférieur	6,2	596
Secondaire supérieur	5,7	1023
Supérieur	5,3	1125
Total	6,2	3325
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	5,3	279
20.000-30.000	5,5	771
30.000-40.000	6,5	878
40.000-60.000	6,8	1097
>60.000	5,3	318
Total	6,2	3343
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	4,6	1840
Très mauvaise à moyenne	11,6	815
Total	6,5	2655
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	6,6	1262
Dans le passé	6,5	639
Modéré (<20)	5,9	521
Gros fumeur	7,1	301
Total	6,5	2723

CONSUMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP06)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	RAISON DU CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE						Total
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	54,0	19,7	21,0	3,4	,9	1,0	2912
Femme	47,3	22,5	25,6	2,9	,6	1,1	4009
Total	50,1	21,3	23,7	3,1	,7	1,1	6921
GROUPES AGE							
0-14	82,3	8,3	7,0	,7	,0	1,6	761
15-24	67,4	10,7	14,8	4,7	,5	1,9	513
25-34	65,2	12,1	18,1	2,2	1,2	1,1	756
35-44	53,6	19,3	22,5	3,1	1,0	,4	834
45-54	49,1	17,1	28,2	3,1	1,8	,8	873
55-64	35,2	27,1	30,9	6,1	,1	,6	908
65-74	27,5	35,3	33,0	2,9	,4	1,0	1245
75 +	20,3	42,8	33,0	2,2	,1	1,5	1031
Total	50,1	21,3	23,7	3,1	,7	1,1	6921
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	51,2	16,4	29,1	2,5	,4	,5	324
Ecole primaire	34,3	22,2	37,9	4,4	,1	1,0	1301
Secondaire inférieur	48,9	24,5	22,5	2,3	,6	1,2	1420
Secondaire supérieur	51,3	24,0	20,0	2,8	,9	1,1	1853
Supérieur	58,2	15,8	20,3	3,6	1,0	1,1	1776
Total	50,2	21,1	23,7	3,1	,7	1,1	6674
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	44,7	25,9	24,0	2,5	,9	2,0	467
20.000-30.000	45,1	22,6	26,4	4,1	,4	1,5	1575
30.000-40.000	44,8	25,5	25,3	2,5	,8	1,1	1815
40.000-60.000	55,9	17,4	22,9	2,7	,6	,5	2032
>60.000	56,5	19,0	17,9	3,9	1,6	1,1	741
Total	50,0	21,3	23,8	3,1	,7	1,0	6630
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	52,0	21,2	20,6	3,9	1,0	1,3	2944
Très mauvaise à moyenne	38,5	24,5	32,7	3,0	,5	,8	2711
Total	46,2	22,6	25,9	3,5	,8	1,1	5655
CONSUMMATION DE TABAC							
Jamais	48,2	21,0	26,5	2,7	,5	1,1	2616
Dans le passé	38,4	25,6	28,2	5,9	1,0	,8	1582
Modéré (<20)	52,4	19,3	23,0	3,5	1,1	,8	966
Gros fumeur	45,2	27,4	22,6	1,6	1,5	1,7	565
Total	46,0	22,7	25,9	3,5	,8	1,0	5729
REGION DE RESIDENCE							
Région flamande	53,4	21,1	20,7	3,5	,5	,8	2488
Région bruxelloise	45,6	24,0	25,6	2,7	,9	1,3	1707
Région wallonne	45,5	21,0	28,3	2,6	1,1	1,4	2726
Belgique	50,1	21,3	23,7	3,1	,7	1,1	6921

(*) N = Nombre total de contacts mentionnés

1 Plainte ou maladie

2 Examen diagnostique ou préventif

3 Traitement ou prescription

4 Résultat d'un examen

5 Raison administrative

6 Référé ou pour une autre raison

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP06)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	RAISON DU CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE						Total
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	58,7	18,7	17,0	4,1	,5	1,0	1028
Femme	49,7	22,8	23,2	3,1	,4	,7	1460
Total	53,4	21,1	20,7	3,5	,5	,8	2488
GROUPES AGE							
0-14	86,8	4,9	6,2	1,2	,0	1,0	272
15-24	66,7	8,4	16,0	6,6	,2	2,1	218
25-34	67,3	8,4	20,7	2,8	,5	,3	319
35-44	55,5	24,4	16,6	2,8	,7	,0	256
45-54	52,4	16,1	26,5	2,6	1,6	,8	323
55-64	35,8	27,7	28,9	7,3	,0	,3	364
65-74	27,0	43,9	25,8	2,2	,0	1,1	434
75 +	27,2	46,6	21,3	3,0	,0	2,0	302
Total	53,4	21,1	20,7	3,5	,5	,8	2488
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	48,8	20,4	27,9	2,4	,0	,5	58
Ecole primaire	36,6	24,2	33,4	4,8	,0	1,0	487
Secondaire inférieur	52,8	23,3	19,5	2,1	,4	1,9	537
Secondaire supérieur	54,9	24,3	16,8	3,2	,2	,7	706
Supérieur	62,1	13,3	18,6	4,6	1,2	,2	634
Total	53,6	20,8	20,6	3,6	,5	,8	2422
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	35,6	39,9	23,3	1,3	,0	,0	102
20.000-30.000	45,2	26,3	21,9	4,8	,0	1,8	539
30.000-40.000	47,5	25,4	22,6	2,8	,5	1,2	667
40.000-60.000	62,0	14,1	20,2	3,2	,3	,2	770
>60.000	62,1	17,2	14,9	3,7	1,8	,3	300
Total	53,5	21,1	20,6	3,5	,5	,8	2378
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	55,5	18,5	19,8	4,7	,4	1,0	1217
Très mauvaise à moyenne	40,9	28,7	26,9	2,5	,3	,7	867
Total	49,6	22,6	22,7	3,8	,4	,8	2084
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	52,9	21,3	22,3	2,7	,3	,6	1019
Dans le passé	41,6	24,7	25,0	7,6	,7	,5	574
Modéré (<20)	52,1	17,4	24,8	3,5	,9	1,2	342
Gros fumeur	50,1	28,7	17,3	1,2	,8	1,9	170
Total	49,6	22,4	22,7	3,8	,5	,8	2105

(*) N = Nombre total de contacts mentionnés

1 Plainte ou maladie

4 Résultat d'un examen

2 Examen diagnostic ou préventif

5 Raison administrative

3 Traitement ou prescription

6 Référé ou pour une autre raison

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP06)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	RAISON DU CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE						Total
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	45,4	24,4	24,7	3,5	1,1	,9	720
Femme	45,6	23,7	26,1	2,2	,7	1,6	987
Total	45,6	24,0	25,6	2,7	,9	1,3	1707
GROUPES AGE							
0-14	75,4	15,1	7,1	,0	,0	2,5	154
15-24	60,7	13,8	24,6	,0	,9	,0	111
25-34	67,2	17,3	10,9	1,2	2,5	,9	169
35-44	59,4	11,8	21,1	3,9	,4	3,3	213
45-54	44,9	24,1	23,0	6,5	1,5	,0	252
55-64	30,2	24,2	41,1	4,0	,4	,2	217
65-74	26,2	26,9	40,6	4,3	1,1	,9	280
75 +	20,2	47,2	29,7	,0	,1	2,7	311
Total	45,6	24,0	25,6	2,7	,9	1,3	1707
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	50,8	16,5	28,3	2,7	1,7	,0	131
Ecole primaire	38,3	32,6	24,0	3,2	,2	1,8	259
Secondaire inférieur	38,0	25,7	33,7	1,5	,9	,2	320
Secondaire supérieur	38,0	27,0	30,7	2,2	,6	1,6	397
Supérieur	58,0	18,5	17,0	3,5	,8	2,2	496
Total	45,5	23,8	25,9	2,7	,8	1,4	1603
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	65,0	15,5	15,8	2,7	1,0	,0	163
20.000-30.000	38,2	22,6	35,0	2,4	,6	1,2	406
30.000-40.000	43,2	28,2	23,2	3,3	1,0	1,1	398
40.000-60.000	51,8	18,8	26,6	1,2	,2	1,5	415
>60.000	42,1	30,7	19,0	4,2	1,5	2,4	236
Total	45,9	23,5	25,8	2,7	,8	1,3	1618
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	50,3	21,6	23,3	2,3	,8	1,7	693
Très mauvaise à moyenne	31,4	27,7	34,7	4,4	1,1	,7	677
Total	41,6	24,4	28,5	3,3	,9	1,3	1370
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	39,6	25,3	31,4	1,5	,7	1,6	572
Dans le passé	33,1	28,5	32,9	3,8	,6	1,0	400
Modéré (<20)	47,2	27,8	17,7	5,9	1,2	,2	251
Gros fumeur	52,8	13,1	28,6	2,7	1,7	1,0	156
Total	40,9	25,2	28,9	3,0	,9	1,1	1379

(*) N = Nombre total de contacts mentionnés

1 Plainte ou maladie

4 Résultat d'un examen

2 Examen diagnostic ou préventif

5 Raison administrative

3 Traitement ou prescription

6 Référé ou pour une autre raison

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP06)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	RAISON DU CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE						Total N (*)
	1	2	3	4	5	6	
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	48,0	20,2	26,8	2,2	1,6	1,2	1164
Femme	43,8	21,5	29,4	2,8	,8	1,6	1562
Total	45,5	21,0	28,3	2,6	1,1	1,4	2726
GROUPES AGE							
0-14	76,7	12,4	8,2	,2	,1	2,5	335
15-24	70,8	14,7	9,2	2,2	1,0	2,1	184
25-34	59,7	19,5	14,0	1,0	2,6	3,1	268
35-44	49,6	12,8	31,8	3,5	1,7	,6	365
45-54	43,4	17,0	33,1	3,1	2,3	1,1	298
55-64	35,1	26,6	32,3	4,3	,4	1,3	327
65-74	28,4	26,2	40,4	3,4	,8	,9	531
75 +	13,6	37,8	45,5	2,1	,2	,7	418
Total	45,5	21,0	28,3	2,6	1,1	1,4	2726
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	53,1	13,6	30,3	2,4	,0	,6	135
Ecole primaire	29,9	17,3	47,5	4,1	,3	,9	555
Secondaire inférieur	44,1	26,4	25,7	2,8	,8	,3	563
Secondaire supérieur	47,5	22,7	23,7	2,1	2,3	1,7	750
Supérieur	52,0	19,1	23,8	1,9	,8	2,3	646
Total	45,6	21,1	28,4	2,5	1,1	1,4	2649
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	45,9	16,9	27,4	3,6	1,8	4,4	202
20.000-30.000	47,2	15,8	31,6	3,4	,9	,9	630
30.000-40.000	41,0	25,3	29,7	1,8	1,3	1,0	750
40.000-60.000	46,7	22,6	26,6	2,1	1,1	,8	847
>60.000	46,9	18,0	26,6	4,4	1,0	3,2	205
Total	45,2	21,1	28,6	2,6	1,2	1,3	2634
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	45,5	26,6	21,6	2,5	2,0	1,8	1034
Très mauvaise à moyenne	36,7	17,6	40,6	3,5	,6	1,0	1167
Total	41,2	22,2	30,8	3,0	1,3	1,4	2201
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	41,6	19,6	33,0	3,1	,8	1,8	1025
Dans le passé	34,2	26,6	32,5	3,6	1,7	1,4	608
Modéré (<20)	54,3	20,1	21,4	2,8	1,4	,1	373
Gros fumeur	36,0	28,2	29,8	2,1	2,5	1,4	239
Total	41,0	22,6	30,6	3,1	1,3	1,4	2245

(*) N = Nombre total de contacts mentionnés

1 Plainte ou maladie

2 Examen diagnostic ou préventif

3 Traitement ou prescription

4 Résultat d'un examen

5 Raison administrative

6 Référé ou pour une autre raison

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP07R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

Total	PLAINTE/MALADIE/INVESTIGATION PRINCIPALE POUR LAQUELLE						
	Respiratoire	Cardio-vasculaire	Locomotion	Digestif	Genitourinaire	Endocrine/metabole	Dermatologie
N (**)	%	%	%	%	%	%	%
SEXE							
Homme	33,0	15,6	17,4	6,1	2,6	4,7	5,3
2513							
Femme	27,0	17,9	14,4	7,6	8,6	5,6	3,4
3406							
Total	29,5	16,9	15,7	7,0	6,1	5,2	4,2
5919							
GROUPE AGE							
0-14	61,2	,8	2,4	7,5	3,2	,5	7,2
710							
15-24	31,1	1,6	15,1	11,7	11,5	1,2	8,0
492							
25-34	32,3	3,3	19,3	9,0	14,0	2,3	4,2
703							
35-44	28,5	12,5	16,0	6,1	3,6	5,7	4,0
776							
45-54	22,2	15,6	22,4	8,6	6,7	8,3	2,5
775							
55-64	19,1	27,3	23,2	3,9	3,3	8,8	2,4
757							
65-74	21,0	38,5	14,2	4,6	3,2	7,2	3,1
1000							
75 +	15,5	50,8	7,5	2,7	1,1	8,2	1,8
706							
Total	29,5	16,9	15,7	7,0	6,1	5,2	4,2
5919							
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	20,5	25,8	20,5	9,5	5,6	4,0	1,3
294							
Ecole primaire	21,0	23,3	15,4	4,9	6,7	6,8	2,6
1049							
Secondaire inférieur	23,5	21,9	19,0	6,3	3,9	5,3	4,7
1197							
Secondaire supérieur	32,5	15,4	14,0	7,1	6,9	6,0	4,0
1601							
Supérieur	35,4	11,2	15,3	7,6	6,0	3,4	5,3
1556							
Total	29,3	17,1	15,9	6,8	5,9	5,1	4,2
5697							
REVENU EQUIVALENT (FB)							

< 20.000 414	22,5	23,6	16,4	9,3	1,9	7,7	5,3
20.000-30.000 1336	23,8	19,0	15,2	8,3	7,9	5,3	3,4
30.000-40.000 1549	26,3	21,0	14,5	6,3	5,7	7,2	3,9
40.000-60.000 1749	35,9	13,0	16,9	6,1	4,7	4,0	4,8
>60.000 644	32,4	12,7	15,5	7,6	9,7	3,8	4,0
Total 5692	29,6	17,0	15,7	7,0	6,1	5,3	4,2
SANTÉ SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne 2556	28,6	14,4	16,9	7,4	9,2	5,1	5,0
Très mauvaise à moyenne 2242	20,0	26,2	18,7	6,0	3,4	6,3	2,6
Total 4798	25,0	19,4	17,6	6,8	6,7	5,6	4,0
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais 2210	23,4	19,8	18,3	6,8	6,4	5,6	3,2
Dans le passé 1323	25,9	23,4	14,4	7,2	8,4	6,7	2,7
Modéré (<20) 836	33,5	12,7	18,4	8,4	5,8	4,1	5,4
Gros fumeur 494	18,5	16,5	20,7	3,7	5,6	7,4	6,4
Total 4863	25,0	19,2	17,6	6,8	6,7	5,9	3,8
RÉGION DE RESIDENCE							
Région flamande 2276	27,3	17,4	17,6	6,8	7,4	4,9	4,5
Région bruxelloise 1438	31,5	19,3	10,6	8,0	4,5	7,4	2,2
Région wallonne 2205	33,2	15,3	13,3	7,1	3,9	5,2	4,0
Belgique 5919	29,5	16,9	15,7	7,0	6,1	5,2	4,2

(*) Examen physique général ne pas inclus

(**) N = Nombre total de contacts mentionnés

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP07R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

Total	PLAINTES/MALADIES/INVESTIGATIONS PRINCIPALES POUR LAQUELLES						
	Respiratoire	Cardio-vasculaire	Locomotion	Digestif	Genitourinaire	Endocrine/metabole	Dermatologique
N (**)	%	%	%	%	%	%	%
SEXE							
Homme 946	29,8	17,7	19,5	5,9	2,2	4,7	5,4
Femme 1330	25,5	17,3	16,2	7,4	11,2	5,1	3,9
Total 2276	27,3	17,4	17,6	6,8	7,4	4,9	4,5
GROUPE AGE							
0-14 254	63,4	,8	2,5	7,2	3,0	,6	7,0
15-24 216	21,8	,6	19,3	12,0	14,5	,3	9,4
25-34 303	29,7	2,8	23,6	9,0	16,9	1,5	4,3
35-44 241	26,7	13,9	12,4	6,7	4,9	8,7	4,9
45-54 295	22,3	12,6	26,8	8,0	8,9	7,0	1,9
55-64 331	18,0	30,3	23,5	3,8	3,5	9,8	2,7
65-74 385	22,2	46,6	15,4	2,2	1,1	2,8	3,8
75 + 251	6,6	54,6	5,7	2,5	1,4	10,1	2,7
Total 2276	27,3	17,4	17,6	6,8	7,4	4,9	4,5
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme 52	25,4	36,4	12,1	1,3	2,2	2,6	1,6
Ecole primaire 445	18,1	24,7	18,7	4,3	9,5	4,4	2,8
Secondaire inférieur 469	18,9	20,9	21,1	7,2	3,9	5,8	6,3
Secondaire supérieur 651	33,0	16,3	14,6	6,7	8,7	6,0	3,8
Supérieur 598	31,3	11,7	19,0	7,6	6,9	3,3	5,5

Total	27,0	17,6	17,9	6,6	7,1	4,8	4,6
2215							
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	20,4	39,7	13,0	1,5	2,1	10,5	7,0
93							
20.000-30.000	18,5	23,0	17,9	8,7	9,4	3,9	4,7
496							
30.000-40.000	24,4	18,3	13,9	6,6	7,7	9,0	4,2
610							
40.000-60.000	33,5	13,0	20,3	7,0	4,8	3,0	4,8
699							
>60.000	33,9	11,7	18,4	5,5	11,7	3,3	3,5
286							
Total	27,4	17,5	17,6	6,8	7,4	5,0	4,5
2184							
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	26,3	13,8	18,3	7,0	11,4	5,1	5,9
1118							
Très mauvaise à moyenne	17,2	29,2	21,1	5,7	3,6	6,0	2,3
784							
Total	22,7	19,9	19,4	6,5	8,3	5,4	4,4
1902							
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	21,4	19,8	20,8	5,9	7,4	4,5	3,9
928							
Dans le passé	25,4	23,6	13,5	7,9	11,4	7,7	2,4
526							
Modéré (<20)	30,2	10,6	21,7	9,7	6,4	4,2	7,5
314							
Gros fumeur	14,0	22,1	25,2	3,9	6,9	6,8	6,2
155							
Total	22,9	19,7	19,5	6,7	8,2	5,5	4,3
1923							

(*) Examen physique général ne pas inclus
 (**) N = Nombre total de contacts mentionnés

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP07R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

Total	PLAINTES/MALADIES/INVESTIGATIONS PRINCIPALES POUR LAQUELLES						
	Respiratoire	Cardio-vasculaire	Locomotion	Digestif	Genitourinaire	Endocrine/metabole	Dermatologique
N (**)	%	%	%	%	%	%	%
SEXE							
Homme 614	36,2	17,4	11,0	10,0	2,4	5,4	2,9
Femme 824	28,2	20,5	10,3	6,7	5,9	8,7	1,6
Total 1438	31,5	19,3	10,6	8,0	4,5	7,4	2,2
GROUPE AGE							
0-14 133	76,7	,0	1,7	6,6	1,2	,2	,8
15-24 103	36,4	2,1	11,8	12,3	7,6	1,0	8,9
25-34 156	29,1	5,0	12,3	10,1	9,7	4,5	1,8
35-44 195	33,8	10,0	17,2	7,6	2,7	3,4	1,1
45-54 228	24,9	13,8	13,7	9,5	7,9	12,2	1,1
55-64 182	20,6	33,7	11,4	4,7	3,8	7,1	1,9
65-74 226	15,2	46,1	6,6	7,8	1,0	14,7	2,1
75 + 215	22,4	42,3	8,7	4,9	,7	12,1	,3
Total 1438	31,5	19,3	10,6	8,0	4,5	7,4	2,2
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme 125	28,4	28,5	9,7	12,5	5,3	6,1	1,3
Ecole primaire 213	18,3	24,7	13,6	8,3	1,1	9,9	1,5
Secondaire inférieur 273	27,2	19,5	14,7	4,9	3,3	9,5	1,0
Secondaire supérieur 331	37,0	19,0	7,7	5,4	5,8	6,0	3,9
Supérieur 406	34,4	15,2	10,0	10,4	5,2	5,4	2,3

Total	31,0	19,8	10,6	8,0	4,5	7,0	2,3
1348							
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	25,1	10,8	15,9	17,9	2,5	3,8	3,3
145							
20.000-30.000	35,3	22,0	7,8	7,3	5,7	6,7	1,2
343							
30.000-40.000	32,7	20,6	13,6	5,1	1,6	11,8	,9
342							
40.000-60.000	33,8	17,9	8,0	4,5	6,5	6,2	3,4
346							
>60.000	25,2	17,9	10,6	13,4	5,6	7,6	2,4
195							
Total	31,7	18,8	10,5	8,3	4,6	7,6	2,1
1371							
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	29,0	18,3	13,0	9,4	7,3	5,5	3,8
597							
Très mauvaise à moyenne	21,3	28,9	9,9	5,9	2,5	9,7	1,1
559							
Total	25,5	23,1	11,6	7,8	5,1	7,4	2,6
1156							
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	20,8	25,2	9,5	8,5	5,2	11,5	2,7
481							
Dans le passé	24,2	29,8	13,9	7,3	7,0	5,8	,7
334							
Modéré (<20)	35,1	19,9	13,3	7,7	3,5	2,1	3,5
212							
Gros fumeur	24,8	10,9	13,3	6,6	1,7	7,0	4,1
136							
Total	24,9	23,6	11,7	7,8	4,9	7,7	2,5
1163							

(*) Examen physique général ne pas inclus
 (**) N = Nombre total de contacts mentionnés

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP07R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

Total	PLAINTES/MALADIES/INVESTIGATIONS PRINCIPALES POUR LAQUELLES						
	Respiratoire	Cardio-vasculaire	Locomotion	Digestif	Genitourinaire	Endocrine/metabole	Dermatologique
N (**)	%	%	%	%	%	%	%
SEXE							
Homme	38,0	11,2	15,0	5,7	3,5	4,7	5,6
953							
Femme	29,6	18,4	12,1	8,2	4,2	5,6	2,8
1252							
Total	33,2	15,3	13,3	7,1	3,9	5,2	4,0
2205							
GROUPE AGE							
0-14	55,1	,9	2,2	8,3	3,8	,5	8,6
323							
15-24	51,1	4,0	6,3	11,0	5,5	3,5	4,6
173							
25-34	39,7	4,2	10,4	8,6	7,8	3,6	4,9
244							
35-44	30,4	10,8	21,4	4,8	1,7	1,6	3,1
340							
45-54	21,1	23,0	15,2	9,4	1,5	9,8	4,1
252							
55-64	21,6	17,5	25,5	3,8	2,6	6,5	1,6
244							
65-74	20,7	24,9	14,2	7,4	6,8	12,0	2,4
389							
75 +	25,9	48,6	9,8	2,2	,9	3,8	1,2
240							
Total	33,2	15,3	13,3	7,1	3,9	5,2	4,0
2205							
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	13,1	17,2	31,7	13,6	8,0	3,9	1,1
117							
Ecole primaire	27,2	20,3	9,3	5,2	2,3	10,9	2,5
391							
Secondaire inférieur	32,1	24,4	15,8	4,7	4,0	3,3	2,5
455							
Secondaire supérieur	30,6	12,8	14,1	8,5	3,1	6,1	4,7
619							
Supérieur	43,1	9,5	9,9	6,9	4,7	3,2	5,6
552							

Total	33,2	15,5	13,5	7,0	4,0	5,2	4,0
2134							
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	23,8	11,6	20,2	14,3	1,5	6,3	4,2
176							
20.000-30.000	30,8	10,2	12,0	7,9	5,7	7,7	1,4
497							
30.000-40.000	28,0	25,4	15,6	6,1	3,2	3,4	3,9
597							
40.000-60.000	40,8	12,2	12,3	4,9	4,1	5,4	5,2
704							
>60.000	30,8	13,6	7,0	12,3	4,2	3,7	7,0
163							
Total	33,1	15,4	13,4	7,1	4,0	5,3	4,1
2137							
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	33,9	14,6	14,6	8,0	4,3	5,1	3,1
841							
Très mauvaise à moyenne	24,5	20,6	16,7	6,5	3,5	6,1	3,6
899							
Total	29,4	17,5	15,6	7,3	3,9	5,5	3,4
1740							
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	28,6	18,5	15,2	8,5	4,5	6,5	1,8
801							
Dans le passé	27,3	21,5	16,4	6,0	2,7	5,0	3,9
463							
Modéré (<20)	38,9	14,5	14,1	6,1	5,5	4,4	2,0
310							
Gros fumeur	25,0	8,0	14,6	2,8	4,1	8,4	7,2
203							
Total	29,5	17,2	15,3	6,7	4,1	6,0	3,1
1777							

(*) Examen physique général ne pas inclus
 (**) N = Nombre total de contacts mentionnés

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP08R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE(*)		Total
	Consultation	Visite à domicile	N (**)
	%	%	
SEXE			
Homme	69,5	30,5	2974
Femme	62,2	37,8	4134
Total	65,2	34,8	7108
GROUPE AGE			
0-14	66,1	33,9	771
15-24	82,2	17,8	540
25-34	82,5	17,5	753
35-44	76,0	24,0	864
45-54	76,1	23,9	886
55-64	67,5	32,5	939
65-74	44,2	55,8	1305
75 +	16,6	83,4	1050
Total	65,2	34,8	7108
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	47,2	52,8	342
Ecole primaire	49,3	50,7	1344
Secondaire inférieur	61,2	38,8	1452
Secondaire supérieur	68,0	32,0	1905
Supérieur	74,9	25,1	1809
Total	64,8	35,2	6852
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	55,2	44,8	488
20.000-30.000	61,4	38,6	1609
30.000-40.000	61,1	38,9	1885
40.000-60.000	69,8	30,2	2084
>60.000	74,7	25,3	753
Total	65,3	34,7	6819
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	74,0	26,0	3020
Très mauvaise à moyenne	56,4	43,6	2812
Total	66,2	33,8	5832
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	63,5	36,5	2710
Dans le passé	64,2	35,8	1631
Modéré (<20)	70,3	29,7	989
Gros fumeur	72,6	27,4	581
Total	65,9	34,1	5911
REGION DE RESIDENCE			
Région flamande	70,8	29,2	2528
Région bruxelloise	70,5	29,5	1729
Région wallonne	54,9	45,1	2851
Belgique	65,2	34,8	7108

(*) Seulement consultations et visites à domicile prises en considération

(**) N = Nombre total de contacts mentionnés

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP08R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE (*)		Total
	Consultation	Visite à domicile	N(**)
	%	%	
SEXE			
Homme	74,6	25,4	1046
Femme	68,1	31,9	1482
Total	70,8	29,2	2528
GROUPES AGE			
0-14	67,3	32,7	266
15-24	87,2	12,8	220
25-34	85,8	14,2	320
35-44	82,1	17,9	263
45-54	80,5	19,5	327
55-64	75,1	24,9	382
65-74	42,8	57,2	441
75 +	14,5	85,5	309
Total	70,8	29,2	2528
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	26,1	73,9	60
Ecole primaire	59,6	40,4	491
Secondaire inférieur	68,7	31,3	550
Secondaire supérieur	71,4	28,6	728
Supérieur	80,0	20,0	634
Total	70,5	29,5	2463
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	44,9	55,1	109
20.000-30.000	69,7	30,3	542
30.000-40.000	64,3	35,7	692
40.000-60.000	77,7	22,3	780
>60.000	75,0	25,0	301
Total	70,7	29,3	2424
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	79,8	20,2	1238
Très mauvaise à moyenne	62,6	37,4	887
Total	72,8	27,2	2125
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	70,5	29,5	1033
Dans le passé	69,2	30,8	588
Modéré (<20)	76,9	23,1	351
Gros fumeur	84,0	16,0	177
Total	72,8	27,2	2149

(*) Seulement consultations et visites à domicile prises en considération

(**) N = Nombre total de contacts mentionnés

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP08R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE(*)		Total
	Consultation	Visite à domicile	N(**)
	%	%	
SEXE			
Homme	77,6	22,4	723
Femme	65,9	34,1	1006
Total	70,5	29,5	1729
GROUPES AGE			
0-14	79,6	20,4	154
15-24	87,0	13,0	118
25-34	85,9	14,1	165
35-44	86,3	13,7	216
45-54	92,3	7,7	253
55-64	66,2	33,8	218
65-74	50,7	49,3	290
75 +	30,3	69,7	315
Total	70,5	29,5	1729
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	67,8	32,2	136
Ecole primaire	55,0	45,0	263
Secondaire inférieur	70,9	29,1	322
Secondaire supérieur	68,1	31,9	395
Supérieur	80,0	20,0	505
Total	70,4	29,6	1621
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	88,6	11,4	165
20.000-30.000	67,7	32,3	412
30.000-40.000	65,6	34,4	405
40.000-60.000	73,3	26,7	413
>60.000	69,0	31,0	244
Total	71,0	29,0	1639
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	74,8	25,2	702
Très mauvaise à moyenne	63,9	36,1	695
Total	69,7	30,3	1397
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	61,0	39,0	591
Dans le passé	72,0	28,0	406
Modéré (<20)	75,6	24,4	251
Gros fumeur	86,4	13,6	157
Total	69,3	30,7	1405

(*) Seulement consultations et visites à domicile prises en considération

(**) N = Nombre total de contacts mentionnés

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP08R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE (*)		Total
	Consultation	Visite à domicile	N(**)
	%	%	
SEXE			
Homme	59,4	40,6	1205
Femme	51,7	48,3	1646
Total	54,9	45,1	2851
GROUPES AGE			
0-14	62,0	38,0	351
15-24	70,8	29,2	202
25-34	73,7	26,3	268
35-44	64,9	35,1	385
45-54	62,4	37,6	306
55-64	51,9	48,1	339
65-74	44,6	55,4	574
75 +	14,4	85,6	426
Total	54,9	45,1	2851
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	51,1	48,9	146
Ecole primaire	32,4	67,6	590
Secondaire inférieur	45,6	54,4	580
Secondaire supérieur	61,5	38,5	782
Supérieur	65,9	34,1	670
Total	54,3	45,7	2768
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	53,9	46,1	214
20.000-30.000	44,9	55,1	655
30.000-40.000	55,6	44,4	788
40.000-60.000	56,8	43,2	891
>60.000	77,0	23,0	208
Total	55,2	44,8	2756
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	61,9	38,1	1080
Très mauvaise à moyenne	46,0	54,0	1230
Total	54,0	46,0	2310
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	51,8	48,2	1086
Dans le passé	54,3	45,7	637
Modéré (<20)	58,1	41,9	387
Gros fumeur	51,3	48,7	247
Total	53,4	46,6	2357

(*) Seulement consultations et visites à domicile prises en considération

(**) N = Nombre total de contacts mentionnés

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP09R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	PERSONNE QUI A PRIS L'INITIATIF POUR LE CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE			Total
	Personne lui-même	Médecin généraliste	Autre personne	N(*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	75,8	19,7	4,5	2955
Femme	73,2	22,9	3,9	4102
Total	74,3	21,6	4,1	7057
GROUPES AGE				
0-14	82,1	5,8	12,1	764
15-24	85,7	9,7	4,6	536
25-34	89,3	8,6	2,1	763
35-44	78,9	17,2	3,9	847
45-54	76,9	20,3	2,8	876
55-64	75,0	23,6	1,5	938
65-74	58,4	38,4	3,2	1293
75 +	43,6	52,0	4,3	1040
Total	74,3	21,6	4,1	7057
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	73,4	26,0	,6	339
Ecole primaire	59,3	38,3	2,4	1331
Secondaire inférieur	70,2	24,7	5,1	1437
Secondaire supérieur	77,3	17,9	4,8	1881
Supérieur	81,9	14,3	3,8	1805
Total	74,2	21,8	4,0	6793
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	71,4	26,7	1,9	485
20.000-30.000	70,2	28,0	1,8	1598
30.000-40.000	73,1	20,2	6,7	1854
40.000-60.000	75,9	20,3	3,8	2076
>60.000	81,2	15,0	3,8	746
Total	74,2	21,8	4,0	6759
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	81,3	15,7	3,0	2977
Très mauvaise à moyenne	66,1	32,5	1,4	2801
Total	74,6	23,1	2,3	5778
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	73,2	24,5	2,3	2678
Dans le passé	70,9	27,3	1,8	1628
Modéré (<20)	77,6	19,8	2,6	974
Gros fumeur	79,9	17,3	2,8	578
Total	74,2	23,6	2,3	5858
REGION DE RESIDENCE				
Région flamande	72,6	23,3	4,1	2553
Région bruxelloise	71,9	25,1	3,0	1696
Région wallonne	77,6	17,9	4,5	2808
Belgique	74,3	21,6	4,1	7057

(*) N = Nombre total de contacts mentionnés

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP09R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PERSONNE QUI A PRIS L'INITIATIF POUR LE CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE			Total
	Personne lui-même	Médecin généraliste	Autre personne	N(*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	74,3	21,2	4,6	1055
Femme	71,4	24,8	3,7	1498
Total	72,6	23,3	4,1	2553
GROUPES AGE				
0-14	83,5	6,3	10,3	267
15-24	84,5	13,1	2,4	225
25-34	87,8	10,5	1,6	326
35-44	75,9	18,2	5,9	261
45-54	76,2	19,9	4,0	329
55-64	70,8	27,1	2,1	382
65-74	50,9	46,0	3,1	451
75 +	32,6	62,7	4,8	312
Total	72,6	23,3	4,1	2553
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	64,0	35,0	1,1	60
Ecole primaire	56,8	40,9	2,3	505
Secondaire inférieur	68,3	27,3	4,4	550
Secondaire supérieur	76,5	18,0	5,5	725
Supérieur	79,9	16,7	3,4	645
Total	72,4	23,5	4,1	2485
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	54,2	45,8	,0	111
20.000-30.000	67,6	30,7	1,8	549
30.000-40.000	72,3	19,5	8,2	692
40.000-60.000	74,0	23,0	3,0	784
>60.000	85,0	12,6	2,4	304
Total	72,7	23,5	3,8	2440
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	80,8	16,8	2,5	1249
Très mauvaise à moyenne	61,2	37,3	1,5	892
Total	72,8	25,1	2,1	2141
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	71,2	27,0	1,8	1040
Dans le passé	71,2	26,7	2,1	592
Modéré (<20)	76,7	21,4	1,9	354
Gros fumeur	75,4	21,1	3,5	178
Total	72,6	25,3	2,1	2164

(*) N = Nombre total de contacts mentionnés

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP09R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PERSONNE QUI A PRIS L'INITIATIF POUR LE CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE			Total
	Personne lui-même	Médecin généraliste	Autre personne	N(*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	74,2	23,2	2,7	717
Femme	70,4	26,4	3,2	979
Total	71,9	25,1	3,0	1696
GROUPES AGE				
0-14	83,4	6,2	10,4	145
15-24	83,7	13,5	2,8	117
25-34	88,6	9,6	1,8	167
35-44	84,8	13,6	1,6	209
45-54	81,7	14,7	3,6	247
55-64	64,0	35,0	1,0	222
65-74	60,6	37,8	1,6	280
75 +	41,4	55,8	2,8	309
Total	71,9	25,1	3,0	1696
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	59,3	40,7	,0	136
Ecole primaire	61,4	35,6	3,0	253
Secondaire inférieur	73,9	21,5	4,6	317
Secondaire supérieur	69,4	28,6	2,0	381
Supérieur	82,1	15,1	2,8	498
Total	71,8	25,6	2,6	1585
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	83,6	16,4	,0	164
20.000-30.000	66,4	31,4	2,3	403
30.000-40.000	71,0	24,3	4,8	397
40.000-60.000	77,2	17,8	4,9	407
>60.000	68,1	30,4	1,5	236
Total	71,9	25,1	3,0	1607
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	79,4	18,9	1,8	689
Très mauvaise à moyenne	60,8	37,2	2,0	687
Total	70,7	27,4	1,9	1376
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	66,7	31,7	1,7	578
Dans le passé	68,3	28,8	2,8	400
Modéré (<20)	74,6	24,2	1,2	246
Gros fumeur	87,9	10,8	1,3	156
Total	71,0	27,2	1,8	1380

(*) N = Nombre total de contacts mentionnés

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP09R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PERSONNE QUI A PRIS L'INITIATIF POUR LE CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE			Total			
	Personne lui-même	Médecin généraliste	Autre personne	N(*)			
	%	%	%				
SEXE							
Homme	78,9	16,4	4,8	1183			
Femme	76,8	18,9	4,3	1625			
Total	77,6	17,9	4,5	2808			
GROUPES AGE							
0-14	80,1	5,1	14,8	352			
15-24	88,9	1,2	10,0	194			
25-34	93,0	3,7	3,3	270			
35-44	82,6	16,2	1,2	377			
45-54	77,2	22,8	,0	300			
55-64	86,3	13,3	,4	334			
65-74	66,9	29,5	3,6	562			
75 +	55,3	40,3	4,4	419			
Total	77,6	17,9	4,5	2808			
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	85,1	14,4	,5	143			
Ecole primaire	62,8	34,8	2,4	573			
Secondaire inférieur	72,9	20,5	6,6	570			
Secondaire supérieur	80,6	15,3	4,2	775			
Supérieur	84,8	10,5	4,7	662			
Total	77,7	18,0	4,3	2723			
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	84,0	11,6	4,4	210			
20.000-30.000	76,1	22,1	1,9	646			
30.000-40.000	74,6	20,6	4,9	765			
40.000-60.000	78,8	16,3	4,9	885			
>60.000	76,8	13,8	9,4	206			
Total	77,3	18,2	4,5	2712			
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	82,9	12,7	4,4	1039			
Très mauvaise à moyenne	74,2	24,8	1,0	1222			
Total	78,6	18,7	2,7	2261			
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	78,2	18,4	3,3	1060			
Dans le passé	71,0	28,0	1,1	636			
Modéré (<20)	80,0	15,9	4,1	374			
Gros fumeur	85,8	12,2	2,0	244			
Total	77,6	19,7	2,7	2314			
(*)	N	=	Nombre	total	de	contacts	mentionnés

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP10R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	REFERE APRES LE CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE		Total
	Oui %	Non %	N(*)
SEXE			
Homme	3,4	96,6	2904
Femme	3,2	96,8	4067
Total	3,3	96,7	6971
GROUPE AGE			
0-14	1,3	98,7	775
15-24	4,2	95,8	528
25-34	3,6	96,4	761
35-44	4,0	96,0	843
45-54	4,5	95,5	864
55-64	4,2	95,8	930
65-74	1,8	98,2	1268
75 +	2,1	97,9	1002
Total	3,3	96,7	6971
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	2,0	98,0	331
Ecole primaire	3,5	96,5	1309
Secondaire inférieur	2,6	97,4	1419
Secondaire supérieur	2,5	97,5	1873
Supérieur	4,8	95,2	1776
Total	3,3	96,7	6708
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	3,1	96,9	481
20.000-30.000	2,2	97,8	1580
30.000-40.000	2,9	97,1	1837
40.000-60.000	3,8	96,2	2049
>60.000	4,8	95,2	741
Total	3,3	96,7	6688
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	3,7	96,3	2946
Très mauvaise à moyenne	3,3	96,7	2756
Total	3,5	96,5	5702
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	3,0	97,0	2650
Dans le passé	4,4	95,6	1596
Modéré (<20)	3,8	96,2	958
Gros fumeur	4,2	95,8	568
Total	3,6	96,4	5772
REGION DE RESIDENCE			
Région flamande	2,6	97,4	2532
Région bruxelloise	4,5	95,5	1654
Région wallonne	4,2	95,8	2785
Belgique	3,3	96,7	6971

(*) N = Nombre total de contacts mentionnés

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP10R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	REFERE APRES LE CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE		Total
	Oui	Non	N(*)
	%	%	
SEXE			
Homme	3,0	97,0	1039
Femme	2,3	97,7	1493
Total	2,6	97,4	2532
GROUPES AGE			
0-14	,5	99,5	273
15-24	3,7	96,3	221
25-34	2,5	97,5	326
35-44	3,3	96,7	261
45-54	3,7	96,3	328
55-64	2,4	97,6	380
65-74	2,0	98,0	438
75 +	1,7	98,3	305
Total	2,6	97,4	2532
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	2,6	97,4	54
Ecole primaire	3,9	96,1	495
Secondaire inférieur	2,0	98,0	544
Secondaire supérieur	2,1	97,9	722
Supérieur	3,1	96,9	649
Total	2,6	97,4	2464
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	,4	99,6	110
20.000-30.000	1,6	98,4	543
30.000-40.000	2,3	97,7	684
40.000-60.000	2,7	97,3	777
>60.000	4,8	95,2	306
Total	2,5	97,5	2420
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	3,3	96,7	1240
Très mauvaise à moyenne	2,1	97,9	884
Total	2,8	97,2	2124
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	2,7	97,3	1033
Dans le passé	3,6	96,4	586
Modéré (<20)	1,3	98,7	350
Gros fumeur	4,7	95,3	175
Total	2,9	97,1	2144
(*)	N	=	Nombre total de contacts mentionnés

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP10R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	REFERE APRES LE CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE		Total
	Oui	Non	N(*)
	%	%	
SEXE			
Homme	4,3	95,7	690
Femme	4,6	95,4	964
Total	4,5	95,5	1654
GROUPES AGE			
0-14	,7	99,3	150
15-24	3,8	96,2	114
25-34	7,1	92,9	165
35-44	8,2	91,8	205
45-54	3,9	96,1	246
55-64	2,8	97,2	218
65-74	2,4	97,6	271
75 +	6,4	93,6	285
Total	4,5	95,5	1654
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	5,1	94,9	134
Ecole primaire	4,0	96,0	247
Secondaire inférieur	3,5	96,5	311
Secondaire supérieur	3,4	96,6	382
Supérieur	6,6	93,4	470
Total	4,6	95,4	1544
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	2,4	97,6	163
20.000-30.000	3,5	96,5	396
30.000-40.000	6,5	93,5	392
40.000-60.000	2,7	97,3	391
>60.000	6,5	93,5	235
Total	4,4	95,6	1577
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	5,5	94,5	670
Très mauvaise à moyenne	4,9	95,1	664
Total	5,2	94,8	1334
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	3,4	96,6	566
Dans le passé	6,1	93,9	381
Modéré (<20)	6,0	94,0	236
Gros fumeur	6,2	93,8	152
Total	4,9	95,1	1335
(*) N = Nombre total de contacts mentionnés			

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE GENERALISTE (INDICATEUR : GP10R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	REFERE APRES LE CONTACT AVEC LE MEDECIN GENERALISTE		Total
	Oui	Non	N(*)
	%	%	
SEXE			
Homme	3,7	96,3	1175
Femme	4,5	95,5	1610
Total	4,2	95,8	2785
GROUPES AGE			
0-14	2,6	97,4	352
15-24	5,4	94,6	193
25-34	5,7	94,3	270
35-44	4,5	95,5	377
45-54	6,5	93,5	290
55-64	8,2	91,8	332
65-74	1,4	98,6	559
75 +	1,2	98,8	412
Total	4,2	95,8	2785
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	,4	99,6	143
Ecole primaire	2,8	97,2	567
Secondaire inférieur	3,6	96,4	564
Secondaire supérieur	3,0	97,0	769
Supérieur	7,3	92,7	657
Total	4,2	95,8	2700
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	6,0	94,0	208
20.000-30.000	3,0	97,0	641
30.000-40.000	3,0	97,0	761
40.000-60.000	5,6	94,4	881
>60.000	3,8	96,2	200
Total	4,2	95,8	2691
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	4,3	95,7	1036
Très mauvaise à moyenne	4,6	95,4	1208
Total	4,5	95,5	2244
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	3,6	96,4	1051
Dans le passé	5,5	94,5	629
Modéré (<20)	7,3	92,7	372
Gros fumeur	3,1	96,9	241
Total	4,6	95,4	2293

(*) N = Nombre total de contacts mentionnés