

7.3. Style de Vie et Prévention

7.3.5. Connaissances et attitudes par rapport au SIDA

7.3.5.1. Résumé

Les objectifs principaux de ce module sont d'évaluer (afin de suivre leur évolution au cours du temps) les connaissances de la population de 15 ans et plus sur les modes de transmission et les moyens de protection contre le SIDA, les pratiques en matière de test de dépistage du HIV et les attitudes face aux personnes séropositives. Cette enquête confirme qu'une proportion importante de la population bruxelloise a encore une connaissance incorrecte de la transmission du SIDA et des moyens de protection efficaces.

Les principaux résultats sont les suivants :

- En région bruxelloise, 54% de la population de 15 ans et plus reconnaît les modes de transmission du SIDA qui sont non contaminants mais moins d'un tiers sait que la transmission du SIDA n'est pas possible ni en donnant ni en recevant du sang actuellement en Belgique. 50% de la population cite comme efficaces des moyens de protection qui ne le sont pas, et 34% a déjà pratiqué au moins une fois un test de dépistage du HIV. Une large majorité de la population (65%) a des attitudes discriminatoires vis-à-vis des séropositifs et/ou des malades atteints du SIDA.
- La connaissance des modes de transmission et des moyens de protection diminue avec l'âge. La pratique d'un test de dépistage du HIV varie avec l'âge : 17% des jeunes de 15-19 ans, 1/3 des personnes de 20-24 ans et la moitié des 25-44 ans.
- La connaissance des modes de transmission, y compris ceux liés à la transfusion sanguine, ainsi que la connaissance des moyens de protection augmente avec le niveau d'instruction et le revenu équivalent du ménage. L'utilisation du test de dépistage HIV augmente avec le niveau d'instruction. Les attitudes discriminatoires sont moins fréquentes parmi les personnes plus instruites et ayant des revenus plus élevés.
- Plus de la moitié des personnes ayant pratiqué un test HIV l'a fait de sa propre initiative. Un tiers des tests sont réalisés à l'initiative d'un médecin. Les autres tests ont été réalisés dans le cadre de dons de sang, d'examen d'embauche,... Les principales raisons sont : check-up général (47%), inquiétude personnelle quant à la possibilité d'avoir été infecté (18%), grossesse (13%).
- 1 Bruxellois sur 5 a effectué un test de dépistage du SIDA de sa propre initiative, environ 1 sur 10 à l'initiative d'un médecin et 1 sur 20 à l'initiative d'un tiers.