

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO01_1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIERE HOSPITALISATION			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais été hospitalisé	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	11,3	60,9	27,8	4938
Femme	14,0	56,6	29,4	5176
Total	12,7	58,7	28,6	10114
GROUPES AGE				
0-14	12,5	32,7	54,9	1629
15-24	9,5	55,4	35,1	1128
25-34	9,6	57,3	33,2	1637
35-44	11,9	65,3	22,9	1604
45-54	10,8	69,6	19,6	1284
55-64	13,1	70,8	16,1	1087
65-74	25,0	67,2	7,7	1069
75 +	23,6	67,7	8,7	676
Total	12,7	58,7	28,6	10114
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	20,9	51,7	27,3	350
Ecole primaire	16,6	65,3	18,0	1280
Secondaire inférieur	16,2	59,6	24,2	1656
Secondaire supérieur	11,5	57,1	31,5	2920
Supérieur	10,3	58,0	31,7	3486
Total	12,7	58,6	28,7	9692
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	11,9	53,0	35,1	780
20.000-30.000	15,9	57,0	27,2	2024
30.000-40.000	12,9	60,7	26,4	2350
40.000-60.000	11,1	59,3	29,5	3224
>60.000	12,5	59,3	28,2	1277
Total	12,8	58,8	28,5	9655
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	8,9	63,5	27,6	5872
Très mauvaise à moyenne	24,1	65,2	10,8	2012
Total	12,2	63,9	23,9	7884
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	10,8	62,2	26,9	3690
Dans le passé	13,4	67,6	19,0	1916
Modéré (<20)	10,1	65,4	24,5	1556
Gros fumeur	18,6	61,8	19,6	828
Total	12,1	64,1	23,9	7990
REGION DE RESIDENCE				
Région flamande	12,7	59,1	28,3	3506
Région bruxelloise	12,2	57,0	30,7	3014
Région wallonne	12,7	58,8	28,5	3594
Belgique	12,7	58,7	28,6	10114

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO01_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIERE HOSPITALISATION			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais été hospitalisé	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	11,2	61,4	27,4	1739
Femme	14,2	56,6	29,1	1767
Total	12,7	59,1	28,3	3506
GROUPES AGE				
0-14	12,7	33,1	54,2	540
15-24	10,8	58,7	30,5	422
25-34	9,4	55,9	34,7	590
35-44	12,3	64,0	23,7	532
45-54	11,1	69,5	19,4	465
55-64	11,8	71,5	16,7	403
65-74	26,4	65,7	7,9	360
75 +	20,9	72,1	7,0	194
Total	12,7	59,1	28,3	3506
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	20,3	46,6	33,1	64
Ecole primaire	16,2	67,1	16,7	422
Secondaire inférieur	15,0	62,2	22,7	605
Secondaire supérieur	12,5	56,5	31,0	1164
Supérieur	10,4	57,2	32,4	1130
Total	12,8	58,7	28,6	3385
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	15,0	62,2	22,8	119
20.000-30.000	16,2	59,9	23,9	603
30.000-40.000	12,6	61,2	26,2	851
40.000-60.000	11,1	58,6	30,3	1284
>60.000	13,0	55,5	31,5	458
Total	12,8	59,0	28,1	3315
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	9,8	63,3	26,9	2265
Très mauvaise à moyenne	22,6	66,9	10,4	566
Total	12,1	63,9	23,9	2831
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	9,8	62,8	27,4	1368
Dans le passé	14,2	65,8	20,0	700
Modéré (<20)	10,6	66,9	22,5	555
Gros fumeur	19,7	61,2	19,0	238
Total	11,9	64,2	23,9	2861

REGIO: 2 Région bruxelloise
 CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO01_1)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIERE HOSPITALISATION			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais été hospitalisé	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	11,7	58,8	29,6	1463
Femme	12,8	55,4	31,8	1551
Total	12,2	57,0	30,7	3014
GROUPES AGE				
0-14	10,8	35,5	53,7	470
15-24	10,3	46,1	43,6	310
25-34	8,9	57,0	34,1	494
35-44	9,2	63,6	27,2	484
45-54	15,9	64,2	19,8	382
55-64	9,7	65,8	24,5	312
65-74	19,2	70,9	9,9	324
75 +	23,1	65,8	11,1	238
Total	12,2	57,0	30,7	3014
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	13,6	56,7	29,6	167
Ecole primaire	13,6	61,6	24,8	367
Secondaire inférieur	15,1	54,2	30,6	424
Secondaire supérieur	12,3	53,1	34,7	697
Supérieur	10,9	58,9	30,2	1194
Total	12,4	56,9	30,7	2849
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	7,5	47,7	44,8	365
20.000-30.000	14,3	50,4	35,3	621
30.000-40.000	12,5	62,4	25,1	603
40.000-60.000	12,8	59,5	27,7	783
>60.000	13,0	62,6	24,4	494
Total	12,4	56,7	30,9	2866
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	8,4	60,8	30,8	1670
Très mauvaise à moyenne	22,8	64,3	12,9	619
Total	12,1	61,7	26,3	2289
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	10,4	61,0	28,6	1009
Dans le passé	14,9	64,7	20,5	561
Modéré (<20)	9,9	58,0	32,1	455
Gros fumeur	17,0	63,1	19,9	274
Total	12,0	61,4	26,6	2299

REGIO: 3 Région wallonne
 CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO01_1)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIERE HOSPITALISATION			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais été hospitalisé	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	11,4	60,6	27,9	1736
Femme	14,0	56,9	29,1	1858
Total	12,7	58,8	28,5	3594
GROUPES AGE				
0-14	12,6	31,3	56,2	619
15-24	6,9	52,8	40,3	396
25-34	10,0	60,2	29,8	553
35-44	11,9	67,9	20,2	588
45-54	8,6	71,5	19,8	437
55-64	17,2	71,0	11,8	372
65-74	25,0	68,2	6,8	385
75 +	27,8	62,2	10,0	244
Total	12,7	58,8	28,5	3594
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	26,5	52,9	20,6	119
Ecole primaire	18,4	63,8	17,8	491
Secondaire inférieur	18,3	56,5	25,2	627
Secondaire supérieur	9,1	59,2	31,7	1059
Supérieur	9,7	59,2	31,1	1162
Total	12,6	59,0	28,4	3458
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	12,3	49,7	38,0	296
20.000-30.000	15,9	55,1	29,0	800
30.000-40.000	13,3	59,7	27,0	896
40.000-60.000	10,9	60,7	28,4	1157
>60.000	10,8	68,5	20,7	325
Total	12,8	58,9	28,3	3474
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	7,2	64,9	27,9	1937
Très mauvaise à moyenne	26,2	63,3	10,5	827
Total	12,3	64,4	23,2	2764
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	12,9	61,5	25,6	1313
Dans le passé	11,4	71,9	16,7	655
Modéré (<20)	9,3	65,3	25,4	546
Gros fumeur	17,4	62,2	20,3	316
Total	12,4	64,7	22,9	2830

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HOCOUNT1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	Nombre moyen d'hospitalisations par an par 100 personnes dans la population	N
SEXE		
Homme	11,1	4940
Femme	13,9	5180
Total	12,5	10120
GROUPES AGE		
0-14	12,3	1630
15-24	9,5	1129
25-34	9,4	1638
35-44	11,8	1606
45-54	10,6	1284
55-64	12,6	1088
65-74	24,5	1069
75 +	23,1	676
Total	12,5	10120
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	20,6	350
Ecole primaire	16,2	1280
Secondaire inférieur	15,7	1657
Secondaire supérieur	11,3	2922
Supérieur	10,3	3489
Total	12,5	9698
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	11,6	780
20.000-30.000	15,3	2025
30.000-40.000	12,7	2352
40.000-60.000	11,1	3225
>60.000	12,3	1278
Total	12,6	9660
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	8,9	5875
Très mauvaise à moyenne	23,3	2014
Total	12,0	7889
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	10,6	3693
Dans le passé	13,3	1916
Modéré (<20)	10,0	1558
Gros fumeur	18,3	828
Total	11,9	7995
REGION DE RESIDENCE		
Région flamande	12,6	3506
Région bruxelloise	11,5	3016
Région wallonne	12,6	3598
Belgique	12,5	10120

REGIO: 1 Région flamande
 CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HOCOUNT1)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	Nombre moyen d'hospitalisations par an par 100 personnes dans la population	N
SEXE		
Homme	11,0	1739
Femme	14,2	1767
Total	12,6	3506
GROUPES AGE		
0-14	12,5	540
15-24	10,9	422
25-34	9,4	590
35-44	12,3	532
45-54	10,9	465
55-64	11,6	403
65-74	26,0	360
75 +	20,4	194
Total	12,6	3506
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	20,3	64
Ecole primaire	15,8	422
Secondaire inférieur	14,9	605
Secondaire supérieur	12,4	1164
Supérieur	10,5	1130
Total	12,7	3385
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	15,0	119
20.000-30.000	15,9	603
30.000-40.000	12,5	851
40.000-60.000	11,1	1284
>60.000	12,8	458
Total	12,7	3315
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	9,8	2265
Très mauvaise à moyenne	22,3	566
Total	12,0	2831
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	9,8	1368
Dans le passé	13,9	700
Modéré (<20)	10,4	555
Gros fumeur	19,9	238
Total	11,8	2861

REGIO: 2 Région bruxelloise
 CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HOCOUNT1)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	Nombre moyen d'hospitalisations par an par 100 personnes dans la population	N
SEXE		
Homme	11,3	1464
Femme	11,8	1552
Total	11,5	3016
GROUPES AGE		
0-14	10,5	470
15-24	10,7	311
25-34	7,2	494
35-44	9,0	485
45-54	15,2	382
55-64	9,4	312
65-74	17,2	324
75 +	22,1	238
Total	11,5	3016
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	12,9	167
Ecole primaire	12,8	367
Secondaire inférieur	13,1	424
Secondaire supérieur	11,8	697
Supérieur	10,5	1196
Total	11,7	2851
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	6,3	365
20.000-30.000	13,5	621
30.000-40.000	11,3	603
40.000-60.000	12,7	783
>60.000	12,3	495
Total	11,6	2867
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	8,2	1671
Très mauvaise à moyenne	20,6	620
Total	11,3	2291
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	9,5	1010
Dans le passé	15,0	561
Modéré (<20)	9,7	456
Gros fumeur	15,1	274
Total	11,4	2301

REGIO: 3 Région wallonne
 CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HOCOUNT1)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	Nombre moyen d'hospitalisations par an par 100 personnes dans la population	N
SEXE		
Homme	11,2	1737
Femme	14,0	1861
Total	12,6	3598
GROUPES AGE		
0-14	12,5	620
15-24	6,9	396
25-34	10,2	554
35-44	11,9	589
45-54	8,6	437
55-64	15,8	373
65-74	24,8	385
75 +	27,6	244
Total	12,6	3598
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	26,0	119
Ecole primaire	18,1	491
Secondaire inférieur	17,7	628
Secondaire supérieur	9,1	1061
Supérieur	9,8	1163
Total	12,5	3462
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	12,3	296
20.000-30.000	15,1	801
30.000-40.000	13,4	898
40.000-60.000	10,9	1158
>60.000	10,7	325
Total	12,6	3478
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	7,3	1939
Très mauvaise à moyenne	25,4	828
Total	12,2	2767
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	12,6	1315
Dans le passé	11,4	655
Modéré (<20)	9,4	547
Gros fumeur	17,1	316
Total	12,3	2833

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO05R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	SERVICE D'HOSPITALISATION						Total
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	33,7	20,5	13,4	10,6	,0	21,8	578
Femme	19,8	22,7	9,9	4,9	17,1	25,6	653
Total	26,2	21,7	11,5	7,5	9,3	23,8	1231
GROUPES AGE							
0-14	15,1	10,8	2,4	47,7	,0	24,0	190
15-24	20,4	12,6	20,6	,0	11,4	35,0	96
25-34	32,1	13,7	8,3	,0	24,1	21,9	150
35-44	30,6	18,7	10,0	,0	14,0	26,8	160
45-54	26,2	29,8	17,5	,0	7,5	19,0	150
55-64	37,3	24,5	10,6	,0	3,4	24,2	134
65-74	23,7	27,8	16,3	,0	8,9	23,3	210
75 +	26,2	49,5	9,9	,0	,2	14,2	141
Total	26,2	21,7	11,5	7,5	9,3	23,8	1231
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	39,7	30,1	6,0	1,3	2,9	20,0	55
Ecole primaire	30,0	27,5	7,0	1,3	2,8	31,5	200
Secondaire inférieur	30,9	30,0	12,8	5,4	7,9	12,9	236
Secondaire supérieur	22,2	17,3	10,7	9,7	12,3	27,9	338
Supérieur	24,0	17,3	14,5	10,4	10,3	23,5	358
Total	26,4	22,1	11,5	7,4	9,0	23,6	1187
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	18,1	29,7	8,1	7,6	5,9	30,7	89
20.000-30.000	26,8	23,4	10,9	6,6	6,5	25,8	274
30.000-40.000	29,8	22,2	12,7	9,1	7,9	18,2	320
40.000-60.000	25,5	21,1	13,3	8,1	10,5	21,6	343
>60.000	26,6	14,6	6,7	5,9	14,3	31,9	148
Total	26,5	21,6	11,4	7,6	9,1	23,7	1174
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	33,9	16,8	14,2	,0	13,5	21,6	497
Très mauvaise à moyenne	22,0	35,6	13,7	,0	6,7	22,0	461
Total	28,9	24,7	14,0	,0	10,6	21,8	958
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	28,8	24,0	13,4	,0	10,6	23,2	408
Dans le passé	27,5	27,5	11,1	,0	10,8	23,0	265
Modéré (<20)	29,5	21,2	19,4	,0	13,0	16,9	161
Gros fumeur	33,2	16,9	11,5	,0	9,1	29,2	131
Total	29,3	23,2	13,5	,0	10,8	23,1	965
REGION DE RESIDENCE							
Région flamande	24,2	20,7	12,3	6,4	9,7	26,7	409
Région bruxelloise	26,9	24,9	13,4	7,8	7,3	19,7	381
Région wallonne	29,4	22,5	9,5	9,3	9,2	20,1	441
Belgique	26,2	21,7	11,5	7,5	9,3	23,8	1231

1 Chirurgie
2 Médecine interne
3 Orthopédie
4 Pédiatrie
5 Gynécologie-obstétrique
6 Autre service

(*) N = Nombre total d'hospitalisations

REGIO: 1 Région flamande
 CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO05R)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	SERVICE D'HOSPITALISATION						Total
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	32,6	21,1	15,1	9,7	,0	21,5	191
Femme	17,3	20,3	10,1	3,7	17,7	30,9	218
Total	24,2	20,7	12,3	6,4	9,7	26,7	409
GROUPES AGE							
0-14	12,4	15,9	1,6	41,7	,0	28,5	64
15-24	19,5	12,0	22,3	,0	10,1	36,1	39
25-34	31,2	9,8	11,7	,0	23,8	23,4	55
35-44	29,9	22,0	9,1	,0	13,8	25,2	52
45-54	28,3	31,6	13,0	,0	7,0	20,2	46
55-64	32,4	21,0	16,6	,0	3,2	26,8	48
65-74	15,8	21,3	19,4	,0	11,4	32,1	67
75 +	28,6	47,1	7,0	,0	,0	17,4	38
Total	24,2	20,7	12,3	6,4	9,7	26,7	409
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	25,2	29,1	8,7	,0	,0	37,0	13
Ecole primaire	30,6	27,5	5,5	1,7	1,3	33,4	68
Secondaire inférieur	28,4	33,9	14,7	5,9	7,2	9,9	74
Secondaire supérieur	19,6	16,3	11,7	7,2	14,6	30,6	137
Supérieur	24,6	14,1	16,5	7,7	7,5	29,6	108
Total	24,4	21,0	12,7	6,1	8,9	26,9	400
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	18,0	24,5	11,3	,0	,0	46,1	15
20.000-30.000	21,5	31,6	15,3	2,3	6,5	22,8	81
30.000-40.000	24,0	21,7	11,8	13,0	9,0	20,6	114
40.000-60.000	24,8	17,3	13,7	6,0	13,2	25,0	126
>60.000	31,0	10,0	4,7	5,2	9,6	39,5	50
Total	24,5	20,8	12,2	6,4	9,6	26,4	386
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	34,7	14,3	14,9	,0	12,8	23,4	199
Très mauvaise à moyenne	14,6	37,7	17,5	,0	5,9	24,3	127
Total	27,8	22,3	15,8	,0	10,4	23,7	326
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	11,3	7,6	5,1	,0	2,8	11,4	131
Dans le passé	6,2	8,2	3,9	,0	3,3	6,8	99
Modéré (<20)	5,7	2,4	4,0	,0	2,5	2,8	58
Gros fumeur	4,6	2,9	2,5	,0	2,0	3,9	38
Total	27,8	21,0	15,5	,0	10,7	25,0	326

1 Chirurgie
 2 Médecine interne
 3 Orthopédie
 4 Pédiatrie
 5 Gynécologie-obstétrique
 6 Autre service

(*) N = Nombre total d'hospitalisations

REGIO: 2 Région bruxelloise
 CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO05R)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	SERVICE D'HOSPITALISATION						Total
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	38,0	21,4	13,1	9,9	,0	17,6	189
Femme	16,9	28,2	13,6	5,8	13,9	21,6	192
Total	26,9	24,9	13,4	7,8	7,3	19,7	381
GROUPES AGE							
0-14	17,9	1,3	3,6	62,9	,0	14,2	50
15-24	46,0	9,8	19,1	,0	7,5	17,7	29
25-34	19,9	25,3	10,9	,0	21,3	22,6	45
35-44	39,4	18,9	8,0	,0	13,1	20,6	51
45-54	14,9	27,7	26,1	,0	7,1	24,3	58
55-64	29,5	31,7	3,2	,0	6,6	29,0	38
65-74	40,6	36,0	12,4	,0	,9	10,2	58
75 +	13,3	50,4	15,1	,0	,0	21,3	52
Total	26,9	24,9	13,4	7,8	7,3	19,7	381
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	17,8	44,4	11,4	,0	9,3	17,0	25
Ecole primaire	47,5	21,9	18,2	1,2	,0	11,1	50
Secondaire inférieur	21,8	17,4	9,8	16,1	13,7	21,2	58
Secondaire supérieur	26,5	31,2	16,5	4,1	5,0	16,7	95
Supérieur	23,5	18,8	13,2	11,8	9,3	23,3	134
Total	26,9	24,3	14,0	8,1	7,7	19,1	362
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	21,5	15,0	10,9	11,7	14,1	26,8	41
20.000-30.000	31,8	25,0	9,9	15,3	2,8	15,2	86
30.000-40.000	25,3	20,1	12,2	5,8	4,3	32,3	85
40.000-60.000	32,0	29,1	15,4	5,4	4,5	13,6	91
>60.000	20,9	25,6	17,8	1,3	15,7	18,7	60
Total	27,7	24,3	13,3	8,0	6,9	19,8	363
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	34,9	22,9	15,3	,0	11,4	15,6	154
Très mauvaise à moyenne	24,1	34,5	9,6	,0	7,1	24,7	142
Total	29,9	28,3	12,7	,0	9,4	19,8	296
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	9,8	13,5	4,6	,0	3,6	6,6	113
Dans le passé	12,3	4,9	2,9	,0	2,9	4,1	82
Modéré (<20)	4,1	6,1	2,5	,0	1,2	4,1	52
Gros fumeur	3,7	3,7	2,2	,0	1,7	5,8	49
Total	29,8	28,1	12,2	,0	9,3	20,5	296

1 Chirurgie
 2 Médecine interne
 3 Orthopédie
 4 Pédiatrie
 5 Gynécologie-obstétrique
 6 Autre service

(*) N = Nombre total d'hospitalisation

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO05R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	SERVICE D'HOSPITALISATION						Total
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	34,3	19,1	10,6	12,3	,0	23,7	198
Femme	25,2	25,3	8,5	6,8	17,1	17,1	243
Total	29,4	22,5	9,5	9,3	9,2	20,1	441
GROUPES AGE							
0-14	18,5	5,2	3,3	53,5	,0	19,4	76
15-24	10,8	15,3	17,3	,0	16,4	40,2	28
25-34	37,9	17,2	,7	,0	25,5	18,6	50
35-44	29,7	12,3	12,0	,0	14,5	31,4	57
45-54	27,6	27,1	23,1	,0	8,9	13,4	46
55-64	45,4	27,8	3,8	,0	3,1	19,8	48
65-74	33,0	37,3	11,8	,0	6,9	11,0	85
75 +	28,8	51,7	11,0	,0	,5	8,1	51
Total	29,4	22,5	9,5	9,3	9,2	20,1	441
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	67,2	23,3	,0	3,4	2,6	3,5	17
Ecole primaire	24,4	29,0	6,1	,7	5,7	34,1	82
Secondaire inférieur	36,0	27,5	11,0	2,6	7,7	15,0	104
Secondaire supérieur	28,1	15,1	5,6	18,7	8,3	24,2	106
Supérieur	23,2	22,0	11,7	14,5	15,3	13,3	116
Total	30,0	23,2	8,7	9,5	9,5	19,2	425
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	17,0	38,8	4,6	12,4	7,9	19,3	33
20.000-30.000	32,5	11,5	5,0	10,0	7,8	33,2	107
30.000-40.000	40,8	23,6	14,5	3,5	7,1	10,5	121
40.000-60.000	25,1	26,3	12,1	12,8	6,7	17,0	126
>60.000	17,4	21,1	4,9	11,1	27,4	18,1	38
Total	29,7	22,0	9,4	9,6	8,9	20,4	425
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	31,4	21,0	12,0	,0	16,4	19,2	144
Très mauvaise à moyenne	30,0	33,5	10,3	,0	7,4	18,7	192
Total	30,7	27,9	11,1	,0	11,5	18,9	336
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	13,2	12,4	6,4	,0	7,2	6,9	164
Dans le passé	7,1	5,9	1,1	,0	1,9	4,9	84
Modéré (<20)	4,0	4,9	2,3	,0	1,9	2,5	51
Gros fumeur	7,5	2,4	,7	,0	,6	6,1	44
Total	31,8	25,5	10,5	,0	11,6	20,5	343
1 Chirurgie 2 Médecine interne 3 Orthopédie 4 Pédiatrie 5 Gynécologie-obstétrique 6 Autre service							
(*)	N	=	Nombre	total	d'hospitalisations		

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO06R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

DUREE D'HOSPITALISATION (NOMBRE DE NUITS)					

	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N

SEXE					
Homme	6,4	1	2	6	572
Femme	7,2	1	4	7	662
Total	6,9	1	3	6	1234
GROUPES AGE					
0-14	5,2	1	2	4	195
15-24	3,4	0	1	3	103
25-34	4,3	1	2	4	152
35-44	7,6	1	3	7	156
45-54	6,6	1	3	6	147
55-64	7,7	1	4	9	129
65-74	8,2	2	6	10	209
75 +	15,2	3	9	21	143
Total	6,9	1	3	6	1234
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	9,7	0	4	14	58
Ecole primaire	9,2	2	5	11	191
Secondaire inférieur	8,0	1	3	8	242
Secondaire supérieur	7,1	1	3	7	342
Supérieur	4,5	0	2	4	358
Total	7,0	1	3	7	1191
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	8,7	2	5	12	86
20.000-30.000	8,1	1	4	8	279
30.000-40.000	8,5	1	4	9	321
40.000-60.000	6,0	1	2	6	341
>60.000	3,2	0	2	3	151
Total	6,9	1	3	7	1178
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	4,6	0	2	4	500
Très mauvaise à moyenne	9,8	2	6	10	460
Total	6,8	1	3	6	960
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	6,9	1	4	7	416
Dans le passé	8,2	1	3	7	257
Modéré (<20)	5,3	1	3	6	160
Gros fumeur	7,1	1	3	5	132
Total	7,0	1	3	7	965
REGION DE RESIDENCE					
Région flamande	6,3	0	2	6	417
Région bruxelloise	7,9	1	4	7	383
Région wallonne	7,6	1	4	7	434
Belgique	6,9	1	3	6	1234

REGIO: 1 Région flamande
 CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO06R)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	DUREE D'HOSPITALISATION (NOMBRE DE NUITS)				
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
SEXE					
Homme	5,9	1	2	4	191
Femme	6,7	0	3	7	226
Total	6,3	0	2	6	417
GROUPE AGE					
0-14	6,3	0	2	5	66
15-24	2,8	0	1	3	45
25-34	4,6	0	1	3	56
35-44	6,6	0	2	5	51
45-54	5,2	1	2	6	47
55-64	7,2	0	1	4	47
65-74	8,2	2	8	10	65
75 +	13,6	3	9	14	40
Total	6,3	0	2	6	417
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	13,9	0	3	27	14
Ecole primaire	6,8	1	2	9	65
Secondaire inférieur	7,3	1	2	6	81
Secondaire supérieur	6,9	1	3	8	137
Supérieur	4,2	0	1	3	110
Total	6,4	0	2	6	407
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	9,1	1	6	13	15
20.000-30.000	8,9	1	3	10	86
30.000-40.000	8,3	1	3	9	111
40.000-60.000	4,6	0	2	5	127
>60.000	3,1	0	1	3	55
Total	6,4	0	2	6	394
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	3,9	0	1	3	207
Très mauvaise à moyenne	9,9	2	6	10	127
Total	5,9	0	2	5	334
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	6,2	1	3	6	137
Dans le passé	7,3	0	2	7	96
Modéré (<20)	3,1	0	2	4	58
Gros fumeur	6,4	1	2	4	41
Total	6,0	0	2	5	332

REGIO: 2 Région bruxelloise
 CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO06R)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	DUREE D'HOSPITALISATION (NOMBRE DE NUITS)				
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
SEXE					
Homme	6,8	1	3	6	186
Femme	8,8	2	5	8	197
Total	7,9	1	4	7	383
GROUPE AGE					
0-14	3,8	1	2	4	54
15-24	6,5	0	2	4	29
25-34	4,1	1	3	5	44
35-44	5,9	1	5	6	48
45-54	7,6	2	4	7	56
55-64	9,0	3	5	9	38
65-74	14,5	3	7	15	59
75 +	11,7	3	6	10	55
Total	7,9	1	4	7	383
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	15,2	3	12	15	25
Ecole primaire	7,8	3	3	8	49
Secondaire inférieur	10,7	4	7	11	59
Secondaire supérieur	7,9	2	3	6	98
Supérieur	5,0	1	2	5	134
Total	8,0	1	3	7	365
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	5,0	0	3	6	38
20.000-30.000	7,0	2	3	7	88
30.000-40.000	10,9	2	5	9	87
40.000-60.000	9,2	1	4	11	91
>60.000	3,6	1	3	5	61
Total	7,5	1	3	7	365
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	4,8	1	3	5	151
Très mauvaise à moyenne	10,3	3	6	11	143
Total	7,4	2	4	7	294
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	7,7	2	4	7	115
Dans le passé	7,7	3	4	7	81
Modéré (<20)	7,3	1	3	8	52
Gros fumeur	6,8	2	4	9	47
Total	7,5	2	4	7	295

REGIO: 3 Région wallonne
 CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO06R)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	DUREE D'HOSPITALISATION (NOMBRE DE NUITS)				
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
SEXE					
Homme	7,3	1	4	7	195
Femme	7,8	2	5	9	239
Total	7,6	1	4	7	434
GROUPE AGE					
0-14	3,7	1	2	4	75
15-24	3,8	1	2	3	29
25-34	3,8	1	4	5	52
35-44	9,9	2	5	11	57
45-54	9,8	2	6	8	44
55-64	8,1	5	7	10	44
65-74	6,6	0	4	9	85
75 +	18,6	5	12	21	48
Total	7,6	1	4	7	434
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	4,9	0	2	7	19
Ecole primaire	13,1	4	10	16	77
Secondaire inférieur	8,3	2	5	10	102
Secondaire supérieur	7,4	1	4	6	107
Supérieur	5,0	1	3	5	114
Total	7,7	1	5	7	419
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	9,5	4	8	14	33
20.000-30.000	7,1	1	4	7	105
30.000-40.000	8,2	2	5	8	123
40.000-60.000	8,0	1	4	7	123
>60.000	3,4	1	3	4	35
Total	7,6	1	4	7	419
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	6,3	1	4	6	142
Très mauvaise à moyenne	9,6	2	5	10	190
Total	8,1	2	5	7	332
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	7,6	2	5	10	164
Dans le passé	10,4	2	5	9	80
Modéré (<20)	9,0	2	6	7	50
Gros fumeur	8,4	1	4	14	44
Total	8,5	2	5	9	338

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO06RC)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	HOSPITALISATION DE JOUR		Total
	Oui	Non	N(*)
	%	%	
SEXE			
Homme	18,2	81,8	572
Femme	22,9	77,1	662
Total	20,8	79,2	1234
GROUPE AGE			
0-14	21,0	79,0	195
15-24	34,3	65,7	103
25-34	24,6	75,4	152
35-44	22,8	77,2	156
45-54	15,1	84,9	147
55-64	19,1	80,9	129
65-74	18,4	81,6	209
75 +	6,0	94,0	143
Total	20,8	79,2	1234
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	32,4	67,6	58
Ecole primaire	8,9	91,1	191
Secondaire inférieur	13,1	86,9	242
Secondaire supérieur	22,3	77,7	342
Supérieur	28,4	71,6	358
Total	20,7	79,3	1191
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	15,1	84,9	86
20.000-30.000	15,4	84,6	279
30.000-40.000	15,9	84,1	321
40.000-60.000	21,3	78,7	341
>60.000	37,2	62,8	151
Total	20,3	79,7	1178
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	28,1	71,9	500
Très mauvaise à moyenne	11,3	88,7	460
Total	21,1	78,9	960
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	18,1	81,9	416
Dans le passé	22,4	77,6	257
Modéré (<20)	21,4	78,6	160
Gros fumeur	15,7	84,3	132
Total	19,4	80,6	965
REGION DE RESIDENCE			
Région flamande	26,0	74,0	417
Région bruxelloise	14,0	86,0	383
Région wallonne	13,7	86,3	434
Belgique	20,8	79,2	1234

(*) N = Nombre total d'hospitalisations

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO06RC)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	HOSPITALISATION DE JOUR		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	23,3	76,7	191
Femme	28,1	71,9	226
Total	26,0	74,0	417
GROUPES AGE			
0-14	27,0	73,0	66
15-24	40,1	59,9	45
25-34	30,9	69,1	56
35-44	30,2	69,8	51
45-54	16,9	83,1	47
55-64	29,9	70,1	47
65-74	16,1	83,9	65
75 +	8,1	91,9	40
Total	26,0	74,0	417
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	39,9	60,1	14
Ecole primaire	9,2	90,8	65
Secondaire inférieur	18,6	81,4	81
Secondaire supérieur	24,4	75,6	137
Supérieur	38,5	61,5	110
Total	25,6	74,4	407
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	20,0	80,0	15
20.000-30.000	18,4	81,6	86
30.000-40.000	16,7	83,3	111
40.000-60.000	26,5	73,5	127
>60.000	45,6	54,4	55
Total	25,1	74,9	394
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	33,4	66,6	207
Très mauvaise à moyenne	11,2	88,8	127
Total	26,0	74,0	334
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	23,2	76,8	137
Dans le passé	29,0	71,0	96
Modéré (<20)	26,0	74,0	58
Gros fumeur	22,1	77,9	41
Total	25,1	74,9	332

(*) N = Nombre total d'hospitalisations

REGIO: 2 Région bruxelloise
 CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO06RC)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	HOSPITALISATION DE JOUR		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	17,4	82,6	186
Femme	11,1	88,9	197
Total	14,0	86,0	383
GROUPES AGE			
0-14	4,5	95,5	54
15-24	34,6	65,4	29
25-34	19,2	80,8	44
35-44	22,5	77,5	48
45-54	12,4	87,6	56
55-64	5,5	94,5	38
65-74	5,6	94,4	59
75 +	7,2	92,8	55
Total	14,0	86,0	383
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	4,7	95,3	25
Ecole primaire	11,7	88,3	49
Secondaire inférieur	4,9	95,1	59
Secondaire supérieur	15,4	84,6	98
Supérieur	21,4	78,6	134
Total	14,4	85,6	365
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	26,4	73,6	38
20.000-30.000	9,8	90,2	88
30.000-40.000	12,6	87,4	87
40.000-60.000	13,7	86,3	91
>60.000	18,5	81,5	61
Total	14,3	85,7	365
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	23,0	77,0	151
Très mauvaise à moyenne	6,8	93,2	143
Total	15,3	84,7	294
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	17,0	83,0	115
Dans le passé	9,8	90,2	81
Modéré (<20)	23,6	76,4	52
Gros fumeur	8,2	91,8	47
Total	14,9	85,1	295

(*) N = Nombre total d'hospitalisations

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO06RC)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	HOSPITALISATION DE JOUR		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	9,7	90,3	195
Femme	17,0	83,0	239
Total	13,7	86,3	434
GROUPES AGE			
0-14	15,2	84,8	75
15-24	18,3	81,7	29
25-34	14,7	85,3	52
35-44	9,2	90,8	57
45-54	12,0	88,0	44
55-64	6,6	93,4	44
65-74	25,5	74,5	85
75 +	3,2	96,8	48
Total	13,7	86,3	434
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	36,6	63,4	19
Ecole primaire	7,6	92,4	77
Secondaire inférieur	7,0	93,0	102
Secondaire supérieur	18,8	81,2	107
Supérieur	13,2	86,8	114
Total	13,7	86,3	419
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	7,8	92,2	33
20.000-30.000	12,7	87,3	105
30.000-40.000	15,7	84,3	123
40.000-60.000	12,7	87,3	123
>60.000	21,1	78,9	35
Total	13,7	86,3	419
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	15,2	84,8	142
Très mauvaise à moyenne	12,6	87,4	190
Total	13,7	86,3	332
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	11,1	88,9	164
Dans le passé	11,7	88,3	80
Modéré (<20)	11,7	88,3	50
Gros fumeur	7,0	93,0	44
Total	10,6	89,4	338

(*) N = Nombre total d'hospitalisations

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO07R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PLAINTES/MALADIES/INVESTIGATION PRINCIPALE POUR LAQUELLE LA PERSONNE A ETE HOSPITALISEE										Total N (*)
	Locomotion	Digestif	Genito-urinaire	Cardio-vasculaire	Respiratoire	Neurologique	Psychosociale	Endocrine/métabole	Dermatologique	Autre ou général	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE											
Homme	20,0	15,8	12,4	13,2	11,1	4,9	2,6	1,3	4,8	13,9	568
Femme	19,7	17,9	20,5	9,5	5,6	3,6	5,9	2,7	3,7	10,9	650
Total	19,9	16,9	16,9	11,2	8,1	4,2	4,4	2,0	4,2	12,2	1218
GROUPES AGE											
0-14	8,4	25,3	7,4	1,0	18,5	6,7	1,1	1,4	4,8	25,4	188
15-24	29,4	17,7	16,9	,5	6,2	3,6	2,4	2,3	5,5	15,6	95
25-34	15,4	23,0	30,7	3,9	8,4	4,3	1,5	,8	1,8	10,1	147
35-44	22,1	16,3	20,2	7,5	4,7	5,0	9,5	2,9	7,3	4,3	158
45-54	26,0	15,0	22,2	12,2	6,7	3,6	7,2	1,7	1,4	4,0	147
55-64	13,0	16,0	13,1	14,9	8,9	5,2	8,6	3,1	3,1	14,1	131
65-74	23,5	8,4	15,3	30,2	2,7	2,2	,9	2,4	5,5	8,9	209
75 +	26,0	10,3	3,2	23,2	8,0	,8	4,8	1,6	2,4	19,5	143
Total	19,9	16,9	16,9	11,2	8,1	4,2	4,4	2,0	4,2	12,2	1218
NIVEAU INSTRUCTION											
Pas de diplôme	16,1	9,2	4,1	24,6	17,0	5,4	6,9	7,2	2,2	7,4	56
Ecole primaire	14,7	10,9	13,0	14,4	7,3	6,1	8,6	1,8	7,4	15,9	197
Secondaire inférieur	20,6	19,7	15,7	16,9	6,9	,3	7,1	1,5	2,3	9,2	236
Secondaire supérieur	18,2	20,5	19,2	6,7	6,7	6,5	1,6	6,2	12,8	336	
Supérieur	24,0	15,5	18,8	8,5	9,7	2,5	2,0	2,2	2,8	13,8	350
Total	19,8	17,0	16,7	11,4	8,2	3,9	4,2	2,0	4,3	12,5	1175
REVENU EQUIVALENT (FB)											
< 20.000	11,4	11,5	13,7	23,5	8,8	1,8	11,6	,4	6,1	11,1	88
20.000-30.000	18,4	18,2	14,4	6,7	8,1	5,8	9,2	2,1	2,4	14,7	274
30.000-40.000	23,2	13,2	15,3	14,0	9,4	6,3	2,1	3,8	2,9	9,7	323
40.000-60.000	19,6	17,0	19,9	11,8	9,0	2,7	2,6	,8	4,0	12,5	336
>60.000	21,6	21,4	18,7	8,6	4,0	1,0	1,4	1,4	10,3	11,7	145
Total	19,9	16,7	16,9	11,3	8,2	4,1	4,5	1,9	4,3	12,2	1166
SANTE SUBJECTIVE											
Bonne à très bonne	25,0	19,6	22,1	7,9	6,1	2,2	1,3	,8	4,7	10,2	485
Très mauvaise à moyenne	21,3	10,0	13,7	21,1	7,7	3,5	7,2	3,8	1,8	9,9	458
Total	23,4	15,5	18,6	13,5	6,8	2,8	3,8	2,1	3,5	10,1	943
CONSOMMATION DE TABAC											
Jamais	23,3	20,0	18,4	12,0	5,4	2,3	1,3	1,3	5,8	10,3	405
Dans le passé	20,1	7,3	22,7	18,7	8,7	1,9	4,8	2,4	1,0	12,5	259
Modéré (<20)	24,0	18,8	21,3	8,7	10,5	3,0	1,9	2,3	2,2	7,1	158
Gros fumeur	23,6	12,9	12,5	7,3	2,9	5,9	16,5	3,3	6,8	8,3	132
Total	22,7	15,4	19,0	12,4	6,6	2,9	4,8	2,1	4,1	10,0	954
REGION DE RESIDENCE											
Région flamande	21,9	17,2	17,1	9,3	6,9	4,3	4,0	1,7	5,6	12,0	410
Région bruxelloise	17,2	19,0	18,4	6,9	10,4	4,5	5,5	3,9	3,0	11,2	377
Région wallonne	17,2	15,8	15,9	15,7	9,6	3,8	4,9	2,1	2,1	13,0	431
Belgique	19,9	16,9	16,9	11,2	8,1	4,2	4,4	2,0	4,2	12,2	1218

(*) Hospitalisation pour contrôle général ne pas inclus

(**) N = Nombre total d'hospitalisations mentionnées

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : H007R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	PLAINTES/MALADIES/INVESTIGATION PRINCIPALE POUR LAQUELLE LA PERSONNE A ETE HOSPITALISEE										Total
	Locomotion	Digestif	Genito-urinaire	Cardio-vasculaire	Respiratoire	Neurologique	Psychosociale	Endocrine/métabole	Dermatologique	Autre ou général	N (**)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE											
Homme	21,9	16,7	12,8	13,2	8,7	4,3	1,0	,5	6,1	14,7	190
Femme	21,8	17,6	20,5	6,2	5,4	4,4	6,3	2,6	5,3	9,8	220
Total	21,9	17,2	17,1	9,3	6,9	4,3	4,0	1,7	5,6	12,0	410
GROUPES AGE											
0-14	10,5	27,4	4,7	1,7	16,7	3,8	1,2	2,0	6,8	25,3	64
15-24	35,6	17,9	14,9	,7	4,6	4,3	,0	2,7	5,4	13,9	42
25-34	21,8	23,4	34,1	3,0	8,6	,0	,9	,0	,0	8,2	53
35-44	21,4	17,7	21,1	4,5	5,0	8,1	7,6	3,6	9,8	1,3	52
45-54	22,6	17,8	26,9	9,2	5,4	5,7	8,3	,0	2,3	1,8	45
55-64	18,6	9,7	6,5	20,4	4,1	8,9	6,1	1,6	4,9	19,3	49
65-74	23,7	7,8	15,7	25,7	2,8	1,9	1,6	,6	9,7	10,6	66
75 +	26,5	7,4	1,4	17,2	4,4	,0	8,4	3,8	2,0	28,9	39
Total	21,9	17,2	17,1	9,3	6,9	4,3	4,0	1,7	5,6	12,0	410
NIVEAU INSTRUCTION											
Pas de diplôme	27,3	1,9	,0	4,6	10,2	12,7	16,1	3,2	6,3	17,7	14
Ecole primaire	12,3	12,7	11,2	12,1	9,0	7,3	4,8	2,1	10,5	18,0	68
Secondaire inférieur	20,0	22,1	15,4	16,2	5,2	,0	8,2	1,9	3,1	7,9	77
Secondaire supérieur	20,3	20,1	21,5	7,6	4,5	7,3	,3	1,8	7,5	9,0	136
Supérieur	29,2	13,9	15,3	6,6	10,4	1,7	2,3	1,1	3,1	16,4	106
Total	21,8	17,3	16,5	9,6	7,0	4,4	3,5	1,7	5,8	12,3	401
REVENU EQUIVALENT (FB)											
< 20.000	11,3	7,5	5,2	26,4	6,7	,0	19,0	,0	8,5	15,5	15
20.000-30.000	26,1	19,6	12,4	8,4	3,3	3,5	8,7	2,2	2,2	13,5	85
30.000-40.000	18,7	13,1	20,6	12,5	10,0	9,3	,5	3,2	4,4	7,6	113
40.000-60.000	19,8	16,6	22,0	8,2	10,0	2,8	2,4	,0	4,8	13,4	125
>60.000	27,0	21,3	12,9	6,8	,9	1,5	2,2	1,1	15,7	10,6	50
Total	21,8	16,9	17,4	9,7	6,9	4,1	4,1	1,4	5,8	11,8	388
SANTE SUBJECTIVE											
Bonne à très bonne	27,9	19,6	23,1	6,1	4,1	2,7	1,3	,2	5,6	9,5	200
Très mauvaise à moyenne	22,1	7,1	11,7	20,9	8,5	3,7	8,8	4,4	1,8	11,0	126
Total	25,9	15,4	19,2	11,1	5,6	3,0	3,8	1,6	4,3	10,0	326
CONSOMMATION DE TABAC											
Jamais	26,0	18,8	17,2	9,9	5,1	1,7	1,4	,3	8,8	10,8	133
Dans le passé	22,3	5,1	22,7	22,1	7,0	2,4	3,4	1,7	,5	12,7	97
Modéré (<20)	28,4	19,8	22,7	5,1	6,3	4,0	,0	2,1	2,2	9,3	57
Gros fumeur	22,7	15,6	16,5	2,9	3,8	6,4	14,6	4,0	10,6	3,0	39
Total	24,9	14,6	19,6	11,4	5,6	3,0	3,8	1,6	5,6	9,9	326

(*) Hospitalisation pour contrôle général ne pas inclus

(**) N = Nombre total d'hospitalisations mentionnés

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO07R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	PLAINTES/MALADIES/INVESTIGATION PRINCIPALE POUR LAQUELLE LA PERSONNE A ETE HOSPITALISEE										Total
	Locomotion	Digestif	Genito-urinaire	Cardio-vasculaire	Respiratoire	Neurologique	Psychosociale	Endocrine/métabole	Dermatologique	Autre ou général	N (**)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE											
Homme	16,8	16,4	16,8	8,5	11,9	8,1	3,5	1,7	5,3	10,8	184
Femme	17,5	21,3	19,8	5,4	9,2	1,3	7,3	5,7	,9	11,5	193
Total	17,2	19,0	18,4	6,9	10,4	4,5	5,5	3,9	3,0	11,2	377
GROUPES AGE											
0-14	4,4	23,2	6,7	,0	28,3	18,5	4,7	1,5	,0	12,5	51
15-24	16,3	20,9	28,6	,0	2,3	6,9	2,8	,0	6,5	15,8	27
25-34	12,4	26,5	28,5	,0	5,8	,0	9,8	,0	7,1	9,9	43
35-44	19,9	20,7	21,0	10,3	1,5	2,1	12,3	3,6	5,0	3,6	49
45-54	29,0	17,0	15,7	5,6	10,1	1,4	3,4	7,9	,0	9,9	57
55-64	16,8	11,5	14,2	18,0	8,8	,0	5,8	4,2	6,3	14,5	37
65-74	17,3	5,4	28,0	15,5	9,2	3,2	,0	11,7	,4	9,3	60
75 +	16,6	25,4	4,0	10,0	16,3	3,5	6,6	,0	1,4	16,3	53
Total	17,2	19,0	18,4	6,9	10,4	4,5	5,5	3,9	3,0	11,2	377
NIVEAU INSTRUCTION											
Pas de diplôme	17,5	15,1	14,5	13,8	,0	2,0	8,0	21,7	,0	7,4	24
Ecole primaire	23,8	11,8	31,4	4,4	7,1	1,6	3,2	,0	6,9	9,7	50
Secondaire inférieur	20,8	6,9	24,1	8,6	19,5	,0	13,5	,6	,7	5,4	57
Secondaire supérieur	13,5	29,0	9,7	6,1	11,5	4,2	4,0	2,0	3,5	16,5	95
Supérieur	16,9	19,1	19,7	4,6	9,2	9,0	2,8	4,2	3,2	11,2	132
Total	17,7	18,2	19,1	6,4	10,5	4,7	5,4	3,8	3,1	11,1	358
REVENU EQUIVALENT (FB)											
< 20.000	7,7	11,8	19,3	12,4	7,2	2,7	2,3	2,3	18,6	15,7	41
20.000-30.000	12,3	13,7	20,1	6,2	18,6	6,9	9,1	1,3	2,6	9,3	86
30.000-40.000	26,5	16,0	9,8	3,2	11,6	4,8	10,6	6,9	,0	10,7	85
40.000-60.000	15,5	26,0	14,4	6,1	4,2	5,9	2,8	7,8	1,2	16,1	89
>60.000	21,5	26,3	29,1	7,9	8,4	,0	,0	,7	,0	6,1	59
Total	17,2	19,4	18,2	6,4	10,8	4,6	5,6	4,0	2,6	11,2	360
SANTE SUBJECTIVE											
Bonne à très bonne	20,4	22,6	21,1	6,9	6,5	1,6	3,1	3,7	5,5	8,7	147
Très mauvaise à moyenne	17,4	18,0	21,0	9,8	8,9	4,3	7,0	2,3	1,5	9,8	141
Total	19,0	20,4	21,1	8,3	7,7	2,9	4,9	3,0	3,5	9,2	288
CONSOMMATION DE TABAC											
Jamais	16,5	25,2	15,1	9,0	9,8	4,5	1,6	4,0	6,1	8,3	110
Dans le passé	17,5	13,1	36,0	11,4	8,8	,8	2,2	1,9	1,5	6,9	81
Modéré (<20)	21,4	21,8	19,1	6,5	11,0	2,8	5,9	,0	3,4	8,1	51
Gros fumeur	22,5	18,8	10,7	6,7	2,0	1,9	17,7	5,4	,0	14,4	49
Total	18,7	20,3	20,5	8,8	8,4	2,8	5,3	3,0	3,3	8,9	291

(*) Hospitalisation pour contrôle général ne pas inclus

(**) N = Nombre total d'hospitalisations mentionnées

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : H007R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	PLAINTES/MALADIES/INVESTIGATION PRINCIPALE POUR LAQUELLE LA PERSONNE A ETE HOSPITALISEE										Total
	Locomotion	Digestif	Genito-urinaire	Cardio-vasculaire	Respiratoire	Neurologique	Psychosociale	Endocrine/métabole	Dermatologique	Autre ou général	N (**)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE											
Homme	17,8	13,8	10,2	14,7	15,2	4,9	4,9	2,4	2,5	13,6	194
Femme	16,7	17,3	20,7	16,5	4,9	2,8	4,9	1,9	1,8	12,6	237
Total	17,2	15,8	15,9	15,7	9,6	3,8	4,9	2,1	2,1	13,0	431
GROUPES AGE											
0-14	5,8	22,4	12,1	,0	19,1	8,8	,0	,4	2,6	28,8	73
15-24	19,1	15,5	16,7	,0	12,4	,0	8,7	2,3	5,0	20,3	26
25-34	4,9	21,1	25,5	6,9	8,8	13,5	,0	2,6	3,2	13,6	51
35-44	24,0	12,8	18,5	12,4	4,8	,0	12,3	1,6	3,4	10,2	57
45-54	32,2	7,2	14,7	23,0	8,1	,0	6,8	2,1	,0	6,0	45
55-64	4,2	22,4	22,4	6,3	15,9	,8	12,9	5,1	,0	6,5	45
65-74	24,8	10,3	11,3	41,6	,7	2,5	,0	2,9	,0	5,9	83
75 +	29,5	7,0	4,7	35,2	8,2	,5	,4	,0	3,3	11,2	51
Total	17,2	15,8	15,9	15,7	9,6	3,8	4,9	2,1	2,1	13,0	431
NIVEAU INSTRUCTION											
Pas de diplôme	7,7	12,5	3,6	42,3	27,3	1,3	,0	5,3	,0	,0	18
Ecole primaire	15,8	8,0	10,8	20,3	4,8	5,4	15,5	2,0	3,0	14,4	79
Secondaire inférieur	21,2	18,9	14,5	19,5	6,7	,7	4,3	1,1	1,4	11,7	102
Secondaire supérieur	14,2	18,6	16,1	4,3	11,3	4,8	4,6	,8	3,1	22,4	105
Supérieur	17,7	16,7	24,7	13,3	8,8	1,5	1,2	3,3	2,2	10,5	112
Total	16,8	16,0	16,3	16,2	9,5	2,6	5,0	2,1	2,2	13,3	416
REVENU EQUIVALENT (FB)											
< 20.000	12,7	14,8	18,9	24,9	11,1	3,0	8,7	,0	,0	5,9	32
20.000-30.000	8,7	17,5	15,6	4,2	11,9	8,8	10,0	2,3	2,7	18,3	103
30.000-40.000	28,9	12,8	8,9	18,6	8,1	2,5	2,4	4,0	1,5	12,5	125
40.000-60.000	20,2	15,4	17,2	20,5	8,4	1,5	3,0	,7	3,4	9,8	122
>60.000	4,1	18,4	29,7	14,9	10,7	,0	,0	3,0	,0	19,2	36
Total	17,5	15,5	15,6	15,4	9,7	3,8	5,0	2,1	2,1	13,3	418
SANTE SUBJECTIVE											
Bonne à très bonne	18,7	18,6	20,0	13,3	11,3	1,1	,9	1,6	1,8	12,8	138
Très mauvaise à moyenne	21,6	11,0	13,9	24,3	6,5	3,1	5,4	3,6	1,9	8,7	191
Total	20,3	14,3	16,6	19,5	8,6	2,2	3,5	2,7	1,9	10,5	329
CONSOMMATION DE TABAC											
Jamais	21,2	20,5	20,8	15,8	4,6	2,7	1,0	2,0	1,4	10,0	162
Dans le passé	16,0	10,2	17,6	13,5	12,6	1,1	8,9	4,1	1,9	14,2	81
Modéré (<20)	16,5	15,7	19,5	16,4	18,4	1,2	4,2	3,6	1,8	2,6	50
Gros fumeur	25,3	6,6	6,5	14,8	1,7	6,4	19,3	1,5	2,8	15,0	44
Total	20,1	15,4	17,5	15,3	7,9	2,7	6,2	2,6	1,8	10,5	337

(*) Hospitalisation pour contrôle général ne pas inclus

(**) N = Nombre total d'hospitalisations mentionnées

CONSUMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO08S)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	OPERATION PENDANT L'HOSPITALISATION		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	57,7	42,3	589
Femme	49,2	50,8	682
Total	53,0	47,0	1271
GROUPES AGE			
0-14	40,6	59,4	196
15-24	49,3	50,7	104
25-34	69,7	30,3	154
35-44	45,4	54,6	161
45-54	51,5	48,5	152
55-64	51,9	48,1	137
65-74	69,3	30,7	217
75 +	42,3	57,7	150
Total	53,0	47,0	1271
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	42,5	57,5	60
Ecole primaire	49,2	50,8	203
Secondaire inférieur	54,3	45,7	248
Secondaire supérieur	46,9	53,1	346
Supérieur	62,8	37,2	369
Total	53,3	46,7	1226
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	43,1	56,9	88
20.000-30.000	41,9	58,1	288
30.000-40.000	52,5	47,5	334
40.000-60.000	62,0	38,0	346
>60.000	54,1	45,9	157
Total	52,4	47,6	1213
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	60,7	39,3	511
Très mauvaise à moyenne	51,6	48,4	476
Total	56,8	43,2	987
CONSUMMATION DE TABAC			
Jamais	57,7	42,3	424
Dans le passé	56,9	43,1	269
Modéré (<20)	52,2	47,8	164
Gros fumeur	57,3	42,7	136
Total	56,5	43,5	993
REGION DE RESIDENCE			
Région flamande	54,9	45,1	423
Région bruxelloise	50,6	49,4	396
Région wallonne	50,5	49,5	452
Belgique	53,0	47,0	1271

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO08S)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	OPERATION PENDANT L'HOSPITALISATION		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	64,1	35,9	195
Femme	47,5	52,5	228
Total	54,9	45,1	423
GROUPES AGE			
0-14	45,9	54,1	65
15-24	49,4	50,6	45
25-34	79,2	20,8	54
35-44	44,5	55,5	52
45-54	46,7	53,3	48
55-64	56,0	44,0	50
65-74	71,0	29,0	68
75 +	40,1	59,9	41
Total	54,9	45,1	423
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	34,1	65,9	14
Ecole primaire	53,1	46,9	68
Secondaire inférieur	54,7	45,3	81
Secondaire supérieur	48,5	51,5	138
Supérieur	66,1	33,9	112
Total	54,9	45,1	413
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	42,2	57,8	15
20.000-30.000	46,7	53,3	87
30.000-40.000	49,1	50,9	116
40.000-60.000	64,1	35,9	126
>60.000	52,6	47,4	56
Total	53,9	46,1	400
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	60,4	39,6	207
Très mauvaise à moyenne	50,1	49,9	131
Total	56,9	43,1	338
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	61,2	38,8	136
Dans le passé	54,2	45,8	100
Modéré (<20)	60,0	40,0	59
Gros fumeur	60,9	39,1	41
Total	59,0	41,0	336

REGIO: 2 Région bruxelloise
 CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO08S)
 Enquête de santé, Belgique, 1997

	OPERATION PENDANT L'HOSPITALISATION		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	50,7	49,3	194
Femme	50,5	49,5	202
Total	50,6	49,4	396
GROUPES AGE			
0-14	28,9	71,1	54
15-24	63,1	36,9	30
25-34	56,5	43,5	46
35-44	55,2	44,8	50
45-54	56,1	43,9	59
55-64	51,3	48,7	39
65-74	61,6	38,4	61
75 +	31,2	68,8	57
Total	50,6	49,4	396
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	39,8	60,2	27
Ecole primaire	64,9	35,1	53
Secondaire inférieur	47,2	52,8	59
Secondaire supérieur	39,9	60,1	98
Supérieur	57,1	42,9	140
Total	50,8	49,2	377
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	49,7	50,3	40
20.000-30.000	42,1	57,9	89
30.000-40.000	49,6	50,4	90
40.000-60.000	53,0	47,0	95
>60.000	61,8	38,2	63
Total	50,6	49,4	377
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	61,5	38,5	156
Très mauvaise à moyenne	50,2	49,8	149
Total	56,2	43,8	305
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	45,9	54,1	119
Dans le passé	71,0	29,0	85
Modéré (<20)	47,4	52,6	53
Gros fumeur	62,0	38,0	49
Total	55,4	44,6	306

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : HOSPITALISATION (INDICATEUR : HO08S)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	OPERATION PENDANT L'HOSPITALISATION		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	48,8	51,2	200
Femme	51,9	48,1	252
Total	50,5	49,5	452
GROUPES AGE			
0-14	35,1	64,9	77
15-24	42,5	57,5	29
25-34	57,6	42,4	54
35-44	44,8	55,2	59
45-54	61,5	38,5	45
55-64	46,0	54,0	48
65-74	68,5	31,5	88
75 +	49,8	50,2	52
Total	50,5	49,5	452
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	49,2	50,8	19
Ecole primaire	39,3	60,7	82
Secondaire inférieur	55,3	44,7	108
Secondaire supérieur	45,0	55,0	110
Supérieur	59,4	40,6	117
Total	51,2	48,8	436
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	41,7	58,3	33
20.000-30.000	34,9	65,1	112
30.000-40.000	58,0	42,0	128
40.000-60.000	60,0	40,0	125
>60.000	53,3	46,7	38
Total	50,4	49,6	436
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	61,1	38,9	148
Très mauvaise à moyenne	53,5	46,5	196
Total	56,8	43,2	344
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	55,6	44,4	169
Dans le passé	57,7	42,3	84
Modéré (<20)	38,9	61,1	52
Gros fumeur	50,1	49,9	46
Total	52,5	47,5	351