

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

SCORE-SF36 POUR LE FONCTIONNEMENT PHYSIQUE						
	Moyenne	5 ^e Percentile	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	N
SEXE						
Homme	92,5	50,0	95,0	100,0	100,0	4133
Femme	87,2	25,0	85,0	100,0	100,0	4410
Total	89,8	40,0	90,0	100,0	100,0	8543
GROUPES AGE						
15-24	98,0	90,0	100,0	100,0	100,0	1149
25-34	96,7	85,0	100,0	100,0	100,0	1638
35-44	93,9	65,0	95,0	100,0	100,0	1610
45-54	91,6	55,0	90,0	100,0	100,0	1294
55-64	85,9	45,0	80,0	95,0	100,0	1094
65-74	70,5	10,0	50,0	80,0	95,0	1076
75 +	53,6	,0	15,0	60,0	85,0	682
Total	89,8	40,0	90,0	100,0	100,0	8543
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	77,7	10,0	65,0	95,0	100,0	302
Primaire	77,4	5,0	60,0	95,0	100,0	1218
Secondaire inférieur	86,8	30,0	85,0	100,0	100,0	1449
Secondaire supérieur	92,6	50,0	95,0	100,0	100,0	2421
Supérieur	94,1	70,0	95,0	100,0	100,0	2800
Total	89,8	40,0	90,0	100,0	100,0	8190
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	86,8	20,0	90,0	100,0	100,0	635
20.000-30.000	86,4	20,0	85,0	100,0	100,0	1699
30.000-40.000	87,2	35,0	90,0	100,0	100,0	1984
40.000-60.000	91,9	50,0	95,0	100,0	100,0	2693
>60.000	95,0	70,0	95,0	100,0	100,0	1128
Total	89,8	40,0	90,0	100,0	100,0	8139
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	95,7	80,0	95,0	100,0	100,0	5907
Très mauvaise à moyenne	71,8	5,0	55,0	80,0	95,0	2026
Total	90,5	45,0	90,0	100,0	100,0	7933
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	90,3	45,0	95,0	100,0	100,0	3710
Dans le passé	88,9	40,0	90,0	100,0	100,0	1925
Modéré (< 20)	92,8	55,0	95,0	100,0	100,0	1572
Gros fumeur	89,8	45,0	90,0	100,0	100,0	837
Total	90,5	45,0	90,0	100,0	100,0	8044
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	91,5	50,0	95,0	100,0	100,0	2985
Région Bruxelloise	87,2	30,0	90,0	100,0	100,0	2558
Région Wallonne	87,6	25,0	90,0	100,0	100,0	3000
Belgique	89,8	40,0	90,0	100,0	100,0	8543

Personnes de 15 ans et plus

Score-SF36 : 0 - 100

un score bas signifie beaucoup d'incapacités physiques
un score de 100 signifie aucune incapacité physique dans

les différents domaines (10) physiques

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE(INDICATEUR : IL01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	SCORE-SF36 POUR LE FONCTIONNEMENT PHYSIQUE					N
	Moyenne	5è Percentile	25è Percentile	Médiane	75è Percentile	
SEXE						
Homme	93,9	60,0	95,0	100,0	100,0	1471
Femme	89,1	45,0	90,0	100,0	100,0	1514
Total	91,5	50,0	95,0	100,0	100,0	2985
GROUPES AGE						
15-24	97,9	90,0	100,0	100,0	100,0	430
25-34	97,7	90,0	100,0	100,0	100,0	590
35-44	95,3	75,0	95,0	100,0	100,0	533
45-54	92,3	60,0	90,0	100,0	100,0	468
55-64	88,1	45,0	85,0	95,0	100,0	406
65-74	74,1	5,0	60,0	85,0	95,0	363
75 +	57,8	,0	20,0	70,0	90,0	195
Total	91,5	50,0	95,0	100,0	100,0	2985
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	79,2	,0	65,0	95,0	100,0	61
Primaire	82,0	20,0	75,0	95,0	100,0	410
Secondaire inférieur	89,5	45,0	90,0	100,0	100,0	545
Secondaire supérieur	93,1	60,0	95,0	100,0	100,0	982
Supérieur	94,9	75,0	95,0	100,0	100,0	877
Total	91,4	50,0	95,0	100,0	100,0	2875
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	82,2	5,0	80,0	95,0	100,0	102
20.000-30.000	86,6	20,0	85,0	100,0	100,0	536
30.000-40.000	90,1	45,0	90,0	100,0	100,0	733
40.000-60.000	93,5	60,0	95,0	100,0	100,0	1046
>60.000	96,4	80,0	100,0	100,0	100,0	398
Total	91,5	50,0	95,0	100,0	100,0	2815
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	96,4	80,0	95,0	100,0	100,0	2278
Très mauvaise à moyenne	74,0	10,0	60,0	80,0	95,0	569
Total	92,3	55,0	95,0	100,0	100,0	2847
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	92,1	50,0	95,0	100,0	100,0	1375
Dans le passé	90,9	50,0	90,0	100,0	100,0	703
Modéré (< 20)	94,4	65,0	95,0	100,0	100,0	561
Gros fumeur	91,2	45,0	90,0	100,0	100,0	241
Total	92,2	55,0	95,0	100,0	100,0	2880

Personnes de 15 ans et plus

Score-SF36 : 0 - 100

un score bas signifie beaucoup d'incapacités physiques
 un score de 100 signifie aucune incapacité physique dans
 les différents domaines (10) physiques

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE(INDICATEUR : IL01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

SCORE-SF36 POUR LE FONCTIONNEMENT PHYSIQUE						
	Moyenne	5è Percentile	25è Percentile	Médiane	75è Percentile	N
SEXE						
Homme	89,6	35,0	95,0	100,0	100,0	1232
Femme	85,0	20,0	85,0	100,0	100,0	1326
Total	87,2	30,0	90,0	100,0	100,0	2558
GROUPES AGE						
15-24	97,0	85,0	100,0	100,0	100,0	314
25-34	95,9	80,0	100,0	100,0	100,0	495
35-44	93,1	55,0	95,0	100,0	100,0	488
45-54	86,7	30,0	90,0	100,0	100,0	385
55-64	84,1	30,0	75,0	95,0	100,0	314
65-74	71,4	5,0	50,0	85,0	95,0	324
75 +	55,3	,0	20,0	60,0	90,0	238
Total	87,2	30,0	90,0	100,0	100,0	2558
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	81,6	15,0	70,0	100,0	100,0	137
Primaire	78,5	5,0	65,0	95,0	100,0	330
Secondaire inférieur	82,7	10,0	75,0	100,0	100,0	364
Secondaire supérieur	88,1	35,0	90,0	100,0	100,0	582
Supérieur	92,8	50,0	95,0	100,0	100,0	1004
Total	87,6	30,0	90,0	100,0	100,0	2417
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	91,5	40,0	95,0	100,0	100,0	291
20.000-30.000	83,8	20,0	80,0	100,0	100,0	506
30.000-40.000	82,3	10,0	75,0	100,0	100,0	514
40.000-60.000	90,6	40,0	90,0	100,0	100,0	673
>60.000	90,3	45,0	90,0	100,0	100,0	441
Total	87,5	30,0	90,0	100,0	100,0	2425
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	94,7	70,0	95,0	100,0	100,0	1676
Très mauvaise à moyenne	67,7	5,0	45,0	80,0	100,0	624
Total	87,8	30,0	90,0	100,0	100,0	2300
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	87,1	25,0	90,0	100,0	100,0	1011
Dans le passé	86,1	30,0	85,0	100,0	100,0	562
Modéré (< 20)	89,5	35,0	90,0	100,0	100,0	460
Gros fumeur	89,3	35,0	90,0	100,0	100,0	279
Total	87,7	30,0	90,0	100,0	100,0	2312

Personnes de 15 ans et plus

Score-SF36 : 0 - 100

un score bas signifie beaucoup d'incapacités physiques
 un score de 100 signifie aucune incapacité physique dans
 les différents domaines (10) physiques

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE(INDICATEUR : IL01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

SCORE-SF36 POUR LE FONCTIONNEMENT PHYSIQUE						
	Moyenne	5è Percentile	25è Percentile	Médiane	75è Percentile	N
SEXE						
Homme	90,8	40,0	90,0	100,0	100,0	1430
Femme	84,4	15,0	80,0	100,0	100,0	1570
Total	87,6	25,0	90,0	100,0	100,0	3000
GROUPES AGE						
15-24	98,4	95,0	100,0	100,0	100,0	405
25-34	95,1	80,0	95,0	100,0	100,0	553
35-44	91,6	50,0	90,0	100,0	100,0	589
45-54	91,6	55,0	90,0	100,0	100,0	441
55-64	81,9	35,0	70,0	90,0	100,0	374
65-74	64,7	10,0	40,0	70,0	95,0	389
75 +	46,6	,0	10,0	50,0	75,0	249
Total	87,6	25,0	90,0	100,0	100,0	3000
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	73,5	10,0	50,0	85,0	100,0	104
Primaire	69,2	,0	45,0	80,0	100,0	478
Secondaire inférieur	83,0	20,0	80,0	95,0	100,0	540
Secondaire supérieur	92,6	55,0	95,0	100,0	100,0	857
Supérieur	93,2	65,0	95,0	100,0	100,0	919
Total	87,4	25,0	90,0	100,0	100,0	2898
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	87,5	20,0	90,0	100,0	100,0	242
20.000-30.000	87,1	25,0	85,0	100,0	100,0	657
30.000-40.000	83,9	15,0	80,0	100,0	100,0	737
40.000-60.000	88,9	30,0	90,0	100,0	100,0	974
>60.000	94,1	70,0	95,0	100,0	100,0	289
Total	87,6	25,0	90,0	100,0	100,0	2899
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	94,6	70,0	95,0	100,0	100,0	1953
Très mauvaise à moyenne	70,3	,0	50,0	80,0	95,0	833
Total	88,0	30,0	90,0	100,0	100,0	2786
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	88,1	30,0	90,0	100,0	100,0	1324
Dans le passé	85,8	20,0	85,0	100,0	100,0	660
Modéré (< 20)	91,2	35,0	95,0	100,0	100,0	551
Gros fumeur	87,9	35,0	90,0	100,0	100,0	317
Total	88,2	30,0	90,0	100,0	100,0	2852

Personnes de 15 ans et plus

Score-SF36 : 0 - 100

un score bas signifie beaucoup d'incapacités physiques
 un score de 100 signifie aucune incapacité physique dans
 les différents domaines (10) physiques

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL11_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	HANDICAP EN MOBILITE				Total
	Aucun	Confiné maison/ jardin	Confiné fauteuil	Confiné lit	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	97,6	1,5	,7	,2	3866
Femme	94,7	3,3	1,3	,6	4132
Total	96,2	2,4	1,0	,4	7998
GROUPES AGE					
15-24	99,7	,1	,0	,1	1115
25-34	99,2	,5	,2	,1	1582
35-44	98,4	,7	,3	,6	1536
45-54	97,8	1,6	,3	,3	1237
55-64	96,3	2,6	,8	,3	940
65-74	87,1	9,7	2,6	,5	951
75 +	70,1	16,4	11,9	1,6	637
Total	96,2	2,4	1,0	,4	7998
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	92,0	5,9	,7	1,4	287
Primaire	88,2	7,3	3,9	,5	1127
Secondaire inférieur	95,0	3,4	1,3	,3	1347
Secondaire supérieur	97,4	1,5	,5	,5	2264
Supérieur	98,7	,8	,4	,1	2636
Total	96,2	2,4	1,0	,4	7661
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	91,9	4,5	2,9	,7	597
20.000-30.000	94,3	4,0	1,5	,2	1570
30.000-40.000	95,7	2,4	,9	,9	1862
40.000-60.000	97,3	1,8	,7	,1	2526
>60.000	98,5	1,0	,3	,2	1067
Total	96,2	2,4	1,0	,4	7622
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	99,3	,5	,0	,1	5532
Très mauvaise à moyenne	87,2	8,1	4,1	,5	1897
Total	96,7	2,2	,9	,2	7429
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	96,3	2,4	1,1	,2	3487
Dans le passé	96,4	2,6	,9	,1	1787
Modéré (< 20)	97,8	1,3	,7	,1	1476
Gros fumeur	97,3	1,9	,7	,1	796
Total	96,8	2,2	,9	,2	7546
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	97,1	2,1	,5	,3	2783
Région Bruxelloise	93,9	3,3	2,2	,7	2390
Région Wallonne	95,4	2,7	1,5	,3	2825
Belgique	96,2	2,4	1,0	,4	7998

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL11_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	HANDICAP EN MOBILITE				Total
	Aucun	Confiné maison/ jardin	Confiné fauteuil	Confiné lit	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	98,4	1,3	,3	,0	1384
Femme	95,7	2,9	,7	,7	1399
Total	97,1	2,1	,5	,3	2783
GROUPES AGE					
15-24	99,6	,1	,0	,2	416
25-34	99,8	,2	,0	,0	568
35-44	98,6	,3	,0	1,0	508
45-54	98,5	1,3	,1	,0	441
55-64	97,9	2,1	,0	,0	347
65-74	89,2	8,2	2,4	,1	319
75 +	69,8	21,1	7,3	1,7	184
Total	97,1	2,1	,5	,3	2783
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	91,3	4,3	1,0	3,4	61
Primaire	91,9	5,8	2,3	,1	383
Secondaire inférieur	96,7	2,7	,6	,0	497
Secondaire supérieur	97,4	1,6	,3	,7	921
Supérieur	99,0	,9	,1	,0	818
Total	97,0	2,1	,5	,3	2680
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	85,4	11,8	,4	2,4	93
20.000-30.000	95,6	3,3	1,1	,0	486
30.000-40.000	96,7	1,6	,7	1,0	688
40.000-60.000	98,4	1,2	,3	,1	977
>60.000	98,6	1,2	,2	,0	379
Total	97,1	2,0	,5	,4	2623
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	99,7	,3	,0	,1	2134
Très mauvaise à moyenne	88,8	8,7	2,5	,0	524
Total	97,7	1,8	,5	,0	2658
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	97,3	1,9	,7	,1	1291
Dans le passé	98,0	1,6	,4	,0	655
Modéré (< 20)	98,5	1,4	,1	,0	521
Gros fumeur	98,3	1,7	,0	,0	223
Total	97,8	1,7	,5	,0	2690

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL11_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	HANDICAP EN MOBILITE				Total
	Aucun	Confiné maison/ jardin	Confiné fauteuil	Confiné lit	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	94,4	3,3	2,0	,3	1150
Femme	93,4	3,3	2,3	1,0	1240
Total	93,9	3,3	2,2	,7	2390
GROUPES AGE					
15-24	99,4	,6	,0	,0	304
25-34	98,5	,7	,0	,8	474
35-44	97,5	1,7	,4	,3	461
45-54	94,8	3,9	1,3	,0	366
55-64	91,3	3,7	5,0	,0	275
65-74	81,5	11,2	5,8	1,5	288
75 +	76,4	9,0	10,7	3,9	222
Total	93,9	3,3	2,2	,7	2390
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	93,6	5,8	,4	,1	131
Primaire	82,3	8,4	7,9	1,5	307
Secondaire inférieur	91,5	3,5	3,4	1,6	341
Secondaire supérieur	95,5	2,3	1,6	,6	528
Supérieur	98,2	,9	,6	,3	948
Total	94,2	3,0	2,1	,7	2255
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	96,0	1,9	2,0	,1	275
20.000-30.000	87,5	7,7	3,7	1,0	474
30.000-40.000	92,5	3,3	3,3	,9	479
40.000-60.000	96,0	2,2	1,2	,6	626
>60.000	98,4	,8	,2	,6	415
Total	93,8	3,4	2,1	,7	2269
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	99,3	,5	,1	,2	1560
Très mauvaise à moyenne	81,2	10,4	6,8	1,6	586
Total	94,6	3,1	1,8	,6	2146
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	94,7	2,7	1,9	,6	952
Dans le passé	91,7	6,0	1,8	,6	519
Modéré (< 20)	96,2	2,1	1,6	,1	430
Gros fumeur	94,3	2,3	2,5	,9	265
Total	94,3	3,2	1,9	,5	2166

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL11_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	HANDICAP EN MOBILITE				Total
	Aucun	Confiné maison/ jardin	Confiné fauteuil	Confiné lit	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	97,3	1,4	,8	,4	1332
Femme	93,5	4,0	2,2	,3	1493
Total	95,4	2,7	1,5	,3	2825
GROUPE AGE					
15-24	100,0	,0	,0	,0	395
25-34	98,3	1,0	,7	,0	540
35-44	98,2	1,1	,7	,0	567
45-54	97,3	1,6	,3	,8	430
55-64	94,5	3,4	,9	1,2	318
65-74	85,9	11,4	1,9	,8	344
75 +	67,2	13,3	19,3	,3	231
Total	95,4	2,7	1,5	,3	2825
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	91,6	7,7	,6	,0	95
Primaire	84,1	9,5	5,3	1,0	437
Secondaire inférieur	93,0	4,5	2,0	,5	509
Secondaire supérieur	98,0	1,2	,8	,0	815
Supérieur	98,5	,5	,8	,2	870
Total	95,3	2,8	1,6	,3	2726
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	93,9	1,1	5,1	,0	229
20.000-30.000	94,6	3,7	1,4	,3	610
30.000-40.000	95,0	3,4	,8	,7	695
40.000-60.000	95,6	2,8	1,6	,1	923
>60.000	98,2	,4	,7	,7	273
Total	95,3	2,8	1,5	,3	2730
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	98,7	1,1	,1	,1	1838
Très mauvaise à moyenne	87,2	6,7	5,3	,8	787
Total	95,6	2,6	1,5	,3	2625
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	95,0	3,1	1,5	,3	1244
Dans le passé	94,9	3,6	1,4	,1	613
Modéré (< 20)	97,3	1,0	1,4	,4	525
Gros fumeur	97,0	2,0	1,0	,0	308
Total	95,7	2,7	1,4	,2	2690

Personnes de 15 ans et plus

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITES			Total
	Pas d'incapacité s'	Incapacité modéré	Incapacité sévère	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	84,8	12,2	3,0	3749
Femme	79,4	14,5	6,1	4022
Total	82,1	13,4	4,5	7771
GROUPE AGE				
15-24	94,0	5,1	,9	1059
25-34	93,2	5,4	1,5	1521
35-44	88,9	8,3	2,8	1484
45-54	83,9	13,4	2,7	1196
55-64	71,2	24,7	4,0	921
65-74	55,0	31,4	13,6	954
75 +	30,6	40,4	29,0	636
Total	82,1	13,4	4,5	7771
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	59,3	25,6	15,1	279
Primaire	63,0	26,7	10,3	1092
Secondaire inférieur	76,5	16,5	7,0	1313
Secondaire supérieur	86,5	10,7	2,9	2202
Supérieur	89,0	8,9	2,1	2554
Total	81,9	13,5	4,6	7440
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	78,7	13,1	8,2	583
20.000-30.000	74,6	19,0	6,4	1532
30.000-40.000	78,1	16,0	5,9	1819
40.000-60.000	85,9	10,9	3,2	2445
>60.000	91,0	7,7	1,3	1030
Total	82,1	13,4	4,5	7409
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	90,6	8,0	1,4	5340
Très mauvaise à moyenne	57,7	29,5	12,8	1882
Total	83,3	12,7	4,0	7222
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	84,2	11,1	4,7	3377
Dans le passé	79,8	16,0	4,2	1747
Modéré (< 20)	84,7	12,8	2,5	1428
Gros fumeur	82,9	15,1	2,0	776
Total	83,2	13,0	3,9	7328
REGION DE RESIDENCE				
Région Flamande	83,8	13,1	3,2	2701
Région Bruxelloise	78,5	14,5	7,0	2318
Région Wallonne	80,2	13,6	6,2	2752
Belgique	82,1	13,4	4,5	7771

Personnes de 15 ans et plus

O.M.S.-score pour des incapacités : sur base de 10 fonctions physiques comme marcher, se lever et se coucher (lit), s'asseoir et se lever (fauteuil), s'habiller et se déshabiller, se laver les mains et le visage, manger et couper la nourriture, aller aux toilettes, continence urinaire, trouble de l'audition et de la vue

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITES			Total
	Pas d'incapacités	Incapacité modérée	Incapacité sévère	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	86,0	11,6	2,4	1341
Femme	81,5	14,5	4,0	1360
Total	83,8	13,1	3,2	2701
GROUPES AGE				
15-24	93,3	6,0	,7	401
25-34	94,3	4,8	,9	551
35-44	91,6	6,5	1,9	487
45-54	84,3	13,9	1,8	425
55-64	72,5	24,0	3,5	336
65-74	56,0	33,7	10,2	318
75 +	33,2	43,8	23,0	183
Total	83,8	13,1	3,2	2701
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	65,9	23,9	10,3	57
Primaire	65,8	27,6	6,6	367
Secondaire inférieur	77,6	16,5	5,9	490
Secondaire supérieur	87,5	10,5	2,0	896
Supérieur	89,7	8,7	1,5	788
Total	83,5	13,3	3,2	2598
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	73,4	17,0	9,6	94
20.000-30.000	73,9	21,3	4,9	481
30.000-40.000	80,9	15,4	3,7	671
40.000-60.000	86,9	10,5	2,6	944
>60.000	93,0	6,6	,4	359
Total	83,7	13,2	3,2	2549
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	91,1	7,8	1,2	2056
Très mauvaise à moyenne	59,0	31,2	9,8	520
Total	85,2	12,1	2,7	2576
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	86,6	10,2	3,2	1243
Dans le passé	80,5	15,8	3,7	639
Modéré (< 20)	86,1	13,0	,9	510
Gros fumeur	85,8	13,6	,6	215
Totaal	85,0	12,4	2,6	2607

Personnes de 15 ans et plus

O.M.S.-score pour des incapacités : sur base de 10 fonctions physiques comme marcher, se lever et se coucher (lit), s'asseoir et se lever (fauteuil), s'habiller et se déshabiller, se laver les mains et le visage, manger et couper la nourriture, aller aux toilettes, continence urinaire, trouble de l'audition et de la vue

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITES			Total
	Pas d'incapacités	Incapacité modérée	Incapacité sévère	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	80,3	14,4	5,3	1100
Femme	76,9	14,5	8,6	1218
Total	78,5	14,5	7,0	2318
GROUPE AGE				
15-24	91,1	7,9	1,0	281
25-34	91,7	5,7	2,6	452
35-44	88,2	8,4	3,4	447
45-54	79,0	14,8	6,2	355
55-64	73,3	21,2	5,5	270
65-74	57,6	29,1	13,3	288
75 +	30,0	36,3	33,8	225
Total	78,5	14,5	7,0	2318
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	73,1	20,1	6,8	129
Primaire	65,0	21,1	13,9	297
Secondaire inférieur	71,2	18,0	10,8	326
Secondaire supérieur	78,3	14,1	7,6	514
Supérieur	87,3	9,4	3,3	922
Total	78,9	14,1	7,0	2188
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	86,1	8,4	5,5	266
20.000-30.000	67,6	21,5	10,9	459
30.000-40.000	75,8	15,2	9,0	461
40.000-60.000	84,3	10,4	5,3	605
>60.000	84,9	11,9	3,2	409
Total	79,1	13,9	6,9	2200
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	88,9	8,9	2,3	1507
Très mauvaise à moyenne	51,1	32,8	16,1	580
Total	78,9	15,2	5,9	2087
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	78,6	14,1	7,3	923
Dans le passé	76,4	17,7	5,9	511
Modéré (< 20)	78,1	17,1	4,8	410
Gros fumeur	83,5	11,1	5,3	257
Totaal	78,6	15,1	6,2	2101

Personnes de 15 ans et plus

O.M.S.-score pour des incapacités : sur base de 10 fonctions physiques comme marcher, se lever et se coucher (lit), s'asseoir et se lever (fauteuil), s'habiller et se déshabiller, se laver les mains et le visage, manger et couper la nourriture, aller aux toilettes, continence urinaire, trouble de l'audition et de la vue

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITES			Total
	Pas d'incapacité s'	Incapacité modéré	Incapacité sévère	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	84,0	12,7	3,3	1308
Femme	76,5	14,5	9,0	1444
Total	80,2	13,6	6,2	2752
GROUPES AGE				
15-24	96,2	2,7	1,1	377
25-34	91,3	6,4	2,2	518
35-44	84,4	11,2	4,3	550
45-54	84,6	12,1	3,3	416
55-64	67,7	27,6	4,7	315
65-74	52,8	28,8	18,4	348
75 +	26,9	37,6	35,5	228
Total	80,2	13,6	6,2	2752
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	42,9	31,2	25,9	93
Primaire	57,9	27,1	15,0	428
Secondaire inférieur	75,9	16,2	7,9	497
Secondaire supérieur	86,4	10,1	3,6	792
Supérieur	88,6	8,9	2,6	844
Total	80,0	13,7	6,3	2654
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	78,2	13,0	8,7	223
20.000-30.000	78,0	14,8	7,2	592
30.000-40.000	74,5	17,1	8,5	687
40.000-60.000	84,3	11,9	3,8	896
>60.000	88,8	8,4	2,8	262
Total	80,3	13,7	6,1	2660
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	90,1	8,2	1,8	1777
Très mauvaise à moyenne	58,1	26,3	15,6	782
Total	81,3	13,1	5,5	2559
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	81,5	11,8	6,7	1211
Dans le passé	79,5	15,8	4,6	597
Modéré (< 20)	84,3	11,1	4,6	508
Gros fumeur	79,0	18,3	2,8	304
Totaal	81,3	13,4	5,3	2620

Personnes de 15 ans et plus

O.M.S.-score pour des incapacités : sur base de 10 fonctions physiques comme marcher, se lever et se coucher (lit), s'asseoir et se lever (fauteuil), s'habiller et se déshabiller, se laver les mains et le visage, manger et couper la nourriture, aller aux toilettes, continence urinaire, trouble de l'audition et de la vue

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : i114_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE FONCTIONS AVEC DES INCAPACITES*					
	Moyenne	25è Percentile	Médiane	75è Percentile	N

SEXE					
Homme	1,9	1,0	1,0	2,0	643
Femme	2,4	1,0	1,0	3,0	916
Total	2,2	1,0	1,0	2,0	1559
GROUPE AGE					
15-24	1,4	1,0	1,0	1,0	50
25-34	1,7	1,0	1,0	1,0	95
35-44	1,8	1,0	1,0	2,0	162
45-54	1,5	1,0	1,0	2,0	201
55-64	1,8	1,0	1,0	2,0	235
65-74	2,3	1,0	1,0	3,0	404
75 +	3,5	1,0	2,0	6,0	412
Total	2,2	1,0	1,0	2,0	1559
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	2,5	1,0	2,0	3,0	101
Primaire	2,6	1,0	2,0	3,0	444
Secondaire inférieur	2,1	1,0	1,0	3,0	340
Secondaire supérieur	2,1	1,0	1,0	2,0	313
Supérieur	1,7	1,0	1,0	2,0	300
Total	2,2	1,0	1,0	2,0	1498
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	3,1	1,0	1,0	5,0	125
20.000-30.000	2,3	1,0	1,0	3,0	413
30.000-40.000	2,3	1,0	1,0	3,0	437
40.000-60.000	1,8	1,0	1,0	2,0	386
>60.000	1,7	1,0	1,0	2,0	114
Total	2,2	1,0	1,0	2,0	1475
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,4	1,0	1,0	1,0	539
Très mauvaise à moyenne	2,5	1,0	1,0	3,0	855
Total	2,0	1,0	1,0	2,0	1394
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	2,2	1,0	1,0	2,0	664
Dans le passé	2,0	1,0	1,0	2,0	413
Modéré (< 20)	1,7	1,0	1,0	2,0	235
Gros fumeur	1,7	1,0	1,0	2,0	123
Total	2,0	1,0	1,0	2,0	1435
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	2,0	1,0	1,0	2,0	461
Région Bruxelloise	2,3	1,0	1,0	3,0	495
Région Wallonne	2,4	1,0	1,0	3,0	603
Belgique	2,2	1,0	1,0	2,0	1559

Personnes de 15 ans et plus

* Seulement les personnes avec une incapacité en matière d'au moins une fonction

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	NOMBRE DE FONCTIONS AVEC DES INCAPACITES*				N
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	
SEXE					
Homme	1,7	1,0	1,0	2,0	196
Femme	2,2	1,0	1,0	2,0	265
Total	2,0	1,0	1,0	2,0	461
GROUPES AGE					
15-24	1,4	1,0	1,0	1,0	22
25-34	1,3	1,0	1,0	1,0	26
35-44	2,1	1,0	1,0	2,0	40
45-54	1,3	1,0	1,0	2,0	58
55-64	1,5	1,0	1,0	2,0	84
65-74	2,3	1,0	1,0	3,0	115
75 +	3,3	1,0	2,0	6,0	116
Total	2,0	1,0	1,0	2,0	461
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	3,1	1,0	2,0	4,0	22
Primaire	2,3	1,0	2,0	3,0	139
Secondaire inférieur	1,8	1,0	1,0	2,0	114
Secondaire supérieur	2,2	1,0	1,0	2,0	101
Supérieur	1,6	1,0	1,0	1,0	73
Total	2,0	1,0	1,0	2,0	449
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	3,2	1,0	2,0	5,0	25
20.000-30.000	2,2	1,0	1,0	2,0	132
30.000-40.000	2,1	1,0	1,0	2,0	133
40.000-60.000	1,6	1,0	1,0	2,0	122
>60.000	1,6	1,0	1,0	2,0	27
Total	2,0	1,0	1,0	2,0	439
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,3	1,0	1,0	1,0	192
Très mauvaise à moyenne	2,3	1,0	1,0	3,0	229
Total	1,8	1,0	1,0	2,0	421
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	2,0	1,0	1,0	2,0	198
Dans le passé	1,7	1,0	1,0	2,0	140
Modéré (< 20)	1,5	1,0	1,0	2,0	63
Gros fumeur	1,6	1,0	1,0	2,0	26
Total	1,8	1,0	1,0	2,0	427

Personnes de 15 ans et plus

* Seulement les personnes avec une incapacité en matière d'au moins une fonction

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	NOMBRE DE FONCTIONS AVEC DES INCAPACITES*				N
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	
SEXE					
Homme	2,2	1,0	1,0	3,0	208
Femme	2,3	1,0	1,0	3,0	287
Total	2,3	1,0	1,0	3,0	495
GROUPES AGE					
15-24	1,3	1,0	1,0	1,0	15
25-34	1,9	1,0	1,0	2,0	31
35-44	2,0	1,0	1,0	3,0	46
45-54	1,8	1,0	1,0	3,0	70
55-64	1,6	1,0	1,0	1,0	65
65-74	2,5	1,0	1,0	3,0	122
75 +	3,2	1,0	2,0	5,0	146
Total	2,3	1,0	1,0	3,0	495
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	1,9	1,0	1,0	3,0	33
Primaire	2,9	1,0	2,0	4,0	106
Secondaire inférieur	2,6	1,0	1,0	4,0	101
Secondaire supérieur	2,1	1,0	1,0	2,0	98
Supérieur	1,7	1,0	1,0	2,0	123
Total	2,3	1,0	1,0	3,0	461
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	2,7	1,0	2,0	4,0	49
20.000-30.000	2,1	1,0	1,0	2,0	128
30.000-40.000	2,9	1,0	2,0	4,0	124
40.000-60.000	2,0	1,0	1,0	2,0	100
>60.000	1,6	1,0	1,0	1,0	57
Total	2,3	1,0	1,0	3,0	458
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,3	1,0	1,0	1,0	157
Très mauvaise à moyenne	2,5	1,0	1,0	4,0	276
Total	2,0	1,0	1,0	2,0	433
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	2,2	1,0	1,0	3,0	197
Dans le passé	2,2	1,0	1,0	2,0	123
Modéré (< 20)	1,9	1,0	1,0	2,0	83
Gros fumeur	2,1	1,0	1,0	3,0	46
Total	2,1	1,0	1,0	3,0	449

Personnes de 15 ans et plus

* Seulement les personnes avec une incapacité en matière d'au moins une fonction

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	NOMBRE DE FONCTIONS AVEC DES INCAPACITES*				N
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	
SEXE					
Homme	2,0	1,0	1,0	2,0	239
Femme	2,6	1,0	2,0	3,0	364
Total	2,4	1,0	1,0	3,0	603
GROUPES AGE					
15-24	1,7	1,0	1,0	1,0	13
25-34	2,1	1,0	1,0	2,0	38
35-44	1,6	1,0	1,0	2,0	76
45-54	1,6	1,0	1,0	1,0	73
55-64	2,3	1,0	2,0	3,0	86
65-74	2,4	1,0	2,0	3,0	167
75 +	3,9	1,0	3,0	6,0	150
Total	2,4	1,0	1,0	3,0	603
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	2,2	1,0	2,0	2,0	46
Primaire	3,0	1,0	2,0	4,0	199
Secondaire inférieur	2,5	1,0	1,0	3,0	125
Secondaire supérieur	1,9	1,0	1,0	2,0	114
Supérieur	1,8	1,0	1,0	2,0	104
Total	2,4	1,0	1,0	3,0	588
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	3,1	1,0	1,0	5,0	51
20.000-30.000	2,5	1,0	2,0	3,0	153
30.000-40.000	2,4	1,0	1,0	3,0	180
40.000-60.000	1,9	1,0	1,0	2,0	164
>60.000	2,1	1,0	1,0	3,0	30
Total	2,4	1,0	1,0	3,0	578
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,6	1,0	1,0	1,0	190
Très mauvaise à moyenne	2,7	1,0	2,0	4,0	350
Total	2,3	1,0	1,0	3,0	540
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	2,5	1,0	1,0	3,0	269
Dans le passé	2,4	1,0	1,0	3,0	150
Modéré (< 20)	1,8	1,0	1,0	2,0	89
Gros fumeur	1,7	1,0	1,0	2,0	51
Total	2,3	1,0	1,0	3,0	559

Personnes de 15 ans et plus

* Seulement les personnes avec une incapacité en matière d'au moins une fonction

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PAS D'INCA- PACITE	INCA- PACITE MODEREE	INCA- PACITE SEVERE	TOTAL
Homme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
AUDITION	93,0	6,6	,4	3981
MOBILITE	95,7	3,3	1,0	3857
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	96,7	2,7	,6	3860
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	97,2	2,1	,6	3861
VUE	97,4	2,3	,3	4005
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	97,5	2,0	,4	3857
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	98,8	,9	,3	3860
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	98,8	,9	,3	3860
CONTINENCE URINAIRE	98,9	,4	,7	3845
ALLER AUX TOILETTES	99,0	,7	,3	3860
Femme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	92,3	5,5	2,2	4123
AUDITION	93,5	5,5	1,0	4277
VUE	94,2	4,8	,9	4281
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	94,3	4,4	1,3	4132
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	95,1	3,9	1,1	4132
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	95,3	3,2	1,5	4131
CONTINENCE URINAIRE	96,8	1,2	2,0	4114
ALLER AUX TOILETTES	97,7	1,5	,9	4129
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	98,0	1,2	,9	4129
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	98,0	1,2	,8	4130
Total				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
AUDITION	93,3	6,1	,7	8258
MOBILITE	94,0	4,4	1,6	7980
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	95,8	3,2	1,0	7993
VUE	95,8	3,6	,6	8286
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	96,0	2,9	1,0	7991
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	96,3	2,9	,8	7989
CONTINENCE URINAIRE	97,9	,8	1,4	7959
ALLER AUX TOILETTES	98,3	1,1	,6	7989
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	98,4	1,0	,6	7989
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	98,4	1,0	,6	7990

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 1 RÉGION FLAMANDE

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PAS D'INCA- PACITE	INCA- PACITE MODEREE	INCA- PACITE SEVERE	TOTAL
Homme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
AUDITION	93,2	6,5	,3	1416
MOBILITE	96,6	2,7	,8	1382
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	96,7	2,8	,4	1384
VUE	97,8	1,9	,3	1431
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	97,9	1,4	,7	1383
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL	98,1	1,4	,5	1383
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	98,8	,9	,3	1384
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	99,0	,9	,2	1384
ALLER AUX TOILETTES	99,4	,5	,1	1384
CONTINENCE URINAIRE	99,5	,3	,3	1377
Femme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
AUDITION	93,7	5,8	,5	1470
MOBILITE	94,3	4,4	1,3	1396
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	95,0	3,7	1,3	1401
VUE	95,9	3,8	,2	1469
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	95,9	2,4	1,6	1399
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL	96,1	3,1	,9	1400
CONTINENCE URINAIRE	97,7	,8	1,4	1391
ALLER AUX TOILETTES	97,8	1,4	,8	1398
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	97,9	1,1	,9	1398
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	98,1	1,1	,7	1398
Total				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
AUDITION	93,4	6,2	,4	2886
MOBILITE	95,5	3,5	1,0	2778
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	96,3	2,6	1,0	2783
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	96,5	2,5	1,0	2784
VUE	96,9	2,9	,3	2900
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL	97,1	2,2	,7	2783
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	98,4	1,0	,6	2782
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	98,6	1,0	,5	2782
CONTINENCE URINAIRE	98,6	,5	,8	2768
ALLER AUX TOILETTES	98,6	,9	,4	2782

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 2 RÉGION BRUXELLOISE

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PAS D'INCA- PACITE	INCA- PACITE MODEREE	INCA- PACITE SEVERE	TOTAL
Homme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	92,3	5,6	2,2	1148
AUDITION	93,3	5,8	,9	1170
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	95,1	4,2	,8	1148
VUE	95,4	3,6	1,0	1175
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	95,6	3,5	,9	1144
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	96,0	3,1	,9	1146
CONTINENCE URINAIRE	97,6	,9	1,5	1140
ALLER AUX TOILETTES	97,7	1,9	,3	1146
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	98,6	1,0	,4	1146
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	99,1	,7	,3	1146
Femme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	91,8	5,5	2,7	1240
AUDITION	92,0	6,0	2,0	1286
VUE	92,2	5,6	2,2	1288
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	94,2	5,2	,6	1239
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	94,3	5,0	,7	1240
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	95,3	3,9	,7	1240
CONTINENCE URINAIRE	95,8	1,2	3,0	1239
ALLER AUX TOILETTES	98,0	1,4	,6	1239
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	98,3	1,2	,5	1239
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	98,4	,9	,7	1240
Total				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	92,1	5,5	2,4	2388
AUDITION	92,6	5,9	1,5	2456
VUE	93,7	4,7	1,6	2463
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	94,6	4,7	,7	2387
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	95,0	4,2	,8	2384
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	95,7	3,5	,8	2386
CONTINENCE URINAIRE	96,6	1,1	2,3	2379
ALLER AUX TOILETTES	97,9	1,7	,5	2385
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	98,5	1,0	,6	2386
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	98,6	1,0	,4	2385

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 3 RÉGION WALLONE

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PAS D'INCA- PACITE	INCA- PACITE MODEREE	INCA- PACITE SEVERE	TOTAL
Homme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
AUDITION	92,6	7,0	,4	1395
MOBILITE	95,2	3,6	1,2	1327
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	96,7	2,8	,5	1330
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	96,9	2,3	,8	1330
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	97,1	2,6	,2	1330
VUE	97,2	2,6	,2	1399
CONTINENCE URINAIRE	98,4	,5	1,1	1328
ALLER AUX TOILETTES	98,5	,8	,6	1330
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	98,6	,9	,5	1330
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	98,8	,7	,4	1330
Femme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	89,0	7,5	3,5	1487
VUE	92,0	6,3	1,8	1524
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	93,2	5,2	1,6	1492
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	93,5	4,9	1,5	1492
AUDITION	93,8	4,9	1,4	1521
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	94,3	4,2	1,5	1492
CONTINENCE URINAIRE	95,5	1,7	2,8	1484
ALLER AUX TOILETTES	97,3	1,7	1,1	1492
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	97,5	1,3	1,2	1492
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	98,1	1,4	,5	1492
Total				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	92,1	5,5	2,4	2814
AUDITION	93,2	5,9	,9	2916
VUE	94,6	4,5	1,0	2923
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	94,9	4,0	1,0	2822
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	95,3	3,8	,9	2822
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	95,6	3,3	1,2	2822
CONTINENCE URINAIRE	96,9	1,1	2,0	2812
ALLER AUX TOILETTES	97,9	1,2	,9	2822
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	98,0	1,1	,9	2822
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	98,5	1,1	,5	2822

Personnes de 15 ans et plus

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PAS D'INCA- PACITE	INCA- PACITE MODEREE	INCA- PACITE SEVERE	TOTAL
Homme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
AUDITION	79,7	19,2	1,1	744
MOBILITE	80,7	13,1	6,2	653
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	84,0	12,0	4,0	655
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	84,9	10,7	4,3	655
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	87,2	9,9	3,0	654
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	92,0	6,4	1,7	655
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	92,8	6,2	1,0	655
CONTINENCE URINAIRE	94,0	1,7	4,3	647
ALLER AUX TOILETTES	94,7	3,9	1,4	655
VUE	95,4	3,9	,7	747
Femme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	67,5	21,9	10,7	925
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	78,7	16,9	4,4	931
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	79,3	15,1	5,6	931
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	80,2	13,4	6,4	930
AUDITION	80,4	16,6	3,0	987
VUE	86,5	10,1	3,4	987
CONTINENCE URINAIRE	87,7	4,9	7,4	927
ALLER AUX TOILETTES	89,5	7,4	3,1	931
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	90,5	6,6	2,9	931
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	90,8	6,1	3,1	931
Total				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	72,8	18,3	8,9	1578
AUDITION	80,1	17,6	2,3	1731
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	81,5	13,3	5,1	1586
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	81,7	12,8	5,5	1585
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	82,1	14,1	3,8	1585
VUE	90,1	7,6	2,3	1734
CONTINENCE URINAIRE	90,3	3,6	6,2	1574
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	91,2	6,2	2,5	1586
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	91,4	6,4	2,1	1586
ALLER AUX TOILETTES	91,6	6,0	2,4	1586

Personnes de 65 ans et plus

REGIO: 1 RÉGION FLAMANDE

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PAS D'INCA- PACITE	INCA- PACITE MODEREE	INCA- PACITE SEVERE	TOTAL
Homme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
AUDITION	77,9	21,1	,9	243
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	80,2	15,6	4,2	216
MOBILITE	83,6	11,1	5,4	215
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	84,7	9,3	6,0	215
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	87,4	8,6	4,0	216
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	89,6	8,5	1,9	216
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	90,2	8,4	1,4	216
ALLER AUX TOILETTES	95,1	3,9	1,0	216
VUE	96,4	3,2	,4	244
CONTINENCE URINAIRE	97,1	1,5	1,4	212
Femme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	71,0	20,9	8,1	286
AUDITION	79,9	17,9	2,2	306
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	80,7	12,8	6,5	288
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	83,0	12,2	4,8	288
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	83,7	13,8	2,5	288
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	89,2	7,9	2,9	288
ALLER AUX TOILETTES	89,7	8,4	1,9	288
CONTINENCE URINAIRE	90,0	4,0	6,0	287
VUE	91,5	8,1	,4	306
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	91,5	6,8	1,7	288
Total				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	76,2	16,9	7,0	501
AUDITION	79,1	19,2	1,7	549
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	80,5	14,0	5,6	504
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	83,7	11,0	5,3	503
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE				
LEVER D'UN FAUTEUIL	85,2	11,6	3,1	504
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	89,6	8,1	2,3	504
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	90,7	7,5	1,8	504
ALLER AUX TOILETTES	91,9	6,6	1,5	504
CONTINENCE URINAIRE	92,9	3,0	4,1	499
VUE	93,5	6,1	,4	550

Personnes de 65 ans et plus

REGIO: 2 RÉGION BRUXELLOISE

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PAS D'INCA- PACITE	INCA- PACITE MODEREE	INCA- PACITE SEVERE	TOTAL
Homme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	65,0	27,0	7,9	216
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	84,0	11,4	4,6	216
AUDITION	85,0	13,1	1,9	243
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	85,4	10,0	4,7	215
ALLER AUX TOILETTES	86,5	12,0	1,5	215
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL	86,9	9,6	3,5	214
CONTINENCE URINAIRE	88,6	2,7	8,7	213
VUE	89,6	8,2	2,3	244
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	91,7	6,7	1,7	215
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	95,2	3,6	1,1	215
Femme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	71,8	16,5	11,7	293
AUDITION	77,9	15,9	6,2	314
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	82,0	15,1	2,9	293
VUE	82,3	11,7	6,0	313
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL	83,0	14,7	2,3	293
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	83,2	13,9	3,0	292
CONTINENCE URINAIRE	85,7	4,9	9,4	292
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	92,5	5,1	2,4	293
ALLER AUX TOILETTES	92,6	5,2	2,3	293
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	93,0	3,4	3,6	293
Total				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	69,3	20,4	10,3	509
AUDITION	80,6	14,8	4,6	557
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	82,7	13,7	3,6	509
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	84,0	12,4	3,6	507
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL	84,4	12,8	2,7	507
VUE	85,0	10,4	4,6	557
CONTINENCE URINAIRE	86,8	4,1	9,1	505
ALLER AUX TOILETTES	90,3	7,7	2,0	508
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	92,5	4,6	2,9	508
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	93,5	4,5	1,9	508

Personnes de 65 ans et plus

REGIO: 3 RÉGION WALLONE

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PAS D'INCA- PACITE	INCA- PACITE MODEREE	INCA- PACITE SEVERE	TOTAL
Homme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
AUDITION	80,6	18,4	1,0	258
MOBILITE	82,3	10,9	6,8	222
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	85,6	12,7	1,7	224
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL	86,9	11,9	1,2	224
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	89,3	7,2	3,5	224
CONTINENCE URINAIRE	91,4	1,5	7,1	222
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	94,5	4,0	1,5	224
VUE	96,1	3,4	,5	259
ALLER AUX TOILETTES	97,2	,9	1,9	224
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	97,3	2,5	,1	224
Femme				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	60,3	25,6	14,1	346
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL	69,8	22,3	7,9	350
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	72,8	19,2	8,0	350
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	78,3	14,0	7,7	350
VUE	80,8	12,5	6,6	368
AUDITION	82,2	14,9	2,9	367
CONTINENCE URINAIRE	85,2	6,0	8,8	348
ALLER AUX TOILETTES	88,0	6,7	5,3	350
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	89,0	5,5	5,5	350
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	91,4	6,0	2,6	350
Total				
INCAPACITE EN MATIERE DE				
MOBILITE	69,1	19,7	11,2	568
TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL	76,5	18,2	5,3	574
TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER	77,8	16,6	5,5	574
AUDITION	81,5	16,3	2,2	625
S'HABILLER ET SE DESHABILLER	82,6	11,3	6,0	574
VUE	86,9	8,9	4,2	627
CONTINENCE URINAIRE	87,7	4,2	8,1	570
SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE	91,1	5,0	3,9	574
ALLER AUX TOILETTES	91,6	4,4	3,9	574
MANGER ET COUPER LA NOURRITURE	93,7	4,6	1,6	574

Personnes de 65 ans et plus

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITE CAUSEE PAR MALADIE CHRONIQUE, AFFECTION DE LONGUE DUREE OU HANDICAP					Total
	Incapacité sevère	Incapacité modérée	Incapacité faible	Souffrance sans incapacité	Pas de souffrance d'une affection de longue durée	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	2,7	5,6	8,1	6,6	77,0	4943
Femme	4,3	6,1	7,8	7,2	74,6	5203
Total	3,5	5,9	8,0	6,9	75,8	10146
GROUPES AGE						
0-14	,7	,7	3,3	4,0	91,3	1647
15-24	,9	1,6	4,6	4,0	89,0	1143
25-34	1,9	2,9	4,3	6,0	84,9	1637
35-44	4,2	5,4	9,6	5,5	75,3	1603
45-54	3,1	7,9	9,1	9,6	70,3	1283
55-64	5,2	11,4	15,0	10,2	58,2	1086
65-74	9,1	15,3	16,5	12,3	46,9	1071
75 +	14,5	17,5	10,9	9,4	47,7	676
Total	3,5	5,9	8,0	6,9	75,8	10146
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	10,7	11,7	12,4	4,3	60,9	352
Primaire	9,3	11,2	12,2	6,6	60,6	1278
Secondaire inférieur	4,8	9,5	9,9	6,9	68,9	1652
Secondaire supérieur	2,4	5,1	6,7	7,3	78,5	2938
Supérieur	1,6	2,7	6,6	6,9	82,1	3507
Total	3,5	5,9	8,0	6,9	75,7	9727
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	6,5	7,0	7,8	4,8	73,9	783
20.000-30.000	5,6	7,3	9,3	7,8	69,9	2025
30.000-40.000	4,8	8,9	8,3	6,7	71,4	2361
40.000-60.000	1,8	3,8	8,1	6,6	79,6	3233
>60.000	1,0	3,1	5,2	8,4	82,3	1285
Total	3,5	5,8	8,0	7,0	75,7	9687
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,7	2,2	5,5	7,1	84,5	5881
Très mauvaise à moyenne	13,6	22,8	21,9	8,9	32,8	2012
Total	3,5	6,7	9,0	7,5	73,3	7893
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	3,7	5,7	8,0	5,8	76,8	3699
Dans le passé	3,9	8,1	11,5	10,1	66,4	1908
Modéré (< 20)	3,0	5,1	8,5	8,0	75,4	1565
Gros fumeur	5,2	9,8	8,7	7,4	68,9	831
Total	3,8	6,5	9,0	7,4	73,3	8003
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	2,7	5,1	7,3	7,6	77,3	3516
Région Bruxelloise	5,9	5,5	7,0	6,8	74,8	3018
Région Wallonne	4,2	7,3	9,5	5,5	73,5	3612
Belgique	3,5	5,9	8,0	6,9	75,8	10146

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITE CAUSEE PAR MALADIE CHRONIQUE, AFFECTION DE LONGUE DUREE OU HANDICAP					Total
	Incapacité sevère	Incapacité modérée	Incapacité faible	Souffrance sans incapacité	Pas de souffrance d'une affection de longue durée	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	1,8	4,7	7,6	7,6	78,3	1745
Femme	3,5	5,5	7,0	7,7	76,2	1771
Total	2,7	5,1	7,3	7,6	77,3	3516
GROUPES AGE						
0-14	,9	,6	2,7	4,4	91,4	548
15-24	,4	1,3	4,0	4,8	89,5	427
25-34	,7	2,9	4,0	6,9	85,5	589
35-44	3,6	4,8	8,4	6,9	76,3	531
45-54	2,5	8,2	7,2	9,7	72,4	464
55-64	3,8	9,2	16,0	11,7	59,3	403
65-74	6,5	12,3	16,9	13,6	50,8	363
75 +	14,6	13,3	8,4	7,3	56,4	191
Total	2,7	5,1	7,3	7,6	77,3	3516
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	8,9	6,2	6,8	3,8	74,3	65
Primaire	6,3	10,0	12,1	8,9	62,7	423
Secondaire inférieur	4,1	8,6	9,7	7,5	70,1	600
Secondaire supérieur	2,2	5,0	6,4	8,1	78,4	1171
Supérieur	1,2	2,0	5,6	7,3	83,9	1137
Total	2,7	5,1	7,3	7,7	77,1	3396
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	11,6	7,5	12,4	6,7	61,7	117
20.000-30.000	3,7	8,5	9,8	11,1	66,9	604
30.000-40.000	4,4	7,7	6,4	6,8	74,6	855
40.000-60.000	1,3	2,6	7,3	6,7	82,1	1285
>60.000	,4	2,6	4,0	8,9	84,0	460
Total	2,7	5,1	7,2	7,9	77,2	3321
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,8	2,0	4,8	7,7	84,7	2267
Très mauvaise à moyenne	10,0	23,6	24,8	10,0	31,6	563
Total	2,4	5,9	8,4	8,1	75,1	2830
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	2,4	5,0	7,3	6,1	79,2	1369
Dans le passé	3,2	6,2	11,2	10,9	68,4	697
Modéré (< 20)	1,9	5,0	7,8	8,7	76,6	560
Gros fumeur	3,5	11,6	6,8	8,3	69,8	238
Total	2,6	5,9	8,3	8,0	75,3	2864

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITE CAUSEE PAR MALADIE CHRONIQUE, AFFECTION DE LONGUE DUREE OU HANDICAP					Total
	Incapacité sevère	Incapacité modérée	Incapacité faible	Souffrance sans incapacité	Pas de souffrance d'une affection de longue durée	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	5,8	5,5	7,5	6,1	75,1	1457
Femme	6,1	5,4	6,6	7,5	74,4	1561
Total	5,9	5,5	7,0	6,8	74,8	3018
GROUPES AGE						
0-14	1,5	,5	2,1	4,7	91,2	477
15-24	2,1	2,2	5,4	4,0	86,3	313
25-34	3,3	2,9	4,4	4,6	84,9	495
35-44	5,2	2,4	7,1	4,7	80,6	484
45-54	5,9	8,1	11,0	7,9	67,1	379
55-64	11,2	11,2	9,7	10,1	57,7	312
65-74	17,2	8,6	12,1	13,5	48,6	322
75 +	10,7	19,9	10,6	12,4	46,3	236
Total	5,9	5,5	7,0	6,8	74,8	3018
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	17,2	7,4	12,5	5,2	57,7	167
Primaire	15,8	7,1	6,9	2,6	67,7	363
Secondaire inférieur	7,0	8,8	6,9	5,6	71,7	423
Secondaire supérieur	3,2	5,2	6,0	10,0	75,4	703
Supérieur	1,6	3,4	6,4	6,4	82,1	1197
Total	5,7	5,4	6,9	6,7	75,3	2853
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	3,9	4,5	3,4	3,3	84,9	367
20.000-30.000	10,9	5,9	7,8	6,7	68,7	623
30.000-40.000	6,5	7,8	7,4	9,1	69,2	605
40.000-60.000	3,7	5,3	8,5	7,0	75,5	783
>60.000	1,3	2,3	7,2	6,6	82,5	495
Total	5,6	5,3	7,2	6,8	75,1	2873
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,5	1,8	5,5	7,6	84,6	1665
Très mauvaise à moyenne	24,3	17,0	14,9	7,1	36,7	620
Total	6,6	5,7	7,8	7,5	72,4	2285
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	7,3	5,1	6,3	6,6	74,6	1009
Dans le passé	5,8	8,9	9,7	9,7	65,8	555
Modéré (< 20)	7,5	3,3	9,3	6,2	73,6	456
Gros fumeur	5,1	7,1	7,1	8,3	72,4	277
Total	6,8	5,8	7,8	7,4	72,3	2297

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITE CAUSEE PAR MALADIE CHRONIQUE, AFFECTION DE LONGUE DUREE OU HANDICAP					Total
	Incapacité sevère	Incapacité modérée	Incapacité faible	Souffrance sans incapacité	Pas de souffrance d'une affection de longue durée	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	3,3	7,3	9,2	5,0	75,2	1741
Femme	5,0	7,3	9,7	6,1	71,9	1871
Total	4,2	7,3	9,5	5,5	73,5	3612
GROUPES AGE						
0-14	,2	,9	4,5	3,3	91,2	622
15-24	1,2	1,8	5,3	2,6	89,1	403
25-34	3,6	2,9	4,9	4,9	83,7	553
35-44	5,0	7,3	12,5	3,3	71,9	588
45-54	3,5	7,3	12,1	9,8	67,3	440
55-64	6,0	16,4	14,7	7,0	55,9	371
65-74	10,2	22,1	17,5	9,9	40,3	386
75 +	16,5	22,3	14,5	10,9	35,8	249
Total	4,2	7,3	9,5	5,5	73,5	3612
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	7,9	19,6	17,5	4,1	50,8	120
Primaire	12,1	14,7	14,4	4,4	54,4	492
Secondaire inférieur	5,5	11,3	10,9	6,2	66,1	629
Secondaire supérieur	2,6	5,5	7,5	4,9	79,5	1064
Supérieur	2,2	3,6	8,5	6,4	79,2	1173
Total	4,2	7,3	9,6	5,6	73,3	3478
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	4,6	8,0	7,2	4,4	75,8	299
20.000-30.000	6,5	6,2	9,2	3,5	74,6	798
30.000-40.000	5,0	11,0	11,3	5,9	66,9	901
40.000-60.000	2,4	5,7	9,6	6,4	75,8	1165
>60.000	2,6	4,7	7,6	8,0	77,1	330
Total	4,2	7,3	9,6	5,6	73,4	3493
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,8	2,7	6,9	5,7	83,9	1949
Très mauvaise à moyenne	14,9	23,5	20,3	8,2	33,1	829
Total	4,6	8,3	10,5	6,4	70,2	2778
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	5,1	7,1	10,0	4,8	73,0	1321
Dans le passé	4,7	11,6	12,5	8,4	62,8	656
Modéré (< 20)	3,5	5,7	9,5	7,3	74,0	549
Gros fumeur	7,6	8,2	11,7	5,9	66,5	316
Total	5,0	7,9	10,7	6,3	70,2	2842

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PREVALENCE DE L'INVALIDITE OU HANDICAP OFFICIELLEMENT RECONNUS				Total
	Handicap reconnu	Handicap, demande en cours	Handicap, pas de demande	Pas de handicap	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	5,6	,6	1,7	92,0	4949
Femme	4,8	,5	1,9	92,8	5201
Total	5,2	,6	1,8	92,4	10150
GROUPE AGE					
0-14	,7	,3	,2	98,8	1648
15-24	1,4	,4	,8	97,4	1142
25-34	2,5	,5	1,2	95,8	1633
35-44	6,2	,6	2,1	91,2	1602
45-54	6,7	1,3	1,4	90,7	1292
55-64	11,8	,2	2,8	85,2	1089
65-74	11,0	,4	4,6	83,9	1069
75 +	12,5	,3	7,6	79,6	675
Total	5,2	,6	1,8	92,4	10150
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	13,7	1,6	4,4	80,3	351
Primaire	11,2	,8	4,5	83,5	1280
Secondaire inférieur	9,3	,9	2,1	87,7	1652
Secondaire supérieur	3,7	,4	,8	95,0	2939
Supérieur	2,3	,3	1,6	95,8	3506
Total	5,2	,5	1,8	92,4	9728
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	7,1	1,5	2,2	89,2	788
20.000-30.000	7,4	,7	2,0	89,8	2022
30.000-40.000	7,4	,8	2,3	89,5	2358
40.000-60.000	3,4	,4	1,8	94,4	3231
>60.000	2,3	,1	,6	97,0	1288
Total	5,2	,6	1,8	92,4	9687
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	2,1	,1	,9	96,9	5888
Très mauvaise à moyenne	18,7	2,3	6,4	72,6	2009
Total	5,7	,6	2,1	91,7	7897
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	4,4	,4	2,2	93,0	3704
Dans le passé	7,7	,5	2,6	89,2	1911
Modéré (< 20)	4,9	,7	1,3	93,0	1561
Gros fumeur	8,5	1,6	2,8	87,1	831
Total	5,7	,6	2,2	91,5	8007
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	3,9	,5	1,0	94,7	3512
Région Bruxelloise	5,9	,8	2,5	90,8	3028
Région Wallonne	7,3	,7	3,1	88,9	3610
Belgique	5,2	,6	1,8	92,4	10150

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PREVALENCE DE L'INVALIDITE OU HANDICAP OFFICIELLEMENT RECONNUS				Total
	Handicap reconnu	Handicap, demande en cours	Handicap, pas de demande	Pas de handicap	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	3,8	,4	1,0	94,7	1742
Femme	4,1	,5	,9	94,6	1770
Total	3,9	,5	1,0	94,7	3512
GROUPE AGE					
0-14	,3	,4	,1	99,2	547
15-24	,9	,4	,8	98,0	428
25-34	1,5	,4	,5	97,6	585
35-44	6,0	,0	1,2	92,7	529
45-54	5,5	1,6	,8	92,1	466
55-64	8,2	,1	1,6	90,1	404
65-74	7,5	,5	1,9	90,1	361
75 +	6,6	,3	3,3	89,8	192
Total	3,9	,5	1,0	94,7	3512
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	7,8	,0	1,3	90,8	65
Primaire	6,3	,9	2,7	90,1	424
Secondaire inférieur	7,3	,9	1,0	90,8	599
Secondaire supérieur	4,0	,2	,5	95,4	1168
Supérieur	1,3	,2	,9	97,6	1134
Total	3,9	,4	1,0	94,7	3390
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	6,5	2,2	2,8	88,5	119
20.000-30.000	5,8	,6	,8	92,8	598
30.000-40.000	6,5	1,0	1,1	91,3	856
40.000-60.000	2,4	,2	,9	96,6	1284
>60.000	1,9	,0	,4	97,7	460
Total	4,0	,5	,9	94,6	3317
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	1,8	,0	,4	97,7	2266
Très mauvaise à moyenne	15,1	2,5	3,9	78,5	562
Total	4,2	,5	1,1	94,3	2828
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	3,6	,4	,9	95,1	1367
Dans le passé	6,0	,3	1,4	92,2	698
Modéré (< 20)	2,9	,6	1,5	95,1	557
Gros fumeur	5,2	1,2	1,0	92,6	238
Total	4,2	,5	1,2	94,2	2860

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PREVALENCE DE L'INVALIDITE OU HANDICAP OFFICIELLEMENT RECONNUS				Total
	Handicap reconnu	Handicap, demande en cours	Handicap, pas de demande	Pas de handicap	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	7,5	,9	2,2	89,4	1463
Femme	4,4	,8	2,7	92,1	1565
Total	5,9	,8	2,5	90,8	3028
GROUPE AGE					
0-14	,5	,0	,0	99,5	478
15-24	2,7	1,2	,8	95,4	312
25-34	4,0	,9	1,8	93,2	496
35-44	4,2	,7	1,5	93,5	485
45-54	7,8	2,2	2,9	87,1	384
55-64	10,9	,3	2,8	86,1	313
65-74	12,4	,4	8,1	79,1	322
75 +	14,2	,5	7,2	78,0	238
Total	5,9	,8	2,5	90,8	3028
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	15,3	2,1	3,3	79,2	166
Primaire	13,2	,9	5,5	80,5	366
Secondaire inférieur	7,9	,9	3,2	87,9	424
Secondaire supérieur	2,8	,7	1,2	95,3	705
Supérieur	2,6	,7	1,8	94,9	1201
Total	5,6	,9	2,4	91,1	2862
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	4,6	1,1	1,2	93,1	369
20.000-30.000	8,5	1,0	4,1	86,4	624
30.000-40.000	8,4	,6	2,9	88,1	604
40.000-60.000	4,1	1,0	2,1	92,8	785
>60.000	1,8	,5	1,1	96,5	498
Total	5,7	,9	2,4	91,0	2880
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	2,3	,2	1,2	96,3	1674
Très mauvaise à moyenne	18,9	3,6	7,5	70,0	620
Total	6,4	1,0	2,8	89,8	2294
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	4,2	1,0	2,9	91,9	1013
Dans le passé	9,1	1,1	3,7	86,0	557
Modéré (< 20)	8,4	,8	2,5	88,3	458
Gros fumeur	7,2	1,3	2,1	89,4	277
Total	6,5	1,0	2,9	89,6	2305

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PREVALENCE DE L'INVALIDITE OU HANDICAP OFFICIELLEMENT RECONNUS				Total
	Handicap reconnu	Handicap, demande en cours	Handicap, pas de demande	Pas de handicap	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	8,4	,8	2,8	88,0	1744
Femme	6,2	,6	3,5	89,8	1866
Total	7,3	,7	3,1	88,9	3610
GROUPE AGE					
0-14	1,2	,4	,4	98,0	623
15-24	1,9	,2	1,0	96,9	402
25-34	3,8	,7	2,1	93,4	552
35-44	6,9	1,7	3,7	87,7	588
45-54	8,4	,5	2,1	89,0	442
55-64	19,6	,4	5,3	74,6	372
65-74	16,0	,4	7,7	75,9	386
75 +	20,2	,3	14,1	65,4	245
Total	7,3	,7	3,1	88,9	3610
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	18,0	2,7	7,9	71,4	120
Primaire	18,6	,7	7,2	73,6	490
Secondaire inférieur	13,0	,9	3,6	82,5	629
Secondaire supérieur	3,4	,8	1,5	94,2	1066
Supérieur	3,8	,2	2,7	93,2	1171
Total	7,4	,7	3,2	88,7	3476
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	8,9	1,2	2,3	87,6	300
20.000-30.000	9,3	,9	3,0	86,7	800
30.000-40.000	8,5	,6	3,8	87,1	898
40.000-60.000	5,2	,6	3,5	90,7	1162
>60.000	3,7	,3	1,0	95,0	330
Total	7,2	,7	3,2	89,0	3490
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	2,6	,2	1,8	95,3	1948
Très mauvaise à moyenne	23,2	1,8	9,1	65,9	827
Total	8,1	,7	3,8	87,5	2775
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	6,2	,3	4,2	89,3	1324
Dans le passé	10,6	,6	4,6	84,2	656
Modéré (< 20)	7,3	1,0	,7	91,0	546
Gros fumeur	13,6	2,2	5,5	78,8	316
Total	8,3	,7	3,8	87,2	2842

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

LE POURCENTAGE RECONNU OFFICIELLEMENT DU HANDICAP OU DE L'INVALIDITE					
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	N
SEXE					
Homme	59,9	65,0	66,0	69,0	284
Femme	60,2	65,0	66,0	70,0	223
Total	60,0	65,0	66,0	69,0	507
GROUPE AGE					
0-14	56,5	60,0	66,0	80,0	14
15-24	59,3	60,0	66,0	80,0	17
25-34	53,9	15,0	66,0	70,0	37
35-44	64,5	66,0	66,0	66,0	72
45-54	51,7	17,0	66,0	66,0	76
55-64	60,2	65,0	66,0	66,0	109
65-74	60,1	60,0	66,0	80,0	119
75 +	74,7	66,0	75,0	85,0	63
Total	60,0	65,0	66,0	69,0	507
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	66,3	65,0	66,0	80,0	36
Primaire	65,5	66,0	66,0	79,0	130
Secondaire inférieur	60,1	65,0	66,0	70,0	137
Secondaire supérieur	58,9	66,0	66,0	66,0	99
Supérieur	50,4	7,0	66,0	80,0	88
Total	60,0	65,0	66,0	69,0	490
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	75,8	66,0	70,0	100,0	38
20.000-30.000	59,6	65,0	66,0	66,0	135
30.000-40.000	62,6	66,0	66,0	71,0	167
40.000-60.000	55,2	20,0	66,0	70,0	110
>60.000	54,0	25,0	66,0	66,0	24
Total	60,5	65,0	66,0	70,0	474
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	46,4	15,0	65,0	66,0	103
Très mauvaise à moyenne	63,0	66,0	66,0	71,0	329
Total	58,5	60,0	66,0	67,0	432
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	56,3	40,0	66,0	67,0	160
Dans le passé	55,5	37,0	66,0	66,0	151
Modéré (< 20)	64,0	65,0	66,0	67,0	80
Gros fumeur	67,8	66,0	66,0	72,0	53
Total	59,2	61,0	66,0	67,0	444
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	52,7	25,0	66,0	66,0	135
Région Bruxelloise	63,9	66,0	66,0	80,0	149
Région Wallonne	66,8	66,0	66,0	80,0	223
Belgique	60,0	65,0	66,0	69,0	507

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

LE POURCENTAGE RECONNU OFFICIELLEMENT DU HANDICAP OU DE L'INVALIDITE					
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	N
SEXE					
Homme	52,9	25,0	66,0	66,0	70
Femme	52,5	30,0	66,0	66,0	65
Total	52,7	25,0	66,0	66,0	135
GROUPES AGE					
0-14	28,9	1,0	1,0	80,0	2
15-24	56,7	65,0	66,0	66,0	5
25-34	42,8	8,0	66,0	66,0	9
35-44	62,1	66,0	66,0	66,0	21
45-54	41,9	7,0	66,0	66,0	26
55-64	54,9	35,0	66,0	66,0	31
65-74	48,4	20,0	66,0	66,0	23
75 +	71,1	66,0	66,0	80,0	18
Total	52,7	25,0	66,0	66,0	135
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	73,3	66,0	66,0	80,0	7
Primaire	53,3	35,0	66,0	66,0	31
Secondaire inférieur	54,2	30,0	66,0	66,0	40
Secondaire supérieur	56,0	66,0	66,0	66,0	34
Supérieur	28,8	1,0	5,0	66,0	17
Total	52,5	30,0	66,0	66,0	129
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	71,5	66,0	66,0	95,0	7
20.000-30.000	53,3	30,0	66,0	66,0	33
30.000-40.000	57,9	66,0	66,0	66,0	53
40.000-60.000	41,4	8,0	65,0	66,0	31
>60.000	61,5	66,0	66,0	66,0	6
Total	53,8	35,0	66,0	66,0	130
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	40,6	6,0	66,0	66,0	34
Très mauvaise à moyenne	56,5	60,0	66,0	66,0	81
Total	51,4	20,0	66,0	66,0	115
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	47,0	15,0	66,0	66,0	47
Dans le passé	52,2	15,0	66,0	66,0	39
Modéré (< 20)	55,9	55,0	66,0	66,0	19
Gros fumeur	65,4	66,0	66,0	66,0	11
Total	52,2	25,0	66,0	66,0	116

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

LE POURCENTAGE RECONNU OFFICIELLEMENT DU HANDICAP OU DE L'INVALIDITE					
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	N
SEXE					
Homme	63,5	66,0	66,0	75,0	87
Femme	64,7	66,0	66,0	80,0	62
Total	63,9	66,0	66,0	80,0	149
GROUPES AGE					
0-14	63,9	66,0	80,0	80,0	4
15-24	77,1	80,0	80,0	80,0	3
25-34	56,4	60,0	66,0	66,0	14
35-44	62,4	66,0	66,0	66,0	17
45-54	64,1	66,0	66,0	66,0	23
55-64	63,9	66,0	66,0	68,0	25
65-74	62,2	37,0	66,0	80,0	38
75 +	69,6	66,0	80,0	85,0	25
Total	63,9	66,0	66,0	80,0	149
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	66,4	60,0	66,0	80,0	17
Primaire	69,2	66,0	66,0	68,0	34
Secondaire inférieur	59,5	61,0	66,0	80,0	34
Secondaire supérieur	60,0	66,0	66,0	66,0	24
Supérieur	57,6	40,0	66,0	70,0	29
Total	63,6	66,0	66,0	80,0	138
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	72,1	66,0	66,0	86,0	16
20.000-30.000	66,4	66,0	66,0	80,0	42
30.000-40.000	64,2	66,0	66,0	66,0	45
40.000-60.000	59,2	60,0	68,0	80,0	24
>60.000	47,5	25,0	40,0	66,0	7
Total	64,3	66,0	66,0	80,0	134
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	49,9	37,0	60,0	66,0	23
Très mauvaise à moyenne	66,6	66,0	66,0	69,0	100
Total	63,0	66,0	66,0	68,0	123
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	68,7	66,0	66,0	80,0	35
Dans le passé	58,2	37,0	66,0	68,0	49
Modéré (< 20)	66,7	66,0	66,0	68,0	30
Gros fumeur	54,8	20,0	66,0	66,0	15
Total	62,9	66,0	66,0	68,0	129

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

LE POURCENTAGE RECONNU OFFICIELLEMENT DU HANDICAP OU DE L'INVALIDITE					
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	N
SEXE					
Homme	64,8	65,0	66,0	78,0	127
Femme	69,6	66,0	66,0	80,0	96
Total	66,8	66,0	66,0	80,0	223
GROUPES AGE					
0-14	68,5	66,0	66,0	80,0	8
15-24	58,0	60,0	66,0	80,0	9
25-34	63,6	55,0	67,0	85,0	14
35-44	68,8	66,0	66,0	80,0	34
45-54	63,4	66,0	66,0	66,0	27
55-64	64,0	65,0	66,0	66,0	53
65-74	68,4	66,0	67,0	80,0	58
75 +	79,6	65,0	75,0	100,0	20
Total	66,8	66,0	66,0	80,0	223
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	62,4	65,0	65,0	66,0	12
Primaire	71,5	66,0	66,0	80,0	65
Secondaire inférieur	66,3	66,0	66,0	72,0	63
Secondaire supérieur	66,5	66,0	66,0	75,0	41
Supérieur	62,1	60,0	66,0	90,0	42
Total	66,8	66,0	66,0	80,0	223
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	79,5	60,0	100,0	100,0	15
20.000-30.000	63,0	65,0	66,0	66,0	60
30.000-40.000	69,0	66,0	66,0	80,0	69
40.000-60.000	67,7	66,0	66,0	80,0	55
>60.000	42,0	17,0	65,0	66,0	11
Total	66,6	66,0	66,0	80,0	210
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	54,3	55,0	65,0	66,0	46
Très mauvaise à moyenne	68,3	66,0	66,0	80,0	148
Total	65,0	65,0	66,0	80,0	194
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	65,3	66,0	66,0	80,0	78
Dans le passé	58,6	65,0	66,0	66,0	63
Modéré (< 20)	69,5	65,0	66,0	80,0	31
Gros fumeur	71,3	66,0	66,0	90,0	27
Total	65,4	66,0	66,0	78,0	199

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB07_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CAUSE DE L'INVALIDITE OU HANDICAP								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE									
Homme	14,3	13,1	1,6	4,6	,5	37,0	9,8	19,1	445
Femme	6,5	2,9	5,1	6,1	,7	43,4	13,0	22,2	407
Total	10,7	8,3	3,3	5,3	,6	40,0	11,3	20,5	852
GROUPES AGE									
0-14	,0	,0	12,2	,0	,0	27,6	45,0	15,2	23
15-24	2,4	,0	3,7	19,5	,0	15,6	47,0	11,7	35
25-34	12,3	7,0	2,8	9,7	,8	31,3	19,8	16,2	75
35-44	16,9	5,1	2,7	1,9	1,2	39,4	13,6	19,1	117
45-54	16,6	9,9	2,2	8,5	1,2	32,7	7,8	21,1	131
55-64	7,6	17,3	1,5	3,5	,0	42,7	4,7	22,6	142
65-74	8,0	6,6	3,6	3,8	,3	53,9	3,2	20,5	192
75 +	2,0	5,9	6,9	1,7	,0	51,2	4,2	28,1	137
Total	10,7	8,3	3,3	5,3	,6	40,0	11,3	20,5	852
NIVEAU INSTRUCTION									
Pas de diplôme	13,7	25,5	3,1	3,1	,0	32,6	10,1	11,9	71
Primaire	11,8	9,4	2,6	6,3	,0	46,7	6,4	16,8	219
Secondaire inférieur	13,0	6,3	3,6	4,0	1,1	40,1	12,1	19,8	210
Secondaire supérieur	5,6	6,6	4,6	3,8	1,1	48,0	9,9	20,6	162
Supérieur	10,6	5,1	1,4	9,4	,5	29,5	15,7	27,9	158
Total	10,6	8,3	3,1	5,5	,6	40,7	10,9	20,2	820
REVENU EQUIVALENT (FB)									
< 20.000	10,1	2,3	3,3	7,1	,0	49,6	10,9	16,8	74
20.000-30.000	8,2	9,1	4,7	4,6	,0	45,5	11,5	16,4	229
30.000-40.000	9,1	6,8	1,6	4,2	1,7	40,8	12,2	23,5	267
40.000-60.000	15,8	12,9	4,2	5,1	,1	30,7	10,7	20,3	192
>60.000	10,6	4,1	3,0	12,9	,0	46,5	5,1	17,9	45
Total	10,8	8,5	3,4	5,3	,6	40,5	11,1	19,8	807
SANTE SUBJECTIVE									
Bonne à très bonne	14,7	10,6	1,7	8,0	2,2	27,9	15,7	19,2	188
Très mauvaise à moyenne	9,5	7,7	3,8	4,2	,1	44,8	8,6	21,3	543
Total	11,0	8,5	3,2	5,3	,7	39,9	10,6	20,7	731
CONSOMMATION DE TABAC									
Jamais	10,3	5,6	3,7	5,2	,7	45,0	14,3	15,1	308
Dans le passé	11,2	10,6	1,9	5,2	1,0	42,2	2,6	25,3	222
Modéré (< 20)	10,0	12,6	4,3	5,9	,2	38,6	9,1	19,2	129
Gros fumeur	16,3	7,2	2,8	1,9	,2	25,8	18,1	27,8	92
Total	11,4	8,5	3,2	4,8	,6	40,2	10,6	20,7	751
REGION DE RESIDENCE									
Région Flamande	12,9	7,5	2,8	5,2	,5	38,5	12,1	20,5	193
Région Bruxelloise	9,5	8,5	4,6	6,7	1,4	43,7	6,1	19,6	267
Région Wallonne	9,0	9,0	3,3	5,0	,5	40,4	12,0	20,8	392
Belgique	10,7	8,3	3,3	5,3	,6	40,0	11,3	20,5	852

1 : Accident de travail
 2 : Maladie professionnelle
 3 : Accident domestique

4 : Accident de la route
 5 : Accident de sport
 6 : Maladie
 7 : Affection congénitale
 8 : Autre raison

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB07_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CAUSE D'INVALIDITE OU HANDICAP								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE									
Homme	14,8	10,6	,5	3,4	1,1	39,4	11,8	18,5	101
Femme	10,9	4,4	5,2	6,9	,0	37,6	12,4	22,6	92
Total	12,9	7,5	2,8	5,2	,5	38,5	12,1	20,5	193
GROUPES AGE									
0-14	,0	,0	26,8	,0	,0	26,8	46,4	,0	5
15-24	,0	,0	4,7	24,6	,0	11,8	42,0	16,8	10
25-34	2,9	15,7	,0	16,2	,0	25,2	32,4	7,5	16
35-44	19,0	6,9	,0	,0	,0	50,7	11,0	12,5	25
45-54	25,2	10,8	,8	5,1	2,4	23,6	7,1	25,0	37
55-64	4,3	9,3	1,3	5,1	,0	46,5	5,5	28,0	39
65-74	13,4	1,4	5,5	1,9	,0	49,5	4,7	23,6	35
75 +	,0	,0	14,7	,0	,0	48,8	,0	36,5	26
Total	12,9	7,5	2,8	5,2	,5	38,5	12,1	20,5	193
NIVEAU INSTRUCTION									
Pas de diplôme	,0	18,5	13,5	,0	,0	42,3	,0	25,7	9
Primaire	18,4	10,5	1,4	7,0	,0	30,5	8,1	24,0	47
Secondaire inférieur	15,6	9,6	3,9	3,7	1,9	33,8	13,8	17,8	57
Secondaire supérieur	6,1	5,7	2,6	1,9	,0	57,8	10,5	15,4	44
Supérieur	16,7	3,5	,0	15,2	,0	24,5	11,2	28,8	28
Total	12,7	7,8	2,7	5,4	,6	39,8	10,8	20,2	185
REVENU EQUIVALENT (FB)									
< 20.000	,0	,0	,0	21,1	,0	46,6	7,2	25,2	13
20.000-30.000	5,3	2,8	4,6	6,0	,0	52,8	13,3	15,2	46
30.000-40.000	11,6	6,9	,4	2,9	1,6	39,4	15,1	22,2	72
40.000-60.000	25,9	18,4	5,5	2,9	,0	18,1	12,2	17,0	48
>60.000	10,1	,0	3,8	10,5	,0	67,4	,0	8,1	8
Total	12,7	7,9	3,0	5,4	,6	39,7	12,4	18,4	187
SANTE SUBJECTIVE									
Bonne à très bonne	19,5	10,1	1,9	9,5	2,0	32,9	17,0	7,2	49
Très mauvaise à moyenne	9,5	7,7	2,8	3,6	,0	38,8	10,0	27,6	117
Total	12,6	8,4	2,6	5,5	,6	37,0	12,2	21,2	166
CONSOMMATION DE TABAC									
Jamais	17,5	5,5	4,2	5,0	1,5	37,2	14,2	14,9	73
Dans le passé	9,8	16,3	,0	3,4	,0	43,0	1,7	25,9	52
Modéré (< 20)	13,1	,0	1,9	8,5	,0	39,8	17,8	18,8	30
Gros fumeur	12,2	8,6	2,2	,0	,0	19,1	19,8	38,1	15
Total	13,8	8,2	2,3	4,5	,6	37,2	11,7	21,7	170

1 : Accident de travail

- 2 : Maladie professionnelle
- 3 : Accident domestique
- 4 : Accident de la route
- 5 : Accident de sport
- 6 : Maladie
- 7 : Affection congénitale
- 8 : Autre raison

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB07_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CAUSE D'INVALIDITE OU HANDICAP								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE									
Homme	14,0	14,4	3,9	6,2	,9	39,8	4,6	16,1	135
Femme	4,0	1,4	5,4	7,2	2,0	48,3	8,0	23,7	132
Total	9,5	8,5	4,6	6,7	1,4	43,7	6,1	19,6	267
GROUPES AGE									
0-14	,0	,0	23,3	,0	,0	47,4	29,3	,0	5
15-24	12,7	,0	8,2	,0	,0	44,1	22,3	12,7	12
25-34	6,7	,0	12,7	6,6	5,8	36,2	5,0	27,0	26
35-44	13,8	5,9	6,2	8,2	2,5	38,2	11,4	13,8	32
45-54	6,4	1,5	7,2	13,4	,0	35,0	1,8	34,7	43
55-64	11,9	22,6	1,0	4,8	,0	41,3	8,5	9,9	37
65-74	12,6	1,3	,0	4,0	2,2	68,3	1,2	10,3	62
75 +	5,1	22,7	1,2	6,4	,0	36,3	3,3	24,9	50
Total	9,5	8,5	4,6	6,7	1,4	43,7	6,1	19,6	267
NIVEAU INSTRUCTION									
Pas de diplôme	29,4	17,0	,0	3,5	,0	37,7	6,7	5,7	31
Primaire	5,2	7,5	1,5	5,8	,0	55,0	8,1	16,9	56
Secondaire inférieur	5,2	4,3	5,6	7,1	2,4	54,3	,0	21,0	62
Secondaire supérieur	5,6	5,1	7,1	5,2	2,1	38,7	4,0	32,1	43
Supérieur	6,5	,6	7,3	13,9	3,4	35,2	10,4	22,7	57
Total	9,7	6,7	4,1	7,3	1,5	45,1	6,2	19,3	249
REVENU EQUIVALENT (FB)									
< 20.000	17,9	,0	5,7	1,7	,0	56,0	5,8	13,0	27
20.000-30.000	10,8	13,6	7,4	6,3	,0	40,3	6,8	14,8	80
30.000-40.000	5,1	3,1	3,8	3,0	2,9	58,3	7,4	16,4	76
40.000-60.000	9,4	15,0	,0	13,1	1,1	36,7	1,4	23,3	47
>60.000	14,3	,0	7,5	10,0	,0	17,0	3,4	47,9	16
Total	10,0	8,8	4,9	6,5	1,0	44,4	5,6	18,9	246
SANTE SUBJECTIVE									
Bonne à très bonne	15,4	3,2	4,8	9,2	4,3	31,4	7,4	24,2	55
Très mauvaise à moyenne	6,7	8,5	4,7	4,9	,7	51,7	5,9	16,9	168
Total	9,0	7,1	4,7	6,1	1,7	46,3	6,3	18,8	223
CONSOMMATION DE TABAC									
Jamais	5,5	5,8	4,2	9,2	,0	46,9	10,2	18,1	85
Dans le passé	13,0	,7	,0	7,6	1,7	58,1	1,8	17,1	69
Modéré (< 20)	7,8	16,4	9,8	4,7	1,3	37,4	4,6	18,0	47
Gros fumeur	14,3	5,5	6,0	2,3	1,9	36,7	10,6	22,9	30
Total	9,3	6,9	4,6	6,8	1,1	46,5	6,4	18,4	231

1 : Accident de travail
 2 : Maladie professionnelle
 3 : Accident domestique
 4 : Accident de la route
 5 : Accident de sport
 6 : Maladie
 7 : Affection congénitale
 8 : Autre raison

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB07_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CAUSE D'INVALIDITE OU HANDICAP								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE									
Homme	14,0	14,9	1,9	5,0	,0	34,3	9,5	20,4	209
Femme	2,7	1,7	5,0	5,0	1,0	48,0	15,2	21,4	183
Total	9,0	9,0	3,3	5,0	,5	40,4	12,0	20,8	392
GROUPES AGE									
0-14	,0	,0	,0	,0	,0	26,4	45,3	28,2	13
15-24	,0	,0	,0	23,5	,0	5,5	66,1	5,0	13
25-34	22,1	1,8	2,2	5,1	,0	34,9	13,7	20,3	33
35-44	15,2	3,0	5,0	2,9	2,4	27,1	16,9	27,5	60
45-54	8,0	11,5	2,5	11,7	,0	44,5	10,9	10,9	51
55-64	9,9	24,1	1,8	1,6	,0	39,2	3,0	20,2	66
65-74	3,2	11,4	3,5	4,9	,0	52,5	3,0	21,6	95
75 +	1,8	2,1	5,7	,7	,0	57,6	6,1	25,9	61
Total	9,0	9,0	3,3	5,0	,5	40,4	12,0	20,8	392
NIVEAU INSTRUCTION									
Pas de diplôme	10,3	31,7	1,5	3,8	,0	27,2	14,8	10,6	31
Primaire	9,3	9,1	3,7	6,0	,0	55,5	4,7	11,8	116
Secondaire inférieur	11,8	3,5	3,0	3,8	,0	43,8	12,6	21,5	91
Secondaire supérieur	4,7	8,3	7,6	6,7	2,8	32,8	10,2	27,0	75
Supérieur	7,9	7,1	,8	4,7	,0	31,1	19,8	28,6	73
Total	9,0	9,1	3,3	5,0	,5	40,4	12,1	20,6	386
REVENU EQUIVALENT (FB)									
< 20.000	14,0	4,4	4,7	,0	,0	49,6	14,6	12,7	34
20.000-30.000	9,6	12,9	3,8	2,8	,0	41,1	11,7	18,1	103
30.000-40.000	7,5	7,7	2,5	5,9	1,6	38,1	10,1	26,7	119
40.000-60.000	8,8	8,1	4,0	5,5	,0	39,9	11,3	22,5	97
>60.000	9,6	11,4	,0	17,5	,0	30,5	12,7	18,4	21
Total	9,2	9,0	3,4	4,9	,5	40,2	11,4	21,4	374
SANTE SUBJECTIVE									
Bonne à très bonne	9,6	13,0	,7	6,1	1,9	21,9	16,5	30,3	84
Très mauvaise à moyenne	10,3	7,5	4,4	4,5	,0	48,1	8,1	17,1	258
Total	10,1	9,0	3,4	4,9	,5	40,9	10,4	20,8	342
CONSOMMATION DE TABAC									
Jamais	4,6	5,7	3,2	4,6	,0	52,0	15,2	14,7	150
Dans le passé	12,1	7,7	4,3	6,4	1,8	37,1	3,7	26,9	101
Modéré (< 20)	7,9	23,4	4,2	3,9	,0	38,0	2,6	20,0	52
Gros fumeur	19,1	6,7	2,5	2,9	,0	27,9	18,4	22,5	47
Total	9,8	9,1	3,6	4,7	,5	41,4	10,6	20,3	350

1 : Accident de travail
 2 : Maladie professionnelle
 3 : Accident domestique
 4 : Accident de la route
 5 : Accident de sport
 6 : Maladie
 7 : Affection congénitale
 8 : Autre raison

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	8,2	91,8	4900
Femme	9,7	90,3	5174
Total	9,0	91,0	10074
GROUPES AGE			
0-14	7,1	92,9	1529
15-24	8,7	91,3	1149
25-34	7,3	92,7	1640
35-44	9,2	90,8	1612
45-54	9,1	90,9	1292
55-64	11,6	88,4	1093
65-74	10,5	89,5	1075
75 +	13,1	86,9	684
Total	9,0	91,0	10074
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	13,5	86,5	351
Primaire	12,1	87,9	1291
Secondaire inférieur	10,7	89,3	1647
Secondaire supérieur	8,3	91,7	2915
Supérieur	7,6	92,4	3448
Total	9,0	91,0	9652
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	8,7	91,3	785
20.000-30.000	10,6	89,4	2007
30.000-40.000	10,9	89,1	2347
40.000-60.000	8,1	91,9	3204
>60.000	6,9	93,1	1272
Total	9,1	90,9	9615
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	5,9	94,1	5911
Très mauvaise à moyenne	19,9	80,1	2024
Total	9,0	91,0	7935
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	8,0	92,0	3713
Dans le passé	9,6	90,4	1924
Modéré (< 20)	9,0	91,0	1571
Gros fumeur	13,3	86,7	837
Total	9,1	90,9	8045
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	9,5	90,5	3497
Région Bruxelloise	10,0	90,0	3000
Région Wallonne	7,7	92,3	3577
België	9,0	91,0	10074

Personnes d' un an et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	8,8	91,2	1735
Femme	10,2	89,8	1762
Total	9,5	90,5	3497
GROUPES AGE			
0-14	8,2	91,8	511
15-24	9,9	90,1	430
25-34	7,7	92,3	590
35-44	8,7	91,3	533
45-54	9,6	90,4	468
55-64	12,7	87,3	406
65-74	10,5	89,5	364
75 +	14,2	85,8	195
Total	9,5	90,5	3497
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	16,6	83,4	65
Primaire	12,7	87,3	425
Secondaire inférieur	10,5	89,5	603
Secondaire supérieur	8,7	91,3	1165
Supérieur	8,6	91,4	1117
Total	9,6	90,4	3375
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	12,6	87,4	119
20.000-30.000	10,5	89,5	602
30.000-40.000	13,4	86,6	853
40.000-60.000	8,3	91,7	1275
>60.000	7,0	93,0	454
Total	9,8	90,2	3303
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	6,4	93,6	2279
Très mauvaise à moyenne	23,5	76,5	569
Total	9,6	90,4	2848
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	8,8	91,2	1375
Dans le passé	10,0	90,0	703
Modéré (< 20)	8,8	91,2	561
Gros fumeur	14,0	86,0	241
Total	9,6	90,4	2880

Personnes d' un an et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	8,9	91,1	1446
Femme	11,0	89,0	1554
Total	10,0	90,0	3000
GROUPES AGE			
0-14	4,6	95,4	441
15-24	9,1	90,9	314
25-34	8,5	91,5	496
35-44	8,9	91,1	489
45-54	13,4	86,6	384
55-64	11,9	88,1	313
65-74	15,3	84,7	323
75 +	13,6	86,4	240
Total	10,0	90,0	3000
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	11,4	88,6	166
Primaire	14,0	86,0	370
Secondaire inférieur	13,7	86,3	419
Secondaire supérieur	8,3	91,7	704
Supérieur	8,2	91,8	1176
Total	10,0	90,0	2835
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	9,0	91,0	368
20.000-30.000	13,0	87,0	617
30.000-40.000	10,4	89,6	601
40.000-60.000	9,5	90,5	776
>60.000	6,4	93,6	491
Total	9,9	90,1	2853
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	6,2	93,8	1679
Très mauvaise à moyenne	23,3	76,7	622
Total	10,5	89,5	2301
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	8,4	91,6	1012
Dans le passé	14,9	85,1	561
Modéré (< 20)	10,4	89,6	461
Gros fumeur	10,5	89,5	279
Total	10,4	89,6	2313

Personnes d' un an et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	7,0	93,0	1719
Femme	8,4	91,6	1858
Total	7,7	92,3	3577
GROUPES AGE			
0-14	6,0	94,0	577
15-24	6,6	93,4	405
25-34	5,9	94,1	554
35-44	10,3	89,7	590
45-54	7,0	93,0	440
55-64	9,2	90,8	374
65-74	9,0	91,0	388
75 +	11,3	88,7	249
Total	7,7	92,3	3577
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	11,9	88,1	120
Primaire	10,5	89,5	496
Secondaire inférieur	10,4	89,6	625
Secondaire supérieur	7,3	92,7	1046
Supérieur	5,7	94,3	1155
Total	7,8	92,2	3442
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	5,9	94,1	298
20.000-30.000	9,9	90,1	788
30.000-40.000	7,3	92,7	893
40.000-60.000	7,4	92,6	1153
>60.000	6,9	93,1	327
Total	7,7	92,3	3459
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	4,8	95,2	1953
Très mauvaise à moyenne	14,3	85,7	833
Total	7,3	92,7	2786
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	6,3	93,7	1326
Dans le passé	7,5	92,5	660
Modéré (< 20)	8,8	91,2	549
Gros fumeur	13,3	86,7	317
Total	7,9	92,1	2852

Personnes d' un an et plus

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES						
	Moyenne	25è Percentile	Médiane	75è Percentile	95è Percentile	N
SEXE						
Homme	15,5	,0	,0	,0	104,0	4881
Femme	17,7	,0	,0	,0	130,0	5144
Total	16,6	,0	,0	,0	104,0	10025
GROUPES AGE						
0-14	8,8	,0	,0	,0	52,0	1523
15-24	13,4	,0	,0	,0	78,0	1149
25-34	11,8	,0	,0	,0	52,0	1634
35-44	15,3	,0	,0	,0	104,0	1606
45-54	20,0	,0	,0	,0	182,0	1285
55-64	25,5	,0	,0	,0	364,0	1087
65-74	24,4	,0	,0	,0	260,0	1065
75 +	33,8	,0	,0	,0	364,0	676
Total	16,6	,0	,0	,0	104,0	10025
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	34,8	,0	,0	,0	364,0	348
Primaire	26,3	,0	,0	,0	260,0	1283
Secondaire inférieur	23,6	,0	,0	,0	234,0	1637
Secondaire supérieur	13,5	,0	,0	,0	78,0	2905
Supérieur	11,8	,0	,0	,0	78,0	3432
Total	16,7	,0	,0	,0	104,0	9605
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	19,0	,0	,0	,0	208,0	779
20.000-30.000	20,8	,0	,0	,0	182,0	1998
30.000-40.000	21,5	,0	,0	,0	182,0	2339
40.000-60.000	13,9	,0	,0	,0	78,0	3190
>60.000	10,3	,0	,0	,0	52,0	1266
Total	16,9	,0	,0	,0	130,0	9572
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	9,2	,0	,0	,0	26,0	5894
Très mauvaise à moyenne	44,8	,0	,0	,0	364,0	2004
Total	16,9	,0	,0	,0	130,0	7898
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	15,4	,0	,0	,0	78,0	3697
Dans le passé	19,5	,0	,0	,0	182,0	1912
Modéré (< 20)	14,1	,0	,0	,0	104,0	1566
Gros fumeur	26,0	,0	,0	,0	260,0	831
Total	17,2	,0	,0	,0	130,0	8006
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	18,0	,0	,0	,0	130,0	3483
Région Bruxelloise	20,4	,0	,0	,0	182,0	2977
Région Wallonne	12,8	,0	,0	,0	78,0	3565
België	16,6	,0	,0	,0	104,0	10025

Personnes d' un an et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES						
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	95 ^e Percentile	N
SEXE						
Homme	16,6	,0	,0	,0	104,0	1730
Femme	19,4	,0	,0	,0	156,0	1753
Total	18,0	,0	,0	,0	130,0	3483
GROUPES AGE						
0-14	7,9	,0	,0	,0	52,0	506
15-24	16,2	,0	,0	,0	104,0	430
25-34	12,9	,0	,0	,0	52,0	588
35-44	13,3	,0	,0	,0	78,0	530
45-54	22,4	,0	,0	,0	260,0	467
55-64	31,3	,0	,0	,0	364,0	404
65-74	25,1	,0	,0	,0	260,0	363
75 +	44,0	,0	,0	,0	364,0	195
Total	18,0	,0	,0	,0	130,0	3483
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	55,6	,0	,0	,0	364,0	65
Primaire	27,8	,0	,0	,0	364,0	424
Secondaire inférieur	25,4	,0	,0	,0	364,0	602
Secondaire supérieur	13,7	,0	,0	,0	78,0	1160
Supérieur	14,2	,0	,0	,0	78,0	1110
Total	18,1	,0	,0	,0	130,0	3361
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	31,4	,0	,0	,0	364,0	117
20.000-30.000	21,3	,0	,0	,0	182,0	601
30.000-40.000	26,0	,0	,0	,0	260,0	849
40.000-60.000	14,9	,0	,0	,0	104,0	1272
>60.000	11,1	,0	,0	,0	52,0	451
Total	18,6	,0	,0	,0	130,0	3290
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	10,2	,0	,0	,0	52,0	2273
Très mauvaise à moyenne	58,2	,0	,0	,0	364,0	566
Total	18,9	,0	,0	,0	130,0	2839
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	18,3	,0	,0	,0	130,0	1372
Dans le passé	20,7	,0	,0	,0	182,0	701
Modéré (< 20)	14,1	,0	,0	,0	104,0	560
Gros fumeur	26,6	,0	,0	,0	364,0	238
Total	18,8	,0	,0	,0	130,0	2871

Personnes d' un an et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES						
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	95 ^e Percentile	N
SEXE						
Homme	18,8	,0	,0	,0	182,0	1437
Femme	21,9	,0	,0	,0	182,0	1540
Total	20,4	,0	,0	,0	182,0	2977
GROUPES AGE						
0-14	9,9	,0	,0	,0	,0	441
15-24	17,7	,0	,0	,0	182,0	314
25-34	12,5	,0	,0	,0	78,0	494
35-44	17,2	,0	,0	,0	130,0	487
45-54	29,3	,0	,0	,0	364,0	380
55-64	21,0	,0	,0	,0	182,0	310
65-74	44,6	,0	,0	,0	364,0	317
75 +	28,2	,0	,0	,0	364,0	234
Total	20,4	,0	,0	,0	182,0	2977
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	29,9	,0	,0	,0	364,0	163
Primaire	37,2	,0	,0	,0	364,0	366
Secondaire inférieur	32,0	,0	,0	,0	364,0	413
Secondaire supérieur	16,0	,0	,0	,0	156,0	703
Supérieur	13,7	,0	,0	,0	78,0	1169
Total	21,0	,0	,0	,0	182,0	2814
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	20,5	,0	,0	,0	182,0	367
20.000-30.000	28,1	,0	,0	,0	364,0	611
30.000-40.000	21,8	,0	,0	,0	182,0	598
40.000-60.000	19,1	,0	,0	,0	156,0	768
>60.000	10,3	,0	,0	,0	52,0	490
Total	20,5	,0	,0	,0	182,0	2834
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	11,0	,0	,0	,0	52,0	1670
Très mauvaise à moyenne	51,0	,0	,0	,0	364,0	611
Total	20,9	,0	,0	,0	182,0	2281
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	16,3	,0	,0	,0	104,0	1005
Dans le passé	33,1	,0	,0	,0	364,0	554
Modéré (< 20)	18,7	,0	,0	,0	182,0	459
Gros fumeur	23,7	,0	,0	,0	260,0	276
Total	21,2	,0	,0	,0	182,0	2294

Personnes d' un an et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES						
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	95 ^e Percentile	N
SEXE						
Homme	12,4	,0	,0	,0	78,0	1714
Femme	13,1	,0	,0	,0	78,0	1851
Total	12,8	,0	,0	,0	78,0	3565
GROUPES AGE						
0-14	10,0	,0	,0	,0	26,0	576
15-24	7,0	,0	,0	,0	52,0	405
25-34	9,4	,0	,0	,0	52,0	552
35-44	18,4	,0	,0	,0	130,0	589
45-54	12,8	,0	,0	,0	78,0	438
55-64	14,8	,0	,0	,0	104,0	373
65-74	16,6	,0	,0	,0	156,0	385
75 +	21,2	,0	,0	,0	208,0	247
Total	12,8	,0	,0	,0	78,0	3565
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	19,1	,0	,0	,0	130,0	120
Primaire	19,9	,0	,0	,0	130,0	493
Secondaire inférieur	18,6	,0	,0	,0	182,0	622
Secondaire supérieur	12,6	,0	,0	,0	78,0	1042
Supérieur	7,3	,0	,0	,0	26,0	1153
Total	12,8	,0	,0	,0	78,0	3430
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	9,9	,0	,0	,0	26,0	295
20.000-30.000	17,5	,0	,0	,0	104,0	786
30.000-40.000	14,5	,0	,0	,0	104,0	892
40.000-60.000	10,7	,0	,0	,0	78,0	1150
>60.000	8,1	,0	,0	,0	52,0	325
Total	12,9	,0	,0	,0	78,0	3448
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	6,5	,0	,0	,0	,0	1951
Très mauvaise à moyenne	26,1	,0	,0	,0	260,0	827
Total	11,8	,0	,0	,0	78,0	2778
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	9,5	,0	,0	,0	52,0	1320
Dans le passé	13,3	,0	,0	,0	78,0	657
Modéré (< 20)	12,5	,0	,0	,0	78,0	547
Gros fumeur	25,9	,0	,0	,0	234,0	317
Total	13,0	,0	,0	,0	78,0	2841

Personnes d' un an et plus

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES						
	Moyenne	25è Percentile	Médiane	75è Percentile	95è Percentile	N
SEXE						
Homme	2,8	,0	,0	,0	,0	4872
Femme	4,8	,0	,0	,0	,0	5134
Total	3,8	,0	,0	,0	,0	10006
GROUPE AGE						
0-14	1,7	,0	,0	,0	,0	1520
15-24	2,8	,0	,0	,0	,0	1147
25-34	2,5	,0	,0	,0	,0	1633
35-44	4,7	,0	,0	,0	,0	1603
45-54	3,0	,0	,0	,0	,0	1285
55-64	3,9	,0	,0	,0	,0	1085
65-74	7,4	,0	,0	,0	,0	1061
75 +	12,4	,0	,0	,0	26,0	672
Total	3,8	,0	,0	,0	,0	10006
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	11,8	,0	,0	,0	26,0	347
Primaire	7,4	,0	,0	,0	26,0	1280
Secondaire inférieur	3,5	,0	,0	,0	,0	1633
Secondaire supérieur	3,7	,0	,0	,0	,0	2899
Supérieur	2,2	,0	,0	,0	,0	3427
Total	3,8	,0	,0	,0	,0	9586
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	6,3	,0	,0	,0	,0	776
20.000-30.000	4,1	,0	,0	,0	,0	1995
30.000-40.000	5,9	,0	,0	,0	,0	2334
40.000-60.000	2,6	,0	,0	,0	,0	3185
>60.000	2,4	,0	,0	,0	,0	1264
Total	3,9	,0	,0	,0	,0	9554
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,7	,0	,0	,0	,0	5889
Très mauvaise à moyenne	9,2	,0	,0	,0	52,0	1996
Total	3,3	,0	,0	,0	,0	7885
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	3,0	,0	,0	,0	,0	3691
Dans le passé	4,2	,0	,0	,0	,0	1908
Modéré (< 20)	2,5	,0	,0	,0	,0	1566
Gros fumeur	3,9	,0	,0	,0	,0	827
Total	3,3	,0	,0	,0	,0	7992
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	3,4	,0	,0	,0	,0	3474
Région Bruxelloise	8,0	,0	,0	,0	,0	2971
Région Wallonne	3,1	,0	,0	,0	,0	3561
België	3,8	,0	,0	,0	,0	10006

Personnes d' un an et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES						
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	95 ^e Percentile	N
SEXE						
Homme	2,0	,0	,0	,0	,0	1728
Femme	4,8	,0	,0	,0	,0	1746
Total	3,4	,0	,0	,0	,0	3474
GROUPES AGE						
0-14	1,9	,0	,0	,0	,0	504
15-24	2,5	,0	,0	,0	,0	429
25-34	1,8	,0	,0	,0	,0	587
35-44	5,2	,0	,0	,0	,0	530
45-54	1,9	,0	,0	,0	,0	467
55-64	3,7	,0	,0	,0	,0	403
65-74	3,7	,0	,0	,0	,0	359
75 +	17,0	,0	,0	,0	78,0	195
Total	3,4	,0	,0	,0	,0	3474
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	23,5	,0	,0	,0	364,0	65
Primaire	5,7	,0	,0	,0	26,0	423
Secondaire inférieur	2,4	,0	,0	,0	,0	599
Secondaire supérieur	3,5	,0	,0	,0	,0	1156
Supérieur	2,0	,0	,0	,0	,0	1109
Total	3,4	,0	,0	,0	,0	3352
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	13,9	,0	,0	,0	,0	115
20.000-30.000	2,6	,0	,0	,0	,0	600
30.000-40.000	5,9	,0	,0	,0	,0	845
40.000-60.000	2,5	,0	,0	,0	,0	1270
>60.000	2,0	,0	,0	,0	,0	451
Total	3,6	,0	,0	,0	,0	3281
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,4	,0	,0	,0	,0	2272
Très mauvaise à moyenne	8,2	,0	,0	,0	52,0	561
Total	2,6	,0	,0	,0	,0	2833
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	2,4	,0	,0	,0	,0	1368
Dans le passé	3,5	,0	,0	,0	,0	701
Modéré (< 20)	2,2	,0	,0	,0	,0	560
Gros fumeur	2,3	,0	,0	,0	,0	235
Total	2,6	,0	,0	,0	,0	2864

Personnes d' un an et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES						
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	95 ^e Percentile	N
SEXE						
Homme	7,5	,0	,0	,0	,0	1432
Femme	8,5	,0	,0	,0	26,0	1539
Total	8,0	,0	,0	,0	,0	2971
GROUPES AGE						
0-14	1,3	,0	,0	,0	,0	440
15-24	6,1	,0	,0	,0	78,0	314
25-34	5,0	,0	,0	,0	,0	494
35-44	7,8	,0	,0	,0	26,0	485
45-54	7,7	,0	,0	,0	26,0	380
55-64	6,3	,0	,0	,0	,0	309
65-74	25,2	,0	,0	,0	364,0	317
75 +	15,9	,0	,0	,0	104,0	232
Total	8,0	,0	,0	,0	,0	2971
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	4,3	,0	,0	,0	,0	162
Primaire	21,9	,0	,0	,0	364,0	365
Secondaire inférieur	11,7	,0	,0	,0	78,0	413
Secondaire supérieur	6,3	,0	,0	,0	,0	702
Supérieur	4,6	,0	,0	,0	,0	1166
Total	8,2	,0	,0	,0	,0	2808
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	7,0	,0	,0	,0	26,0	366
20.000-30.000	12,0	,0	,0	,0	52,0	611
30.000-40.000	9,5	,0	,0	,0	,0	597
40.000-60.000	6,7	,0	,0	,0	,0	767
>60.000	3,9	,0	,0	,0	,0	488
Total	8,1	,0	,0	,0	,0	2829
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	3,3	,0	,0	,0	,0	1667
Très mauvaise à moyenne	22,3	,0	,0	,0	182,0	609
Total	8,0	,0	,0	,0	,0	2276
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	4,4	,0	,0	,0	,0	1004
Dans le passé	16,6	,0	,0	,0	78,0	550
Modéré (< 20)	5,6	,0	,0	,0	,0	459
Gros fumeur	10,8	,0	,0	,0	78,0	276
Total	8,0	,0	,0	,0	,0	2289

Personnes d' un an et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES						
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	95 ^e Percentile	N
SEXE						
Homme	2,8	,0	,0	,0	,0	1712
Femme	3,4	,0	,0	,0	,0	1849
Total	3,1	,0	,0	,0	,0	3561
GROUPES AGE						
0-14	1,5	,0	,0	,0	,0	576
15-24	2,3	,0	,0	,0	,0	404
25-34	2,8	,0	,0	,0	,0	552
35-44	3,0	,0	,0	,0	,0	588
45-54	3,6	,0	,0	,0	,0	438
55-64	3,5	,0	,0	,0	,0	373
65-74	7,1	,0	,0	,0	26,0	385
75 +	3,5	,0	,0	,0	,0	245
Total	3,1	,0	,0	,0	,0	3561
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	6,0	,0	,0	,0	,0	120
Primaire	5,2	,0	,0	,0	,0	492
Secondaire inférieur	3,5	,0	,0	,0	,0	621
Secondaire supérieur	3,3	,0	,0	,0	,0	1041
Supérieur	1,7	,0	,0	,0	,0	1152
Total	3,0	,0	,0	,0	,0	3426
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	1,0	,0	,0	,0	,0	295
20.000-30.000	3,6	,0	,0	,0	,0	784
30.000-40.000	5,1	,0	,0	,0	,0	892
40.000-60.000	2,0	,0	,0	,0	,0	1148
>60.000	2,7	,0	,0	,0	,0	325
Total	3,1	,0	,0	,0	,0	3444
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,7	,0	,0	,0	,0	1950
Très mauvaise à moyenne	6,5	,0	,0	,0	26,0	826
Total	3,0	,0	,0	,0	,0	2776
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	3,8	,0	,0	,0	,0	1319
Dans le passé	1,9	,0	,0	,0	,0	657
Modéré (< 20)	2,0	,0	,0	,0	,0	547
Gros fumeur	3,9	,0	,0	,0	26,0	316
Total	3,0	,0	,0	,0	,0	2839

Personnes d' un an et plus

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	1,3	98,7	4902
Femme	3,4	96,6	5165
Total	2,3	97,7	10067
GROUPES AGE			
0-14	,7	99,3	1524
15-24	1,7	98,3	1147
25-34	1,4	98,6	1642
35-44	3,5	96,5	1612
45-54	3,0	97,0	1294
55-64	1,9	98,1	1092
65-74	3,8	96,2	1073
75 +	5,9	94,1	683
Total	2,3	97,7	10067
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	3,4	96,6	351
Primaire	4,4	95,6	1291
Secondaire inférieur	3,0	97,0	1646
Secondaire supérieur	2,1	97,9	2912
Supérieur	1,5	98,5	3446
Total	2,3	97,7	9646
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	3,9	96,1	785
20.000-30.000	3,4	96,6	2005
30.000-40.000	2,6	97,4	2348
40.000-60.000	2,0	98,0	3199
>60.000	1,1	98,9	1272
Total	2,4	97,6	9609
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	,9	99,1	5912
Très mauvaise à moyenne	7,5	92,5	2022
Total	2,4	97,6	7934
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	2,1	97,9	3716
Dans le passé	2,6	97,4	1923
Modéré (< 20)	1,9	98,1	1570
Gros fumeur	4,1	95,9	836
Total	2,4	97,6	8045
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	2,4	97,6	3493
Région Bruxelloise	3,0	97,0	2998
Région Wallonne	2,0	98,0	3576
België	2,3	97,7	10067

Personnes d' un an et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	1,2	98,8	1734
Femme	3,6	96,4	1759
Total	2,4	97,6	3493
GROUPES AGE			
0-14	1,0	99,0	510
15-24	1,7	98,3	428
25-34	1,3	98,7	590
35-44	4,3	95,7	533
45-54	2,2	97,8	468
55-64	1,6	98,4	406
65-74	4,3	95,7	363
75 +	6,5	93,5	195
Total	2,4	97,6	3493
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	8,6	91,4	65
Primaire	3,7	96,3	425
Secondaire inférieur	3,4	96,6	603
Secondaire supérieur	2,3	97,7	1163
Supérieur	1,3	98,7	1116
Total	2,4	97,6	3372
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	8,7	91,3	119
20.000-30.000	3,6	96,4	601
30.000-40.000	3,1	96,9	853
40.000-60.000	1,7	98,3	1274
>60.000	,7	99,3	453
Total	2,4	97,6	3300
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	,9	99,1	2276
Très mauvaise à moyenne	8,9	91,1	569
Total	2,4	97,6	2845
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	2,3	97,7	1373
Dans le passé	2,3	97,7	703
Modéré (< 20)	2,2	97,8	560
Gros fumeur	2,7	97,3	241
Total	2,3	97,7	2877

Personnes d' un an et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	2,8	97,2	1447
Femme	3,3	96,7	1551
Total	3,0	97,0	2998
GROUPES AGE			
0-14	,3	99,7	438
15-24	2,7	97,3	314
25-34	2,2	97,8	498
35-44	3,2	96,8	489
45-54	5,4	94,6	385
55-64	1,6	98,4	313
65-74	6,5	93,5	322
75 +	4,5	95,5	239
Total	3,0	97,0	2998
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	1,3	98,7	166
Primaire	7,3	92,7	369
Secondaire inférieur	3,1	96,9	418
Secondaire supérieur	2,5	97,5	703
Supérieur	2,1	97,9	1177
Total	2,9	97,1	2833
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	4,2	95,8	369
20.000-30.000	3,6	96,4	614
30.000-40.000	3,2	96,8	601
40.000-60.000	2,6	97,4	775
>60.000	2,3	97,7	492
Total	3,1	96,9	2851
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	1,5	98,5	1681
Très mauvaise à moyenne	8,5	91,5	622
Total	3,3	96,7	2303
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	1,6	98,4	1016
Dans le passé	5,7	94,3	560
Modéré (< 20)	2,7	97,3	460
Gros fumeur	6,3	93,7	279
Total	3,3	96,7	2315

Personnes d' un an et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	1,0	99,0	1721
Femme	3,0	97,0	1855
Total	2,0	98,0	3576
GROUPES AGE			
0-14	,3	99,7	576
15-24	1,2	98,8	405
25-34	1,2	98,8	554
35-44	2,1	97,9	590
45-54	3,9	96,1	441
55-64	2,7	97,3	373
65-74	2,1	97,9	388
75 +	5,8	94,2	249
Total	2,0	98,0	3576
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	,1	99,9	120
Primaire	4,5	95,5	497
Secondaire inférieur	2,2	97,8	625
Secondaire supérieur	1,5	98,5	1046
Supérieur	1,7	98,3	1153
Total	2,0	98,0	3441
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	,6	99,4	297
20.000-30.000	3,0	97,0	790
30.000-40.000	1,5	98,5	894
40.000-60.000	2,3	97,7	1150
>60.000	1,5	98,5	327
Total	2,1	97,9	3458
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	,7	99,3	1955
Très mauvaise à moyenne	5,6	94,4	831
Total	2,0	98,0	2786
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	2,0	98,0	1327
Dans le passé	2,5	97,5	660
Modéré (< 20)	1,1	98,9	550
Gros fumeur	5,4	94,6	316
Total	2,3	97,7	2853

Personnes d' un an et plus

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS						
	Moyenne	25è Percentile	Médiane	75è Percentile	95è Percentile	N
SEXE						
Homme	2,9	,0	,0	,0	,0	4898
Femme	5,8	,0	,0	,0	,0	5148
Total	4,4	,0	,0	,0	,0	10046
GROUPES AGE						
0-14	1,0	,0	,0	,0	,0	1521
15-24	2,4	,0	,0	,0	,0	1145
25-34	3,0	,0	,0	,0	,0	1641
35-44	6,5	,0	,0	,0	,0	1611
45-54	5,0	,0	,0	,0	,0	1290
55-64	2,7	,0	,0	,0	,0	1090
65-74	7,1	,0	,0	,0	,0	1067
75 +	16,5	,0	,0	,0	130,0	681
Total	4,4	,0	,0	,0	,0	10046
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	11,0	,0	,0	,0	,0	351
Primaire	9,3	,0	,0	,0	,0	1288
Secondaire inférieur	5,2	,0	,0	,0	,0	1639
Secondaire supérieur	4,4	,0	,0	,0	,0	2910
Supérieur	1,7	,0	,0	,0	,0	3440
Total	4,3	,0	,0	,0	,0	9628
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	9,2	,0	,0	,0	,0	781
20.000-30.000	5,5	,0	,0	,0	,0	2002
30.000-40.000	6,6	,0	,0	,0	,0	2343
40.000-60.000	2,7	,0	,0	,0	,0	3191
>60.000	1,7	,0	,0	,0	,0	1271
Total	4,5	,0	,0	,0	,0	9588
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,2	,0	,0	,0	,0	5903
Très mauvaise à moyenne	14,6	,0	,0	,0	104,0	2015
Total	4,1	,0	,0	,0	,0	7918
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	3,7	,0	,0	,0	,0	3710
Dans le passé	5,2	,0	,0	,0	,0	1917
Modéré (< 20)	2,8	,0	,0	,0	,0	1566
Gros fumeur	6,4	,0	,0	,0	,0	835
Total	4,1	,0	,0	,0	,0	8028
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	4,9	,0	,0	,0	,0	3484
Région Bruxelloise	6,2	,0	,0	,0	,0	2990
Région Wallonne	2,8	,0	,0	,0	,0	3572
België	4,4	,0	,0	,0	,0	10046

Personnes d' un an et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS						
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	95 ^e Percentile	N
SEXE						
Homme	2,7	,0	,0	,0	,0	1732
Femme	7,0	,0	,0	,0	,0	1752
Total	4,9	,0	,0	,0	,0	3484
GROUPE AGE						
0-14	1,3	,0	,0	,0	,0	508
15-24	2,8	,0	,0	,0	,0	427
25-34	3,4	,0	,0	,0	,0	590
35-44	8,4	,0	,0	,0	,0	532
45-54	5,4	,0	,0	,0	,0	468
55-64	2,0	,0	,0	,0	,0	404
65-74	6,7	,0	,0	,0	,0	360
75 +	21,1	,0	,0	,0	364,0	195
Total	4,9	,0	,0	,0	,0	3484
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	29,1	,0	,0	,0	364,0	65
Primaire	9,5	,0	,0	,0	,0	425
Secondaire inférieur	4,4	,0	,0	,0	,0	598
Secondaire supérieur	5,5	,0	,0	,0	,0	1161
Supérieur	1,6	,0	,0	,0	,0	1114
Total	4,8	,0	,0	,0	,0	3363
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	22,2	,0	,0	,0	260,0	117
20.000-30.000	5,9	,0	,0	,0	,0	599
30.000-40.000	8,8	,0	,0	,0	,0	852
40.000-60.000	2,4	,0	,0	,0	,0	1270
>60.000	1,4	,0	,0	,0	,0	453
Total	5,0	,0	,0	,0	,0	3291
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,3	,0	,0	,0	,0	2271
Très mauvaise à moyenne	18,3	,0	,0	,0	156,0	567
Total	4,4	,0	,0	,0	,0	2838
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	4,7	,0	,0	,0	,0	1370
Dans le passé	5,2	,0	,0	,0	,0	703
Modéré (< 20)	3,3	,0	,0	,0	,0	557
Gros fumeur	2,3	,0	,0	,0	,0	240
Total	4,3	,0	,0	,0	,0	2870

Personnes d' un an et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS						
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	95 ^e Percentile	N
SEXE						
Homme	6,8	,0	,0	,0	,0	1445
Femme	5,6	,0	,0	,0	,0	1545
Total	6,2	,0	,0	,0	,0	2990
GROUPES AGE						
0-14	,4	,0	,0	,0	,0	438
15-24	6,4	,0	,0	,0	,0	313
25-34	4,0	,0	,0	,0	,0	497
35-44	5,3	,0	,0	,0	,0	489
45-54	5,3	,0	,0	,0	,0	383
55-64	4,4	,0	,0	,0	,0	313
65-74	18,6	,0	,0	,0	364,0	319
75 +	14,1	,0	,0	,0	,0	238
Total	6,2	,0	,0	,0	,0	2990
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	2,1	,0	,0	,0	,0	166
Primaire	17,2	,0	,0	,0	78,0	367
Secondaire inférieur	7,7	,0	,0	,0	,0	416
Secondaire supérieur	6,3	,0	,0	,0	,0	703
Supérieur	3,0	,0	,0	,0	,0	1175
Total	6,3	,0	,0	,0	,0	2827
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	8,6	,0	,0	,0	,0	368
20.000-30.000	9,1	,0	,0	,0	,0	613
30.000-40.000	6,7	,0	,0	,0	,0	598
40.000-60.000	4,9	,0	,0	,0	,0	773
>60.000	2,5	,0	,0	,0	,0	491
Total	6,4	,0	,0	,0	,0	2843
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,8	,0	,0	,0	,0	1677
Très mauvaise à moyenne	18,5	,0	,0	,0	182,0	620
Total	6,0	,0	,0	,0	,0	2297
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	1,8	,0	,0	,0	,0	1014
Dans le passé	12,1	,0	,0	,0	,0	556
Modéré (< 20)	2,9	,0	,0	,0	,0	459
Gros fumeur	17,9	,0	,0	,0	182,0	279
Total	6,1	,0	,0	,0	,0	2308

Personnes d' un an et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS						
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	95 ^e Percentile	N
SEXE						
Homme	1,9	,0	,0	,0	,0	1721
Femme	3,8	,0	,0	,0	,0	1851
Total	2,8	,0	,0	,0	,0	3572
GROUPES AGE						
0-14	,7	,0	,0	,0	,0	575
15-24	,6	,0	,0	,0	,0	405
25-34	1,8	,0	,0	,0	,0	554
35-44	3,7	,0	,0	,0	,0	590
45-54	4,2	,0	,0	,0	,0	439
55-64	3,7	,0	,0	,0	,0	373
65-74	3,9	,0	,0	,0	,0	388
75 +	10,9	,0	,0	,0	,0	248
Total	2,8	,0	,0	,0	,0	3572
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	,4	,0	,0	,0	,0	120
Primaire	6,1	,0	,0	,0	,0	496
Secondaire inférieur	6,2	,0	,0	,0	,0	625
Secondaire supérieur	1,5	,0	,0	,0	,0	1046
Supérieur	1,5	,0	,0	,0	,0	1151
Total	2,8	,0	,0	,0	,0	3438
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	1,0	,0	,0	,0	,0	296
20.000-30.000	3,7	,0	,0	,0	,0	790
30.000-40.000	3,4	,0	,0	,0	,0	893
40.000-60.000	2,6	,0	,0	,0	,0	1148
>60.000	2,2	,0	,0	,0	,0	327
Total	2,9	,0	,0	,0	,0	3454
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,8	,0	,0	,0	,0	1955
Très mauvaise à moyenne	8,9	,0	,0	,0	,0	828
Total	3,0	,0	,0	,0	,0	2783
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	2,4	,0	,0	,0	,0	1326
Dans le passé	3,0	,0	,0	,0	,0	658
Modéré (< 20)	2,1	,0	,0	,0	,0	550
Gros fumeur	8,7	,0	,0	,0	52,0	316
Total	3,3	,0	,0	,0	,0	2850

Personnes d' un an et plus

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS						
	Moyenne	25è Percentile	Médiane	75è Percentile	95è Percentile	N
SEXE						
Homme	,7	,0	,0	,0	,0	4898
Femme	2,2	,0	,0	,0	,0	5145
Total	1,4	,0	,0	,0	,0	10043
GROUPES AGE						
0-14	,2	,0	,0	,0	,0	1521
15-24	,4	,0	,0	,0	,0	1145
25-34	,5	,0	,0	,0	,0	1641
35-44	2,7	,0	,0	,0	,0	1611
45-54	1,4	,0	,0	,0	,0	1290
55-64	,8	,0	,0	,0	,0	1089
65-74	2,3	,0	,0	,0	,0	1066
75 +	8,8	,0	,0	,0	,0	680
Total	1,4	,0	,0	,0	,0	10043
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	8,2	,0	,0	,0	,0	351
Primaire	2,7	,0	,0	,0	,0	1288
Secondaire inférieur	1,1	,0	,0	,0	,0	1637
Secondaire supérieur	1,6	,0	,0	,0	,0	2909
Supérieur	,5	,0	,0	,0	,0	3440
Total	1,4	,0	,0	,0	,0	9625
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	4,6	,0	,0	,0	,0	780
20.000-30.000	1,7	,0	,0	,0	,0	2002
30.000-40.000	2,5	,0	,0	,0	,0	2343
40.000-60.000	,5	,0	,0	,0	,0	3189
>60.000	,9	,0	,0	,0	,0	1271
Total	1,5	,0	,0	,0	,0	9585
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,2	,0	,0	,0	,0	5903
Très mauvaise à moyenne	3,4	,0	,0	,0	,0	2013
Total	,9	,0	,0	,0	,0	7916
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	,4	,0	,0	,0	,0	3708
Dans le passé	2,0	,0	,0	,0	,0	1917
Modéré (< 20)	,4	,0	,0	,0	,0	1566
Gros fumeur	1,8	,0	,0	,0	,0	835
Total	,9	,0	,0	,0	,0	8026
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	1,5	,0	,0	,0	,0	3482
Région Bruxelloise	3,8	,0	,0	,0	,0	2990
Région Wallonne	,6	,0	,0	,0	,0	3571
België	1,4	,0	,0	,0	,0	10043

Personnes d' un an et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS						
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	95 ^e Percentile	N
SEXE						
Homme	,1	,0	,0	,0	,0	1732
Femme	2,9	,0	,0	,0	,0	1750
Total	1,5	,0	,0	,0	,0	3482
GROUPES AGE						
0-14	,3	,0	,0	,0	,0	508
15-24	,0	,0	,0	,0	,0	427
25-34	,1	,0	,0	,0	,0	590
35-44	3,7	,0	,0	,0	,0	532
45-54	,9	,0	,0	,0	,0	468
55-64	1,0	,0	,0	,0	,0	403
65-74	,5	,0	,0	,0	,0	359
75 +	13,8	,0	,0	,0	,0	195
Total	1,5	,0	,0	,0	,0	3482
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	22,6	,0	,0	,0	364,0	65
Primaire	,7	,0	,0	,0	,0	425
Secondaire inférieur	,7	,0	,0	,0	,0	597
Secondaire supérieur	2,1	,0	,0	,0	,0	1160
Supérieur	,3	,0	,0	,0	,0	1114
Total	1,4	,0	,0	,0	,0	3361
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	13,3	,0	,0	,0	,0	116
20.000-30.000	1,0	,0	,0	,0	,0	599
30.000-40.000	3,4	,0	,0	,0	,0	852
40.000-60.000	,3	,0	,0	,0	,0	1269
>60.000	,5	,0	,0	,0	,0	453
Total	1,6	,0	,0	,0	,0	3289
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,2	,0	,0	,0	,0	2271
Très mauvaise à moyenne	2,3	,0	,0	,0	,0	565
Total	,5	,0	,0	,0	,0	2836
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	,4	,0	,0	,0	,0	1368
Dans le passé	1,3	,0	,0	,0	,0	703
Modéré (< 20)	,1	,0	,0	,0	,0	557
Gros fumeur	,0	,0	,0	,0	,0	240
Total	,5	,0	,0	,0	,0	2868

Personnes d' un an et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS						
	Moyenne	25 ^e Percentile	Médiane	75 ^e Percentile	95 ^e Percentile	N
SEXE						
Homme	4,3	,0	,0	,0	,0	1445
Femme	3,2	,0	,0	,0	,0	1545
Total	3,8	,0	,0	,0	,0	2990
GROUPES AGE						
0-14	,0	,0	,0	,0	,0	438
15-24	2,8	,0	,0	,0	,0	313
25-34	1,3	,0	,0	,0	,0	497
35-44	2,6	,0	,0	,0	,0	489
45-54	3,6	,0	,0	,0	,0	383
55-64	2,1	,0	,0	,0	,0	313
65-74	16,6	,0	,0	,0	,0	319
75 +	9,1	,0	,0	,0	,0	238
Total	3,8	,0	,0	,0	,0	2990
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	,8	,0	,0	,0	,0	166
Primaire	14,6	,0	,0	,0	26,0	367
Secondaire inférieur	5,0	,0	,0	,0	,0	416
Secondaire supérieur	2,6	,0	,0	,0	,0	703
Supérieur	1,6	,0	,0	,0	,0	1175
Total	3,9	,0	,0	,0	,0	2827
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	2,3	,0	,0	,0	,0	368
20.000-30.000	7,8	,0	,0	,0	,0	613
30.000-40.000	2,5	,0	,0	,0	,0	598
40.000-60.000	3,4	,0	,0	,0	,0	773
>60.000	2,0	,0	,0	,0	,0	491
Total	3,9	,0	,0	,0	,0	2843
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,5	,0	,0	,0	,0	1677
Très mauvaise à moyenne	13,1	,0	,0	,0	26,0	620
Total	3,7	,0	,0	,0	,0	2297
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	,5	,0	,0	,0	,0	1014
Dans le passé	10,2	,0	,0	,0	,0	556
Modéré (< 20)	,9	,0	,0	,0	,0	459
Gros fumeur	10,4	,0	,0	,0	,0	279
Total	3,8	,0	,0	,0	,0	2308

Personnes d' un an et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS						
	Moyenne	25è Percentile	Médiane	75è Percentile	95è Percentile	N
SEXE						
Homme	,6	,0	,0	,0	,0	1721
Femme	,6	,0	,0	,0	,0	1850
Total	,6	,0	,0	,0	,0	3571
GROUPES AGE						
0-14	,0	,0	,0	,0	,0	575
15-24	,2	,0	,0	,0	,0	405
25-34	1,0	,0	,0	,0	,0	554
35-44	,8	,0	,0	,0	,0	590
45-54	1,6	,0	,0	,0	,0	439
55-64	,0	,0	,0	,0	,0	373
65-74	,2	,0	,0	,0	,0	388
75 +	1,1	,0	,0	,0	,0	247
Total	,6	,0	,0	,0	,0	3571
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	,0	,0	,0	,0	,0	120
Primaire	1,9	,0	,0	,0	,0	496
Secondaire inférieur	,7	,0	,0	,0	,0	624
Secondaire supérieur	,2	,0	,0	,0	,0	1046
Supérieur	,6	,0	,0	,0	,0	1151
Total	,6	,0	,0	,0	,0	3437
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	,4	,0	,0	,0	,0	296
20.000-30.000	,6	,0	,0	,0	,0	790
30.000-40.000	1,1	,0	,0	,0	,0	893
40.000-60.000	,3	,0	,0	,0	,0	1147
>60.000	1,2	,0	,0	,0	,0	327
Total	,6	,0	,0	,0	,0	3453
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,2	,0	,0	,0	,0	1955
Très mauvaise à moyenne	2,0	,0	,0	,0	,0	828
Total	,7	,0	,0	,0	,0	2783
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	,4	,0	,0	,0	,0	1326
Dans le passé	,8	,0	,0	,0	,0	658
Modéré (< 20)	,6	,0	,0	,0	,0	550
Gros fumeur	1,6	,0	,0	,0	,0	316
Total	,7	,0	,0	,0	,0	2850

Personnes d' un an et plus