

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| SCORE-SF36 POUR LE FONCTIONNEMENT PHYSIQUE | | | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | Moyenne | 5è Percentile | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 92,5 | 50,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 4133 |
| Femme | 87,2 | 25,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 4410 |
| Total | 89,8 | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 8543 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 15-24 | 98,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1149 |
| 25-34 | 96,7 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1638 |
| 35-44 | 93,9 | 65,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 1610 |
| 45-54 | 91,6 | 55,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 1294 |
| 55-64 | 85,9 | 45,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 1094 |
| 65-74 | 70,5 | 10,0 | 50,0 | 80,0 | 95,0 | 1076 |
| 75 + | 53,6 | ,0 | 15,0 | 60,0 | 85,0 | 682 |
| Total | 89,8 | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 8543 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 77,7 | 10,0 | 65,0 | 95,0 | 100,0 | 302 |
| Primaire | 77,4 | 5,0 | 60,0 | 95,0 | 100,0 | 1218 |
| Secondaire inférieur | 86,8 | 30,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 1449 |
| Secondaire supérieur | 92,6 | 50,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 2421 |
| Supérieur | 94,1 | 70,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 2800 |
| Total | 89,8 | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 8190 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 86,8 | 20,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 635 |
| 20.000-30.000 | 86,4 | 20,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 1699 |
| 30.000-40.000 | 87,2 | 35,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 1984 |
| 40.000-60.000 | 91,9 | 50,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 2693 |
| >60.000 | 95,0 | 70,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 1128 |
| Total | 89,8 | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 8139 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 95,7 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 5907 |
| Très mauvaise à moyenne | 71,8 | 5,0 | 55,0 | 80,0 | 95,0 | 2026 |
| Total | 90,5 | 45,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 7933 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 90,3 | 45,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 3710 |
| Dans le passé | 88,9 | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 1925 |
| Modéré (< 20) | 92,8 | 55,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 1572 |
| Gros fumeur | 89,8 | 45,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 837 |
| Total | 90,5 | 45,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 8044 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | |
| Région Flamande | 91,5 | 50,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 2985 |
| Région Bruxelloise | 87,2 | 30,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 2558 |
| Région Wallonne | 87,6 | 25,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 3000 |
| Belgique | 89,8 | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 8543 |

Personnes de 15 ans et plus

Score-SF36 : 0 - 100

un score bas signifie beaucoup d'incapacités physiques

**un score de 100 signifie aucune incapacité physique dans
les différents domaines (10) physiques**

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE(INDICATEUR : IL01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| SCORE-SF36 POUR LE FONCTIONNEMENT PHYSIQUE | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|------|
| | Moyenne | 5 ^e Percentile | 25 ^e Percentile | Médiane | 75 ^e Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 93,9 | 60,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 1471 |
| Femme | 89,1 | 45,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 1514 |
| Total | 91,5 | 50,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 2985 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 15-24 | 97,9 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 430 |
| 25-34 | 97,7 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 590 |
| 35-44 | 95,3 | 75,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 533 |
| 45-54 | 92,3 | 60,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 468 |
| 55-64 | 88,1 | 45,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 406 |
| 65-74 | 74,1 | 5,0 | 60,0 | 85,0 | 95,0 | 363 |
| 75 + | 57,8 | ,0 | 20,0 | 70,0 | 90,0 | 195 |
| Total | 91,5 | 50,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 2985 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 79,2 | ,0 | 65,0 | 95,0 | 100,0 | 61 |
| Primaire | 82,0 | 20,0 | 75,0 | 95,0 | 100,0 | 410 |
| Secondaire inférieur | 89,5 | 45,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 545 |
| Secondaire supérieur | 93,1 | 60,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 982 |
| Supérieur | 94,9 | 75,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 877 |
| Total | 91,4 | 50,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 2875 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 82,2 | 5,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 102 |
| 20.000-30.000 | 86,6 | 20,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 536 |
| 30.000-40.000 | 90,1 | 45,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 733 |
| 40.000-60.000 | 93,5 | 60,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 1046 |
| >60.000 | 96,4 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 398 |
| Total | 91,5 | 50,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 2815 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 96,4 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 2278 |
| Très mauvaise à moyenne | 74,0 | 10,0 | 60,0 | 80,0 | 95,0 | 569 |
| Total | 92,3 | 55,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 2847 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 92,1 | 50,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 1375 |
| Dans le passé | 90,9 | 50,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 703 |
| Modéré (< 20) | 94,4 | 65,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 561 |
| Gros fumeur | 91,2 | 45,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 241 |
| Total | 92,2 | 55,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 2880 |

Personnes de 15 ans et plus

Score-SF36 : 0 - 100

un score bas signifie beaucoup d'incapacités physiques
un score de 100 signifie aucune incapacité physique dans
les différents domaines (10) physiques

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE(INDICATEUR : IL01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| SCORE-SF36 POUR LE FONCTIONNEMENT PHYSIQUE | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|------|
| | Moyenne | 5 ^e Percentile | 25 ^e Percentile | Médiane | 75 ^e Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 89,6 | 35,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 1232 |
| Femme | 85,0 | 20,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 1326 |
| Total | 87,2 | 30,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 2558 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 15-24 | 97,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 314 |
| 25-34 | 95,9 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 495 |
| 35-44 | 93,1 | 55,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 488 |
| 45-54 | 86,7 | 30,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 385 |
| 55-64 | 84,1 | 30,0 | 75,0 | 95,0 | 100,0 | 314 |
| 65-74 | 71,4 | 5,0 | 50,0 | 85,0 | 95,0 | 324 |
| 75 + | 55,3 | ,0 | 20,0 | 60,0 | 90,0 | 238 |
| Total | 87,2 | 30,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 2558 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 81,6 | 15,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 137 |
| Primaire | 78,5 | 5,0 | 65,0 | 95,0 | 100,0 | 330 |
| Secondaire inférieur | 82,7 | 10,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 364 |
| Secondaire supérieur | 88,1 | 35,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 582 |
| Supérieur | 92,8 | 50,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 1004 |
| Total | 87,6 | 30,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 2417 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 91,5 | 40,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 291 |
| 20.000-30.000 | 83,8 | 20,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 506 |
| 30.000-40.000 | 82,3 | 10,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 514 |
| 40.000-60.000 | 90,6 | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 673 |
| >60.000 | 90,3 | 45,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 441 |
| Total | 87,5 | 30,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 2425 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 94,7 | 70,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 1676 |
| Très mauvaise à moyenne | 67,7 | 5,0 | 45,0 | 80,0 | 100,0 | 624 |
| Total | 87,8 | 30,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 2300 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 87,1 | 25,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 1011 |
| Dans le passé | 86,1 | 30,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 562 |
| Modéré (< 20) | 89,5 | 35,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 460 |
| Gros fumeur | 89,3 | 35,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 279 |
| Total | 87,7 | 30,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 2312 |

Personnes de 15 ans et plus

Score-SF36 : 0 - 100

un score bas signifie beaucoup d'incapacités physiques
un score de 100 signifie aucune incapacité physique dans
les différents domaines (10) physiques

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE(INDICATEUR : IL01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| SCORE-SF36 POUR LE FONCTIONNEMENT PHYSIQUE | | | | | | |
|--|---------|------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|------|
| | Moyenne | 5 ^e Percentile | 25 ^e Percentile | Médiane | 75 ^e Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 90,8 | 40,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 1430 |
| Femme | 84,4 | 15,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 1570 |
| Total | 87,6 | 25,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 3000 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 15-24 | 98,4 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 405 |
| 25-34 | 95,1 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 553 |
| 35-44 | 91,6 | 50,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 589 |
| 45-54 | 91,6 | 55,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 441 |
| 55-64 | 81,9 | 35,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 374 |
| 65-74 | 64,7 | 10,0 | 40,0 | 70,0 | 95,0 | 389 |
| 75 + | 46,6 | ,0 | 10,0 | 50,0 | 75,0 | 249 |
| Total | 87,6 | 25,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 3000 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 73,5 | 10,0 | 50,0 | 85,0 | 100,0 | 104 |
| Primaire | 69,2 | ,0 | 45,0 | 80,0 | 100,0 | 478 |
| Secondaire inférieur | 83,0 | 20,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 540 |
| Secondaire supérieur | 92,6 | 55,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 857 |
| Supérieur | 93,2 | 65,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 919 |
| Total | 87,4 | 25,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 2898 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 87,5 | 20,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 242 |
| 20.000-30.000 | 87,1 | 25,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 657 |
| 30.000-40.000 | 83,9 | 15,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 737 |
| 40.000-60.000 | 88,9 | 30,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 974 |
| >60.000 | 94,1 | 70,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 289 |
| Total | 87,6 | 25,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 2899 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 94,6 | 70,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 1953 |
| Très mauvaise à moyenne | 70,3 | ,0 | 50,0 | 80,0 | 95,0 | 833 |
| Total | 88,0 | 30,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 2786 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 88,1 | 30,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 1324 |
| Dans le passé | 85,8 | 20,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 660 |
| Modéré (< 20) | 91,2 | 35,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 551 |
| Gros fumeur | 87,9 | 35,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 317 |
| Total | 88,2 | 30,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 2852 |

Personnes de 15 ans et plus

Score-SF36 : 0 - 100

un score bas signifie beaucoup d'incapacités physiques
un score de 100 signifie aucune incapacité physique dans
les différents domaines (10) physiques

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL11_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | HANDICAP EN MOBILITE | | | | Total |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------|
| | Aucun | Confiné maison/ jardin | Confiné fauteuil | Confiné lit | N |
| | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 97,6 | 1,5 | ,7 | ,2 | 3866 |
| Femme | 94,7 | 3,3 | 1,3 | ,6 | 4132 |
| Total | 96,2 | 2,4 | 1,0 | ,4 | 7998 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 99,7 | ,1 | ,0 | ,1 | 1115 |
| 25-34 | 99,2 | ,5 | ,2 | ,1 | 1582 |
| 35-44 | 98,4 | ,7 | ,3 | ,6 | 1536 |
| 45-54 | 97,8 | 1,6 | ,3 | ,3 | 1237 |
| 55-64 | 96,3 | 2,6 | ,8 | ,3 | 940 |
| 65-74 | 87,1 | 9,7 | 2,6 | ,5 | 951 |
| 75 + | 70,1 | 16,4 | 11,9 | 1,6 | 637 |
| Total | 96,2 | 2,4 | 1,0 | ,4 | 7998 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 92,0 | 5,9 | ,7 | 1,4 | 287 |
| Primaire | 88,2 | 7,3 | 3,9 | ,5 | 1127 |
| Secondaire inférieur | 95,0 | 3,4 | 1,3 | ,3 | 1347 |
| Secondaire supérieur | 97,4 | 1,5 | ,5 | ,5 | 2264 |
| Supérieur | 98,7 | ,8 | ,4 | ,1 | 2636 |
| Total | 96,2 | 2,4 | 1,0 | ,4 | 7661 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 91,9 | 4,5 | 2,9 | ,7 | 597 |
| 20.000-30.000 | 94,3 | 4,0 | 1,5 | ,2 | 1570 |
| 30.000-40.000 | 95,7 | 2,4 | ,9 | ,9 | 1862 |
| 40.000-60.000 | 97,3 | 1,8 | ,7 | ,1 | 2526 |
| >60.000 | 98,5 | 1,0 | ,3 | ,2 | 1067 |
| Total | 96,2 | 2,4 | 1,0 | ,4 | 7622 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 99,3 | ,5 | ,0 | ,1 | 5532 |
| Très mauvaise à moyenne | 87,2 | 8,1 | 4,1 | ,5 | 1897 |
| Total | 96,7 | 2,2 | ,9 | ,2 | 7429 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 96,3 | 2,4 | 1,1 | ,2 | 3487 |
| Dans le passé | 96,4 | 2,6 | ,9 | ,1 | 1787 |
| Modéré (< 20) | 97,8 | 1,3 | ,7 | ,1 | 1476 |
| Gros fumeur | 97,3 | 1,9 | ,7 | ,1 | 796 |
| Total | 96,8 | 2,2 | ,9 | ,2 | 7546 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | |
| Région Flamande | 97,1 | 2,1 | ,5 | ,3 | 2783 |
| Région Bruxelloise | 93,9 | 3,3 | 2,2 | ,7 | 2390 |
| Région Wallonne | 95,4 | 2,7 | 1,5 | ,3 | 2825 |
| Belgique | 96,2 | 2,4 | 1,0 | ,4 | 7998 |

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL11_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | HANDICAP EN MOBILITE | | | | Total |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Aucun | Confiné maison/ jardin | Confiné fauteuil | Confiné lit | N |
| | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 98,4 | 1,3 | ,3 | ,0 | 1384 |
| Femme | 95,7 | 2,9 | ,7 | ,7 | 1399 |
| Total | 97,1 | 2,1 | ,5 | ,3 | 2783 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 99,6 | ,1 | ,0 | ,2 | 416 |
| 25-34 | 99,8 | ,2 | ,0 | ,0 | 568 |
| 35-44 | 98,6 | ,3 | ,0 | 1,0 | 508 |
| 45-54 | 98,5 | 1,3 | ,1 | ,0 | 441 |
| 55-64 | 97,9 | 2,1 | ,0 | ,0 | 347 |
| 65-74 | 89,2 | 8,2 | 2,4 | ,1 | 319 |
| 75 + | 69,8 | 21,1 | 7,3 | 1,7 | 184 |
| Total | 97,1 | 2,1 | ,5 | ,3 | 2783 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 91,3 | 4,3 | 1,0 | 3,4 | 61 |
| Primaire | 91,9 | 5,8 | 2,3 | ,1 | 383 |
| Secondaire inférieur | 96,7 | 2,7 | ,6 | ,0 | 497 |
| Secondaire supérieur | 97,4 | 1,6 | ,3 | ,7 | 921 |
| Supérieur | 99,0 | ,9 | ,1 | ,0 | 818 |
| Total | 97,0 | 2,1 | ,5 | ,3 | 2680 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 85,4 | 11,8 | ,4 | 2,4 | 93 |
| 20.000-30.000 | 95,6 | 3,3 | 1,1 | ,0 | 486 |
| 30.000-40.000 | 96,7 | 1,6 | ,7 | 1,0 | 688 |
| 40.000-60.000 | 98,4 | 1,2 | ,3 | ,1 | 977 |
| >60.000 | 98,6 | 1,2 | ,2 | ,0 | 379 |
| Total | 97,1 | 2,0 | ,5 | ,4 | 2623 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 99,7 | ,3 | ,0 | ,1 | 2134 |
| Très mauvaise à moyenne | 88,8 | 8,7 | 2,5 | ,0 | 524 |
| Total | 97,7 | 1,8 | ,5 | ,0 | 2658 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 97,3 | 1,9 | ,7 | ,1 | 1291 |
| Dans le passé | 98,0 | 1,6 | ,4 | ,0 | 655 |
| Modéré (< 20) | 98,5 | 1,4 | ,1 | ,0 | 521 |
| Gros fumeur | 98,3 | 1,7 | ,0 | ,0 | 223 |
| Total | 97,8 | 1,7 | ,5 | ,0 | 2690 |

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL11_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | HANDICAP EN MOBILITE | | | | Total |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Aucun | Confiné maison/ jardin | Confiné fauteuil | Confiné lit | N |
| | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 94,4 | 3,3 | 2,0 | ,3 | 1150 |
| Femme | 93,4 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | 1240 |
| Total | 93,9 | 3,3 | 2,2 | ,7 | 2390 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 99,4 | ,6 | ,0 | ,0 | 304 |
| 25-34 | 98,5 | ,7 | ,0 | ,8 | 474 |
| 35-44 | 97,5 | 1,7 | ,4 | ,3 | 461 |
| 45-54 | 94,8 | 3,9 | 1,3 | ,0 | 366 |
| 55-64 | 91,3 | 3,7 | 5,0 | ,0 | 275 |
| 65-74 | 81,5 | 11,2 | 5,8 | 1,5 | 288 |
| 75 + | 76,4 | 9,0 | 10,7 | 3,9 | 222 |
| Total | 93,9 | 3,3 | 2,2 | ,7 | 2390 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 93,6 | 5,8 | ,4 | ,1 | 131 |
| Primaire | 82,3 | 8,4 | 7,9 | 1,5 | 307 |
| Secondaire inférieur | 91,5 | 3,5 | 3,4 | 1,6 | 341 |
| Secondaire supérieur | 95,5 | 2,3 | 1,6 | ,6 | 528 |
| Supérieur | 98,2 | ,9 | ,6 | ,3 | 948 |
| Total | 94,2 | 3,0 | 2,1 | ,7 | 2255 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 96,0 | 1,9 | 2,0 | ,1 | 275 |
| 20.000-30.000 | 87,5 | 7,7 | 3,7 | 1,0 | 474 |
| 30.000-40.000 | 92,5 | 3,3 | 3,3 | ,9 | 479 |
| 40.000-60.000 | 96,0 | 2,2 | 1,2 | ,6 | 626 |
| >60.000 | 98,4 | ,8 | ,2 | ,6 | 415 |
| Total | 93,8 | 3,4 | 2,1 | ,7 | 2269 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 99,3 | ,5 | ,1 | ,2 | 1560 |
| Très mauvaise à moyenne | 81,2 | 10,4 | 6,8 | 1,6 | 586 |
| Total | 94,6 | 3,1 | 1,8 | ,6 | 2146 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 94,7 | 2,7 | 1,9 | ,6 | 952 |
| Dans le passé | 91,7 | 6,0 | 1,8 | ,6 | 519 |
| Modéré (< 20) | 96,2 | 2,1 | 1,6 | ,1 | 430 |
| Gros fumeur | 94,3 | 2,3 | 2,5 | ,9 | 265 |
| Total | 94,3 | 3,2 | 1,9 | ,5 | 2166 |

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL11_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | HANDICAP EN MOBILITE | | | | Total |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Aucun | Confiné maison/ jardin | Confiné fauteuil | Confiné lit | N |
| | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 97,3 | 1,4 | ,8 | ,4 | 1332 |
| Femme | 93,5 | 4,0 | 2,2 | ,3 | 1493 |
| Total | 95,4 | 2,7 | 1,5 | ,3 | 2825 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 395 |
| 25-34 | 98,3 | 1,0 | ,7 | ,0 | 540 |
| 35-44 | 98,2 | 1,1 | ,7 | ,0 | 567 |
| 45-54 | 97,3 | 1,6 | ,3 | ,8 | 430 |
| 55-64 | 94,5 | 3,4 | ,9 | 1,2 | 318 |
| 65-74 | 85,9 | 11,4 | 1,9 | ,8 | 344 |
| 75 + | 67,2 | 13,3 | 19,3 | ,3 | 231 |
| Total | 95,4 | 2,7 | 1,5 | ,3 | 2825 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 91,6 | 7,7 | ,6 | ,0 | 95 |
| Primaire | 84,1 | 9,5 | 5,3 | 1,0 | 437 |
| Secondaire inférieur | 93,0 | 4,5 | 2,0 | ,5 | 509 |
| Secondaire supérieur | 98,0 | 1,2 | ,8 | ,0 | 815 |
| Supérieur | 98,5 | ,5 | ,8 | ,2 | 870 |
| Total | 95,3 | 2,8 | 1,6 | ,3 | 2726 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 93,9 | 1,1 | 5,1 | ,0 | 229 |
| 20.000-30.000 | 94,6 | 3,7 | 1,4 | ,3 | 610 |
| 30.000-40.000 | 95,0 | 3,4 | ,8 | ,7 | 695 |
| 40.000-60.000 | 95,6 | 2,8 | 1,6 | ,1 | 923 |
| >60.000 | 98,2 | ,4 | ,7 | ,7 | 273 |
| Total | 95,3 | 2,8 | 1,5 | ,3 | 2730 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 98,7 | 1,1 | ,1 | ,1 | 1838 |
| Très mauvaise à moyenne | 87,2 | 6,7 | 5,3 | ,8 | 787 |
| Total | 95,6 | 2,6 | 1,5 | ,3 | 2625 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 95,0 | 3,1 | 1,5 | ,3 | 1244 |
| Dans le passé | 94,9 | 3,6 | 1,4 | ,1 | 613 |
| Modéré (< 20) | 97,3 | 1,0 | 1,4 | ,4 | 525 |
| Gros fumeur | 97,0 | 2,0 | 1,0 | ,0 | 308 |
| Total | 95,7 | 2,7 | 1,4 | ,2 | 2690 |

Personnes de 15 ans et plus

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITES | | | Total |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| | Pas d'incapacités | Incapacité modéré | Incapacité sévère | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 84,8 | 12,2 | 3,0 | 3749 |
| Femme | 79,4 | 14,5 | 6,1 | 4022 |
| Total | 82,1 | 13,4 | 4,5 | 7771 |
| GROUPES AGE | | | | |
| 15-24 | 94,0 | 5,1 | ,9 | 1059 |
| 25-34 | 93,2 | 5,4 | 1,5 | 1521 |
| 35-44 | 88,9 | 8,3 | 2,8 | 1484 |
| 45-54 | 83,9 | 13,4 | 2,7 | 1196 |
| 55-64 | 71,2 | 24,7 | 4,0 | 921 |
| 65-74 | 55,0 | 31,4 | 13,6 | 954 |
| 75 + | 30,6 | 40,4 | 29,0 | 636 |
| Total | 82,1 | 13,4 | 4,5 | 7771 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 59,3 | 25,6 | 15,1 | 279 |
| Primaire | 63,0 | 26,7 | 10,3 | 1092 |
| Secondaire inférieur | 76,5 | 16,5 | 7,0 | 1313 |
| Secondaire supérieur | 86,5 | 10,7 | 2,9 | 2202 |
| Supérieur | 89,0 | 8,9 | 2,1 | 2554 |
| Total | 81,9 | 13,5 | 4,6 | 7440 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 78,7 | 13,1 | 8,2 | 583 |
| 20.000-30.000 | 74,6 | 19,0 | 6,4 | 1532 |
| 30.000-40.000 | 78,1 | 16,0 | 5,9 | 1819 |
| 40.000-60.000 | 85,9 | 10,9 | 3,2 | 2445 |
| >60.000 | 91,0 | 7,7 | 1,3 | 1030 |
| Total | 82,1 | 13,4 | 4,5 | 7409 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 90,6 | 8,0 | 1,4 | 5340 |
| Très mauvaise à moyenne | 57,7 | 29,5 | 12,8 | 1882 |
| Total | 83,3 | 12,7 | 4,0 | 7222 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 84,2 | 11,1 | 4,7 | 3377 |
| Dans le passé | 79,8 | 16,0 | 4,2 | 1747 |
| Modéré (< 20) | 84,7 | 12,8 | 2,5 | 1428 |
| Gros fumeur | 82,9 | 15,1 | 2,0 | 776 |
| Total | 83,2 | 13,0 | 3,9 | 7328 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | |
| Région Flamande | 83,8 | 13,1 | 3,2 | 2701 |
| Région Bruxelloise | 78,5 | 14,5 | 7,0 | 2318 |
| Région Wallonne | 80,2 | 13,6 | 6,2 | 2752 |
| Belgique | 82,1 | 13,4 | 4,5 | 7771 |

Personnes de 15 ans et plus

O.M.S.-score pour des incapacités : sur base de 10 fonctions physiques comme marcher, se lever et se coucher (lit), s'asseoir et se lever (fauteuil), s'habiller et se déshabiller, se laver les mains et le visage, manger et couper la nourriture, aller aux toilettes, continence urinaire, trouble de l'audition et de la vue

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITES | | | Total |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------|
| | Pas d'incapacités | Incapacité modérée | Incapacité sévère | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 86,0 | 11,6 | 2,4 | 1341 |
| Femme | 81,5 | 14,5 | 4,0 | 1360 |
| Total | 83,8 | 13,1 | 3,2 | 2701 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 15-24 | 93,3 | 6,0 | ,7 | 401 |
| 25-34 | 94,3 | 4,8 | ,9 | 551 |
| 35-44 | 91,6 | 6,5 | 1,9 | 487 |
| 45-54 | 84,3 | 13,9 | 1,8 | 425 |
| 55-64 | 72,5 | 24,0 | 3,5 | 336 |
| 65-74 | 56,0 | 33,7 | 10,2 | 318 |
| 75 + | 33,2 | 43,8 | 23,0 | 183 |
| Total | 83,8 | 13,1 | 3,2 | 2701 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 65,9 | 23,9 | 10,3 | 57 |
| Primaire | 65,8 | 27,6 | 6,6 | 367 |
| Secondaire inférieur | 77,6 | 16,5 | 5,9 | 490 |
| Secondaire supérieur | 87,5 | 10,5 | 2,0 | 896 |
| Supérieur | 89,7 | 8,7 | 1,5 | 788 |
| Total | 83,5 | 13,3 | 3,2 | 2598 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 73,4 | 17,0 | 9,6 | 94 |
| 20.000-30.000 | 73,9 | 21,3 | 4,9 | 481 |
| 30.000-40.000 | 80,9 | 15,4 | 3,7 | 671 |
| 40.000-60.000 | 86,9 | 10,5 | 2,6 | 944 |
| >60.000 | 93,0 | 6,6 | ,4 | 359 |
| Total | 83,7 | 13,2 | 3,2 | 2549 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 91,1 | 7,8 | 1,2 | 2056 |
| Très mauvaise à moyenne | 59,0 | 31,2 | 9,8 | 520 |
| Total | 85,2 | 12,1 | 2,7 | 2576 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 86,6 | 10,2 | 3,2 | 1243 |
| Dans le passé | 80,5 | 15,8 | 3,7 | 639 |
| Modéré (< 20) | 86,1 | 13,0 | ,9 | 510 |
| Gros fumeur | 85,8 | 13,6 | ,6 | 215 |
| Totaal | 85,0 | 12,4 | 2,6 | 2607 |

Personnes de 15 ans et plus

O.M.S.-score pour des incapacités : sur base de 10 fonctions physiques comme marcher, se lever et se coucher (lit), s'asseoir et se lever (fauteuil), s'habiller et se déshabiller, se laver les mains et le visage, manger et couper la nourriture, aller aux toilettes, continence urinaire, trouble de l'audition et de la vue

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITES | | | Total |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| | Pas d'incapacités | Incapacité modérée | Incapacité sévère | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 80,3 | 14,4 | 5,3 | 1100 |
| Femme | 76,9 | 14,5 | 8,6 | 1218 |
| Total | 78,5 | 14,5 | 7,0 | 2318 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 15-24 | 91,1 | 7,9 | 1,0 | 281 |
| 25-34 | 91,7 | 5,7 | 2,6 | 452 |
| 35-44 | 88,2 | 8,4 | 3,4 | 447 |
| 45-54 | 79,0 | 14,8 | 6,2 | 355 |
| 55-64 | 73,3 | 21,2 | 5,5 | 270 |
| 65-74 | 57,6 | 29,1 | 13,3 | 288 |
| 75 + | 30,0 | 36,3 | 33,8 | 225 |
| Total | 78,5 | 14,5 | 7,0 | 2318 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 73,1 | 20,1 | 6,8 | 129 |
| Primaire | 65,0 | 21,1 | 13,9 | 297 |
| Secondaire inférieur | 71,2 | 18,0 | 10,8 | 326 |
| Secondaire supérieur | 78,3 | 14,1 | 7,6 | 514 |
| Supérieur | 87,3 | 9,4 | 3,3 | 922 |
| Total | 78,9 | 14,1 | 7,0 | 2188 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 86,1 | 8,4 | 5,5 | 266 |
| 20.000-30.000 | 67,6 | 21,5 | 10,9 | 459 |
| 30.000-40.000 | 75,8 | 15,2 | 9,0 | 461 |
| 40.000-60.000 | 84,3 | 10,4 | 5,3 | 605 |
| >60.000 | 84,9 | 11,9 | 3,2 | 409 |
| Total | 79,1 | 13,9 | 6,9 | 2200 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 88,9 | 8,9 | 2,3 | 1507 |
| Très mauvaise à moyenne | 51,1 | 32,8 | 16,1 | 580 |
| Total | 78,9 | 15,2 | 5,9 | 2087 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 78,6 | 14,1 | 7,3 | 923 |
| Dans le passé | 76,4 | 17,7 | 5,9 | 511 |
| Modéré (< 20) | 78,1 | 17,1 | 4,8 | 410 |
| Gros fumeur | 83,5 | 11,1 | 5,3 | 257 |
| Totaal | 78,6 | 15,1 | 6,2 | 2101 |

Personnes de 15 ans et plus

O.M.S.-score pour des incapacités : sur base de 10 fonctions physiques comme marcher, se lever et se coucher (lit), s'asseoir et se lever (fauteuil), s'habiller et se déshabiller, se laver les mains et le visage, manger et couper la nourriture, aller aux toilettes, continence urinaire, trouble de l'audition et de la vue

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITES | | | Total |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| | Pas d'incapacités | Incapacité modéré | Incapacité sévère | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 84,0 | 12,7 | 3,3 | 1308 |
| Femme | 76,5 | 14,5 | 9,0 | 1444 |
| Total | 80,2 | 13,6 | 6,2 | 2752 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 15-24 | 96,2 | 2,7 | 1,1 | 377 |
| 25-34 | 91,3 | 6,4 | 2,2 | 518 |
| 35-44 | 84,4 | 11,2 | 4,3 | 550 |
| 45-54 | 84,6 | 12,1 | 3,3 | 416 |
| 55-64 | 67,7 | 27,6 | 4,7 | 315 |
| 65-74 | 52,8 | 28,8 | 18,4 | 348 |
| 75 + | 26,9 | 37,6 | 35,5 | 228 |
| Total | 80,2 | 13,6 | 6,2 | 2752 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 42,9 | 31,2 | 25,9 | 93 |
| Primaire | 57,9 | 27,1 | 15,0 | 428 |
| Secondaire inférieur | 75,9 | 16,2 | 7,9 | 497 |
| Secondaire supérieur | 86,4 | 10,1 | 3,6 | 792 |
| Supérieur | 88,6 | 8,9 | 2,6 | 844 |
| Total | 80,0 | 13,7 | 6,3 | 2654 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 78,2 | 13,0 | 8,7 | 223 |
| 20.000-30.000 | 78,0 | 14,8 | 7,2 | 592 |
| 30.000-40.000 | 74,5 | 17,1 | 8,5 | 687 |
| 40.000-60.000 | 84,3 | 11,9 | 3,8 | 896 |
| >60.000 | 88,8 | 8,4 | 2,8 | 262 |
| Total | 80,3 | 13,7 | 6,1 | 2660 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 90,1 | 8,2 | 1,8 | 1777 |
| Très mauvaise à moyenne | 58,1 | 26,3 | 15,6 | 782 |
| Total | 81,3 | 13,1 | 5,5 | 2559 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 81,5 | 11,8 | 6,7 | 1211 |
| Dans le passé | 79,5 | 15,8 | 4,6 | 597 |
| Modéré (< 20) | 84,3 | 11,1 | 4,6 | 508 |
| Gros fumeur | 79,0 | 18,3 | 2,8 | 304 |
| Totaal | 81,3 | 13,4 | 5,3 | 2620 |

Personnes de 15 ans et plus

O.M.S.-score pour des incapacités : sur base de 10 fonctions physiques comme marcher, se lever et se coucher (lit), s'asseoir et se lever (fauteuil), s'habiller et se déshabiller, se laver les mains et le visage, manger et couper la nourriture, aller aux toilettes, continence urinaire, trouble de l'audition et de la vue

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : i114_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | |
|---|---------|-------------------|---------|-------------------|------|
| NOMBRE DE FONCTIONS AVEC DES INCAPACITES* | | | | | |
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | N |
| ----- | | | | | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 643 |
| Femme | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 916 |
| Total | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1559 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 50 |
| 25-34 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 95 |
| 35-44 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 162 |
| 45-54 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 201 |
| 55-64 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 235 |
| 65-74 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 404 |
| 75 + | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 412 |
| Total | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1559 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 101 |
| Primaire | 2,6 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 444 |
| Secondaire inférieur | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 340 |
| Secondaire supérieur | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 313 |
| Supérieur | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 300 |
| Total | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1498 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 125 |
| 20.000-30.000 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 413 |
| 30.000-40.000 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 437 |
| 40.000-60.000 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 386 |
| >60.000 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 114 |
| Total | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1475 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 539 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 855 |
| Total | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1394 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 664 |
| Dans le passé | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 413 |
| Modéré (< 20) | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 235 |
| Gros fumeur | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 123 |
| Total | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1435 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | |
| Région Flamande | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 461 |
| Région Bruxelloise | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 495 |
| Région Wallonne | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 603 |
| Belgique | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1559 |
| ----- | | | | | |

Personnes de 15 ans et plus

* Seulement les personnes avec une incapacité en matière d'au moins une fonction

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | |
|---|---------|-------------------|---------|-------------------|-----|
| NOMBRE DE FONCTIONS AVEC DES INCAPACITES* | | | | | |
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | N |
| ----- | | | | | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 196 |
| Femme | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 265 |
| Total | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 461 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22 |
| 25-34 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 26 |
| 35-44 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 40 |
| 45-54 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 58 |
| 55-64 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 84 |
| 65-74 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 115 |
| 75 + | 3,3 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 116 |
| Total | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 461 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 3,1 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 22 |
| Primaire | 2,3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 139 |
| Secondaire inférieur | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 114 |
| Secondaire supérieur | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 101 |
| Supérieur | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 73 |
| Total | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 449 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 3,2 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 25 |
| 20.000-30.000 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 132 |
| 30.000-40.000 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 133 |
| 40.000-60.000 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 122 |
| >60.000 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 27 |
| Total | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 439 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 192 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 229 |
| Total | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 421 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 198 |
| Dans le passé | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 140 |
| Modéré (< 20) | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 63 |
| Gros fumeur | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 26 |
| Total | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 427 |
| ----- | | | | | |

Personnes de 15 ans et plus

* Seulement les personnes avec une incapacité en matière d'au moins une fonction

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| NOMBRE DE FONCTIONS AVEC DES INCAPACITES* | | | | | |
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | N |
| ----- | | | | | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 208 |
| Femme | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 287 |
| Total | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 495 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 |
| 25-34 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 31 |
| 35-44 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 46 |
| 45-54 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 70 |
| 55-64 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 65 |
| 65-74 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 122 |
| 75 + | 3,2 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 146 |
| Total | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 495 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 33 |
| Primaire | 2,9 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 106 |
| Secondaire inférieur | 2,6 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 101 |
| Secondaire supérieur | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 98 |
| Supérieur | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 123 |
| Total | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 461 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 49 |
| 20.000-30.000 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 128 |
| 30.000-40.000 | 2,9 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 124 |
| 40.000-60.000 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 100 |
| >60.000 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 57 |
| Total | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 458 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 157 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 276 |
| Total | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 433 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 197 |
| Dans le passé | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 123 |
| Modéré (< 20) | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 83 |
| Gros fumeur | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 46 |
| Total | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 449 |
| ----- | | | | | |

Personnes de 15 ans et plus

* Seulement les personnes avec une incapacité en matière d'au moins une fonction

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| NOMBRE DE FONCTIONS AVEC DES INCAPACITES* | | | | | |
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | N |
| ----- | | | | | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 239 |
| Femme | 2,6 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 364 |
| Total | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 603 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13 |
| 25-34 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 38 |
| 35-44 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 76 |
| 45-54 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 73 |
| 55-64 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 86 |
| 65-74 | 2,4 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 167 |
| 75 + | 3,9 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 150 |
| Total | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 603 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 2,2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 46 |
| Primaire | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 199 |
| Secondaire inférieur | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 125 |
| Secondaire supérieur | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 114 |
| Supérieur | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 104 |
| Total | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 588 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 51 |
| 20.000-30.000 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 153 |
| 30.000-40.000 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 180 |
| 40.000-60.000 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 164 |
| >60.000 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 30 |
| Total | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 578 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 190 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 350 |
| Total | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 540 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 269 |
| Dans le passé | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 150 |
| Modéré (< 20) | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 89 |
| Gros fumeur | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 51 |
| Total | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 559 |
| ----- | | | | | |

Personnes de 15 ans et plus

* Seulement les personnes avec une incapacité en matière d'au moins une fonction

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PAS D'INCA- PACITE | INCA- PACITE MODEREE | INCA- PACITE SEVERE | TOTAL |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Homme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| AUDITION | 93,0 | 6,6 | ,4 | 3981 |
| MOBILITE | 95,7 | 3,3 | 1,0 | 3857 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 96,7 | 2,7 | ,6 | 3860 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 97,2 | 2,1 | ,6 | 3861 |
| VUE | 97,4 | 2,3 | ,3 | 4005 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 97,5 | 2,0 | ,4 | 3857 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 98,8 | ,9 | ,3 | 3860 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 98,8 | ,9 | ,3 | 3860 |
| CONTINENCE URINAIRE | 98,9 | ,4 | ,7 | 3845 |
| ALLER AUX TOILETTES | 99,0 | ,7 | ,3 | 3860 |
| Femme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 92,3 | 5,5 | 2,2 | 4123 |
| AUDITION | 93,5 | 5,5 | 1,0 | 4277 |
| VUE | 94,2 | 4,8 | ,9 | 4281 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 94,3 | 4,4 | 1,3 | 4132 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 95,1 | 3,9 | 1,1 | 4132 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 95,3 | 3,2 | 1,5 | 4131 |
| CONTINENCE URINAIRE | 96,8 | 1,2 | 2,0 | 4114 |
| ALLER AUX TOILETTES | 97,7 | 1,5 | ,9 | 4129 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 98,0 | 1,2 | ,9 | 4129 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 98,0 | 1,2 | ,8 | 4130 |
| Total | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| AUDITION | 93,3 | 6,1 | ,7 | 8258 |
| MOBILITE | 94,0 | 4,4 | 1,6 | 7980 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 95,8 | 3,2 | 1,0 | 7993 |
| VUE | 95,8 | 3,6 | ,6 | 8286 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 96,0 | 2,9 | 1,0 | 7991 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 96,3 | 2,9 | ,8 | 7989 |
| CONTINENCE URINAIRE | 97,9 | ,8 | 1,4 | 7959 |
| ALLER AUX TOILETTES | 98,3 | 1,1 | ,6 | 7989 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 98,4 | 1,0 | ,6 | 7989 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 98,4 | 1,0 | ,6 | 7990 |

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 1 RÉGION FLAMANDE

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PAS D'INCA- PACITE | INCA- PACITE MODEREE | INCA- PACITE SEVERE | TOTAL |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Homme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| AUDITION | 93,2 | 6,5 | ,3 | 1416 |
| MOBILITE | 96,6 | 2,7 | ,8 | 1382 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 96,7 | 2,8 | ,4 | 1384 |
| VUE | 97,8 | 1,9 | ,3 | 1431 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 97,9 | 1,4 | ,7 | 1383 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 98,1 | 1,4 | ,5 | 1383 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 98,8 | ,9 | ,3 | 1384 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 99,0 | ,9 | ,2 | 1384 |
| ALLER AUX TOILETTES | 99,4 | ,5 | ,1 | 1384 |
| CONTINENCE URINAIRE | 99,5 | ,3 | ,3 | 1377 |
| Femme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| AUDITION | 93,7 | 5,8 | ,5 | 1470 |
| MOBILITE | 94,3 | 4,4 | 1,3 | 1396 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 95,0 | 3,7 | 1,3 | 1401 |
| VUE | 95,9 | 3,8 | ,2 | 1469 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 95,9 | 2,4 | 1,6 | 1399 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 96,1 | 3,1 | ,9 | 1400 |
| CONTINENCE URINAIRE | 97,7 | ,8 | 1,4 | 1391 |
| ALLER AUX TOILETTES | 97,8 | 1,4 | ,8 | 1398 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 97,9 | 1,1 | ,9 | 1398 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 98,1 | 1,1 | ,7 | 1398 |
| Total | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| AUDITION | 93,4 | 6,2 | ,4 | 2886 |
| MOBILITE | 95,5 | 3,5 | 1,0 | 2778 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 96,3 | 2,6 | 1,0 | 2783 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 96,5 | 2,5 | 1,0 | 2784 |
| VUE | 96,9 | 2,9 | ,3 | 2900 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 97,1 | 2,2 | ,7 | 2783 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 98,4 | 1,0 | ,6 | 2782 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 98,6 | 1,0 | ,5 | 2782 |
| CONTINENCE URINAIRE | 98,6 | ,5 | ,8 | 2768 |
| ALLER AUX TOILETTES | 98,6 | ,9 | ,4 | 2782 |

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 2 RÉGION BRUXELLOISE

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PAS D'INCA- PACITE | INCA- PACITE MODEREE | INCA- PACITE SEVERE | TOTAL |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Homme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 92,3 | 5,6 | 2,2 | 1148 |
| AUDITION | 93,3 | 5,8 | ,9 | 1170 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 95,1 | 4,2 | ,8 | 1148 |
| VUE | 95,4 | 3,6 | 1,0 | 1175 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 95,6 | 3,5 | ,9 | 1144 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 96,0 | 3,1 | ,9 | 1146 |
| CONTINENCE URINAIRE | 97,6 | ,9 | 1,5 | 1140 |
| ALLER AUX TOILETTES | 97,7 | 1,9 | ,3 | 1146 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 98,6 | 1,0 | ,4 | 1146 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 99,1 | ,7 | ,3 | 1146 |
| Femme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 91,8 | 5,5 | 2,7 | 1240 |
| AUDITION | 92,0 | 6,0 | 2,0 | 1286 |
| VUE | 92,2 | 5,6 | 2,2 | 1288 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 94,2 | 5,2 | ,6 | 1239 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 94,3 | 5,0 | ,7 | 1240 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 95,3 | 3,9 | ,7 | 1240 |
| CONTINENCE URINAIRE | 95,8 | 1,2 | 3,0 | 1239 |
| ALLER AUX TOILETTES | 98,0 | 1,4 | ,6 | 1239 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 98,3 | 1,2 | ,5 | 1239 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 98,4 | ,9 | ,7 | 1240 |
| Total | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 92,1 | 5,5 | 2,4 | 2388 |
| AUDITION | 92,6 | 5,9 | 1,5 | 2456 |
| VUE | 93,7 | 4,7 | 1,6 | 2463 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 94,6 | 4,7 | ,7 | 2387 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 95,0 | 4,2 | ,8 | 2384 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 95,7 | 3,5 | ,8 | 2386 |
| CONTINENCE URINAIRE | 96,6 | 1,1 | 2,3 | 2379 |
| ALLER AUX TOILETTES | 97,9 | 1,7 | ,5 | 2385 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 98,5 | 1,0 | ,6 | 2386 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 98,6 | 1,0 | ,4 | 2385 |

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 3 RÉGION WALLONE

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PAS D'INCA- PACITE | INCA- PACITE MODEREE | INCA- PACITE SEVERE | TOTAL |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Homme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| AUDITION | 92,6 | 7,0 | ,4 | 1395 |
| MOBILITE | 95,2 | 3,6 | 1,2 | 1327 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 96,7 | 2,8 | ,5 | 1330 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 96,9 | 2,3 | ,8 | 1330 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 97,1 | 2,6 | ,2 | 1330 |
| VUE | 97,2 | 2,6 | ,2 | 1399 |
| CONTINENCE URINAIRE | 98,4 | ,5 | 1,1 | 1328 |
| ALLER AUX TOILETTES | 98,5 | ,8 | ,6 | 1330 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 98,6 | ,9 | ,5 | 1330 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 98,8 | ,7 | ,4 | 1330 |
| Femme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 89,0 | 7,5 | 3,5 | 1487 |
| VUE | 92,0 | 6,3 | 1,8 | 1524 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 93,2 | 5,2 | 1,6 | 1492 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 93,5 | 4,9 | 1,5 | 1492 |
| AUDITION | 93,8 | 4,9 | 1,4 | 1521 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 94,3 | 4,2 | 1,5 | 1492 |
| CONTINENCE URINAIRE | 95,5 | 1,7 | 2,8 | 1484 |
| ALLER AUX TOILETTES | 97,3 | 1,7 | 1,1 | 1492 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 97,5 | 1,3 | 1,2 | 1492 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 98,1 | 1,4 | ,5 | 1492 |
| Total | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 92,1 | 5,5 | 2,4 | 2814 |
| AUDITION | 93,2 | 5,9 | ,9 | 2916 |
| VUE | 94,6 | 4,5 | 1,0 | 2923 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 94,9 | 4,0 | 1,0 | 2822 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 95,3 | 3,8 | ,9 | 2822 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 95,6 | 3,3 | 1,2 | 2822 |
| CONTINENCE URINAIRE | 96,9 | 1,1 | 2,0 | 2812 |
| ALLER AUX TOILETTES | 97,9 | 1,2 | ,9 | 2822 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 98,0 | 1,1 | ,9 | 2822 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 98,5 | 1,1 | ,5 | 2822 |

Personnes de 15 ans et plus

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PAS D'INCA- PACITE | INCA- PACITE MODEREE | INCA- PACITE SEVERE | TOTAL |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Homme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| AUDITION | 79,7 | 19,2 | 1,1 | 744 |
| MOBILITE | 80,7 | 13,1 | 6,2 | 653 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 84,0 | 12,0 | 4,0 | 655 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 84,9 | 10,7 | 4,3 | 655 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 87,2 | 9,9 | 3,0 | 654 |
| SE LAVES LES MAINS ET LE VISAGE | 92,0 | 6,4 | 1,7 | 655 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 92,8 | 6,2 | 1,0 | 655 |
| CONTINENCE URINAIRE | 94,0 | 1,7 | 4,3 | 647 |
| ALLER AUX TOILETTES | 94,7 | 3,9 | 1,4 | 655 |
| VUE | 95,4 | 3,9 | ,7 | 747 |
| Femme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 67,5 | 21,9 | 10,7 | 925 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 78,7 | 16,9 | 4,4 | 931 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 79,3 | 15,1 | 5,6 | 931 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 80,2 | 13,4 | 6,4 | 930 |
| AUDITION | 80,4 | 16,6 | 3,0 | 987 |
| VUE | 86,5 | 10,1 | 3,4 | 987 |
| CONTINENCE URINAIRE | 87,7 | 4,9 | 7,4 | 927 |
| ALLER AUX TOILETTES | 89,5 | 7,4 | 3,1 | 931 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 90,5 | 6,6 | 2,9 | 931 |
| SE LAVES LES MAINS ET LE VISAGE | 90,8 | 6,1 | 3,1 | 931 |
| Total | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 72,8 | 18,3 | 8,9 | 1578 |
| AUDITION | 80,1 | 17,6 | 2,3 | 1731 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 81,5 | 13,3 | 5,1 | 1586 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 81,7 | 12,8 | 5,5 | 1585 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 82,1 | 14,1 | 3,8 | 1585 |
| VUE | 90,1 | 7,6 | 2,3 | 1734 |
| CONTINENCE URINAIRE | 90,3 | 3,6 | 6,2 | 1574 |
| SE LAVES LES MAINS ET LE VISAGE | 91,2 | 6,2 | 2,5 | 1586 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 91,4 | 6,4 | 2,1 | 1586 |
| ALLER AUX TOILETTES | 91,6 | 6,0 | 2,4 | 1586 |

Personnes de 65 ans et plus

REGIO: 1 RÉGION FLAMANDE

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PAS D'INCA- PACITE | INCA- PACITE MODEREE | INCA- PACITE SEVERE | TOTAL |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Homme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| AUDITION | 77,9 | 21,1 | ,9 | 243 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 80,2 | 15,6 | 4,2 | 216 |
| MOBILITE | 83,6 | 11,1 | 5,4 | 215 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 84,7 | 9,3 | 6,0 | 215 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 87,4 | 8,6 | 4,0 | 216 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 89,6 | 8,5 | 1,9 | 216 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 90,2 | 8,4 | 1,4 | 216 |
| ALLER AUX TOILETTES | 95,1 | 3,9 | 1,0 | 216 |
| VUE | 96,4 | 3,2 | ,4 | 244 |
| CONTINENCE URINAIRE | 97,1 | 1,5 | 1,4 | 212 |
| Femme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 71,0 | 20,9 | 8,1 | 286 |
| AUDITION | 79,9 | 17,9 | 2,2 | 306 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 80,7 | 12,8 | 6,5 | 288 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 83,0 | 12,2 | 4,8 | 288 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 83,7 | 13,8 | 2,5 | 288 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 89,2 | 7,9 | 2,9 | 288 |
| ALLER AUX TOILETTES | 89,7 | 8,4 | 1,9 | 288 |
| CONTINENCE URINAIRE | 90,0 | 4,0 | 6,0 | 287 |
| VUE | 91,5 | 8,1 | ,4 | 306 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 91,5 | 6,8 | 1,7 | 288 |
| Total | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 76,2 | 16,9 | 7,0 | 501 |
| AUDITION | 79,1 | 19,2 | 1,7 | 549 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 80,5 | 14,0 | 5,6 | 504 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 83,7 | 11,0 | 5,3 | 503 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 85,2 | 11,6 | 3,1 | 504 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 89,6 | 8,1 | 2,3 | 504 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 90,7 | 7,5 | 1,8 | 504 |
| ALLER AUX TOILETTES | 91,9 | 6,6 | 1,5 | 504 |
| CONTINENCE URINAIRE | 92,9 | 3,0 | 4,1 | 499 |
| VUE | 93,5 | 6,1 | ,4 | 550 |

Personnes de 65 ans et plus

REGIO: 2 RÉGION BRUXELLOISE

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PAS D'INCA- PACITE | INCA- PACITE MODEREE | INCA- PACITE SEVERE | TOTAL |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Homme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 65,0 | 27,0 | 7,9 | 216 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 84,0 | 11,4 | 4,6 | 216 |
| AUDITION | 85,0 | 13,1 | 1,9 | 243 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 85,4 | 10,0 | 4,7 | 215 |
| ALLER AUX TOILETTES | 86,5 | 12,0 | 1,5 | 215 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 86,9 | 9,6 | 3,5 | 214 |
| CONTINENCE URINAIRE | 88,6 | 2,7 | 8,7 | 213 |
| VUE | 89,6 | 8,2 | 2,3 | 244 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 91,7 | 6,7 | 1,7 | 215 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 95,2 | 3,6 | 1,1 | 215 |
| Femme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 71,8 | 16,5 | 11,7 | 293 |
| AUDITION | 77,9 | 15,9 | 6,2 | 314 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 82,0 | 15,1 | 2,9 | 293 |
| VUE | 82,3 | 11,7 | 6,0 | 313 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 83,0 | 14,7 | 2,3 | 293 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 83,2 | 13,9 | 3,0 | 292 |
| CONTINENCE URINAIRE | 85,7 | 4,9 | 9,4 | 292 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 92,5 | 5,1 | 2,4 | 293 |
| ALLER AUX TOILETTES | 92,6 | 5,2 | 2,3 | 293 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 93,0 | 3,4 | 3,6 | 293 |
| Total | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 69,3 | 20,4 | 10,3 | 509 |
| AUDITION | 80,6 | 14,8 | 4,6 | 557 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 82,7 | 13,7 | 3,6 | 509 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 84,0 | 12,4 | 3,6 | 507 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE LEVER D'UN FAUTEUIL | 84,4 | 12,8 | 2,7 | 507 |
| VUE | 85,0 | 10,4 | 4,6 | 557 |
| CONTINENCE URINAIRE | 86,8 | 4,1 | 9,1 | 505 |
| ALLER AUX TOILETTES | 90,3 | 7,7 | 2,0 | 508 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 92,5 | 4,6 | 2,9 | 508 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 93,5 | 4,5 | 1,9 | 508 |

Personnes de 65 ans et plus

REGIO: 3 RÉGION WALLONE

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : IL14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PAS D'INCA- PACITE | INCA- PACITE MODEREE | INCA- PACITE SEVERE | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Homme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| AUDITION | 80,6 | 18,4 | 1,0 | 258 |
| MOBILITE | 82,3 | 10,9 | 6,8 | 222 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 85,6 | 12,7 | 1,7 | 224 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE | | | | |
| LEVER D'UN FAUTEUIL | 86,9 | 11,9 | 1,2 | 224 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 89,3 | 7,2 | 3,5 | 224 |
| CONTINENCE URINAIRE | 91,4 | 1,5 | 7,1 | 222 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 94,5 | 4,0 | 1,5 | 224 |
| VUE | 96,1 | 3,4 | ,5 | 259 |
| ALLER AUX TOILETTES | 97,2 | ,9 | 1,9 | 224 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 97,3 | 2,5 | ,1 | 224 |
| Femme | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 60,3 | 25,6 | 14,1 | 346 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE | | | | |
| LEVER D'UN FAUTEUIL | 69,8 | 22,3 | 7,9 | 350 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 72,8 | 19,2 | 8,0 | 350 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 78,3 | 14,0 | 7,7 | 350 |
| VUE | 80,8 | 12,5 | 6,6 | 368 |
| AUDITION | 82,2 | 14,9 | 2,9 | 367 |
| CONTINENCE URINAIRE | 85,2 | 6,0 | 8,8 | 348 |
| ALLER AUX TOILETTES | 88,0 | 6,7 | 5,3 | 350 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 89,0 | 5,5 | 5,5 | 350 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 91,4 | 6,0 | 2,6 | 350 |
| Total | | | | |
| INCAPACITE EN MATIERE DE | | | | |
| MOBILITE | 69,1 | 19,7 | 11,2 | 568 |
| TRANSFERT:S'ASSOIR DANS ET SE | | | | |
| LEVER D'UN FAUTEUIL | 76,5 | 18,2 | 5,3 | 574 |
| TRANSFERT:SE LEVER ET SE COUCHER | 77,8 | 16,6 | 5,5 | 574 |
| AUDITION | 81,5 | 16,3 | 2,2 | 625 |
| S'HABILLER ET SE DESHABILLER | 82,6 | 11,3 | 6,0 | 574 |
| VUE | 86,9 | 8,9 | 4,2 | 627 |
| CONTINENCE URINAIRE | 87,7 | 4,2 | 8,1 | 570 |
| SE LAVER LES MAINS ET LE VISAGE | 91,1 | 5,0 | 3,9 | 574 |
| ALLER AUX TOILETTES | 91,6 | 4,4 | 3,9 | 574 |
| MANGER ET COUPER LA NOURRITURE | 93,7 | 4,6 | 1,6 | 574 |

Personnes de 65 ans et plus

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITE CAUSEE PAR MALADIE CHRONIQUE, AFFECTION DE LONGUE DUREE OU HANDICAP | | | | | Total |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------|
| | Incapacité sevère | Incapacité modérée | Incapacité faible | Souffrance sans incapacité | Pas de souffrance d'une affection de longue durée | N |
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 2,7 | 5,6 | 8,1 | 6,6 | 77,0 | 4943 |
| Femme | 4,3 | 6,1 | 7,8 | 7,2 | 74,6 | 5203 |
| Total | 3,5 | 5,9 | 8,0 | 6,9 | 75,8 | 10146 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 0-14 | ,7 | ,7 | 3,3 | 4,0 | 91,3 | 1647 |
| 15-24 | ,9 | 1,6 | 4,6 | 4,0 | 89,0 | 1143 |
| 25-34 | 1,9 | 2,9 | 4,3 | 6,0 | 84,9 | 1637 |
| 35-44 | 4,2 | 5,4 | 9,6 | 5,5 | 75,3 | 1603 |
| 45-54 | 3,1 | 7,9 | 9,1 | 9,6 | 70,3 | 1283 |
| 55-64 | 5,2 | 11,4 | 15,0 | 10,2 | 58,2 | 1086 |
| 65-74 | 9,1 | 15,3 | 16,5 | 12,3 | 46,9 | 1071 |
| 75 + | 14,5 | 17,5 | 10,9 | 9,4 | 47,7 | 676 |
| Total | 3,5 | 5,9 | 8,0 | 6,9 | 75,8 | 10146 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 10,7 | 11,7 | 12,4 | 4,3 | 60,9 | 352 |
| Primaire | 9,3 | 11,2 | 12,2 | 6,6 | 60,6 | 1278 |
| Secondaire inférieur | 4,8 | 9,5 | 9,9 | 6,9 | 68,9 | 1652 |
| Secondaire supérieur | 2,4 | 5,1 | 6,7 | 7,3 | 78,5 | 2938 |
| Supérieur | 1,6 | 2,7 | 6,6 | 6,9 | 82,1 | 3507 |
| Total | 3,5 | 5,9 | 8,0 | 6,9 | 75,7 | 9727 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 6,5 | 7,0 | 7,8 | 4,8 | 73,9 | 783 |
| 20.000-30.000 | 5,6 | 7,3 | 9,3 | 7,8 | 69,9 | 2025 |
| 30.000-40.000 | 4,8 | 8,9 | 8,3 | 6,7 | 71,4 | 2361 |
| 40.000-60.000 | 1,8 | 3,8 | 8,1 | 6,6 | 79,6 | 3233 |
| >60.000 | 1,0 | 3,1 | 5,2 | 8,4 | 82,3 | 1285 |
| Total | 3,5 | 5,8 | 8,0 | 7,0 | 75,7 | 9687 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | ,7 | 2,2 | 5,5 | 7,1 | 84,5 | 5881 |
| Très mauvaise à moyenne | 13,6 | 22,8 | 21,9 | 8,9 | 32,8 | 2012 |
| Total | 3,5 | 6,7 | 9,0 | 7,5 | 73,3 | 7893 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 3,7 | 5,7 | 8,0 | 5,8 | 76,8 | 3699 |
| Dans le passé | 3,9 | 8,1 | 11,5 | 10,1 | 66,4 | 1908 |
| Modéré (< 20) | 3,0 | 5,1 | 8,5 | 8,0 | 75,4 | 1565 |
| Gros fumeur | 5,2 | 9,8 | 8,7 | 7,4 | 68,9 | 831 |
| Total | 3,8 | 6,5 | 9,0 | 7,4 | 73,3 | 8003 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | |
| Région Flamande | 2,7 | 5,1 | 7,3 | 7,6 | 77,3 | 3516 |
| Région Bruxelloise | 5,9 | 5,5 | 7,0 | 6,8 | 74,8 | 3018 |
| Région Wallonne | 4,2 | 7,3 | 9,5 | 5,5 | 73,5 | 3612 |

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Belgique | 3,5 | 5,9 | 8,0 | 6,9 | 75,8 | 10146 |
|----------|-----|-----|-----|-----|------|-------|

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITE CAUSEE PAR MALADIE CHRONIQUE, AFFECTION DE LONGUE DUREE OU HANDICAP | | | | | Total |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------|
| | Incapacité sevère | Incapacité modérée | Incapacité faible | Souffrance sans incapacité | Pas de souffrance d'une affection de longue durée | N |
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 1,8 | 4,7 | 7,6 | 7,6 | 78,3 | 1745 |
| Femme | 3,5 | 5,5 | 7,0 | 7,7 | 76,2 | 1771 |
| Total | 2,7 | 5,1 | 7,3 | 7,6 | 77,3 | 3516 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 0-14 | ,9 | ,6 | 2,7 | 4,4 | 91,4 | 548 |
| 15-24 | ,4 | 1,3 | 4,0 | 4,8 | 89,5 | 427 |
| 25-34 | ,7 | 2,9 | 4,0 | 6,9 | 85,5 | 589 |
| 35-44 | 3,6 | 4,8 | 8,4 | 6,9 | 76,3 | 531 |
| 45-54 | 2,5 | 8,2 | 7,2 | 9,7 | 72,4 | 464 |
| 55-64 | 3,8 | 9,2 | 16,0 | 11,7 | 59,3 | 403 |
| 65-74 | 6,5 | 12,3 | 16,9 | 13,6 | 50,8 | 363 |
| 75 + | 14,6 | 13,3 | 8,4 | 7,3 | 56,4 | 191 |
| Total | 2,7 | 5,1 | 7,3 | 7,6 | 77,3 | 3516 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 8,9 | 6,2 | 6,8 | 3,8 | 74,3 | 65 |
| Primaire | 6,3 | 10,0 | 12,1 | 8,9 | 62,7 | 423 |
| Secondaire inférieur | 4,1 | 8,6 | 9,7 | 7,5 | 70,1 | 600 |
| Secondaire supérieur | 2,2 | 5,0 | 6,4 | 8,1 | 78,4 | 1171 |
| Supérieur | 1,2 | 2,0 | 5,6 | 7,3 | 83,9 | 1137 |
| Total | 2,7 | 5,1 | 7,3 | 7,7 | 77,1 | 3396 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 11,6 | 7,5 | 12,4 | 6,7 | 61,7 | 117 |
| 20.000-30.000 | 3,7 | 8,5 | 9,8 | 11,1 | 66,9 | 604 |
| 30.000-40.000 | 4,4 | 7,7 | 6,4 | 6,8 | 74,6 | 855 |
| 40.000-60.000 | 1,3 | 2,6 | 7,3 | 6,7 | 82,1 | 1285 |
| >60.000 | ,4 | 2,6 | 4,0 | 8,9 | 84,0 | 460 |
| Total | 2,7 | 5,1 | 7,2 | 7,9 | 77,2 | 3321 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | ,8 | 2,0 | 4,8 | 7,7 | 84,7 | 2267 |
| Très mauvaise à moyenne | 10,0 | 23,6 | 24,8 | 10,0 | 31,6 | 563 |
| Total | 2,4 | 5,9 | 8,4 | 8,1 | 75,1 | 2830 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 2,4 | 5,0 | 7,3 | 6,1 | 79,2 | 1369 |
| Dans le passé | 3,2 | 6,2 | 11,2 | 10,9 | 68,4 | 697 |
| Modéré (< 20) | 1,9 | 5,0 | 7,8 | 8,7 | 76,6 | 560 |
| Gros fumeur | 3,5 | 11,6 | 6,8 | 8,3 | 69,8 | 238 |
| Total | 2,6 | 5,9 | 8,3 | 8,0 | 75,3 | 2864 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITE CAUSEE PAR MALADIE CHRONIQUE, AFFECTION DE LONGUE DUREE OU HANDICAP | | | | | Total |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------|
| | Incapacité sevère | Incapacité modérée | Incapacité faible | Souffrance sans incapacité | Pas de souffrance d'une affection de longue durée | N |
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 5,8 | 5,5 | 7,5 | 6,1 | 75,1 | 1457 |
| Femme | 6,1 | 5,4 | 6,6 | 7,5 | 74,4 | 1561 |
| Total | 5,9 | 5,5 | 7,0 | 6,8 | 74,8 | 3018 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 0-14 | 1,5 | ,5 | 2,1 | 4,7 | 91,2 | 477 |
| 15-24 | 2,1 | 2,2 | 5,4 | 4,0 | 86,3 | 313 |
| 25-34 | 3,3 | 2,9 | 4,4 | 4,6 | 84,9 | 495 |
| 35-44 | 5,2 | 2,4 | 7,1 | 4,7 | 80,6 | 484 |
| 45-54 | 5,9 | 8,1 | 11,0 | 7,9 | 67,1 | 379 |
| 55-64 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 10,1 | 57,7 | 312 |
| 65-74 | 17,2 | 8,6 | 12,1 | 13,5 | 48,6 | 322 |
| 75 + | 10,7 | 19,9 | 10,6 | 12,4 | 46,3 | 236 |
| Total | 5,9 | 5,5 | 7,0 | 6,8 | 74,8 | 3018 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 17,2 | 7,4 | 12,5 | 5,2 | 57,7 | 167 |
| Primaire | 15,8 | 7,1 | 6,9 | 2,6 | 67,7 | 363 |
| Secondaire inférieur | 7,0 | 8,8 | 6,9 | 5,6 | 71,7 | 423 |
| Secondaire supérieur | 3,2 | 5,2 | 6,0 | 10,0 | 75,4 | 703 |
| Supérieur | 1,6 | 3,4 | 6,4 | 6,4 | 82,1 | 1197 |
| Total | 5,7 | 5,4 | 6,9 | 6,7 | 75,3 | 2853 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 3,9 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 84,9 | 367 |
| 20.000-30.000 | 10,9 | 5,9 | 7,8 | 6,7 | 68,7 | 623 |
| 30.000-40.000 | 6,5 | 7,8 | 7,4 | 9,1 | 69,2 | 605 |
| 40.000-60.000 | 3,7 | 5,3 | 8,5 | 7,0 | 75,5 | 783 |
| >60.000 | 1,3 | 2,3 | 7,2 | 6,6 | 82,5 | 495 |
| Total | 5,6 | 5,3 | 7,2 | 6,8 | 75,1 | 2873 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | ,5 | 1,8 | 5,5 | 7,6 | 84,6 | 1665 |
| Très mauvaise à moyenne | 24,3 | 17,0 | 14,9 | 7,1 | 36,7 | 620 |
| Total | 6,6 | 5,7 | 7,8 | 7,5 | 72,4 | 2285 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 7,3 | 5,1 | 6,3 | 6,6 | 74,6 | 1009 |
| Dans le passé | 5,8 | 8,9 | 9,7 | 9,7 | 65,8 | 555 |
| Modéré (< 20) | 7,5 | 3,3 | 9,3 | 6,2 | 73,6 | 456 |
| Gros fumeur | 5,1 | 7,1 | 7,1 | 8,3 | 72,4 | 277 |
| Total | 6,8 | 5,8 | 7,8 | 7,4 | 72,3 | 2297 |

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITE CAUSEE PAR MALADIE CHRONIQUE, AFFECTION DE LONGUE DUREE OU HANDICAP | | | | | Total |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------|
| | Incapacité sevère | Incapacité modérée | Incapacité faible | Souffrance sans incapacité | Pas de souffrance d'une affection de longue durée | N |
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 3,3 | 7,3 | 9,2 | 5,0 | 75,2 | 1741 |
| Femme | 5,0 | 7,3 | 9,7 | 6,1 | 71,9 | 1871 |
| Total | 4,2 | 7,3 | 9,5 | 5,5 | 73,5 | 3612 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 0-14 | ,2 | ,9 | 4,5 | 3,3 | 91,2 | 622 |
| 15-24 | 1,2 | 1,8 | 5,3 | 2,6 | 89,1 | 403 |
| 25-34 | 3,6 | 2,9 | 4,9 | 4,9 | 83,7 | 553 |
| 35-44 | 5,0 | 7,3 | 12,5 | 3,3 | 71,9 | 588 |
| 45-54 | 3,5 | 7,3 | 12,1 | 9,8 | 67,3 | 440 |
| 55-64 | 6,0 | 16,4 | 14,7 | 7,0 | 55,9 | 371 |
| 65-74 | 10,2 | 22,1 | 17,5 | 9,9 | 40,3 | 386 |
| 75 + | 16,5 | 22,3 | 14,5 | 10,9 | 35,8 | 249 |
| Total | 4,2 | 7,3 | 9,5 | 5,5 | 73,5 | 3612 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 7,9 | 19,6 | 17,5 | 4,1 | 50,8 | 120 |
| Primaire | 12,1 | 14,7 | 14,4 | 4,4 | 54,4 | 492 |
| Secondaire inférieur | 5,5 | 11,3 | 10,9 | 6,2 | 66,1 | 629 |
| Secondaire supérieur | 2,6 | 5,5 | 7,5 | 4,9 | 79,5 | 1064 |
| Supérieur | 2,2 | 3,6 | 8,5 | 6,4 | 79,2 | 1173 |
| Total | 4,2 | 7,3 | 9,6 | 5,6 | 73,3 | 3478 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 4,6 | 8,0 | 7,2 | 4,4 | 75,8 | 299 |
| 20.000-30.000 | 6,5 | 6,2 | 9,2 | 3,5 | 74,6 | 798 |
| 30.000-40.000 | 5,0 | 11,0 | 11,3 | 5,9 | 66,9 | 901 |
| 40.000-60.000 | 2,4 | 5,7 | 9,6 | 6,4 | 75,8 | 1165 |
| >60.000 | 2,6 | 4,7 | 7,6 | 8,0 | 77,1 | 330 |
| Total | 4,2 | 7,3 | 9,6 | 5,6 | 73,4 | 3493 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | ,8 | 2,7 | 6,9 | 5,7 | 83,9 | 1949 |
| Très mauvaise à moyenne | 14,9 | 23,5 | 20,3 | 8,2 | 33,1 | 829 |
| Total | 4,6 | 8,3 | 10,5 | 6,4 | 70,2 | 2778 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 5,1 | 7,1 | 10,0 | 4,8 | 73,0 | 1321 |
| Dans le passé | 4,7 | 11,6 | 12,5 | 8,4 | 62,8 | 656 |
| Modéré (< 20) | 3,5 | 5,7 | 9,5 | 7,3 | 74,0 | 549 |
| Gros fumeur | 7,6 | 8,2 | 11,7 | 5,9 | 66,5 | 316 |
| Total | 5,0 | 7,9 | 10,7 | 6,3 | 70,2 | 2842 |

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PREVALENCE DE L'INVALIDITE OU HANDICAP OFFICIELLEMENT RECONNUS | | | | Total |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------|
| | Handicap reconnu | Handicap, demande en cours | Handicap, pas de demande | Pas de handicap | N |
| | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 5,6 | ,6 | 1,7 | 92,0 | 4949 |
| Femme | 4,8 | ,5 | 1,9 | 92,8 | 5201 |
| Total | 5,2 | ,6 | 1,8 | 92,4 | 10150 |
| GROUPE AGE | | | | | |
| 0-14 | ,7 | ,3 | ,2 | 98,8 | 1648 |
| 15-24 | 1,4 | ,4 | ,8 | 97,4 | 1142 |
| 25-34 | 2,5 | ,5 | 1,2 | 95,8 | 1633 |
| 35-44 | 6,2 | ,6 | 2,1 | 91,2 | 1602 |
| 45-54 | 6,7 | 1,3 | 1,4 | 90,7 | 1292 |
| 55-64 | 11,8 | ,2 | 2,8 | 85,2 | 1089 |
| 65-74 | 11,0 | ,4 | 4,6 | 83,9 | 1069 |
| 75 + | 12,5 | ,3 | 7,6 | 79,6 | 675 |
| Total | 5,2 | ,6 | 1,8 | 92,4 | 10150 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 13,7 | 1,6 | 4,4 | 80,3 | 351 |
| Primaire | 11,2 | ,8 | 4,5 | 83,5 | 1280 |
| Secondaire inférieur | 9,3 | ,9 | 2,1 | 87,7 | 1652 |
| Secondaire supérieur | 3,7 | ,4 | ,8 | 95,0 | 2939 |
| Supérieur | 2,3 | ,3 | 1,6 | 95,8 | 3506 |
| Total | 5,2 | ,5 | 1,8 | 92,4 | 9728 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 7,1 | 1,5 | 2,2 | 89,2 | 788 |
| 20.000-30.000 | 7,4 | ,7 | 2,0 | 89,8 | 2022 |
| 30.000-40.000 | 7,4 | ,8 | 2,3 | 89,5 | 2358 |
| 40.000-60.000 | 3,4 | ,4 | 1,8 | 94,4 | 3231 |
| >60.000 | 2,3 | ,1 | ,6 | 97,0 | 1288 |
| Total | 5,2 | ,6 | 1,8 | 92,4 | 9687 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 2,1 | ,1 | ,9 | 96,9 | 5888 |
| Très mauvaise à moyenne | 18,7 | 2,3 | 6,4 | 72,6 | 2009 |
| Total | 5,7 | ,6 | 2,1 | 91,7 | 7897 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 4,4 | ,4 | 2,2 | 93,0 | 3704 |
| Dans le passé | 7,7 | ,5 | 2,6 | 89,2 | 1911 |
| Modéré (< 20) | 4,9 | ,7 | 1,3 | 93,0 | 1561 |
| Gros fumeur | 8,5 | 1,6 | 2,8 | 87,1 | 831 |
| Total | 5,7 | ,6 | 2,2 | 91,5 | 8007 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | |
| Région Flamande | 3,9 | ,5 | 1,0 | 94,7 | 3512 |
| Région Bruxelloise | 5,9 | ,8 | 2,5 | 90,8 | 3028 |
| Région Wallonne | 7,3 | ,7 | 3,1 | 88,9 | 3610 |
| Belgique | 5,2 | ,6 | 1,8 | 92,4 | 10150 |

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PREVALENCE DE L'INVALIDITE OU HANDICAP OFFICIELLEMENT RECONNUS | | | | Total |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------|
| | Handicap reconnu | Handicap, demande en cours | Handicap, pas de demande | Pas de handicap | N |
| | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 3,8 | ,4 | 1,0 | 94,7 | 1742 |
| Femme | 4,1 | ,5 | ,9 | 94,6 | 1770 |
| Total | 3,9 | ,5 | 1,0 | 94,7 | 3512 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 0-14 | ,3 | ,4 | ,1 | 99,2 | 547 |
| 15-24 | ,9 | ,4 | ,8 | 98,0 | 428 |
| 25-34 | 1,5 | ,4 | ,5 | 97,6 | 585 |
| 35-44 | 6,0 | ,0 | 1,2 | 92,7 | 529 |
| 45-54 | 5,5 | 1,6 | ,8 | 92,1 | 466 |
| 55-64 | 8,2 | ,1 | 1,6 | 90,1 | 404 |
| 65-74 | 7,5 | ,5 | 1,9 | 90,1 | 361 |
| 75 + | 6,6 | ,3 | 3,3 | 89,8 | 192 |
| Total | 3,9 | ,5 | 1,0 | 94,7 | 3512 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 7,8 | ,0 | 1,3 | 90,8 | 65 |
| Primaire | 6,3 | ,9 | 2,7 | 90,1 | 424 |
| Secondaire inférieur | 7,3 | ,9 | 1,0 | 90,8 | 599 |
| Secondaire supérieur | 4,0 | ,2 | ,5 | 95,4 | 1168 |
| Supérieur | 1,3 | ,2 | ,9 | 97,6 | 1134 |
| Total | 3,9 | ,4 | 1,0 | 94,7 | 3390 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 6,5 | 2,2 | 2,8 | 88,5 | 119 |
| 20.000-30.000 | 5,8 | ,6 | ,8 | 92,8 | 598 |
| 30.000-40.000 | 6,5 | 1,0 | 1,1 | 91,3 | 856 |
| 40.000-60.000 | 2,4 | ,2 | ,9 | 96,6 | 1284 |
| >60.000 | 1,9 | ,0 | ,4 | 97,7 | 460 |
| Total | 4,0 | ,5 | ,9 | 94,6 | 3317 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,8 | ,0 | ,4 | 97,7 | 2266 |
| Très mauvaise à moyenne | 15,1 | 2,5 | 3,9 | 78,5 | 562 |
| Total | 4,2 | ,5 | 1,1 | 94,3 | 2828 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 3,6 | ,4 | ,9 | 95,1 | 1367 |
| Dans le passé | 6,0 | ,3 | 1,4 | 92,2 | 698 |
| Modéré (< 20) | 2,9 | ,6 | 1,5 | 95,1 | 557 |
| Gros fumeur | 5,2 | 1,2 | 1,0 | 92,6 | 238 |
| Total | 4,2 | ,5 | 1,2 | 94,2 | 2860 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PREVALENCE DE L'INVALIDITE OU HANDICAP OFFICIELLEMENT RECONNUS | | | | Total |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------|
| | Handicap reconnu | Handicap, demande en cours | Handicap, pas de demande | Pas de handicap | N |
| | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 7,5 | ,9 | 2,2 | 89,4 | 1463 |
| Femme | 4,4 | ,8 | 2,7 | 92,1 | 1565 |
| Total | 5,9 | ,8 | 2,5 | 90,8 | 3028 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 0-14 | ,5 | ,0 | ,0 | 99,5 | 478 |
| 15-24 | 2,7 | 1,2 | ,8 | 95,4 | 312 |
| 25-34 | 4,0 | ,9 | 1,8 | 93,2 | 496 |
| 35-44 | 4,2 | ,7 | 1,5 | 93,5 | 485 |
| 45-54 | 7,8 | 2,2 | 2,9 | 87,1 | 384 |
| 55-64 | 10,9 | ,3 | 2,8 | 86,1 | 313 |
| 65-74 | 12,4 | ,4 | 8,1 | 79,1 | 322 |
| 75 + | 14,2 | ,5 | 7,2 | 78,0 | 238 |
| Total | 5,9 | ,8 | 2,5 | 90,8 | 3028 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 15,3 | 2,1 | 3,3 | 79,2 | 166 |
| Primaire | 13,2 | ,9 | 5,5 | 80,5 | 366 |
| Secondaire inférieur | 7,9 | ,9 | 3,2 | 87,9 | 424 |
| Secondaire supérieur | 2,8 | ,7 | 1,2 | 95,3 | 705 |
| Supérieur | 2,6 | ,7 | 1,8 | 94,9 | 1201 |
| Total | 5,6 | ,9 | 2,4 | 91,1 | 2862 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 4,6 | 1,1 | 1,2 | 93,1 | 369 |
| 20.000-30.000 | 8,5 | 1,0 | 4,1 | 86,4 | 624 |
| 30.000-40.000 | 8,4 | ,6 | 2,9 | 88,1 | 604 |
| 40.000-60.000 | 4,1 | 1,0 | 2,1 | 92,8 | 785 |
| >60.000 | 1,8 | ,5 | 1,1 | 96,5 | 498 |
| Total | 5,7 | ,9 | 2,4 | 91,0 | 2880 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 2,3 | ,2 | 1,2 | 96,3 | 1674 |
| Très mauvaise à moyenne | 18,9 | 3,6 | 7,5 | 70,0 | 620 |
| Total | 6,4 | 1,0 | 2,8 | 89,8 | 2294 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 4,2 | 1,0 | 2,9 | 91,9 | 1013 |
| Dans le passé | 9,1 | 1,1 | 3,7 | 86,0 | 557 |
| Modéré (< 20) | 8,4 | ,8 | 2,5 | 88,3 | 458 |
| Gros fumeur | 7,2 | 1,3 | 2,1 | 89,4 | 277 |
| Total | 6,5 | 1,0 | 2,9 | 89,6 | 2305 |

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PREVALENCE DE L'INVALIDITE OU HANDICAP OFFICIELLEMENT RECONNUS | | | | Total |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------|
| | Handicap reconnu | Handicap, demande en cours | Handicap, pas de demande | Pas de handicap | N |
| | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 8,4 | ,8 | 2,8 | 88,0 | 1744 |
| Femme | 6,2 | ,6 | 3,5 | 89,8 | 1866 |
| Total | 7,3 | ,7 | 3,1 | 88,9 | 3610 |
| GROUPE AGE | | | | | |
| 0-14 | 1,2 | ,4 | ,4 | 98,0 | 623 |
| 15-24 | 1,9 | ,2 | 1,0 | 96,9 | 402 |
| 25-34 | 3,8 | ,7 | 2,1 | 93,4 | 552 |
| 35-44 | 6,9 | 1,7 | 3,7 | 87,7 | 588 |
| 45-54 | 8,4 | ,5 | 2,1 | 89,0 | 442 |
| 55-64 | 19,6 | ,4 | 5,3 | 74,6 | 372 |
| 65-74 | 16,0 | ,4 | 7,7 | 75,9 | 386 |
| 75 + | 20,2 | ,3 | 14,1 | 65,4 | 245 |
| Total | 7,3 | ,7 | 3,1 | 88,9 | 3610 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 18,0 | 2,7 | 7,9 | 71,4 | 120 |
| Primaire | 18,6 | ,7 | 7,2 | 73,6 | 490 |
| Secondaire inférieur | 13,0 | ,9 | 3,6 | 82,5 | 629 |
| Secondaire supérieur | 3,4 | ,8 | 1,5 | 94,2 | 1066 |
| Supérieur | 3,8 | ,2 | 2,7 | 93,2 | 1171 |
| Total | 7,4 | ,7 | 3,2 | 88,7 | 3476 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 8,9 | 1,2 | 2,3 | 87,6 | 300 |
| 20.000-30.000 | 9,3 | ,9 | 3,0 | 86,7 | 800 |
| 30.000-40.000 | 8,5 | ,6 | 3,8 | 87,1 | 898 |
| 40.000-60.000 | 5,2 | ,6 | 3,5 | 90,7 | 1162 |
| >60.000 | 3,7 | ,3 | 1,0 | 95,0 | 330 |
| Total | 7,2 | ,7 | 3,2 | 89,0 | 3490 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 2,6 | ,2 | 1,8 | 95,3 | 1948 |
| Très mauvaise à moyenne | 23,2 | 1,8 | 9,1 | 65,9 | 827 |
| Total | 8,1 | ,7 | 3,8 | 87,5 | 2775 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 6,2 | ,3 | 4,2 | 89,3 | 1324 |
| Dans le passé | 10,6 | ,6 | 4,6 | 84,2 | 656 |
| Modéré (< 20) | 7,3 | 1,0 | ,7 | 91,0 | 546 |
| Gros fumeur | 13,6 | 2,2 | 5,5 | 78,8 | 316 |
| Total | 8,3 | ,7 | 3,8 | 87,2 | 2842 |

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| LE POURCENTAGE RECONNU OFFICIELLEMENT DU HANDICAP OU DE L'INVALIDITE | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-----|
| | Moyenne | 25 ^e Percentile | Médiane | 75 ^e Percentile | N |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 59,9 | 65,0 | 66,0 | 69,0 | 284 |
| Femme | 60,2 | 65,0 | 66,0 | 70,0 | 223 |
| Total | 60,0 | 65,0 | 66,0 | 69,0 | 507 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 0-14 | 56,5 | 60,0 | 66,0 | 80,0 | 14 |
| 15-24 | 59,3 | 60,0 | 66,0 | 80,0 | 17 |
| 25-34 | 53,9 | 15,0 | 66,0 | 70,0 | 37 |
| 35-44 | 64,5 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 72 |
| 45-54 | 51,7 | 17,0 | 66,0 | 66,0 | 76 |
| 55-64 | 60,2 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 109 |
| 65-74 | 60,1 | 60,0 | 66,0 | 80,0 | 119 |
| 75 + | 74,7 | 66,0 | 75,0 | 85,0 | 63 |
| Total | 60,0 | 65,0 | 66,0 | 69,0 | 507 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 66,3 | 65,0 | 66,0 | 80,0 | 36 |
| Primaire | 65,5 | 66,0 | 66,0 | 79,0 | 130 |
| Secondaire inférieur | 60,1 | 65,0 | 66,0 | 70,0 | 137 |
| Secondaire supérieur | 58,9 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 99 |
| Supérieur | 50,4 | 7,0 | 66,0 | 80,0 | 88 |
| Total | 60,0 | 65,0 | 66,0 | 69,0 | 490 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 75,8 | 66,0 | 70,0 | 100,0 | 38 |
| 20.000-30.000 | 59,6 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 135 |
| 30.000-40.000 | 62,6 | 66,0 | 66,0 | 71,0 | 167 |
| 40.000-60.000 | 55,2 | 20,0 | 66,0 | 70,0 | 110 |
| >60.000 | 54,0 | 25,0 | 66,0 | 66,0 | 24 |
| Total | 60,5 | 65,0 | 66,0 | 70,0 | 474 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 46,4 | 15,0 | 65,0 | 66,0 | 103 |
| Très mauvaise à moyenne | 63,0 | 66,0 | 66,0 | 71,0 | 329 |
| Total | 58,5 | 60,0 | 66,0 | 67,0 | 432 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 56,3 | 40,0 | 66,0 | 67,0 | 160 |
| Dans le passé | 55,5 | 37,0 | 66,0 | 66,0 | 151 |
| Modéré (< 20) | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 80 |
| Gros fumeur | 67,8 | 66,0 | 66,0 | 72,0 | 53 |
| Total | 59,2 | 61,0 | 66,0 | 67,0 | 444 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | |
| Région Flamande | 52,7 | 25,0 | 66,0 | 66,0 | 135 |
| Région Bruxelloise | 63,9 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 149 |
| Région Wallonne | 66,8 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 223 |
| Belgique | 60,0 | 65,0 | 66,0 | 69,0 | 507 |

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| LE POURCENTAGE RECONNU OFFICIELLEMENT DU HANDICAP OU DE L'INVALIDITE | | | | | |
|---|---------|-------------------|---------|-------------------|-----|
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | N |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 52,9 | 25,0 | 66,0 | 66,0 | 70 |
| Femme | 52,5 | 30,0 | 66,0 | 66,0 | 65 |
| Total | 52,7 | 25,0 | 66,0 | 66,0 | 135 |
| GROUPE AGE | | | | | |
| 0-14 | 28,9 | 1,0 | 1,0 | 80,0 | 2 |
| 15-24 | 56,7 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 5 |
| 25-34 | 42,8 | 8,0 | 66,0 | 66,0 | 9 |
| 35-44 | 62,1 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 21 |
| 45-54 | 41,9 | 7,0 | 66,0 | 66,0 | 26 |
| 55-64 | 54,9 | 35,0 | 66,0 | 66,0 | 31 |
| 65-74 | 48,4 | 20,0 | 66,0 | 66,0 | 23 |
| 75 + | 71,1 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 18 |
| Total | 52,7 | 25,0 | 66,0 | 66,0 | 135 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 73,3 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 7 |
| Primaire | 53,3 | 35,0 | 66,0 | 66,0 | 31 |
| Secondaire inférieur | 54,2 | 30,0 | 66,0 | 66,0 | 40 |
| Secondaire supérieur | 56,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 34 |
| Supérieur | 28,8 | 1,0 | 5,0 | 66,0 | 17 |
| Total | 52,5 | 30,0 | 66,0 | 66,0 | 129 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 71,5 | 66,0 | 66,0 | 95,0 | 7 |
| 20.000-30.000 | 53,3 | 30,0 | 66,0 | 66,0 | 33 |
| 30.000-40.000 | 57,9 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 53 |
| 40.000-60.000 | 41,4 | 8,0 | 65,0 | 66,0 | 31 |
| >60.000 | 61,5 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 6 |
| Total | 53,8 | 35,0 | 66,0 | 66,0 | 130 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 40,6 | 6,0 | 66,0 | 66,0 | 34 |
| Très mauvaise à moyenne | 56,5 | 60,0 | 66,0 | 66,0 | 81 |
| Total | 51,4 | 20,0 | 66,0 | 66,0 | 115 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 47,0 | 15,0 | 66,0 | 66,0 | 47 |
| Dans le passé | 52,2 | 15,0 | 66,0 | 66,0 | 39 |
| Modéré (< 20) | 55,9 | 55,0 | 66,0 | 66,0 | 19 |
| Gros fumeur | 65,4 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 11 |
| Total | 52,2 | 25,0 | 66,0 | 66,0 | 116 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| LE POURCENTAGE RECONNU OFFICIELLEMENT DU HANDICAP OU DE L'INVALIDITE | | | | | |
|---|---------|-------------------|---------|-------------------|-----|
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | N |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 63,5 | 66,0 | 66,0 | 75,0 | 87 |
| Femme | 64,7 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 62 |
| Total | 63,9 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 149 |
| GROUPE AGE | | | | | |
| 0-14 | 63,9 | 66,0 | 80,0 | 80,0 | 4 |
| 15-24 | 77,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 3 |
| 25-34 | 56,4 | 60,0 | 66,0 | 66,0 | 14 |
| 35-44 | 62,4 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 17 |
| 45-54 | 64,1 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 23 |
| 55-64 | 63,9 | 66,0 | 66,0 | 68,0 | 25 |
| 65-74 | 62,2 | 37,0 | 66,0 | 80,0 | 38 |
| 75 + | 69,6 | 66,0 | 80,0 | 85,0 | 25 |
| Total | 63,9 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 149 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 66,4 | 60,0 | 66,0 | 80,0 | 17 |
| Primaire | 69,2 | 66,0 | 66,0 | 68,0 | 34 |
| Secondaire inférieur | 59,5 | 61,0 | 66,0 | 80,0 | 34 |
| Secondaire supérieur | 60,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 24 |
| Supérieur | 57,6 | 40,0 | 66,0 | 70,0 | 29 |
| Total | 63,6 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 138 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 72,1 | 66,0 | 66,0 | 86,0 | 16 |
| 20.000-30.000 | 66,4 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 42 |
| 30.000-40.000 | 64,2 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 45 |
| 40.000-60.000 | 59,2 | 60,0 | 68,0 | 80,0 | 24 |
| >60.000 | 47,5 | 25,0 | 40,0 | 66,0 | 7 |
| Total | 64,3 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 134 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 49,9 | 37,0 | 60,0 | 66,0 | 23 |
| Très mauvaise à moyenne | 66,6 | 66,0 | 66,0 | 69,0 | 100 |
| Total | 63,0 | 66,0 | 66,0 | 68,0 | 123 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 68,7 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 35 |
| Dans le passé | 58,2 | 37,0 | 66,0 | 68,0 | 49 |
| Modéré (< 20) | 66,7 | 66,0 | 66,0 | 68,0 | 30 |
| Gros fumeur | 54,8 | 20,0 | 66,0 | 66,0 | 15 |
| Total | 62,9 | 66,0 | 66,0 | 68,0 | 129 |

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| LE POURCENTAGE RECONNU OFFICIELLEMENT DU HANDICAP OU DE L'INVALIDITE | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-----|
| | Moyenne | 25 ^e Percentile | Médiane | 75 ^e Percentile | N |
| SEXE | | | | | |
| Homme | 64,8 | 65,0 | 66,0 | 78,0 | 127 |
| Femme | 69,6 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 96 |
| Total | 66,8 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 223 |
| GROUPE AGE | | | | | |
| 0-14 | 68,5 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 8 |
| 15-24 | 58,0 | 60,0 | 66,0 | 80,0 | 9 |
| 25-34 | 63,6 | 55,0 | 67,0 | 85,0 | 14 |
| 35-44 | 68,8 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 34 |
| 45-54 | 63,4 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 27 |
| 55-64 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 53 |
| 65-74 | 68,4 | 66,0 | 67,0 | 80,0 | 58 |
| 75 + | 79,6 | 65,0 | 75,0 | 100,0 | 20 |
| Total | 66,8 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 223 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 62,4 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 12 |
| Primaire | 71,5 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 65 |
| Secondaire inférieur | 66,3 | 66,0 | 66,0 | 72,0 | 63 |
| Secondaire supérieur | 66,5 | 66,0 | 66,0 | 75,0 | 41 |
| Supérieur | 62,1 | 60,0 | 66,0 | 90,0 | 42 |
| Total | 66,8 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 223 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 79,5 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 15 |
| 20.000-30.000 | 63,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 60 |
| 30.000-40.000 | 69,0 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 69 |
| 40.000-60.000 | 67,7 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 55 |
| >60.000 | 42,0 | 17,0 | 65,0 | 66,0 | 11 |
| Total | 66,6 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 210 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 54,3 | 55,0 | 65,0 | 66,0 | 46 |
| Très mauvaise à moyenne | 68,3 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 148 |
| Total | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 80,0 | 194 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 65,3 | 66,0 | 66,0 | 80,0 | 78 |
| Dans le passé | 58,6 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 63 |
| Modéré (< 20) | 69,5 | 65,0 | 66,0 | 80,0 | 31 |
| Gros fumeur | 71,3 | 66,0 | 66,0 | 90,0 | 27 |
| Total | 65,4 | 66,0 | 66,0 | 78,0 | 199 |

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB07_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CAUSE DE L'INVALIDITE OU HANDICAP | | | | | | | | Total |
|-------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | | |
| Homme | 14,3 | 13,1 | 1,6 | 4,6 | ,5 | 37,0 | 9,8 | 19,1 | 445 |
| Femme | 6,5 | 2,9 | 5,1 | 6,1 | ,7 | 43,4 | 13,0 | 22,2 | 407 |
| Total | 10,7 | 8,3 | 3,3 | 5,3 | ,6 | 40,0 | 11,3 | 20,5 | 852 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | | |
| 0-14 | ,0 | ,0 | 12,2 | ,0 | ,0 | 27,6 | 45,0 | 15,2 | 23 |
| 15-24 | 2,4 | ,0 | 3,7 | 19,5 | ,0 | 15,6 | 47,0 | 11,7 | 35 |
| 25-34 | 12,3 | 7,0 | 2,8 | 9,7 | ,8 | 31,3 | 19,8 | 16,2 | 75 |
| 35-44 | 16,9 | 5,1 | 2,7 | 1,9 | 1,2 | 39,4 | 13,6 | 19,1 | 117 |
| 45-54 | 16,6 | 9,9 | 2,2 | 8,5 | 1,2 | 32,7 | 7,8 | 21,1 | 131 |
| 55-64 | 7,6 | 17,3 | 1,5 | 3,5 | ,0 | 42,7 | 4,7 | 22,6 | 142 |
| 65-74 | 8,0 | 6,6 | 3,6 | 3,8 | ,3 | 53,9 | 3,2 | 20,5 | 192 |
| 75 + | 2,0 | 5,9 | 6,9 | 1,7 | ,0 | 51,2 | 4,2 | 28,1 | 137 |
| Total | 10,7 | 8,3 | 3,3 | 5,3 | ,6 | 40,0 | 11,3 | 20,5 | 852 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 13,7 | 25,5 | 3,1 | 3,1 | ,0 | 32,6 | 10,1 | 11,9 | 71 |
| Primaire | 11,8 | 9,4 | 2,6 | 6,3 | ,0 | 46,7 | 6,4 | 16,8 | 219 |
| Secondaire inférieur | 13,0 | 6,3 | 3,6 | 4,0 | 1,1 | 40,1 | 12,1 | 19,8 | 210 |
| Secondaire supérieur | 5,6 | 6,6 | 4,6 | 3,8 | 1,1 | 48,0 | 9,9 | 20,6 | 162 |
| Supérieur | 10,6 | 5,1 | 1,4 | 9,4 | ,5 | 29,5 | 15,7 | 27,9 | 158 |
| Total | 10,6 | 8,3 | 3,1 | 5,5 | ,6 | 40,7 | 10,9 | 20,2 | 820 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | | |
| < 20.000 | 10,1 | 2,3 | 3,3 | 7,1 | ,0 | 49,6 | 10,9 | 16,8 | 74 |
| 20.000-30.000 | 8,2 | 9,1 | 4,7 | 4,6 | ,0 | 45,5 | 11,5 | 16,4 | 229 |
| 30.000-40.000 | 9,1 | 6,8 | 1,6 | 4,2 | 1,7 | 40,8 | 12,2 | 23,5 | 267 |
| 40.000-60.000 | 15,8 | 12,9 | 4,2 | 5,1 | ,1 | 30,7 | 10,7 | 20,3 | 192 |
| >60.000 | 10,6 | 4,1 | 3,0 | 12,9 | ,0 | 46,5 | 5,1 | 17,9 | 45 |
| Total | 10,8 | 8,5 | 3,4 | 5,3 | ,6 | 40,5 | 11,1 | 19,8 | 807 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 14,7 | 10,6 | 1,7 | 8,0 | 2,2 | 27,9 | 15,7 | 19,2 | 188 |
| Très mauvaise à moyenne | 9,5 | 7,7 | 3,8 | 4,2 | ,1 | 44,8 | 8,6 | 21,3 | 543 |
| Total | 11,0 | 8,5 | 3,2 | 5,3 | ,7 | 39,9 | 10,6 | 20,7 | 731 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | | |
| Jamais | 10,3 | 5,6 | 3,7 | 5,2 | ,7 | 45,0 | 14,3 | 15,1 | 308 |
| Dans le passé | 11,2 | 10,6 | 1,9 | 5,2 | 1,0 | 42,2 | 2,6 | 25,3 | 222 |
| Modéré (< 20) | 10,0 | 12,6 | 4,3 | 5,9 | ,2 | 38,6 | 9,1 | 19,2 | 129 |
| Gros fumeur | 16,3 | 7,2 | 2,8 | 1,9 | ,2 | 25,8 | 18,1 | 27,8 | 92 |
| Total | 11,4 | 8,5 | 3,2 | 4,8 | ,6 | 40,2 | 10,6 | 20,7 | 751 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | | | | |
| Région Flamande | 12,9 | 7,5 | 2,8 | 5,2 | ,5 | 38,5 | 12,1 | 20,5 | 193 |
| Région Bruxelloise | 9,5 | 8,5 | 4,6 | 6,7 | 1,4 | 43,7 | 6,1 | 19,6 | 267 |
| Région Wallonne | 9,0 | 9,0 | 3,3 | 5,0 | ,5 | 40,4 | 12,0 | 20,8 | 392 |
| Belgique | 10,7 | 8,3 | 3,3 | 5,3 | ,6 | 40,0 | 11,3 | 20,5 | 852 |

1 : Accident de travail

2 : Maladie professionnelle

- 3 : Accident domestique
4 : Accident de la route
5 : Accident de sport
6 : Maladie
7 : Affection congénitale
8 : Autre raison

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB07_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CAUSE D'INVALIDITE OU HANDICAP | | | | | | | | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | | |
| Homme | 14,8 | 10,6 | ,5 | 3,4 | 1,1 | 39,4 | 11,8 | 18,5 | 101 |
| Femme | 10,9 | 4,4 | 5,2 | 6,9 | ,0 | 37,6 | 12,4 | 22,6 | 92 |
| Total | 12,9 | 7,5 | 2,8 | 5,2 | ,5 | 38,5 | 12,1 | 20,5 | 193 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | | |
| 0-14 | ,0 | ,0 | 26,8 | ,0 | ,0 | 26,8 | 46,4 | ,0 | 5 |
| 15-24 | ,0 | ,0 | 4,7 | 24,6 | ,0 | 11,8 | 42,0 | 16,8 | 10 |
| 25-34 | 2,9 | 15,7 | ,0 | 16,2 | ,0 | 25,2 | 32,4 | 7,5 | 16 |
| 35-44 | 19,0 | 6,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 50,7 | 11,0 | 12,5 | 25 |
| 45-54 | 25,2 | 10,8 | ,8 | 5,1 | 2,4 | 23,6 | 7,1 | 25,0 | 37 |
| 55-64 | 4,3 | 9,3 | 1,3 | 5,1 | ,0 | 46,5 | 5,5 | 28,0 | 39 |
| 65-74 | 13,4 | 1,4 | 5,5 | 1,9 | ,0 | 49,5 | 4,7 | 23,6 | 35 |
| 75 + | ,0 | ,0 | 14,7 | ,0 | ,0 | 48,8 | ,0 | 36,5 | 26 |
| Total | 12,9 | 7,5 | 2,8 | 5,2 | ,5 | 38,5 | 12,1 | 20,5 | 193 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | ,0 | 18,5 | 13,5 | ,0 | ,0 | 42,3 | ,0 | 25,7 | 9 |
| Primaire | 18,4 | 10,5 | 1,4 | 7,0 | ,0 | 30,5 | 8,1 | 24,0 | 47 |
| Secondaire inférieur | 15,6 | 9,6 | 3,9 | 3,7 | 1,9 | 33,8 | 13,8 | 17,8 | 57 |
| Secondaire supérieur | 6,1 | 5,7 | 2,6 | 1,9 | ,0 | 57,8 | 10,5 | 15,4 | 44 |
| Supérieur | 16,7 | 3,5 | ,0 | 15,2 | ,0 | 24,5 | 11,2 | 28,8 | 28 |
| Total | 12,7 | 7,8 | 2,7 | 5,4 | ,6 | 39,8 | 10,8 | 20,2 | 185 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | | |
| < 20.000 | ,0 | ,0 | ,0 | 21,1 | ,0 | 46,6 | 7,2 | 25,2 | 13 |
| 20.000-30.000 | 5,3 | 2,8 | 4,6 | 6,0 | ,0 | 52,8 | 13,3 | 15,2 | 46 |
| 30.000-40.000 | 11,6 | 6,9 | ,4 | 2,9 | 1,6 | 39,4 | 15,1 | 22,2 | 72 |
| 40.000-60.000 | 25,9 | 18,4 | 5,5 | 2,9 | ,0 | 18,1 | 12,2 | 17,0 | 48 |
| >60.000 | 10,1 | ,0 | 3,8 | 10,5 | ,0 | 67,4 | ,0 | 8,1 | 8 |
| Total | 12,7 | 7,9 | 3,0 | 5,4 | ,6 | 39,7 | 12,4 | 18,4 | 187 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 19,5 | 10,1 | 1,9 | 9,5 | 2,0 | 32,9 | 17,0 | 7,2 | 49 |
| Très mauvaise à moyenne | 9,5 | 7,7 | 2,8 | 3,6 | ,0 | 38,8 | 10,0 | 27,6 | 117 |
| Total | 12,6 | 8,4 | 2,6 | 5,5 | ,6 | 37,0 | 12,2 | 21,2 | 166 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | | |
| Jamais | 17,5 | 5,5 | 4,2 | 5,0 | 1,5 | 37,2 | 14,2 | 14,9 | 73 |
| Dans le passé | 9,8 | 16,3 | ,0 | 3,4 | ,0 | 43,0 | 1,7 | 25,9 | 52 |
| Modéré (< 20) | 13,1 | ,0 | 1,9 | 8,5 | ,0 | 39,8 | 17,8 | 18,8 | 30 |
| Gros fumeur | 12,2 | 8,6 | 2,2 | ,0 | ,0 | 19,1 | 19,8 | 38,1 | 15 |
| Total | 13,8 | 8,2 | 2,3 | 4,5 | ,6 | 37,2 | 11,7 | 21,7 | 170 |

- 1 : Accident de travail
- 2 : Maladie professionnelle
- 3 : Accident domestique
- 4 : Accident de la route
- 5 : Accident de sport
- 6 : Maladie
- 7 : Affection congénitale
- 8 : Autre raison

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB07_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CAUSE D'INVALIDITE OU HANDICAP | | | | | | | | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | | |
| Homme | 14,0 | 14,4 | 3,9 | 6,2 | ,9 | 39,8 | 4,6 | 16,1 | 135 |
| Femme | 4,0 | 1,4 | 5,4 | 7,2 | 2,0 | 48,3 | 8,0 | 23,7 | 132 |
| Total | 9,5 | 8,5 | 4,6 | 6,7 | 1,4 | 43,7 | 6,1 | 19,6 | 267 |
| GROUPE AGE | | | | | | | | | |
| 0-14 | ,0 | ,0 | 23,3 | ,0 | ,0 | 47,4 | 29,3 | ,0 | 5 |
| 15-24 | 12,7 | ,0 | 8,2 | ,0 | ,0 | 44,1 | 22,3 | 12,7 | 12 |
| 25-34 | 6,7 | ,0 | 12,7 | 6,6 | 5,8 | 36,2 | 5,0 | 27,0 | 26 |
| 35-44 | 13,8 | 5,9 | 6,2 | 8,2 | 2,5 | 38,2 | 11,4 | 13,8 | 32 |
| 45-54 | 6,4 | 1,5 | 7,2 | 13,4 | ,0 | 35,0 | 1,8 | 34,7 | 43 |
| 55-64 | 11,9 | 22,6 | 1,0 | 4,8 | ,0 | 41,3 | 8,5 | 9,9 | 37 |
| 65-74 | 12,6 | 1,3 | ,0 | 4,0 | 2,2 | 68,3 | 1,2 | 10,3 | 62 |
| 75 + | 5,1 | 22,7 | 1,2 | 6,4 | ,0 | 36,3 | 3,3 | 24,9 | 50 |
| Total | 9,5 | 8,5 | 4,6 | 6,7 | 1,4 | 43,7 | 6,1 | 19,6 | 267 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 29,4 | 17,0 | ,0 | 3,5 | ,0 | 37,7 | 6,7 | 5,7 | 31 |
| Primaire | 5,2 | 7,5 | 1,5 | 5,8 | ,0 | 55,0 | 8,1 | 16,9 | 56 |
| Secondaire inférieur | 5,2 | 4,3 | 5,6 | 7,1 | 2,4 | 54,3 | ,0 | 21,0 | 62 |
| Secondaire supérieur | 5,6 | 5,1 | 7,1 | 5,2 | 2,1 | 38,7 | 4,0 | 32,1 | 43 |
| Supérieur | 6,5 | ,6 | 7,3 | 13,9 | 3,4 | 35,2 | 10,4 | 22,7 | 57 |
| Total | 9,7 | 6,7 | 4,1 | 7,3 | 1,5 | 45,1 | 6,2 | 19,3 | 249 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | | |
| < 20.000 | 17,9 | ,0 | 5,7 | 1,7 | ,0 | 56,0 | 5,8 | 13,0 | 27 |
| 20.000-30.000 | 10,8 | 13,6 | 7,4 | 6,3 | ,0 | 40,3 | 6,8 | 14,8 | 80 |
| 30.000-40.000 | 5,1 | 3,1 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 58,3 | 7,4 | 16,4 | 76 |
| 40.000-60.000 | 9,4 | 15,0 | ,0 | 13,1 | 1,1 | 36,7 | 1,4 | 23,3 | 47 |
| >60.000 | 14,3 | ,0 | 7,5 | 10,0 | ,0 | 17,0 | 3,4 | 47,9 | 16 |
| Total | 10,0 | 8,8 | 4,9 | 6,5 | 1,0 | 44,4 | 5,6 | 18,9 | 246 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 15,4 | 3,2 | 4,8 | 9,2 | 4,3 | 31,4 | 7,4 | 24,2 | 55 |
| Très mauvaise à moyenne | 6,7 | 8,5 | 4,7 | 4,9 | ,7 | 51,7 | 5,9 | 16,9 | 168 |
| Total | 9,0 | 7,1 | 4,7 | 6,1 | 1,7 | 46,3 | 6,3 | 18,8 | 223 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | | |
| Jamais | 5,5 | 5,8 | 4,2 | 9,2 | ,0 | 46,9 | 10,2 | 18,1 | 85 |
| Dans le passé | 13,0 | ,7 | ,0 | 7,6 | 1,7 | 58,1 | 1,8 | 17,1 | 69 |
| Modéré (< 20) | 7,8 | 16,4 | 9,8 | 4,7 | 1,3 | 37,4 | 4,6 | 18,0 | 47 |
| Gros fumeur | 14,3 | 5,5 | 6,0 | 2,3 | 1,9 | 36,7 | 10,6 | 22,9 | 30 |
| Total | 9,3 | 6,9 | 4,6 | 6,8 | 1,1 | 46,5 | 6,4 | 18,4 | 231 |

- 1 : Accident de travail
- 2 : Maladie professionnelle
- 3 : Accident domestique
- 4 : Accident de la route
- 5 : Accident de sport
- 6 : Maladie
- 7 : Affection congénitale

8 : Autre raison

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITE PHYSIQUE DE LONGUE DUREE (INDICATEUR : MB07_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CAUSE D'INVALIDITE OU HANDICAP | | | | | | | | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|------|-----|------|-----|------|------|------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | | |
| Homme | 14,0 | 14,9 | 1,9 | 5,0 | ,0 | 34,3 | 9,5 | 20,4 | 209 |
| Femme | 2,7 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 48,0 | 15,2 | 21,4 | 183 |
| Total | 9,0 | 9,0 | 3,3 | 5,0 | ,5 | 40,4 | 12,0 | 20,8 | 392 |
| GROUPE AGE | | | | | | | | | |
| 0-14 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,4 | 45,3 | 28,2 | 13 |
| 15-24 | ,0 | ,0 | ,0 | 23,5 | ,0 | 5,5 | 66,1 | 5,0 | 13 |
| 25-34 | 22,1 | 1,8 | 2,2 | 5,1 | ,0 | 34,9 | 13,7 | 20,3 | 33 |
| 35-44 | 15,2 | 3,0 | 5,0 | 2,9 | 2,4 | 27,1 | 16,9 | 27,5 | 60 |
| 45-54 | 8,0 | 11,5 | 2,5 | 11,7 | ,0 | 44,5 | 10,9 | 10,9 | 51 |
| 55-64 | 9,9 | 24,1 | 1,8 | 1,6 | ,0 | 39,2 | 3,0 | 20,2 | 66 |
| 65-74 | 3,2 | 11,4 | 3,5 | 4,9 | ,0 | 52,5 | 3,0 | 21,6 | 95 |
| 75 + | 1,8 | 2,1 | 5,7 | ,7 | ,0 | 57,6 | 6,1 | 25,9 | 61 |
| Total | 9,0 | 9,0 | 3,3 | 5,0 | ,5 | 40,4 | 12,0 | 20,8 | 392 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 10,3 | 31,7 | 1,5 | 3,8 | ,0 | 27,2 | 14,8 | 10,6 | 31 |
| Primaire | 9,3 | 9,1 | 3,7 | 6,0 | ,0 | 55,5 | 4,7 | 11,8 | 116 |
| Secondaire inférieur | 11,8 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | ,0 | 43,8 | 12,6 | 21,5 | 91 |
| Secondaire supérieur | 4,7 | 8,3 | 7,6 | 6,7 | 2,8 | 32,8 | 10,2 | 27,0 | 75 |
| Supérieur | 7,9 | 7,1 | ,8 | 4,7 | ,0 | 31,1 | 19,8 | 28,6 | 73 |
| Total | 9,0 | 9,1 | 3,3 | 5,0 | ,5 | 40,4 | 12,1 | 20,6 | 386 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | | |
| < 20.000 | 14,0 | 4,4 | 4,7 | ,0 | ,0 | 49,6 | 14,6 | 12,7 | 34 |
| 20.000-30.000 | 9,6 | 12,9 | 3,8 | 2,8 | ,0 | 41,1 | 11,7 | 18,1 | 103 |
| 30.000-40.000 | 7,5 | 7,7 | 2,5 | 5,9 | 1,6 | 38,1 | 10,1 | 26,7 | 119 |
| 40.000-60.000 | 8,8 | 8,1 | 4,0 | 5,5 | ,0 | 39,9 | 11,3 | 22,5 | 97 |
| >60.000 | 9,6 | 11,4 | ,0 | 17,5 | ,0 | 30,5 | 12,7 | 18,4 | 21 |
| Total | 9,2 | 9,0 | 3,4 | 4,9 | ,5 | 40,2 | 11,4 | 21,4 | 374 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 9,6 | 13,0 | ,7 | 6,1 | 1,9 | 21,9 | 16,5 | 30,3 | 84 |
| Très mauvaise à moyenne | 10,3 | 7,5 | 4,4 | 4,5 | ,0 | 48,1 | 8,1 | 17,1 | 258 |
| Total | 10,1 | 9,0 | 3,4 | 4,9 | ,5 | 40,9 | 10,4 | 20,8 | 342 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | | |
| Jamais | 4,6 | 5,7 | 3,2 | 4,6 | ,0 | 52,0 | 15,2 | 14,7 | 150 |
| Dans le passé | 12,1 | 7,7 | 4,3 | 6,4 | 1,8 | 37,1 | 3,7 | 26,9 | 101 |
| Modéré (< 20) | 7,9 | 23,4 | 4,2 | 3,9 | ,0 | 38,0 | 2,6 | 20,0 | 52 |
| Gros fumeur | 19,1 | 6,7 | 2,5 | 2,9 | ,0 | 27,9 | 18,4 | 22,5 | 47 |
| Total | 9,8 | 9,1 | 3,6 | 4,7 | ,5 | 41,4 | 10,6 | 20,3 | 350 |

- 1 : Accident de travail
- 2 : Maladie professionnelle
- 3 : Accident domestique
- 4 : Accident de la route
- 5 : Accident de sport
- 6 : Maladie
- 7 : Affection congénitale

8 : Autre raison

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 8,2 | 91,8 | 4900 |
| Femme | 9,7 | 90,3 | 5174 |
| Total | 9,0 | 91,0 | 10074 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 7,1 | 92,9 | 1529 |
| 15-24 | 8,7 | 91,3 | 1149 |
| 25-34 | 7,3 | 92,7 | 1640 |
| 35-44 | 9,2 | 90,8 | 1612 |
| 45-54 | 9,1 | 90,9 | 1292 |
| 55-64 | 11,6 | 88,4 | 1093 |
| 65-74 | 10,5 | 89,5 | 1075 |
| 75 + | 13,1 | 86,9 | 684 |
| Total | 9,0 | 91,0 | 10074 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 13,5 | 86,5 | 351 |
| Primaire | 12,1 | 87,9 | 1291 |
| Secondaire inférieur | 10,7 | 89,3 | 1647 |
| Secondaire supérieur | 8,3 | 91,7 | 2915 |
| Supérieur | 7,6 | 92,4 | 3448 |
| Total | 9,0 | 91,0 | 9652 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 8,7 | 91,3 | 785 |
| 20.000-30.000 | 10,6 | 89,4 | 2007 |
| 30.000-40.000 | 10,9 | 89,1 | 2347 |
| 40.000-60.000 | 8,1 | 91,9 | 3204 |
| >60.000 | 6,9 | 93,1 | 1272 |
| Total | 9,1 | 90,9 | 9615 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 5,9 | 94,1 | 5911 |
| Très mauvaise à moyenne | 19,9 | 80,1 | 2024 |
| Total | 9,0 | 91,0 | 7935 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 8,0 | 92,0 | 3713 |
| Dans le passé | 9,6 | 90,4 | 1924 |
| Modéré (< 20) | 9,0 | 91,0 | 1571 |
| Gros fumeur | 13,3 | 86,7 | 837 |
| Total | 9,1 | 90,9 | 8045 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 9,5 | 90,5 | 3497 |
| Région Bruxelloise | 10,0 | 90,0 | 3000 |
| Région Wallonne | 7,7 | 92,3 | 3577 |
| België | 9,0 | 91,0 | 10074 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITE TEMPORAIRE | | Total |
|-------------------------------|------------------------|------|-------|
| | CAUSEE PAR DES | | |
| | PROBLEMES PHYSIQUES AU | | |
| COURS DES 2 DERNIERES | | N | |
| SEMAINES | | | |
| | Oui | Non | |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 8,8 | 91,2 | 1735 |
| Femme | 10,2 | 89,8 | 1762 |
| Total | 9,5 | 90,5 | 3497 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 8,2 | 91,8 | 511 |
| 15-24 | 9,9 | 90,1 | 430 |
| 25-34 | 7,7 | 92,3 | 590 |
| 35-44 | 8,7 | 91,3 | 533 |
| 45-54 | 9,6 | 90,4 | 468 |
| 55-64 | 12,7 | 87,3 | 406 |
| 65-74 | 10,5 | 89,5 | 364 |
| 75 + | 14,2 | 85,8 | 195 |
| Total | 9,5 | 90,5 | 3497 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 16,6 | 83,4 | 65 |
| Primaire | 12,7 | 87,3 | 425 |
| Secondaire inférieur | 10,5 | 89,5 | 603 |
| Secondaire supérieur | 8,7 | 91,3 | 1165 |
| Supérieur | 8,6 | 91,4 | 1117 |
| Total | 9,6 | 90,4 | 3375 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 12,6 | 87,4 | 119 |
| 20.000-30.000 | 10,5 | 89,5 | 602 |
| 30.000-40.000 | 13,4 | 86,6 | 853 |
| 40.000-60.000 | 8,3 | 91,7 | 1275 |
| >60.000 | 7,0 | 93,0 | 454 |
| Total | 9,8 | 90,2 | 3303 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 6,4 | 93,6 | 2279 |
| Très mauvaise à moyenne | 23,5 | 76,5 | 569 |
| Total | 9,6 | 90,4 | 2848 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 8,8 | 91,2 | 1375 |
| Dans le passé | 10,0 | 90,0 | 703 |
| Modéré (< 20) | 8,8 | 91,2 | 561 |
| Gros fumeur | 14,0 | 86,0 | 241 |
| Total | 9,6 | 90,4 | 2880 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITE TEMPORAIRE | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES | | |
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 8,9 | 91,1 | 1446 |
| Femme | 11,0 | 89,0 | 1554 |
| Total | 10,0 | 90,0 | 3000 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 4,6 | 95,4 | 441 |
| 15-24 | 9,1 | 90,9 | 314 |
| 25-34 | 8,5 | 91,5 | 496 |
| 35-44 | 8,9 | 91,1 | 489 |
| 45-54 | 13,4 | 86,6 | 384 |
| 55-64 | 11,9 | 88,1 | 313 |
| 65-74 | 15,3 | 84,7 | 323 |
| 75 + | 13,6 | 86,4 | 240 |
| Total | 10,0 | 90,0 | 3000 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 11,4 | 88,6 | 166 |
| Primaire | 14,0 | 86,0 | 370 |
| Secondaire inférieur | 13,7 | 86,3 | 419 |
| Secondaire supérieur | 8,3 | 91,7 | 704 |
| Supérieur | 8,2 | 91,8 | 1176 |
| Total | 10,0 | 90,0 | 2835 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 9,0 | 91,0 | 368 |
| 20.000-30.000 | 13,0 | 87,0 | 617 |
| 30.000-40.000 | 10,4 | 89,6 | 601 |
| 40.000-60.000 | 9,5 | 90,5 | 776 |
| >60.000 | 6,4 | 93,6 | 491 |
| Total | 9,9 | 90,1 | 2853 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 6,2 | 93,8 | 1679 |
| Très mauvaise à moyenne | 23,3 | 76,7 | 622 |
| Total | 10,5 | 89,5 | 2301 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 8,4 | 91,6 | 1012 |
| Dans le passé | 14,9 | 85,1 | 561 |
| Modéré (< 20) | 10,4 | 89,6 | 461 |
| Gros fumeur | 10,5 | 89,5 | 279 |
| Total | 10,4 | 89,6 | 2313 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITE TEMPORAIRE | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES | | |
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 7,0 | 93,0 | 1719 |
| Femme | 8,4 | 91,6 | 1858 |
| Total | 7,7 | 92,3 | 3577 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 6,0 | 94,0 | 577 |
| 15-24 | 6,6 | 93,4 | 405 |
| 25-34 | 5,9 | 94,1 | 554 |
| 35-44 | 10,3 | 89,7 | 590 |
| 45-54 | 7,0 | 93,0 | 440 |
| 55-64 | 9,2 | 90,8 | 374 |
| 65-74 | 9,0 | 91,0 | 388 |
| 75 + | 11,3 | 88,7 | 249 |
| Total | 7,7 | 92,3 | 3577 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 11,9 | 88,1 | 120 |
| Primaire | 10,5 | 89,5 | 496 |
| Secondaire inférieur | 10,4 | 89,6 | 625 |
| Secondaire supérieur | 7,3 | 92,7 | 1046 |
| Supérieur | 5,7 | 94,3 | 1155 |
| Total | 7,8 | 92,2 | 3442 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 5,9 | 94,1 | 298 |
| 20.000-30.000 | 9,9 | 90,1 | 788 |
| 30.000-40.000 | 7,3 | 92,7 | 893 |
| 40.000-60.000 | 7,4 | 92,6 | 1153 |
| >60.000 | 6,9 | 93,1 | 327 |
| Total | 7,7 | 92,3 | 3459 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 4,8 | 95,2 | 1953 |
| Très mauvaise à moyenne | 14,3 | 85,7 | 833 |
| Total | 7,3 | 92,7 | 2786 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 6,3 | 93,7 | 1326 |
| Dans le passé | 7,5 | 92,5 | 660 |
| Modéré (< 20) | 8,8 | 91,2 | 549 |
| Gros fumeur | 13,3 | 86,7 | 317 |
| Total | 7,9 | 92,1 | 2852 |

Personnes d' un an et plus

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------|
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 15,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 4881 |
| Femme | 17,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 5144 |
| Total | 16,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 10025 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | 8,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 1523 |
| 15-24 | 13,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 1149 |
| 25-34 | 11,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 1634 |
| 35-44 | 15,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 1606 |
| 45-54 | 20,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 1285 |
| 55-64 | 25,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 1087 |
| 65-74 | 24,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 260,0 | 1065 |
| 75 + | 33,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 676 |
| Total | 16,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 10025 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 34,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 348 |
| Primaire | 26,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 260,0 | 1283 |
| Secondaire inférieur | 23,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 234,0 | 1637 |
| Secondaire supérieur | 13,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 2905 |
| Supérieur | 11,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 3432 |
| Total | 16,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 9605 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 19,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 208,0 | 779 |
| 20.000-30.000 | 20,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 1998 |
| 30.000-40.000 | 21,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 2339 |
| 40.000-60.000 | 13,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 3190 |
| >60.000 | 10,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 1266 |
| Total | 16,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 9572 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 9,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 5894 |
| Très mauvaise à moyenne | 44,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 2004 |
| Total | 16,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 7898 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 15,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 3697 |
| Dans le passé | 19,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 1912 |
| Modéré (< 20) | 14,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 1566 |
| Gros fumeur | 26,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 260,0 | 831 |
| Total | 17,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 8006 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | |
| Région Flamande | 18,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 3483 |
| Région Bruxelloise | 20,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 2977 |
| Région Wallonne | 12,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 3565 |
| België | 16,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 10025 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | | |
|--|---------|------------|---------|------------|------------|------|
| NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES | | | | | | |
| PROBLEMES PHYSIQUES | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | Moyenne | 25è | Médiane | 75è | 95è | N |
| | | Percentile | | Percentile | Percentile | |
| ----- | | | | | | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 16,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 1730 |
| Femme | 19,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 156,0 | 1753 |
| Total | 18,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 3483 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | 7,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 506 |
| 15-24 | 16,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 430 |
| 25-34 | 12,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 588 |
| 35-44 | 13,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 530 |
| 45-54 | 22,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 260,0 | 467 |
| 55-64 | 31,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 404 |
| 65-74 | 25,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 260,0 | 363 |
| 75 + | 44,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 195 |
| Total | 18,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 3483 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 55,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 65 |
| Primaire | 27,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 424 |
| Secondaire inférieur | 25,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 602 |
| Secondaire supérieur | 13,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 1160 |
| Supérieur | 14,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 1110 |
| Total | 18,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 3361 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 31,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 117 |
| 20.000-30.000 | 21,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 601 |
| 30.000-40.000 | 26,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 260,0 | 849 |
| 40.000-60.000 | 14,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 1272 |
| >60.000 | 11,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 451 |
| Total | 18,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 3290 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 10,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 2273 |
| Très mauvaise à moyenne | 58,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 566 |
| Total | 18,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 2839 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 18,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 1372 |
| Dans le passé | 20,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 701 |
| Modéré (< 20) | 14,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 560 |
| Gros fumeur | 26,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 238 |
| Total | 18,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 2871 |
| ----- | | | | | | |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------|
| NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES | | | | | | |
| PROBLEMES PHYSIQUES | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| ----- | | | | | | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 18,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 1437 |
| Femme | 21,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 1540 |
| Total | 20,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 2977 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | 9,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 441 |
| 15-24 | 17,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 314 |
| 25-34 | 12,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 494 |
| 35-44 | 17,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 487 |
| 45-54 | 29,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 380 |
| 55-64 | 21,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 310 |
| 65-74 | 44,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 317 |
| 75 + | 28,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 234 |
| Total | 20,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 2977 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 29,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 163 |
| Primaire | 37,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 366 |
| Secondaire inférieur | 32,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 413 |
| Secondaire supérieur | 16,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 156,0 | 703 |
| Supérieur | 13,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 1169 |
| Total | 21,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 2814 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 20,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 367 |
| 20.000-30.000 | 28,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 611 |
| 30.000-40.000 | 21,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 598 |
| 40.000-60.000 | 19,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 156,0 | 768 |
| >60.000 | 10,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 490 |
| Total | 20,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 2834 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 11,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 1670 |
| Très mauvaise à moyenne | 51,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 611 |
| Total | 20,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 2281 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 16,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 1005 |
| Dans le passé | 33,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 554 |
| Modéré (< 20) | 18,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 459 |
| Gros fumeur | 23,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 260,0 | 276 |
| Total | 21,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 2294 |
| ----- | | | | | | |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------|
| NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES | | | | | | |
| PROBLEMES PHYSIQUES | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| ----- | | | | | | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 12,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 1714 |
| Femme | 13,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 1851 |
| Total | 12,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 3565 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | 10,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 576 |
| 15-24 | 7,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 405 |
| 25-34 | 9,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 552 |
| 35-44 | 18,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 589 |
| 45-54 | 12,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 438 |
| 55-64 | 14,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 373 |
| 65-74 | 16,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 156,0 | 385 |
| 75 + | 21,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 208,0 | 247 |
| Total | 12,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 3565 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 19,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 120 |
| Primaire | 19,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 493 |
| Secondaire inférieur | 18,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 622 |
| Secondaire supérieur | 12,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 1042 |
| Supérieur | 7,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 1153 |
| Total | 12,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 3430 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 9,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 295 |
| 20.000-30.000 | 17,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 786 |
| 30.000-40.000 | 14,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 892 |
| 40.000-60.000 | 10,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 1150 |
| >60.000 | 8,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 325 |
| Total | 12,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 3448 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 6,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1951 |
| Très mauvaise à moyenne | 26,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 260,0 | 827 |
| Total | 11,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 2778 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 9,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 1320 |
| Dans le passé | 13,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 657 |
| Modéré (< 20) | 12,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 547 |
| Gros fumeur | 25,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 234,0 | 317 |
| Total | 13,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 2841 |
| ----- | | | | | | |

Personnes d' un an et plus

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------|
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 2,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 4872 |
| Femme | 4,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5134 |
| Total | 3,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10006 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 0-14 | 1,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1520 |
| 15-24 | 2,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1147 |
| 25-34 | 2,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1633 |
| 35-44 | 4,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1603 |
| 45-54 | 3,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1285 |
| 55-64 | 3,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1085 |
| 65-74 | 7,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1061 |
| 75 + | 12,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 672 |
| Total | 3,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10006 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 11,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 347 |
| Primaire | 7,4 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 1280 |
| Secondaire inférieur | 3,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1633 |
| Secondaire supérieur | 3,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2899 |
| Supérieur | 2,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3427 |
| Total | 3,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 9586 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 6,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 776 |
| 20.000-30.000 | 4,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1995 |
| 30.000-40.000 | 5,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2334 |
| 40.000-60.000 | 2,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3185 |
| >60.000 | 2,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1264 |
| Total | 3,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 9554 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5889 |
| Très mauvaise à moyenne | 9,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 1996 |
| Total | 3,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 7885 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 3,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3691 |
| Dans le passé | 4,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1908 |
| Modéré (< 20) | 2,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1566 |
| Gros fumeur | 3,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 827 |
| Total | 3,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 7992 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | |
| Région Flamande | 3,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3474 |
| Région Bruxelloise | 8,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2971 |
| Région Wallonne | 3,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3561 |
| België | 3,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10006 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------|
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 2,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1728 |
| Femme | 4,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1746 |
| Total | 3,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3474 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | 1,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 504 |
| 15-24 | 2,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 429 |
| 25-34 | 1,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 587 |
| 35-44 | 5,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 530 |
| 45-54 | 1,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 467 |
| 55-64 | 3,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 403 |
| 65-74 | 3,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 359 |
| 75 + | 17,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 195 |
| Total | 3,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3474 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 23,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 65 |
| Primaire | 5,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 423 |
| Secondaire inférieur | 2,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 599 |
| Secondaire supérieur | 3,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1156 |
| Supérieur | 2,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1109 |
| Total | 3,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3352 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 13,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 115 |
| 20.000-30.000 | 2,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 600 |
| 30.000-40.000 | 5,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 845 |
| 40.000-60.000 | 2,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1270 |
| >60.000 | 2,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 451 |
| Total | 3,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3281 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2272 |
| Très mauvaise à moyenne | 8,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 561 |
| Total | 2,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2833 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 2,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1368 |
| Dans le passé | 3,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 701 |
| Modéré (< 20) | 2,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 560 |
| Gros fumeur | 2,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 235 |
| Total | 2,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2864 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------|
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 7,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1432 |
| Femme | 8,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 1539 |
| Total | 8,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2971 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | 1,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 440 |
| 15-24 | 6,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 314 |
| 25-34 | 5,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 494 |
| 35-44 | 7,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 485 |
| 45-54 | 7,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 380 |
| 55-64 | 6,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 309 |
| 65-74 | 25,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 317 |
| 75 + | 15,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 232 |
| Total | 8,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2971 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 4,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 162 |
| Primaire | 21,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 365 |
| Secondaire inférieur | 11,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 413 |
| Secondaire supérieur | 6,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 702 |
| Supérieur | 4,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1166 |
| Total | 8,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2808 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 7,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 366 |
| 20.000-30.000 | 12,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 611 |
| 30.000-40.000 | 9,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 597 |
| 40.000-60.000 | 6,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 767 |
| >60.000 | 3,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 488 |
| Total | 8,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2829 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 3,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1667 |
| Très mauvaise à moyenne | 22,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 609 |
| Total | 8,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2276 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 4,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1004 |
| Dans le passé | 16,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 550 |
| Modéré (< 20) | 5,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 459 |
| Gros fumeur | 10,8 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 276 |
| Total | 8,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2289 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES PHYSIQUES | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------|
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 2,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1712 |
| Femme | 3,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1849 |
| Total | 3,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3561 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | 1,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 576 |
| 15-24 | 2,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 404 |
| 25-34 | 2,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 552 |
| 35-44 | 3,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 588 |
| 45-54 | 3,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 438 |
| 55-64 | 3,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 373 |
| 65-74 | 7,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 385 |
| 75 + | 3,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 245 |
| Total | 3,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3561 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 6,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 120 |
| Primaire | 5,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 492 |
| Secondaire inférieur | 3,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 621 |
| Secondaire supérieur | 3,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1041 |
| Supérieur | 1,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1152 |
| Total | 3,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3426 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 1,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 295 |
| 20.000-30.000 | 3,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 784 |
| 30.000-40.000 | 5,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 892 |
| 40.000-60.000 | 2,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1148 |
| >60.000 | 2,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 325 |
| Total | 3,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3444 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1950 |
| Très mauvaise à moyenne | 6,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 826 |
| Total | 3,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2776 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 3,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1319 |
| Dans le passé | 1,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 657 |
| Modéré (< 20) | 2,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 547 |
| Gros fumeur | 3,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 316 |
| Total | 3,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2839 |

Personnes d' un an et plus

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITE TEMPORAIRE | | Total |
|-------------------------------|---|-------------|--------------|
| | CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES | | |
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 1,3 | 98,7 | 4902 |
| Femme | 3,4 | 96,6 | 5165 |
| Total | 2,3 | 97,7 | 10067 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | ,7 | 99,3 | 1524 |
| 15-24 | 1,7 | 98,3 | 1147 |
| 25-34 | 1,4 | 98,6 | 1642 |
| 35-44 | 3,5 | 96,5 | 1612 |
| 45-54 | 3,0 | 97,0 | 1294 |
| 55-64 | 1,9 | 98,1 | 1092 |
| 65-74 | 3,8 | 96,2 | 1073 |
| 75 + | 5,9 | 94,1 | 683 |
| Total | 2,3 | 97,7 | 10067 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 3,4 | 96,6 | 351 |
| Primaire | 4,4 | 95,6 | 1291 |
| Secondaire inférieur | 3,0 | 97,0 | 1646 |
| Secondaire supérieur | 2,1 | 97,9 | 2912 |
| Supérieur | 1,5 | 98,5 | 3446 |
| Total | 2,3 | 97,7 | 9646 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 3,9 | 96,1 | 785 |
| 20.000-30.000 | 3,4 | 96,6 | 2005 |
| 30.000-40.000 | 2,6 | 97,4 | 2348 |
| 40.000-60.000 | 2,0 | 98,0 | 3199 |
| >60.000 | 1,1 | 98,9 | 1272 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 9609 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | ,9 | 99,1 | 5912 |
| Très mauvaise à moyenne | 7,5 | 92,5 | 2022 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 7934 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 2,1 | 97,9 | 3716 |
| Dans le passé | 2,6 | 97,4 | 1923 |
| Modéré (< 20) | 1,9 | 98,1 | 1570 |
| Gros fumeur | 4,1 | 95,9 | 836 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 8045 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 2,4 | 97,6 | 3493 |
| Région Bruxelloise | 3,0 | 97,0 | 2998 |
| Région Wallonne | 2,0 | 98,0 | 3576 |
| België | 2,3 | 97,7 | 10067 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES | | Total |
|-------------------------------|--|----------|-------|
| | Oui % | Non % | N |
| SEXE | | | |
| Homme | 1,2 | 98,8 | 1734 |
| Femme | 3,6 | 96,4 | 1759 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 3493 |
| GROUPE AGE | | | |
| 0-14 | 1,0 | 99,0 | 510 |
| 15-24 | 1,7 | 98,3 | 428 |
| 25-34 | 1,3 | 98,7 | 590 |
| 35-44 | 4,3 | 95,7 | 533 |
| 45-54 | 2,2 | 97,8 | 468 |
| 55-64 | 1,6 | 98,4 | 406 |
| 65-74 | 4,3 | 95,7 | 363 |
| 75 + | 6,5 | 93,5 | 195 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 3493 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 8,6 | 91,4 | 65 |
| Primaire | 3,7 | 96,3 | 425 |
| Secondaire inférieur | 3,4 | 96,6 | 603 |
| Secondaire supérieur | 2,3 | 97,7 | 1163 |
| Supérieur | 1,3 | 98,7 | 1116 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 3372 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 8,7 | 91,3 | 119 |
| 20.000-30.000 | 3,6 | 96,4 | 601 |
| 30.000-40.000 | 3,1 | 96,9 | 853 |
| 40.000-60.000 | 1,7 | 98,3 | 1274 |
| >60.000 | ,7 | 99,3 | 453 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 3300 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | ,9 | 99,1 | 2276 |
| Très mauvaise à moyenne | 8,9 | 91,1 | 569 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 2845 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 2,3 | 97,7 | 1373 |
| Dans le passé | 2,3 | 97,7 | 703 |
| Modéré (< 20) | 2,2 | 97,8 | 560 |
| Gros fumeur | 2,7 | 97,3 | 241 |
| Total | 2,3 | 97,7 | 2877 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITE TEMPORAIRE | | Total |
|-------------------------------|---|------|-------|
| | CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES | | |
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 2,8 | 97,2 | 1447 |
| Femme | 3,3 | 96,7 | 1551 |
| Total | 3,0 | 97,0 | 2998 |
| GROUPE AGE | | | |
| 0-14 | ,3 | 99,7 | 438 |
| 15-24 | 2,7 | 97,3 | 314 |
| 25-34 | 2,2 | 97,8 | 498 |
| 35-44 | 3,2 | 96,8 | 489 |
| 45-54 | 5,4 | 94,6 | 385 |
| 55-64 | 1,6 | 98,4 | 313 |
| 65-74 | 6,5 | 93,5 | 322 |
| 75 + | 4,5 | 95,5 | 239 |
| Total | 3,0 | 97,0 | 2998 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 1,3 | 98,7 | 166 |
| Primaire | 7,3 | 92,7 | 369 |
| Secondaire inférieur | 3,1 | 96,9 | 418 |
| Secondaire supérieur | 2,5 | 97,5 | 703 |
| Supérieur | 2,1 | 97,9 | 1177 |
| Total | 2,9 | 97,1 | 2833 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 4,2 | 95,8 | 369 |
| 20.000-30.000 | 3,6 | 96,4 | 614 |
| 30.000-40.000 | 3,2 | 96,8 | 601 |
| 40.000-60.000 | 2,6 | 97,4 | 775 |
| >60.000 | 2,3 | 97,7 | 492 |
| Total | 3,1 | 96,9 | 2851 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 1,5 | 98,5 | 1681 |
| Très mauvaise à moyenne | 8,5 | 91,5 | 622 |
| Total | 3,3 | 96,7 | 2303 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 1,6 | 98,4 | 1016 |
| Dans le passé | 5,7 | 94,3 | 560 |
| Modéré (< 20) | 2,7 | 97,3 | 460 |
| Gros fumeur | 6,3 | 93,7 | 279 |
| Total | 3,3 | 96,7 | 2315 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | INCAPACITE TEMPORAIRE | | Total |
|-------------------------------|---|------|-------|
| | CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS AU COURS DES 2 DERNIERES SEMAINES | | |
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 1,0 | 99,0 | 1721 |
| Femme | 3,0 | 97,0 | 1855 |
| Total | 2,0 | 98,0 | 3576 |
| GROUPE AGE | | | |
| 0-14 | ,3 | 99,7 | 576 |
| 15-24 | 1,2 | 98,8 | 405 |
| 25-34 | 1,2 | 98,8 | 554 |
| 35-44 | 2,1 | 97,9 | 590 |
| 45-54 | 3,9 | 96,1 | 441 |
| 55-64 | 2,7 | 97,3 | 373 |
| 65-74 | 2,1 | 97,9 | 388 |
| 75 + | 5,8 | 94,2 | 249 |
| Total | 2,0 | 98,0 | 3576 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | ,1 | 99,9 | 120 |
| Primaire | 4,5 | 95,5 | 497 |
| Secondaire inférieur | 2,2 | 97,8 | 625 |
| Secondaire supérieur | 1,5 | 98,5 | 1046 |
| Supérieur | 1,7 | 98,3 | 1153 |
| Total | 2,0 | 98,0 | 3441 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | ,6 | 99,4 | 297 |
| 20.000-30.000 | 3,0 | 97,0 | 790 |
| 30.000-40.000 | 1,5 | 98,5 | 894 |
| 40.000-60.000 | 2,3 | 97,7 | 1150 |
| >60.000 | 1,5 | 98,5 | 327 |
| Total | 2,1 | 97,9 | 3458 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | ,7 | 99,3 | 1955 |
| Très mauvaise à moyenne | 5,6 | 94,4 | 831 |
| Total | 2,0 | 98,0 | 2786 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 2,0 | 98,0 | 1327 |
| Dans le passé | 2,5 | 97,5 | 660 |
| Modéré (< 20) | 1,1 | 98,9 | 550 |
| Gros fumeur | 5,4 | 94,6 | 316 |
| Total | 2,3 | 97,7 | 2853 |

Personnes d' un an et plus

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS | | | | | | |
|---|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------|
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 2,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 4898 |
| Femme | 5,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5148 |
| Total | 4,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10046 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | 1,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1521 |
| 15-24 | 2,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1145 |
| 25-34 | 3,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1641 |
| 35-44 | 6,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1611 |
| 45-54 | 5,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1290 |
| 55-64 | 2,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1090 |
| 65-74 | 7,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1067 |
| 75 + | 16,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 130,0 | 681 |
| Total | 4,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10046 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 11,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 351 |
| Primaire | 9,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1288 |
| Secondaire inférieur | 5,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1639 |
| Secondaire supérieur | 4,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2910 |
| Supérieur | 1,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3440 |
| Total | 4,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 9628 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 9,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 781 |
| 20.000-30.000 | 5,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2002 |
| 30.000-40.000 | 6,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2343 |
| 40.000-60.000 | 2,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3191 |
| >60.000 | 1,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1271 |
| Total | 4,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 9588 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5903 |
| Très mauvaise à moyenne | 14,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 104,0 | 2015 |
| Total | 4,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 7918 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 3,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3710 |
| Dans le passé | 5,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1917 |
| Modéré (< 20) | 2,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1566 |
| Gros fumeur | 6,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 835 |
| Total | 4,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 8028 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | |
| Région Flamande | 4,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3484 |
| Région Bruxelloise | 6,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2990 |
| Région Wallonne | 2,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3572 |
| België | 4,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10046 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------|
| NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES | | | | | | |
| PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| ----- | | | | | | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 2,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1732 |
| Femme | 7,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1752 |
| Total | 4,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3484 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | 1,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 508 |
| 15-24 | 2,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 427 |
| 25-34 | 3,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 590 |
| 35-44 | 8,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 532 |
| 45-54 | 5,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 468 |
| 55-64 | 2,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 404 |
| 65-74 | 6,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 360 |
| 75 + | 21,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 195 |
| Total | 4,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3484 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 29,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 65 |
| Primaire | 9,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 425 |
| Secondaire inférieur | 4,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 598 |
| Secondaire supérieur | 5,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1161 |
| Supérieur | 1,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1114 |
| Total | 4,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3363 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 22,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 260,0 | 117 |
| 20.000-30.000 | 5,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 599 |
| 30.000-40.000 | 8,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 852 |
| 40.000-60.000 | 2,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1270 |
| >60.000 | 1,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 453 |
| Total | 5,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3291 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2271 |
| Très mauvaise à moyenne | 18,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 156,0 | 567 |
| Total | 4,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2838 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 4,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1370 |
| Dans le passé | 5,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 703 |
| Modéré (< 20) | 3,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 557 |
| Gros fumeur | 2,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 240 |
| Total | 4,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2870 |
| ----- | | | | | | |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------|
| NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES | | | | | | |
| PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| ----- | | | | | | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 6,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1445 |
| Femme | 5,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1545 |
| Total | 6,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2990 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | ,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 438 |
| 15-24 | 6,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 313 |
| 25-34 | 4,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 497 |
| 35-44 | 5,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 489 |
| 45-54 | 5,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 383 |
| 55-64 | 4,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 313 |
| 65-74 | 18,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 319 |
| 75 + | 14,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 238 |
| Total | 6,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2990 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 2,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 166 |
| Primaire | 17,2 | ,0 | ,0 | ,0 | 78,0 | 367 |
| Secondaire inférieur | 7,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 416 |
| Secondaire supérieur | 6,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 703 |
| Supérieur | 3,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1175 |
| Total | 6,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2827 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 8,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 368 |
| 20.000-30.000 | 9,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 613 |
| 30.000-40.000 | 6,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 598 |
| 40.000-60.000 | 4,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 773 |
| >60.000 | 2,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 491 |
| Total | 6,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2843 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1677 |
| Très mauvaise à moyenne | 18,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 620 |
| Total | 6,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2297 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 1,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1014 |
| Dans le passé | 12,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 556 |
| Modéré (< 20) | 2,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 459 |
| Gros fumeur | 17,9 | ,0 | ,0 | ,0 | 182,0 | 279 |
| Total | 6,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2308 |
| ----- | | | | | | |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | | |
|--|---------|------------|---------|------------|------------|------|
| NOMBRE DE JOURS PAR AN D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES | | | | | | |
| PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | Moyenne | 25è | Médiane | 75è | 95è | N |
| | | Percentile | | Percentile | Percentile | |
| ----- | | | | | | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 1,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1721 |
| Femme | 3,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1851 |
| Total | 2,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3572 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | ,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 575 |
| 15-24 | ,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 405 |
| 25-34 | 1,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 554 |
| 35-44 | 3,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 590 |
| 45-54 | 4,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 439 |
| 55-64 | 3,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 373 |
| 65-74 | 3,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 388 |
| 75 + | 10,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 248 |
| Total | 2,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3572 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | ,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 120 |
| Primaire | 6,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 496 |
| Secondaire inférieur | 6,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 625 |
| Secondaire supérieur | 1,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1046 |
| Supérieur | 1,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1151 |
| Total | 2,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3438 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 1,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 296 |
| 20.000-30.000 | 3,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 790 |
| 30.000-40.000 | 3,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 893 |
| 40.000-60.000 | 2,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1148 |
| >60.000 | 2,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 327 |
| Total | 2,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3454 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | ,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1955 |
| Très mauvaise à moyenne | 8,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 828 |
| Total | 3,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2783 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 2,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1326 |
| Dans le passé | 3,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 658 |
| Modéré (< 20) | 2,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 550 |
| Gros fumeur | 8,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 52,0 | 316 |
| Total | 3,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2850 |
| ----- | | | | | | |

Personnes d' un an et plus

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS | | | | | | |
|---|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------|
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | ,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 4898 |
| Femme | 2,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5145 |
| Total | 1,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10043 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 0-14 | ,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1521 |
| 15-24 | ,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1145 |
| 25-34 | ,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1641 |
| 35-44 | 2,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1611 |
| 45-54 | 1,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1290 |
| 55-64 | ,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1089 |
| 65-74 | 2,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1066 |
| 75 + | 8,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 680 |
| Total | 1,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10043 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 8,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 351 |
| Primaire | 2,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1288 |
| Secondaire inférieur | 1,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1637 |
| Secondaire supérieur | 1,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2909 |
| Supérieur | ,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3440 |
| Total | 1,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 9625 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 4,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 780 |
| 20.000-30.000 | 1,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2002 |
| 30.000-40.000 | 2,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2343 |
| 40.000-60.000 | ,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3189 |
| >60.000 | ,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1271 |
| Total | 1,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 9585 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | ,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5903 |
| Très mauvaise à moyenne | 3,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2013 |
| Total | ,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 7916 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | ,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3708 |
| Dans le passé | 2,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1917 |
| Modéré (< 20) | ,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1566 |
| Gros fumeur | 1,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 835 |
| Total | ,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 8026 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | |
| Région Flamande | 1,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3482 |
| Région Bruxelloise | 3,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2990 |
| Région Wallonne | ,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3571 |
| België | 1,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10043 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 1 Région Flamande

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| ----- | | | | | | |
|---|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------|
| NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| ----- | | | | | | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | ,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1732 |
| Femme | 2,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1750 |
| Total | 1,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3482 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | ,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 508 |
| 15-24 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 427 |
| 25-34 | ,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 590 |
| 35-44 | 3,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 532 |
| 45-54 | ,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 468 |
| 55-64 | 1,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 403 |
| 65-74 | ,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 359 |
| 75 + | 13,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 195 |
| Total | 1,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3482 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 22,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 364,0 | 65 |
| Primaire | ,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 425 |
| Secondaire inférieur | ,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 597 |
| Secondaire supérieur | 2,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1160 |
| Supérieur | ,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1114 |
| Total | 1,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3361 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 13,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 116 |
| 20.000-30.000 | 1,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 599 |
| 30.000-40.000 | 3,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 852 |
| 40.000-60.000 | ,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1269 |
| >60.000 | ,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 453 |
| Total | 1,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3289 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | ,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2271 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 565 |
| Total | ,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2836 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | ,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1368 |
| Dans le passé | 1,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 703 |
| Modéré (< 20) | ,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 557 |
| Gros fumeur | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 240 |
| Total | ,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2868 |
| ----- | | | | | | |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS | | | | | | |
|---|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------|
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 4,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1445 |
| Femme | 3,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1545 |
| Total | 3,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2990 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 438 |
| 15-24 | 2,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 313 |
| 25-34 | 1,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 497 |
| 35-44 | 2,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 489 |
| 45-54 | 3,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 383 |
| 55-64 | 2,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 313 |
| 65-74 | 16,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 319 |
| 75 + | 9,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 238 |
| Total | 3,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2990 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | ,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 166 |
| Primaire | 14,6 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 367 |
| Secondaire inférieur | 5,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 416 |
| Secondaire supérieur | 2,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 703 |
| Supérieur | 1,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1175 |
| Total | 3,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2827 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 2,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 368 |
| 20.000-30.000 | 7,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 613 |
| 30.000-40.000 | 2,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 598 |
| 40.000-60.000 | 3,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 773 |
| >60.000 | 2,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 491 |
| Total | 3,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2843 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | ,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1677 |
| Très mauvaise à moyenne | 13,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 26,0 | 620 |
| Total | 3,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2297 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | ,5 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1014 |
| Dans le passé | 10,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 556 |
| Modéré (< 20) | ,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 459 |
| Gros fumeur | 10,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 279 |
| Total | 3,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2308 |

Personnes d' un an et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

INCAPACITES FONCTIONNELLES DE COURTE DUREE (INDICATEUR : IC04_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| NOMBRE DE JOURS PAR AN AU LIT D' INCAPACITE TEMPORAIRE CAUSEE PAR DES PROBLEMES MENTAUX OU EMOTIONNELS | | | | | | |
|---|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|------|
| | Moyenne | 25è Percentile | Médiane | 75è Percentile | 95è Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | ,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1721 |
| Femme | ,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1850 |
| Total | ,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3571 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 0-14 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 575 |
| 15-24 | ,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 405 |
| 25-34 | 1,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 554 |
| 35-44 | ,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 590 |
| 45-54 | 1,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 439 |
| 55-64 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 373 |
| 65-74 | ,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 388 |
| 75 + | 1,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 247 |
| Total | ,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3571 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 120 |
| Primaire | 1,9 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 496 |
| Secondaire inférieur | ,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 624 |
| Secondaire supérieur | ,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1046 |
| Supérieur | ,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1151 |
| Total | ,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3437 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | ,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 296 |
| 20.000-30.000 | ,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 790 |
| 30.000-40.000 | 1,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 893 |
| 40.000-60.000 | ,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1147 |
| >60.000 | 1,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 327 |
| Total | ,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3453 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | ,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1955 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 828 |
| Total | ,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2783 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | ,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1326 |
| Dans le passé | ,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 658 |
| Modéré (< 20) | ,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 550 |
| Gros fumeur | 1,6 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 316 |
| Total | ,7 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2850 |

Personnes d' un an et plus