


Enquête de Santé par Interview Belgique 2001



Livre 2 Etat de Santé



**Rue de Louvain, 44
1000 Bruxelles**

**Section d'Epidémiologie
Rue Juliette Wytsman, 14
1050 Bruxelles
Tél : 02/642.57.94
e-mail his@iph.fgov.be
[http://www.iph.fgov.be/epidemie/epifr/
index4.htm](http://www.iph.fgov.be/epidemie/epifr/index4.htm)**

Equipe de recherche :

**Jamila Buziarsist
Stefaan Demarest
Lydia Gisle
Jean Tafforeau
Johan Van der Heyden
Herman Van Oyen**

Avec la collaboration de :

**Pieter-Jan Miermans
Francis Sartor**

Equipe logistique :

**Monique Schoonenburg
Véronique Verhocht**

Table des Matières

LIVRE 1 :

Pages

Introduction	8
<i>Objectifs de l'Enquête de Santé</i>	
I. Contenu du Questionnaire	8
II. Constitution de l'Echantillon	11
III. Présentation des Différents Intervenants	17
IV. Organisation du Travail sur le Terrain	19
V. Réseau d'Enquêteurs	20
VI. Contrôles de Qualité	24
VII. Degré de Participation	28
VIII. Facteurs de Pondération	33
IX. Tableaux de Base	34
X. Population de l'Etude	39

LIVRE 2 :

1. Etat de Santé	45
1.1. Santé Subjective	47
1.2. Santé Physique	81
1.2.1. Maladies et Affections Chroniques	81
1.2.2. Affections Aiguës	237
1.3. Santé Mentale	307
1.4. Limitations de l'Activité et Restriction de la Participation	419

LIVRE 3 :

2. Style de Vie	627
2.1. Activités Physiques	629
2.2. Nutrition	699
2.2.1. Etat Nutritionnel	699
2.2.2. Habitudes Nutritionnelles	769
2.3. Consommation d'Alcool	877
2.4. Consommation de Tabac	951
2.5. Usage de Drogues Illicites	1037
2.6. Santé et Sexualité	1081

Table des Matières

Pages

LIVRE 4 :

3. Prévention	1131
3.1. Vaccination chez les Adultes	1133
3.2. Prévention Cardiovasculaire	1201
3.3. Dépistage du Diabète	1277
3.4. Dépistage du Cancer du Sein	1319
3.5. Dépistage du Cancer du Col de l'Utérus	1375

LIVRE 5 :

4. Consommation de Soins	1401
4.1. Contacts avec des Professionnels de la Santé	1403
4.1.1. Contacts avec le Médecin Généraliste	1403
4.1.2. Contacts avec le Médecin Spécialiste	1533
4.1.3. Contacts avec le Service des Urgences	1629
4.1.4. Contacts avec le Dentiste	1679
4.1.5. Contacts avec les Professionnels Paramédicaux	1733
4.2. Hospitalisation	1773
4.3. Consommation de Médicaments	1857
4.4. Satisfaction du Patient	1985
4.5. Thérapies Non-Conventionnelles	2077

LIVRE 6 :


5. Santé et Société	2139
5.1. Accès aux Soins de Santé	2141
5.2. Différences Socio-Economiques en Matière de Santé	2187
5.3. Santé et Environnement	2193
5.4. Accidents, Sécurité Routière et Violence	2235
5.5. Santé Sociale	2339
5.6. Services Sociaux et Préventifs	2407



1.2. Santé Physique



1.2.1. Maladies et Affections Chroniques



Cette enquête a été réalisée à l'initiative de :

J. Tavernier

*Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique
et de l'Environnement*

J. Chabert

*Ministre des Travaux Publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie
et de l'Aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale*

T. Detienne

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé de Région Wallonne

D. Gosuin

*Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature
et de la Propreté Publique, et du Commerce Extérieur de la Région Bruxelles-Capitale*

N. Maréchal

Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé de la Communauté Française

H. Niessen

*Ministre de la Jeunesse et de la Famille, des Monuments et Sites, de la Santé
et des Affaires Sociales de la Communauté Germanophone*

F. Vandenbroucke


Ministre des Affaires Sociales et des Pensions

M. Vogels

Ministre de l'Aide Sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances de la Communauté Flamande

1.2. Santé Physique

1.2.1. Maladies et Affections Chroniques



I. Résumé

Les maladies chroniques ou affections de longue durée ont des conséquences spécifiques sur l'état de santé, sur le statut fonctionnel et sur la consommation de soins. Il est important donc pour les décideurs en matière de soins de santé de disposer d'informations sur la prévalence de ces maladies, de savoir quelles sont celles qui sont les plus fréquentes et de mesurer leur impact sur le statut fonctionnel et la consommation de soins (contacts avec le médecin généraliste, le spécialiste, hospitalisation et consommation de médicaments).

Sur base d'une liste de maladies chroniques (proposée dans le questionnaire de l'enquête), on estime que 52% de la population souffre d'au moins une maladie de longue durée, tandis que 29% souffre simultanément de deux maladies chroniques (co-morbidité). Les femmes déclarent plus souvent qu'elles souffrent d'une maladie chronique que les hommes. La prévalence des maladies, et plus particulièrement de la co-morbidité, augmente fortement avec l'âge: après 65 ans, plus de la moitié de la population souffre d'au moins deux maladies chroniques.

Les maladies les plus fréquentes sont celles qui se rapportent au système locomoteur (principalement l'arthrose et les lombalgies persistantes), au système cardiovasculaire (surtout l'hypertension artérielle) et les problèmes d'allergie. Les migraines sont aussi mentionnées souvent chez les femmes. Chez les 65 ans et plus, les hommes citent fréquemment des problèmes de prostate et les femmes d'ostéoporose. Il semble donc bien que ces problèmes liés au système locomoteur constituent une des principales cause de maladie chronique, alors que ces mêmes pathologies n'apparaissent pas parmi les principales causes de décès.

La plupart des personnes souffrant d'une maladie chronique sont suivies pour cela par un médecin. C'est seulement dans le cas de migraines que moins de la moitié des patients consulte un médecin. Les patients avec de l'hypertension, du diabète, une bronchite chronique ou une sinusite sont surtout suivis par un médecin généraliste. Les problèmes ophtalmologiques sont plutôt pris en charge par le spécialiste. Les troubles cardiaques graves, les ulcères à l'estomac ou au duodénum, les accidents vasculaires cérébraux et les cancers sont pris en charge aussi bien par le médecin généraliste que le spécialiste.

L'asthme, la bronchite chronique, les troubles cardiaques, l'épilepsie et les accidents vasculaires cérébraux sont les maladies chroniques qui entraînent le plus de consommation de médicaments (dans plus de 80% des cas). Pour quelques maladies seulement, comme la fatigue chronique ou les troubles au niveau vésiculaire, moins de la moitié des patients déclare consommer des médicaments.

Les personnes avec un faible niveau d'instruction ont en moyenne plus maladies chroniques et souffrent plus souvent de pathologies multiples. La prévalence de certaines maladies comme par exemple les lombalgies persistantes, augmente quand le niveau d'instruction diminue.

La prévalence de certaines maladies comme les allergies et la migraine, est plus élevée dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

On observe en outre des différences régionales. Le nombre moyen de maladies chroniques déclarées est plus bas en Flandre qu'à Bruxelles ou en Wallonie. On souffre en général moins souvent de pathologies multiples en Flandre et la prévalence de certaines maladies spécifiques comme le diabète et les migraines y est plus basse.

La prévalence de la plupart des maladies a relativement peu changé en 2001 par rapport à 1997, les trois affections les plus fréquentes étant restées dans le même ordre. La prévalence de l'hypertension semble toutefois avoir augmenté sensiblement, ce qui peut s'expliquer par le vieillissement de la population. On observe en outre chez les femmes de 65 ans et plus, une augmentation du nombre de cas de glaucome et une diminution de la prévalence des accidents vasculaires cérébraux.

Conclusions

- Les résultats de l'enquête de santé permettent d'obtenir des informations sur la prévalence des principales maladies chroniques au niveau de la population. Ces dernières sont nécessaires dans le cadre du processus de décisions dans le domaine de la santé publique.
- Il est important d'analyser ces résultats plus en détails pour mieux appréhender l'impact des maladies chroniques sur le statut fonctionnel et la consommation de soins.
- L'enquête de santé met en évidence quelques différences en fonction du niveau social (prévalence plus élevée des maladies chroniques dans les classes sociales défavorisées), du niveau d'urbanisation (plus d'asthme dans les villes) et de la région de résidence (prévalence plus élevée du diabète en Wallonie). Ces constatations devront être approfondies aussi bien dans le cadre de l'enquête de santé elle-même que sur base d'autres sources de données.

II. Introduction

Les maladies de longue durée ont des conséquences spécifiques sur l'état de santé, sur le statut fonctionnel et sur la consommation de soins. Il est important donc pour les décideurs en matière de soins de santé de disposer d'informations sur la prévalence de ces maladies, de savoir quelles sont celles qui sont les plus fréquentes et de mesurer leur impact sur le statut fonctionnel et la consommation de soins comme les contacts avec le médecin généraliste, le spécialiste, les hospitalisations et la consommation de médicaments (1). Les personnes qui souffrent de maladies chroniques ont de plus gros besoins en matière de soins de santé et doivent supporter des dépenses importantes dans ce domaine (2). Il est nécessaire donc de disposer d'informations sur la prévalence de ces maladies afin de pouvoir estimer les besoins en matière de soins et de mesurer leurs conséquences financières.

Pour les décideurs, il est important aussi de mieux appréhender les problèmes de co-morbidité (présence simultanée de plusieurs pathologies). Ce phénomène est surtout observé chez les personnes âgées et est souvent associé avec une mortalité importante, une baisse de la qualité de vie et une consommation importante de soins de santé (3).

L'intérêt du présent module au sujet des maladies chroniques se situe à plusieurs niveaux:

1. Il permet de mesurer la prévalence d'une série de maladies, comme recommandé pour les indicateurs de l'OMS: le cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles du système locomoteur, le diabète et les maladies respiratoires chroniques.
2. L'enquête de santé permet de collecter des informations importantes sur des maladies chroniques pour lesquelles on ne dispose par ailleurs que de très peu de données, comme sur les migraines et les allergies.
3. L'enquête de santé permet de valider les taux de prévalence mesurés sur base d'autres sources d'information, d'autant que les données sont collectées ici sur l'ensemble de la population.
4. L'enquête de santé est l'instrument idéal pour la mesure de la co-morbidité parce que l'on pose au même moment à la même personne des questions sur toute une série de maladies différentes.
5. L'enquête de santé permet de faire le lien entre la présence de maladies chroniques et les limitations fonctionnelles.
6. L'enquête de santé permet d'étudier les relations entre la présence de maladies chroniques et la consommation de soins.

L'enquête de santé souffre aussi bien sûr de limitations en ce qui concerne l'estimation de la prévalence des maladies chroniques. La déclaration de ces maladies peut être sur- ou sous-estimée chez les personnes âgées avec un faible niveau d'instruction, tout simplement parce que leur connaissance dans le domaine sont limitées. Des études ont montré que la validité des informations, surtout chez les personnes âgées, varie suivant le type de maladie (4). La qualité des résultats dépend aussi du taux de participation car la prévalence de certaines maladies peut varier entre les répondants et les non-répondants.

Il faut mentionner que le terme « prévalence » utilisé ici, la fréquence d'une maladie, est limitée à une période d'un an précédant l'enquête. Puisque l'on traite ici de maladies de longue durée, cela ne pose en principe pas de problème.

Le Tableau 1.2.1.0. reprend la liste des maladies chroniques qui ont été reprises dans l'enquête de santé. Cette dernière s'est inspirée de l'enquête de santé hollandaise (5) mais a subi quelques aménagements.

Tableau 1.2.1.0. Liste des maladies chroniques, Enquête de Santé, Belgique, 2001.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Asthme 2. Bronchite chronique, problèmes pulmonaires chroniques non spécifiques 3. Allergie 4. Sinusite 5. Affection cardiaque grave ou infarctus 6. Tension artérielle élevée 7. Troubles intestinaux graves de plus de 3 mois 8. Hépatite, cirrhose ou autre maladie du foie 9. Calculs rénaux 10. Maladie rénale grave excepté calculs rénaux 11. Inflammation chronique de la vessie (ex: cystite chronique) 12. Diabète 13. Troubles de la thyroïde 14. Glaucome - tension oculaire élevée 15. Cataracte 16. Maladie de Parkinson 17. Dépression pour une période d'au moins deux semaines 18. Epilepsie 19. Vertiges avec chute 20. Migraine 21. Affection cutanée grave ou chronique 22. Tumeur maligne ou cancer 23. Fatigue chronique pour une période d'au moins 3 mois 24. Affection persistante au dos de plus de 3 mois, lumbago, sciatique ou hernie discale 25. Arthrose du genou, de la hanche ou des mains 26. Rhumatisme inflammatoire, arthrite chronique, rhumatoïde des mains ou des pieds 27. Autres formes de rhumatisme chronique de plus de 3 mois 28. Accident vasculaire cérébral (attaque) hémorragie cérébrale ou complications 29. Ulcère à l'estomac ou au duodénum 30. Calculs ou inflammation de la vésicule 31. Ostéoporose (décalcification des os) 32. Fracture du poignet 33. Fracture de la hanche (fracture du fémur) 34. Fracture de la colonne vertébrale 35. Troubles prostatiques 36. Descente de la matrice

Les maladies de cette liste sont de type chronique ou ont au moins un caractère récurrent, mis à part les différents types de fractures. Ces questions sur les fractures ont été posées afin de servir d'indicateurs en ce qui concerne le problème de l'ostéoporose. Le répondant pouvait en outre citer d'autres maladies que celles qui se trouvaient dans la liste ; ces dernières n'ont finalement pas été prises en compte dans l'analyse en raison de leur nombre très limité et de leur diversité.

III. Questions

Dans le questionnaire, la liste des maladies chroniques est parcourue en demandant aux gens de répondre à la question suivante :

MA01. Voici une liste de maladies ou d'affections. Pouvez-vous, pour chacune d'entre elles, m'indiquer si vous en souffrez ou si vous en avez souffert au cours des douze derniers mois?

En cas de réponse positive pour une maladie donnée, 3 questions complémentaires sont posées :

- MA02. Pour cette raison, êtes-vous ou étiez-vous en traitement ou sous contrôle chez un médecin généraliste?
- MA03. Pour cette raison, êtes-vous ou étiez-vous en traitement ou sous contrôle chez un médecin spécialiste?
- MA04. Pour cette raison, avez-vous pris des médicaments au cours des 12 derniers mois?

Pour l'hypertension on demande deux questions supplémentaires:

- MA05. Pour cette raison, avez-vous suivi un régime diététique au cours des 12 derniers mois?
- MA06. Pour cette raison, avez-vous pris des pilules ou des comprimés au cours des 12 derniers mois ?

Pour le diabète la question MA04 est remplacée par MA07, MA08 et MA09.

- MA07. Pour cette raison, avez-vous suivi un régime diététique au cours des 12 derniers mois?
- MA08. Pour cette raison, avez-vous pris des injections (insuline) au cours des 12 derniers mois?
- MA09. Pour cette raison, avez-vous pris des pilules ou des comprimés au cours des 12 derniers mois?

IV. Indicateurs

Des indicateurs ont été construits dans ce module au niveau de maladies spécifiques et de l'ensemble des maladies.

Nombre de personnes (en %) avec une maladie précise au cours des douze derniers mois

Des indicateurs ont été construits pour la prévalence de chacune des 36 maladies chroniques reprises dans le questionnaire de l'enquête. Pour chacune on vérifie le pourcentage de cas suivi par un médecin généraliste, par un spécialiste et le pourcentage qui utilise des médicaments pour cette maladie. Cet indicateur est présenté pour 4 groupes: hommes (tous âges confondus), femmes (tous âges confondus), hommes (65 ans et plus) et femmes (65 ans et plus).

Six maladies chroniques sont étudiées plus en détail parce qu'elles sont plus fréquentes ou parce qu'il s'agit d'un problème sérieux: allergies, hypertension, diabète, migraine, problèmes de dos de longue durée et arthrose.

Nombre de maladies chroniques

La liste comprend 34 maladies chroniques communes et 2 affections spécifiques, l'une pour les femmes et l'autre pour les hommes. Etant donné que les questions sur les fractures (ostéoporose, fracture du poignet, fracture de la hanche et fracture de la colonne vertébrale) sont considérées comme des indicateurs en matière

d'ostéoporose, ces quatre maladies seront considérées comme une seule; cela fait donc un total de 32 maladies différentes.

Pour l'asthme et la bronchite chronique, la comparaison avec 1997 n'est pas permise puisqu'elles faisaient partie de la même catégorie de maladie en 1997.

Trois indicateurs synthétiques sont mesurés :

- Distribution de la population (en %) en fonction du nombre de maladies chroniques présentes au cours des douze derniers mois
- Nombre moyen de maladies chroniques
- Nombre de personnes (en %) avec deux maladies chroniques ou plus présentes au cours des douze derniers mois (co-morbidité).

V. Résultats

V.1. Belgique

V.1.1. Prévalence des maladies chroniques ou maladies de longue durée (MA01 – MA04)

Un aperçu de la prévalence des maladies spécifiques est donné dans le Tableau 1.2.1.1.1. La prévalence est souvent plus élevée chez les femmes mais le classement des maladies dans l'ordre de leur fréquence est environ le même pour les deux sexes.

Les maladies avec une prévalence de plus de 10% sont les allergies (13%) et l'hypertension (11%) chez les hommes et l'arthrose (15%), les allergies (14%), l'hypertension (13%), les migraines (12%) et les problèmes de dos de longue durée (11%) chez les femmes.

Les maladies avec une prévalence entre 5 et 10% sont les problèmes de dos de longue durée (9%), l'arthrose (9%), la sinusite (7%) et les migraines (5%) chez les hommes, et le rhumatisme inflammatoire (8%), la sinusite (8%), la dépression (6%), l'ostéoporose (5%), la bronchite chronique (5%) et les troubles thyroïdiens (5%) chez les femmes.

Chez les 65 ans et plus, les maladies les plus fréquentes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, sont les maladies du système locomoteur et les maladies cardiovasculaires.

28% des hommes de 65 ans et plus déclarent souffrir d'hypertension et 27% de ceux-ci d'arthrose. On relève aussi les troubles prostatiques (19%), les troubles cardiaques (16%), la bronchite chronique (14%), les problèmes de dos de longue durée (12%) et le rhumatisme inflammatoire (12%). Une prévalence entre 5% et 10% est relevée pour le diabète (9%), l'asthme (9%), les allergies (8%), la dépression (7%), la cataracte (7%), la sinusite (6%), l'ulcère de l'estomac ou du duodénum (6%) et les tumeurs malignes ou cancers (6%).

Chez les femmes de 65 ans et plus, on trouve aussi une prévalence élevée pour l'arthrose (46%) et l'hypertension (38%). Les maladies avec une prévalence entre 10% et 25% sont le rhumatisme inflammatoire (25%), les problèmes de dos de longue durée (20%), l'ostéoporose (19%), les autres formes d'arthrose (13%), les allergies (12%), les maladies cardiaques graves ou infarctus (11%), la cataracte (11%) et les troubles thyroïdiens (10%). Entre 5% et 10%, on retrouve le diabète (10%), les vertiges avec chute (9%), la bronchite chronique (9%), les migraines (9%), la dépression (8%), les troubles intestinaux graves (8%), le glaucome (7%), les ulcères de l'estomac ou du duodénum (7%), l'asthme (7%) et la descente de matrice (5%).

L'information sur les personnes présentant une maladie chronique et qui sont suivies par un médecin (généraliste et/ou spécialiste) ou prennent des médicaments, est disponible dans les tableaux à la fin du chapitre.

Un résumé des prévalences mesurées en 1997 et en 2001 est présenté dans le Tableau 1.2.1.1.2. et le Tableau 1.2.1.1.3. Les résultats détaillés sont repris dans les tableaux à la fin du chapitre.

Tableau 1.2.1.1.1 Maladies avec une prévalence de 5% au moins (MA01), par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.			
Hommes	Prévalence	Femmes	Prévalence
Tous âges confondus		Tous âges confondus	
Maladies du système locomoteur		Maladies du système locomoteur	
Douleurs au niveau du dos	9,3	Arthrose	14,7
Arthrose	8,7	Douleurs au niveau du dos	10,5
		Rhumatisme inflammatoire	8,2
		Ostéoporose	5,4
Maladies cardiovasculaires		Maladies cardiovasculaires	
Hypertension	10,5	Hypertension	13,1
Maladies des voies respiratoires		Maladies des voies respiratoires	
Allergie	13,3	Allergie	14,3
Sinusite	6,5	Sinusite	8,1
		Bronchite chronique	5,4
Autres maladies		Autres maladies	
Migraine	5,1	Migraine	12,3
		Dépression	6,2
		Troubles thyroïdiens	5,1
<u>Groupe d'âge de 65 ans ou plus</u>		<u>Groupe d'âge de 65 ans ou plus</u>	
Maladies du système locomoteur		Maladies du système locomoteur	
Arthrose	27,3	Arthrose	46,2
Douleurs au niveau du dos	12,4	Rhumatisme inflammatoire	24,7
Rhumatisme inflammatoire	12,0	Douleurs au niveau du dos	20,4
Autres rhumatismes	5,8	Ostéoporose	18,9
		Autres rhumatismes	12,7
Maladies cardiovasculaires		Maladies cardiovasculaires	
Hypertension	27,6	Hypertension	38,1
Troubles cardiaques, infarctus	15,8	Troubles cardiaques, infarctus	11,0
Maladies des voies respiratoires		Maladies des voies respiratoires	
Bronchite chronique	13,9	Allergie	12,1
Asthme	8,5	Bronchite chronique	9,3
Allergie	7,8	Asthme	6,5
Sinusite	6,0		
Autres maladies		Autres maladies	
Troubles prostatiques	18,9	Cataracte	11,0
Diabète	9,1	Troubles thyroïdiens	10,0
Dépression	6,8	Diabète	9,6
Cataracte	6,7	Vertiges avec chute	9,4
Ulcère de l'estomac	5,6	Migraine	8,9
Tumeurs malignes	5,5	Dépression	8,2
		Troubles intestinaux graves	8,0
		Ulcère de l'estomac	6,5
		Descente de matrice	5,0

Tableau 1.2.1.1.2. Différence* dans la prévalence des maladies chroniques entre 2001 et 1997, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Hommes		Femmes	
	Tous âges confondus	65 ans et plus	Tous âges confondus	65 ans et plus
Allergie	0	0	0	0
Sinusite	0	0	0	0
Maladies cardiaques graves ou infarctus	0	0	0	0
Hypertension	+	0	+	0
Troubles intestinaux graves	0	0	0	0
Hépatite, cirrhose du foie	0	0	0	0
Calcul rénal	0	0	0	0
Maladie rénale grave	0	0	0	0
Inflammation chronique de la vessie	0	0	0	0
Diabète	0	0	0	0
Troubles thyroïdiens	0	0	0	0
Glaucome	0	0	0	+
Cataracte	0	0	0	0
Maladie de Parkinson	0	0	0	0
Dépression	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	0	0
Vertiges avec chute	0	0	0	0
Migraine	0	0	0	0
Troubles cutanés graves	0	0	0	0
Tumeur maligne ou cancer	0	0	0	0
Problèmes de dos de longue durée	0	0	0	0
Arthrose	0	0	0	0
Rhumatisme inflammatoire	0	0	0	0
Autres formes d'arthrose	0	0	0	0
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	0	0	-	-
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	0	0	0	0
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	0	0	0	0
Ostéoporose	0	0	0	0
Fracture du poignet	0	0	0	0
Fracture de la hanche	0	0	0	0
Fracture de la colonne vertébrale	0	0	0	0
Troubles prostatiques (hommes)	-	0		
Descente de matrice (femmes)			-	0

Le signe (+) = augmentation significative ($p < 0.01$) par rapport à 1997; le signe (-) = diminution significative par rapport à 1997; 0 = pas de différence significative ($p > 0.01$) par rapport à 1997

Tableau 1.2.1.1.3. Différence* dans la prévalence des maladies chroniques entre 2001 et 1997, taux standardisé pour l'âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Hommes		Femmes	
	Tous âges confondus	65 ans et plus	Tous âges confondus	65 ans et plus
Allergie	+	0	0	0
Sinusite	0	0	0	0
Maladies cardiaques graves ou infarctus	0	0	0	0
Hypertension	0	0	0	0
Troubles intestinaux graves	0	0	0	0
Hépatite, cirrhose du foie	0	0	0	0
Calcul rénal	0	0	0	0
Maladie rénale grave	0	0	0	0
Inflammation chronique de la vessie	0	0	0	0
Diabète	0	0	0	0
Troubles thyroïdiens	0	0	0	0
Glaucome	0	0	0	+
Cataracte	0	0	0	0
Maladie de Parkinson	0	0	0	0
Dépression	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	0	0
Vertiges avec chute	0	0	0	0
Migraine	0	0	0	0
Troubles cutanés graves	0	0	0	0
Tumeur maligne ou cancer	0	0	0	0
Problèmes de dos de longue durée	0	0	0	0
Arthrose	0	0	0	0
Rhumatisme inflammatoire	0	0	0	0
Autres formes d'arthrose	0	0	0	0
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	0	0	-	-
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	0	0	0	0
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	0	0	0	0
Ostéoporose	0	0	0	0
Fracture du poignet	0	0	0	0
Fracture de la hanche	0	0	0	0
Fracture de la colonne vertébrale	0	0	0	0
Troubles prostatiques (hommes)	0	0		
Descente de matrice (femmes)			0	0

Le signe (+) = augmentation significative ($p < 0.01$) par rapport à 1997; le signe (-) = diminution significative par rapport à 1997; 0 = pas de différence significative ($p > 0.01$) par rapport à 1997

On trouve sur base des taux bruts une augmentation significative ($p < 0.01$) de la prévalence de l'hypertension (de 8% en 1997 à 11% en 2001 chez les hommes et de 11% en 1997 à 13% en 2001 chez les femmes). Après standardisation pour l'âge, cette augmentation n'est pas significative. L'augmentation de la prévalence de l'hypertension est donc sans doute une conséquence du vieillissement de la population. Chez les femmes de 65 ans et plus, on observe une augmentation significative de la prévalence du glaucome (de 3% en 1997 à 7% en 2001), même après standardisation pour l'âge. Après standardisation pour l'âge, on observe aussi une augmentation de la prévalence des allergies chez les hommes.

On observe en outre une baisse sensible chez les femmes (65 ans et plus) de la prévalence des accidents vasculaires cérébraux: de 6% en 1997 à 1% en 2001. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

La baisse de la prévalence des troubles prostatiques chez les hommes et de la descente de matrice chez les femmes n'est pas significative après standardisation pour l'âge.


V.1.2. Prévalence des problèmes d'allergie (MA0103)

14% de la population déclare avoir souffert de problèmes d'allergie au cours de la dernière année : 13% chez les hommes et 14% chez les femmes. Cette différence n'est pas significative.

30% des hommes consultent un médecin généraliste pour des problèmes d'allergie, 11% un spécialiste et 17% aussi bien un médecin généraliste qu'un spécialiste. 63% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes d'allergie. 35% des femmes avec des problèmes d'allergie sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 9% par un spécialiste et 30% aussi bien par un médecin généraliste que par un spécialiste. 53% des femmes déclarent prendre des médicaments pour leurs problèmes d'allergie.

Le nombre de personnes ayant souffert de problèmes d'allergie est plus élevé dans le groupe d'âge 15-34 ans, il diminue assez fort entre 34 et 55 ans et stagne aux environs de 10% chez les plus âgés (Figure 1.2.1.1.1).

Figure 1.2.1.1.1 : Nombre de personnes (en %) qui ont eu des problèmes d'allergie au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec des problèmes d'allergie augmente en fonction du niveau d'éducation (10% chez les moins scolarisés, 14% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur, 16% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur), mais les différences ne sont pas significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Le pourcentage de personnes ayant souffert de problèmes d'allergie est plus élevé dans la zone urbaine de Bruxelles (17%) que dans les autres grandes villes (13%), les zones semi-urbaines (15%) et rurales (12%).

Après standardisation pour l'âge et le sexe, on observe une différence significative pour les allergies entre Bruxelles d'une part, et les autres grandes villes et les zones rurales d'autre part.

Le pourcentage de personnes ayant souffert de problèmes allergie est significativement plus élevé à Bruxelles (17%) qu'en Flandre (13%) et en Wallonie (14%). Ces différences sont significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Il n'y a pas d'augmentation significative des problèmes d'allergie entre 1997 et 2001 dans la population générale. Après standardisation pour l'âge toutefois, on observe une augmentation significative chez les hommes.


V.1.3. Prévalence de l'hypertension artérielle (MA0106)

12% de la population déclare avoir souffert d'hypertension au cours des douze derniers mois. Chez les hommes ce taux est de 11% et chez les femmes de 13%. Cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge.

58% des hommes sont suivis pour leurs problèmes d'hypertension par un médecin généraliste, 6% par un spécialiste et 20% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 74% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes d'hypertension et 23% suivent un régime. 65% des femmes avec hypertension sont suivies par un médecin généraliste, 3% par un spécialiste et 19% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 81% des femmes déclarent prendre des médicaments pour leurs problèmes d'hypertension et 31% suivent un régime.

Le nombre de personnes avec hypertension augmente progressivement avec l'âge: de moins de 1% chez les 15-24 ans à 36% chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.1.2).

Figure 1.2.1.1.2 : Nombre de personnes (en %) qui ont souffert d'hypertension au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec hypertension diminue avec le niveau d'éducation: 25% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 17% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 10% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 7% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ce gradient est moins prononcé mais toujours significatif.

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation ou entre les régions.

La prévalence de l'hypertension artérielle a augmenté de 9% en 1997 à 12% en 2001. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative.


V.1.4. Prévalence du diabète (MA0112)

2,6% de la population déclare souffrir de diabète. Chez les hommes ce taux est de 2,4%, chez les femmes 2,9%. Cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge.

55% des hommes sont suivis pour leurs problèmes de diabète par un médecin généraliste, 9% par un spécialiste et 27% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 70% des hommes prennent des médicaments per os pour leurs problèmes de diabète, 34% sont sous Insuline et 61% suivent un régime. Les femmes avec un diabète sont suivies dans 54% des cas par un médecin généraliste, 9% par un spécialiste et 29% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 67% des femmes déclarent prendre un médicament per os, 32% sont sous Insuline et 74% suivent un régime.

Le nombre de personnes avec un diabète est de moins de 1 % chez les moins de 45 ans, mais augmente ensuite avec l'âge (Figure 1.2.1.1.3). Chez les 75 ans et plus, le taux est de 11% de la population.

Figure 1.2.1.1.3 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de diabète au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec un diabète diminue en fonction du niveau d'éducation: 7% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 3% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 2% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 1% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences ne sont pas significatives.

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation. Le pourcentage de diabétiques semble toutefois plus élevé en Wallonie (3,5%) qu'en en Flandre (2,2%). A Bruxelles, le taux se situe à des valeurs intermédiaires (3,0%). La différence entre la Flandre et la Wallonie est significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Odds ratio = 1,73: CI 95% = 1,23 - 2,45).

La prévalence du diabète a augmenté légèrement de 2,3% en 1997 à 2,6% en 2001. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative.


V.1.5. Prévalence des problèmes de migraine (MA0120)

14% de la population déclare avoir eu des problèmes de migraine au cours des douze derniers mois. Chez les hommes ce taux est de 5%, chez les femmes de 12%. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

26% des hommes consultent un médecin généraliste pour leurs problèmes de migraine, 3% un spécialiste et 11% aussi bien un généraliste qu'un spécialiste. 68% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes de migraine. 39% des femmes avec des problèmes de migraine sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 4% par un spécialiste et 11% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 74% des femmes déclarent qu'elles prennent un médicament pour leurs problèmes de migraine.

Le nombre de personnes avec des problèmes de migraine est plus élevé chez les 25-54 ans et le plus bas chez les 0 à 14 ans et les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.1.4). Chez les femmes 25-34 ans et 45-54 ans, le taux est presque de 20%.

Figure 1.2.1.1.4 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes de migraine au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec des problèmes de migraine diminue légèrement en fonction du niveau d'éducation (11% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 9% à 10% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire et 7% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur), mais les différences ne sont pas significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Le pourcentage de personnes avec des problèmes de migraine est plus élevé dans la zone de Bruxelles (13%) que dans les autres grandes villes (11%), dans les zones semi-urbaines (8%) et les zones rurales (7%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, il y a une différence significative entre Bruxelles d'une part, et les autres zones d'autre part.

Le pourcentage de personnes avec des problèmes de migraine est significativement plus bas en Flandre (7%) qu'à Bruxelles (13%) et en Wallonie (11%). Ces différences sont significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Le pourcentage de personnes avec des problèmes de migraine a baissé légèrement de 10% en 1997 à 9% en 2001, mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe.


V.1.6 Prévalence des douleurs au dos de longue durée (MA0124)

10% de la population déclare avoir souffert au cours des douze derniers mois de douleurs au dos de longue durée. Ce pourcentage est de 9% chez les hommes et de 11% chez les femmes. Cette différence n'est pas significative.

31% des hommes sont suivis pour leurs problèmes de douleurs au dos par un médecin généraliste, 14% par un spécialiste et 30% aussi bien par un médecin généraliste qu'un spécialiste. 59% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes de douleurs au dos. 36% des femmes avec des douleurs au dos de longue durée sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 11% par un spécialiste et 30% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 61% des femmes déclarent prendre des médicaments pour leurs problèmes de douleurs au dos de longue durée.

Le nombre de personnes avec des douleurs au dos de longue durée augmente progressivement avec l'âge chez les femmes de 4% chez les 15-24 ans à 21% chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.1.5). Chez les hommes, l'association avec l'âge est moins nette : entre 35 ans et 74 ans, le pourcentage reste stable (15%) pour diminuer ensuite.

Figure 1.2.1.1.5 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de douleurs au dos de longue durée au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec des douleurs au dos de longue durée diminue en fonction du niveau d'éducation: 17% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 12% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 8% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 7% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Ce gradient est significatif après standardisation pour l'âge et le sexe.

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation ou entre les régions. La prévalence en 2001 est la même que celle mesurée en 1997.


V.1.7. Prévalence des problèmes d'arthrose (MA0125)

12% de la population déclare avoir eu des problèmes d'arthrose au cours des douze derniers mois. Chez les hommes ce taux est de 9% et chez les femmes de 15%. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

31% des hommes sont suivis pour leurs problèmes d'arthrose par un médecin généraliste, 11% par un spécialiste et 17% aussi bien par un généraliste que par un spécialiste. 63% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes d'arthrose. 35% des femmes avec arthrose sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 9% par un spécialiste et 30% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 53% des femmes déclarent prendre un médicament pour leurs problèmes d'arthrose

Le nombre de personnes avec arthrose augmente avec l'âge, de moins de 1% chez les 15-24 ans à 42% chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.1.6).

Figure 1.2.1.1.6 : Nombre de personnes (en %) qui ont souffert de problèmes d'arthrose au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec arthrose diminue en fonction du niveau d'éducation: 27% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 16% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 9% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 6% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe ces différences ne sont pas significatives.

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation, ni entre les différentes régions.

La prévalence des problèmes d'arthrose a augmenté de 10% en 1997 à 12% en 2001. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative.

V.1.8. Nombre de maladies chroniques ou de longue durée (MA01_1, MA01_2)

48% de la population ne souffre pas de maladies chroniques, 24% souffre d'une maladie chronique, 12% de 2 maladies, 7% de trois maladies et 10% de 4 maladies ou plus. La Figure 1.2.1.1.7. donne un aperçu de la distribution par âge et par sexe.

Le nombre moyen de maladies chroniques par an (sur base d'une liste de 32 maladies différentes) est de 1,2. Cette moyenne est plus élevée chez les femmes (1,5) que chez les hommes (1,0). Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

Le nombre moyen de maladies chroniques augmente en fonction de l'âge (Figure 1.2.1.1.8) de 0,3 chez les 0-14 ans à 3,0 chez les 75 ans et plus.

On observe aussi un gradient socio-économique important. Chez les personnes avec au maximum un certificat de l'enseignement primaire on observe une moyenne de 2,2 maladies chroniques, chez les personnes avec au maximum un certificat de l'enseignement secondaire inférieur une moyenne de 1,5, chez les personnes avec un diplôme du secondaire supérieur une moyenne de 1,1 et chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur une moyenne de 0,9. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ce gradient persiste.

Le nombre moyen de maladies chroniques diminue en fonction du niveau d'urbanisation: 1,4 à Bruxelles, 1,3 dans les autres grandes villes et zones semi-urbaines et 1,1 dans les zones rurales. Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence entre Bruxelles et les autres zones reste significative.

On observe significativement moins de maladies chroniques en Flandre (1,1) qu'à Bruxelles (1,4) et en Wallonie (1,4). La différence entre la Flandre et les autres régions est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 1.2.1.1.7 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de maladies chroniques au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.





Figure 1.2.1.1.8 : Moyenne du nombre de maladies chroniques présentes au cours des douze derniers mois*, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.




* Sur une liste de 32 maladies chroniques

V.1.9. Co-morbidité (MA01_3)

29% de la population déclare avoir souffert de deux maladies chroniques ou plus au cours des douze derniers mois. Le pourcentage de personnes avec co-morbidité est plus élevé (34%) chez les femmes que chez les hommes (24%) et cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

Le pourcentage de personnes avec co-morbidité augmente en fonction de l'âge jusqu'à 58% chez les hommes et 72% chez les femmes chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.1.9).

Figure 1.2.1.1.9 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de 2 maladies chroniques ou plus (co-morbidité) au cours des douze derniers mois*, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



* Sur une liste de 32 maladies chroniques

Les personnes avec seulement un certificat d'enseignement primaire déclarent dans 51% des cas souffrir au moins de deux maladies chroniques. Ce pourcentage diminue en fonction du niveau d'éducation : 21% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences sont moins nettes mais la différence entre les niveaux extrêmes reste significative.

A Bruxelles, le pourcentage de personnes avec co-morbidité est plus élevé (33%) que dans les autres grandes villes et zones semi-urbaines (29%) et que dans les zones rurales (27%). La différence entre Bruxelles et les autres zones est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Le pourcentage de personnes avec co-morbidité est plus bas (26%) en Flandre qu'à Bruxelles (33%) et en Wallonie (34%). La différence entre la Flandre et les deux autres régions est significative.

Tableau 1.2.1.1.4 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes d'allergie au cours des douze derniers mois, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

MA0103 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	13,3	12,7 (11,5-14,1)	5861
Femme	14,3	14,0 (12,7-15,3)	6117
GROUPE D'ÂGE			
0-14	13,5	13,5 (11,4-15,9)	1931
15-24	19,1	19,1 (16,2-22,4)	1286
25-34	18,9	18,9 (16,3-21,9)	1724
35-44	15,0	15,0 (12,9-17,4)	1910
45-54	11,0	11,0 (9,1-13,2)	1662
55-64	8,9	8,9 (7,1-11,1)	1348
65-74	10,6	10,5 (8,0-13,7)	1223
75+	10,0	9,8 (7,3-13,2)	894
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	9,5	9,3 (5,6-14,8)	267
Enseignement primaire	11,4	12,9 (10,4-15,9)	1552
Secondaire inférieur	11,1	11,3 (9,3-13,6)	2187
Secondaire supérieur	13,7	13,0 (11,5-14,7)	3482
Enseignement supérieur	16,1	14,9 (13,2-16,8)	4105
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	16,7	16,3 (14,6-18,0)	2931
Zone urbaine	13,4	12,9 (10,8-15,2)	1921
Zone semi-urbaine	14,5	14,1 (12,5-15,7)	3882
Zone rurale	12,2	11,8 (10,3-13,6)	3244
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	13,3	12,9 (11,6-14,2)	4070
Région Bruxelloise	16,7	16,3 (14,6-18,0)	2931
Région Wallonne	13,9	13,4 (11,8-15,2)	4977
ANNEE			
1997	12,9	12,1 (11,1-13,1)	10195
2001	13,8	13,3 (12,4-14,3)	11978

Tableau 1.2.1.1.5 : Nombre de personnes (en %) ayant eu des problèmes d'hypertension au cours des douze derniers mois, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0106 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	12,9	8,9 (7,7-10,3)	4879
Femme	15,7	9,9 (8,6-11,4)	5176
GROUPE D'ÂGE			
15-24	1,2	1,2 (0,6- 2,1)	1283
25-34	3,9	3,9 (2,8- 5,4)	1725
35-44	6,0	6,0 (4,6- 7,8)	1916
45-54	15,2	15,2 (12,8-18,0)	1665
55-64	23,9	23,9 (20,8-27,4)	1351
65-74	31,9	31,8 (27,6-36,4)	1222
75+	36,1	35,7 (30,6-41,2)	893
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	19,7	11,5 (5,9-21,4)	238
Enseignement primaire	26,1	10,8 (8,6-13,6)	1450
Secondaire inférieur	19,3	11,7 (9,4-14,4)	1886
Secondaire supérieur	11,9	9,5 (8,0-11,2)	2862
Enseignement supérieur	8,5	7,5 (6,3- 8,9)	3292
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	13,9	8,9 (7,6-10,4)	2454
Zone urbaine	14,2	9,4 (7,4-11,9)	1657
Zone semi-urbaine	15,1	9,9 (8,6-11,5)	3260
Zone rurale	13,5	9,0 (7,4-10,8)	2684
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	14,2	9,3 (8,1-10,8)	3468
Région Bruxelloise	13,9	8,9 (7,6-10,4)	2454
Région Wallonne	14,7	9,9 (8,4-11,6)	4133
ANNEE			
1997	10,9	8,9 (8,0- 9,9)	8543
2001	14,3	10,2 (9,2-11,2)	10055

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.1.6 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de diabète au cours des douze derniers mois, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0112 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	2,9	1,7 (1,2- 2,4)	4842
Femme	3,5	1,8 (1,2- 2,6)	5126
GROUPE D'ÂGE			
15-24	0,4	0,4 (0,1- 2,5)	1279
25-34	0,6	0,6 (0,2- 1,2)	1711
35-44	0,8	0,8 (0,4- 1,4)	1905
45-54	2,4	2,4 (1,6- 3,6)	1650
55-64	5,0	5,0 (3,7- 6,7)	1336
65-74	8,1	8,0 (6,2-10,4)	1208
75+	11,1	11,0 (8,2-14,6)	879
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	6,8	3,0 (1,4- 6,5)	236
Enseignement primaire	7,4	2,3 (1,5- 3,6)	1436
Secondaire inférieur	3,5	1,7 (1,1- 2,6)	1867
Secondaire supérieur	2,7	2,0 (1,3- 3,0)	2846
Enseignement supérieur	1,5	1,3 (0,8- 1,9)	3259
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	3,6	1,9 (1,3- 2,8)	2403
Zone urbaine	3,7	2,0 (1,3- 3,0)	1638
Zone semi-urbaine	3,2	1,7 (1,1- 2,6)	3258
Zone rurale	2,9	1,6 (1,1- 2,3)	2669
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	2,7	1,4 (1,0- 2,1)	3461
Région Bruxelloise	3,6	1,9 (1,3- 2,8)	2403
Région Wallonne	4,3	2,4 (1,7- 3,5)	4104
ANNEE			
1997	2,7	1,9 (1,5- 2,4)	8544
2001	3,2	1,9 (1,5- 2,4)	9968

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.1.7 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes de migraine au cours des douze derniers mois, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

MA0120 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	5,1	4,2 (3,6- 5,0)	5873
Femme	12,3	10,6 (9,5-11,8)	6131
GROUPE D'ÂGE			
0-14	1,7	1,5 (0,9- 2,5)	1938
15-24	7,9	7,3 (5,7- 9,4)	1283
25-34	13,2	12,3 (10,4-14,6)	1726
35-44	11,6	10,9 (9,2-12,8)	1921
45-54	12,3	11,4 (9,7-13,5)	1667
55-64	9,8	9,0 (7,3-11,2)	1350
65-74	8,2	7,3 (5,5- 9,5)	1224
75+	5,5	4,5 (3,2- 6,3)	895
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	6,3	5,3 (3,1- 8,8)	271
Enseignement primaire	10,6	9,1 (7,2-11,4)	1551
Secondaire inférieur	9,4	7,4 (6,1- 9,0)	2189
Secondaire supérieur	9,6	7,2 (6,1- 8,5)	3499
Enseignement supérieur	7,1	5,3 (4,5- 6,3)	4109
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	13,1	10,5 (9,1-12,0)	2958
Zone urbaine	10,7	8,1 (6,6- 9,8)	1919
Zone semi-urbaine	8,4	6,5 (5,6- 7,7)	3881
Zone rurale	6,9	5,4 (4,5- 6,4)	3246
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	7,2	5,5 (4,7- 6,4)	4074
Région Bruxelloise	13,1	10,4 (9,1-12,0)	2958
Région Wallonne	10,7	8,4 (7,3- 9,8)	4972
ANNEE			
1997	9,7	7,0 (6,2- 7,8)	10190
2001	8,8	6,5 (5,9- 7,3)	12004

Tableau 1.2.1.1.8 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes de dos de longue durée au cours des douze derniers mois, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0124 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	11,4	10,2 (9,0-11,6)	4889
Femme	12,5	10,9 (9,5-12,4)	5174
GROUPE D'ÂGE			
15-24	2,7	2,7 (1,7- 4,3)	1283
25-34	7,4	7,4 (5,6- 9,7)	1727
35-44	12,9	12,9 (10,9-15,3)	1920
45-54	15,5	15,5 (13,2-18,1)	1669
55-64	14,0	14,0 (11,9-16,4)	1348
65-74	17,3	17,3 (14,4-20,5)	1223
75+	16,9	16,8 (12,7-21,9)	893
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	21,4	20,3 (11,3-33,6)	237
Enseignement primaire	18,0	14,1 (11,4-17,3)	1450
Secondaire inférieur	13,8	11,9 (10,0-14,1)	1887
Secondaire supérieur	10,3	9,4 (8,0-11,0)	2867
Enseignement supérieur	9,2	8,8 (7,3-10,5)	3296
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	12,7	11,2 (9,6-13,0)	2454
Zone urbaine	12,4	11,1 (9,1-13,5)	1656
Zone semi-urbaine	12,1	10,7 (9,2-12,4)	3269
Zone rurale	11,3	9,9 (8,4-11,5)	2684
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	10,9	9,6 (8,4-10,9)	3472
Région Bruxelloise	12,7	11,2 (9,6-13,0)	2454
Région Wallonne	14,1	12,5 (10,8-14,4)	4137
ANNEE			
1997	11,8	11,1 (10,1-12,1)	8541
2001	11,9	10,6 (9,7-11,6)	10063

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.1.9 : Nombre de personnes (en %) qui ont souffert de problèmes d'arthrose au cours des douze derniers mois, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0125 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	10,6	6,4 (5,3- 7,6)	4881
Femme	17,7	10,1 (8,6-11,8)	5178
GROUPE D'ÂGE			
15-24	0,7	0,7 (0,3- 1,6)	1283
25-34	2,4	2,3 (1,5- 3,6)	1725
35-44	7,7	7,6 (6,0- 9,5)	1918
45-54	10,5	10,4 (8,5-12,6)	1663
55-64	22,1	21,9 (18,8-25,3)	1350
65-74	36,1	35,5 (31,7-39,6)	1224
75+	41,5	39,8 (34,8-45,0)	896
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	19,5	8,9 (4,4-17,2)	236
Enseignement primaire	28,6	9,8 (7,8-12,3)	1447
Secondaire inférieur	18,9	10,1 (8,2-12,4)	1888
Secondaire supérieur	11,1	8,1 (6,6- 9,8)	2865
Enseignement supérieur	7,5	6,2 (5,0- 7,7)	3296
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	13,2	7,1 (5,9- 8,5)	2454
Zone urbaine	13,5	7,5 (6,0- 9,3)	1656
Zone semi-urbaine	15,2	8,7 (7,2-10,4)	3269
Zone rurale	13,8	7,9 (6,5- 9,7)	2680
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	14,9	8,5 (7,3-10,0)	3472
Région Bruxelloise	13,2	7,1 (5,9- 8,5)	2454
Région Wallonne	13,1	7,4 (6,1- 9,0)	4133
ANNEE			
1997	12,1	9,2 (8,1-10,6)	8542
2001	14,2	9,1 (8,1-10,1)	10059

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.1.10 : Moyenne nombre maladies chroniques au cours des douze derniers mois, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA01_1 - Belgique	Moyenne	Taux standardisé (95% BI)	N
SEXE			
Homme	1,0	1,1 (1,0- 1,1)	5921
Femme	1,5	1,4 (1,4- 1,5)	6190
GROUPE D'ÂGE			
0-14	0,3	0,3 (0,3- 0,4)	1955
15-24	0,6	0,7 (0,6- 0,7)	1299
25-34	0,9	0,9 (0,8- 1,0)	1738
35-44	1,1	1,1 (1,0- 1,1)	1935
45-54	1,4	1,4 (1,2- 1,5)	1682
55-64	1,7	1,7 (1,5- 1,8)	1365
65-74	2,5	2,5 (2,3- 2,7)	1234
75+	3,0	3,0 (2,7- 3,2)	903
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	1,8	1,6 (1,0- 2,1)	272
Enseignement primaire	2,2	1,5 (1,4- 1,7)	1568
Secondaire inférieur	1,5	1,4 (1,3- 1,5)	2201
Secondaire supérieur	1,1	1,2 (1,1- 1,3)	3529
Enseignement supérieur	0,9	1,1 (1,0- 1,2)	4151
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	1,4	1,4 (1,4- 1,5)	3006
Zone urbaine	1,3	1,2 (1,1- 1,3)	1932
Zone semi-urbaine	1,3	1,3 (1,2- 1,4)	3905
Zone rurale	1,1	1,2 (1,1- 1,2)	3268
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	1,1	1,1 (1,1- 1,2)	4100
Région Bruxelloise	1,4	1,4 (1,4- 1,5)	3006
Région Wallonne	1,4	1,4 (1,4- 1,5)	5005

* Sur une liste de 32 maladies chroniques

Tableau 1.2.1.1.11 : Nombre de personnes (en %) avec deux maladies chroniques ou plus (co-morbidité) au cours des douze derniers mois, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA01_3 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	24,1	21,4 (19,8-23,1)	5921
Femme	33,6	29,3 (27,4-31,2)	6190
GROUPE D'ÂGE			
0-14	5,8	5,7 (4,4-7,4)	1955
15-24	14,2	14,1 (11,7-16,9)	1299
25-34	21,3	21,2 (18,5-24,2)	1738
35-44	26,2	26,1 (23,3-29,1)	1935
45-54	33,6	33,6 (30,3-37,0)	1682
55-64	40,5	40,5 (36,9-44,1)	1365
65-74	58,8	58,5 (54,3-62,5)	1234
75+	67,1	66,0 (61,0-70,6)	903
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	35,7	26,0 (18,0-36,0)	272
Enseignement primaire	50,8	31,6 (27,7-35,7)	1568
Secondaire inférieur	35,0	28,6 (25,7-31,8)	2201
Secondaire supérieur	25,3	24,6 (22,3-27,0)	3529
Enseignement supérieur	20,8	21,9 (19,9-24,0)	4151
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	33,2	29,5 (27,2-31,9)	3006
Zone urbaine	29,1	24,3 (21,5-27,3)	1932
Zone semi-urbaine	29,4	25,6 (23,5-27,9)	3905
Zone rurale	27,1	24,0 (21,8-26,3)	3268
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	26,3	22,1 (20,4-23,8)	4100
Région Bruxelloise	33,2	29,4 (27,1-31,8)	3006
Région Wallonne	33,6	31,0 (28,5-33,5)	5005

* Sur une liste de 32 maladies chroniques

V.2. Région Flamande

V.2.1. Prévalence des maladies chroniques ou maladies de longue durée (MA01 – MA04)

Un aperçu de la prévalence des maladies spécifiques est donné dans le Tableau 1.2.1.2.1. La prévalence est souvent plus élevée chez les femmes mais le classement des maladies dans l'ordre de leur fréquence est environ le même pour les deux sexes.

Les maladies avec une prévalence de plus de 10% chez les hommes sont les allergies (13%) et l'hypertension (10%), et chez les femmes, l'arthrose (15%), les allergies (14%), l'hypertension (13%) et les migraines (10%).

Les maladies avec une prévalence entre 5 et 10% sont les problèmes de dos de longue durée (9%), arthrose (9%) et la sinusite (7%) chez les hommes, et les problèmes de dos de longue durée (9%), le rhumatisme inflammatoire (8%), la sinusite (8%) et l'ostéoporose (5%) chez les femmes.

Chez les 65 ans et plus, les maladies les plus fréquentes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, sont les maladies du système locomoteur et les maladies cardiovasculaires.

29% des hommes de 65 ans et plus déclarent souffrir d'arthrose. On relève aussi l'hypertension (28%), les troubles prostatiques (19%), troubles cardiaques (14%), la bronchite chronique (13%), les problèmes de dos de longue durée (12%) et le rhumatisme inflammatoire (12%). Une prévalence entre 5% et 10% est relevée pour le diabète (9%), l'asthme (7%), les allergies (6%), la dépression (8%), la sinusite (5%), l'ulcère de l'estomac ou du duodénum (5%) et les tumeurs malignes ou cancers (6%).

Chez les femmes de 65 ans ou plus, on trouve aussi une prévalence élevée d'arthrose (48%) et d'hypertension (40%). Entre 10% et 25% de prévalence, on trouve le rhumatisme inflammatoire (24%), les problèmes de dos de longue durée (19%), l'ostéoporose (18%), les autres formes d'arthrose (11%), les allergies (11%) et les maladies cardiaques graves ou infarctus (11%). Entre 5% et 10%, on retrouve la cataracte (10%), les troubles thyroïdiens (9%), le diabète (8%), les vertiges avec chute (8%), la bronchite chronique (8%), les troubles intestinaux graves (8%), les migraines (7%), la dépression (5%) et les ulcères de l'estomac ou du duodénum (6%).

L'information sur les personnes présentant une maladie chronique et qui sont suivies par un médecin (généraliste et/ou spécialiste) ou prennent des médicaments, est disponible dans les tableaux à la fin du chapitre.

Un résumé des prévalences mesurées en 1997 et en 2001 est présenté dans le Tableau 1.2.1.2.2. et le Tableau 1.2.1.2.3. Les résultats détaillés sont dans les tableaux à la fin du chapitre.

Tableau 1.2.1.2.1 Maladies avec une prévalence de 5% au moins (MA01), par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.			
Hommes	Prévalence	Femmes	Prévalence
Tous âges confondus		Tous âges confondus	
Maladies du système locomoteur		Maladies du système locomoteur	
Arthrose	9,3	Arthrose	15,2
Douleurs au niveau du dos	8,9	Douleurs au niveau du dos	9,2
		Rhumatisme inflammatoire	7,9
		Ostéoporose	5,0
Maladies cardiovasculaires		Maladies cardiovasculaires	
Hypertension	10,1	Hypertension	13,4
Maladies des voies respiratoires		Maladies des voies respiratoires	
Allergie	13,0	Allergie	13,6
Sinusite	5,3	Sinusite	7,4
		Autres maladies	
		Migraine	10,4
<u>Groupe d'âge de 65 ans ou plus</u>		<u>Groupe d'âge de 65 ans ou plus</u>	
Maladies du système locomoteur		Maladies du système locomoteur	
Arthrose	29,0	Arthrose	48,2
Douleurs au niveau du dos	12,2	Rhumatisme inflammatoire	24,3
Rhumatisme inflammatoire	11,6	Douleurs au niveau du dos	19,3
		Ostéoporose	17,7
		Autres formes de rhumatisme	11,4
Maladies cardiovasculaires		Maladies cardiovasculaires	
Hypertension	28,2	Hypertension	40,1
Troubles cardiaques, infarctus	14,1	Troubles cardiaques, infarctus	10,7
Maladies des voies respiratoires		Maladies des voies respiratoires	
Bronchite chronique	12,9	Allergie	10,6
Asthme	6,8	Bronchite chronique	7,9
Allergie	6,3		
Sinusite	5,0		
Autres maladies		Autres maladies	
Troubles prostatiques	19,0	Cataracte	9,8
Diabète	9,4	Troubles thyroïdiens	9,1
Dépression	8,1	Diabète	8,0
Fatigue chronique	5,5	Troubles intestinaux graves	7,9
Ulcère de l'estomac	5,3	Vertiges avec chute	7,5
Tumeurs malignes	5,5	Migraine	7,1
		Ulcère de l'estomac	5,7
		Dépression	5,4

Tableau 1.2.1.2.2. Différence* dans la prévalence des maladies chroniques entre 2001 et 1997, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Hommes		Femmes	
	Tous âges confondus	65 ans et plus	Tous âges confondus	65 ans et plus
Allergie	0	0	0	0
Sinusite	0	0	0	0
Maladies cardiaques graves ou infarctus	0	0	0	0
Hypertension	0	0	+	+
Troubles intestinaux graves	0	0	0	0
Hépatite, cirrhose du foie	0	0	0	0
Calcul rénal	0	0	0	0
Maladie rénale grave	0	0	0	0
Inflammation chronique de la vessie	0	0	0	0
Diabète	0	0	0	0
Troubles thyroïdiens	0	0	0	0
Glaucome	0	0	0	0
Cataracte	0	0	+	0
Maladie de Parkinson	0	0	0	0
Dépression	0	+	0	0
Epilepsie	0	0	0	0
Vertiges avec chute	0	0	0	0
Migraine	0	0	0	0
Troubles cutanés graves	0	0	0	0
Tumeur maligne ou cancer	+	0	0	0
Problèmes de dos de longue durée	0	0	0	0
Arthrose	0	0	0	0
Rhumatisme inflammatoire	0	0	0	0
Autres formes d'arthrose	0	0	0	0
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	0	0	0	0
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	0	0	0	0
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	0	0	0	0
Ostéoporose	0	0	0	0
Fracture du poignet	0	0	0	0
Fracture de la hanche	0	0	0	0
Fracture de la colonne vertébrale	0	0	0	0
Troubles prostatiques (hommes)	-	0		
Descente de matrice (femmes)			-	0

* Le signe (+) = augmentation significative ($p < 0.01$) par rapport à 1997; le signe (-) = diminution significative par rapport à 1997; 0 = pas de différence significative ($p > 0.01$) par rapport à 1997

Tableau 1.2.1.2.3. Différence* dans la prévalence des maladies chroniques entre 2001 et 1997, taux standardisé pour l'âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Hommes		Femmes	
	Tous âges confondus	65 ans et plus	Tous âges confondus	65 ans et plus
Allergie	+	0	0	0
Sinusite	0	0	0	0
Maladies cardiaques graves ou infarctus	0	0	0	0
Hypertension	0	0	0	+
Troubles intestinaux graves	0	0	0	0
Hépatite, cirrhose du foie	0	0	0	0
Calcul rénal	0	0	0	0
Maladie rénale grave	0	0	0	0
Inflammation chronique de la vessie	0	0	0	0
Diabète	0	0	0	0
Troubles thyroïdiens	0	0	0	0
Glaucome	0	0	0	0
Cataracte	0	0	0	0
Maladie de Parkinson	0	0	0	0
Dépression	0	+	0	0
Epilepsie	0	0	0	0
Vertiges avec chute	0	0	0	0
Migraine	0	0	0	0
Troubles cutanés graves	0	0	0	0
Tumeur maligne ou cancer	0	0	0	0
Problèmes de dos de longue durée	0	0	0	0
Arthrose	0	0	0	0
Rhumatisme inflammatoire	0	0	0	0
Autres formes d'arthrose	0	0	0	0
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	0	0	0	-
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	0	0	0	0
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	0	0	0	0
Ostéoporose	0	0	0	0
Fracture du poignet	0	0	0	0
Fracture de la hanche	0	0	0	0
Fracture de la colonne vertébrale	0	0	0	0
Troubles prostatiques (hommes)	0	0		
Descente de matrice (femmes)			0	0

* Le signe (+) = augmentation significative ($p < 0.01$) par rapport à 1997; le signe (-) = diminution significative par rapport à 1997; 0 = pas de différence significative ($p > 0.01$) par rapport à 1997

Sur base des taux bruts, on constate une augmentation significative ($p < 0.01$) de la prévalence de l'hypertension de 9% en 1997 à 13% en 2001 chez les femmes. Après standardisation pour l'âge, cette augmentation n'est significative que pour les 65 ans et plus. L'augmentation de la prévalence de l'hypertension est donc sans doute une conséquence vieillissement de la population.

Chez les femmes, on observe une augmentation significative de la prévalence de la cataracte (de 0,6% en 1997 à 2,0% en 2001), mais différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge.

Après standardisation pour l'âge, on observe une augmentation de la prévalence des allergies chez les hommes.

On observe en outre une baisse sensible chez les femmes (65 ans et plus), de la prévalence des accidents vasculaires cérébraux. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

Chez les hommes, le pourcentage de cancers déclarés a augmenté en 2001 par rapport à 1997, mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge.

Chez les hommes de 65 ans et plus, on observe une augmentation significative de la dépression.

La baisse de la prévalence des troubles prostatiques chez les hommes et de la descente de matrice chez les femmes n'est pas significative après standardisation pour l'âge.


V.2.2. Prévalence des problèmes d'allergie (MA0103)

13% de la population déclare avoir souffert de problèmes d'allergie au cours de la dernière année : 13% chez les hommes et 14% chez les femmes. Cette différence n'est pas significative.

33% des hommes consultent un médecin généraliste pour leurs problèmes d'allergie, 9% un spécialiste et 18% aussi bien un médecin généraliste qu'un spécialiste. 66% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes d'allergie. 36% des femmes avec des problèmes d'allergie sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 11% par un spécialiste et 17% aussi bien par un médecin généraliste que par un spécialiste. 61% des femmes déclarent prendre des médicaments pour leurs problèmes d'allergie.

Le nombre de personnes ayant souffert de problèmes d'allergie est plus élevé dans le groupe d'âge 15-34 ans, il diminue assez fort entre 34 et 55 ans et remonte ensuite chez les 65 ans et plus (Figure 1.2.1.2.1).

Figure 1.2.1.2.1 : Nombre de personnes (en %) qui ont eu des problèmes d'allergie au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec des problèmes d'allergie ne varie pas en fonction du niveau d'éducation, ni en fonction du niveau d'urbanisation.

Il n'y a pas d'augmentation significative des problèmes d'allergie entre 1997 et 2001 dans la population générale. Après standardisation pour l'âge toutefois, on observe une augmentation significative chez les hommes.


V.2.3. Prévalence de l'hypertension artérielle (MA0106)

12% de la population déclare avoir souffert d'hypertension au cours des douze derniers mois. Chez les hommes ce taux est de 10% et chez les femmes de 13%. Cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge.

61% des hommes sont suivis pour leurs problèmes d'hypertension par un médecin généraliste, 4% par un spécialiste et 18% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 73% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes d'hypertension et 23% suivent un régime. 68% des femmes avec hypertension sont suivies par un médecin généraliste, 2% par un spécialiste et 17% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 82% des femmes déclarent prendre des médicaments pour leurs problèmes d'hypertension et 31% suivent un régime.

Le nombre de personnes avec hypertension augmente progressivement avec l'âge de moins de 1% chez les 15-24 ans à 37% chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.2.2).

Figure 1.2.1.2.2 : Nombre de personnes (en %) qui ont souffert d'hypertension au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec hypertension diminue avec le niveau d'éducation: 28% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 16% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 8% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 6% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ce gradient n'est pas significatif.

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation.

La prévalence de l'hypertension artérielle a augmenté de 8% en 1997 à 12% en 2001. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative, sauf chez les femmes de 65 ans et plus où le taux passe de 25% en 1997 à 40% en 2001 !


V.2.4. Prévalence du diabète (MA0112)

2,2% de la population déclare souffrir de diabète en Flandre. Chez les hommes ce taux est de 2,1%, chez les femmes 2,3%. Cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge.

60% des hommes sont suivis pour leurs problèmes de diabète par un médecin généraliste, 4% par un spécialiste et 21% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 68% des hommes prennent des médicaments per os pour leurs problèmes de diabète, 32% sont sous Insuline et 64% suivent un régime. Les femmes avec un diabète sont suivies dans 62% des cas par un médecin généraliste, 14% par un spécialiste et 16% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 66% des femmes déclarent prendre un médicament per os, 35% sont sous Insuline et 76% suivent un régime.

Le nombre de personnes avec un diabète est de moins de 1 % chez les moins de 45 ans, mais augmente ensuite avec l'âge (Figure 1.2.1.2.3). Chez les 75 ans et plus, le taux est de 10% de la population.

Figure 1.2.1.2.3 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de diabète au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec un diabète diminue en fonction du niveau d'éducation: 7% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 2% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 2% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 1% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences ne sont pas significatives.

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation.

La prévalence du diabète a augmenté légèrement de 1,8% en 1997 à 2,2% en 2001. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative.


V.2.5. Prévalence des problèmes de migraine (MA0120)

7% de la population déclare avoir eu des problèmes de migraine au cours des douze derniers mois. Chez les hommes ce taux est de 4%, chez les femmes de 10%. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

27% des hommes consultent un médecin généraliste pour leurs problèmes de migraine, 4% un spécialiste et 9% aussi bien un généraliste qu'un spécialiste. 67% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes de migraine. 41% des femmes avec des problèmes de migraine sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 4% par un spécialiste et 10% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 71% des femmes déclarent qu'elles prennent un médicament pour leurs problèmes de migraine.

Le nombre de personnes avec des problèmes de migraine est plus élevé chez les 25-54 ans et le plus bas chez les 0 à 14 ans et les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.2.4). Chez les femmes 25-34 ans et 45-54 ans, le taux est presque de 15%.

Figure 1.2.1.2.4 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes de migraine au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec des problèmes de migraine ne varie pas en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes avec des problèmes de migraine est plus élevé dans les grandes villes (10%), que dans les zones semi-urbaines (7%) et les zones rurales (5%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences restent significatives sous forme d'un véritable gradient.

Le pourcentage de personnes avec des problèmes de migraine est resté similaire en 1997 et en 2001.


V.2.6. Prévalence des douleurs au dos de longue durée (MA0124)

9% de la population en Flandre déclare avoir souffert au cours des douze derniers mois de douleurs au dos de longue durée. Ce pourcentage est le même chez les hommes et chez les femmes.

30% des hommes sont suivis pour leurs problèmes de douleurs au dos par un médecin généraliste, 14% par un spécialiste et 28% aussi bien par un médecin généraliste qu'un spécialiste. 57% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes de douleurs au dos. 38% des femmes avec des douleurs au dos de longue durée sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 10% par un spécialiste et 25% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 58% des femmes déclarent prendre des médicaments pour leurs problèmes de douleurs au dos de longue durée.

Le nombre de personnes avec des douleurs au dos de longue durée augmente progressivement avec l'âge chez les femmes de 3% chez les 15-24 ans à 21% chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.2.5). Chez les hommes, l'association avec l'âge est moins nette : entre 35 ans et 74 ans, le pourcentage reste stable (15%) pour diminuer ensuite.

Figure 1.2.1.2.5 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de douleurs au dos de longue durée au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec des douleurs au dos de longue durée diminue en fonction du niveau d'éducation: 17% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 11% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 7% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 6% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Ce gradient est significatif après standardisation pour l'âge et le sexe.

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation ou entre les régions. La prévalence en 2001 est la même que celle mesurée en 1997.


V.2.7. Prévalence des problèmes d'arthrose (MA0125)

12% de la population en Flandre déclare avoir eu des problèmes d'arthrose au cours des douze derniers mois. Chez les hommes ce taux est de 9% et chez les femmes de 15%. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

33% des hommes sont suivis pour leurs problèmes d'arthrose par un médecin généraliste, 9% par un spécialiste et 18% aussi bien par un généraliste que par un spécialiste. 66% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes d'arthrose. 33% des femmes avec arthrose sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 9% par un spécialiste et 30% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 50% des femmes déclarent prendre un médicament pour leurs problèmes d'arthrose

Le nombre de personnes avec arthrose augmente avec l'âge, de moins de 1% chez les 15-24 ans à 40% chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.2.6).

Figure 1.2.1.2.6 : Nombre de personnes (en %) qui ont souffert de problèmes d'arthrose au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec arthrose diminue en fonction du niveau d'éducation: 31% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 16% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 8% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 6% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences ne sont pas significatives.

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation, ni entre les différentes régions.

La prévalence des problèmes d'arthrose a augmenté de 11% en 1997 à 12% en 2001. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative.

V.2.8. Nombre de maladies chroniques ou de longue durée (MA01_1, MA01_2)

50% de la population ne souffre pas de maladies chroniques, 24% souffre d'une maladie chronique, 11% de 2 maladies, 7% de trois maladies et 8% de 4 maladies ou plus. La Figure 1.2.1.2.7. donne un aperçu de la distribution par âge et par sexe.

Le nombre moyen de maladies chroniques par an (sur base d'une liste de 32 maladies différentes) est de 1,1. Cette moyenne est plus élevée chez les femmes (1,3) que chez les hommes (0,9). Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

Le nombre moyen de maladies chroniques augmente en fonction de l'âge (Figure 1.2.1.2.8) de 0,3 chez les 0-14 ans à 2,8 chez les 75 ans et plus.

On observe aussi un gradient socio-économique important. Chez les personnes avec au maximum un certificat de l'enseignement primaire on observe une moyenne de 2,2 maladies chroniques, chez les personnes avec au maximum un certificat de l'enseignement secondaire inférieur une moyenne de 1,3 maladies chroniques, chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur une moyenne de 0,9 et chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur une moyenne de 0,8. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ce gradient persiste.

Figure 1.2.1.2.7 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de maladies chroniques au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.





Figure 1.2.1.2.8 : Moyenne du nombre de maladies chroniques présentes au cours des douze derniers mois*, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



* Sur une liste de 32 maladies chroniques


Le nombre moyen de maladies chroniques diminue en fonction du niveau d'urbanisation de manière significative : il est plus élevé dans les grandes villes et dans les zones semi-urbaines que dans les zones rurales.

V.2.9. Co-morbidité (MA01_3)

26% de la population déclare avoir souffert de deux maladies chroniques ou plus au cours des douze derniers mois. Le pourcentage de personnes avec co-morbidité est plus élevé chez les femmes (31%) que chez les hommes (22%) et cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

Le pourcentage de personnes avec co-morbidité augmente en fonction de l'âge jusqu'à 56% chez les hommes et 69% chez les femmes chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.2.9).

Figure 1.2.1.2.9 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de 2 maladies chroniques ou plus (co-morbidité) au cours des douze derniers mois*, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



*Sur une liste de 32 maladies chroniques

Les personnes avec seulement un certificat d'enseignement primaire déclare dans 51% des cas souffrir au moins de deux maladies chroniques. Ce pourcentage diminue en fonction du niveau d'éducation : 18% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences sont moins nettes mais la différence entre les niveaux extrêmes reste significative.

Le pourcentage de personnes avec co-morbidité ne varie pas en fonction du niveau d'urbanisation.

Tableau 1.2.1.2.4 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes d'allergie au cours des douze derniers mois, Enquête de santé, Région Flamande, Belgique, 2001.

MA0103 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	13,0	12,2 (10,5-14,1)	2045
Femme	13,6	13,0 (11,3-14,8)	2025
GROUPE D'ÂGE			
0-14	13,8	13,8 (10,8-17,4)	599
15-24	19,8	19,8 (15,9-24,4)	454
25-34	18,3	18,3 (14,9-22,2)	573
35-44	15,5	15,5 (12,6-19,0)	650
45-54	10,3	10,3 (7,7-13,6)	589
55-64	6,4	6,4 (4,5-8,9)	517
65-74	8,1	8,0 (5,5-11,5)	421
75+	9,8	9,7 (6,1-14,9)	267
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	3,7	3,4 (1,1-9,6)	78
Enseignement primaire	12,1	15,5 (11,3-20,7)	493
Secondaire inférieur	10,5	10,5 (8,0-13,8)	751
Secondaire supérieur	13,8	12,4 (10,4-14,8)	1331
Enseignement supérieur	15,3	13,3 (11,1-15,7)	1359
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	13,0	12,2 (9,9-14,9)	939
Zone semi-urbaine	13,9	13,3 (11,6-15,2)	2043
Zone rurale	12,4	11,6 (9,4-14,4)	1088
ANNEE			
1997	12,3	11,2 (9,8-12,8)	3529
2001	13,3	12,7 (11,4-14,0)	4070

Tableau 1.2.1.2.5 : Nombre de personnes (en %) ayant eu des problèmes d'hypertension au cours des douze derniers mois, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0106 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	12,3	8,1 (6,5-10,1)	1734
Femme	16,1	9,7 (7,8-12,0)	1734
GROUPE D'ÂGE			
15-24	1,0	1,0 (0,4- 2,5)	454
25-34	3,8	3,8 (2,4- 5,8)	571
35-44	4,9	4,9 (3,1- 7,6)	652
45-54	15,3	15,3 (12,1-19,2)	589
55-64	22,6	22,6 (18,5-27,4)	516
65-74	33,5	33,3 (27,3-40,0)	419
75+	37,3	36,7 (29,4-44,7)	267
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	23,1	13,6 (5,7-29,3)	74
Enseignement primaire	29,0	10,8 (7,6-14,9)	479
Secondaire inférieur	18,8	11,0 (7,9-15,0)	669
Secondaire supérieur	10,3	8,1 (6,3-10,4)	1108
Enseignement supérieur	8,0	7,4 (5,8- 9,5)	1089
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	14,4	9,1 (6,6-12,3)	824
Zone semi-urbaine	14,8	9,1 (7,4-11,1)	1745
Zone rurale	13,1	8,3 (6,2-11,1)	899
ANNEE			
1997	9,7	7,9 (6,7- 9,4)	2981
2001	14,2	9,9 (8,7-11,4)	3468

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.2.6 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de diabète au cours des douze derniers mois, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0112 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	2,5	0,9 (0,5- 1,6)	1733
Femme	2,8	0,8 (0,4- 1,6)	1728
GROUPE D'ÂGE			
15-24	0,6	0,6 (0,1- 4,2)	454
25-34	0,1	0,1 (0,0- 0,6)	572
35-44	0,1	0,1 (0,0- 0,9)	649
45-54	1,6	1,6 (0,8- 3,2)	589
55-64	4,3	4,3 (2,7- 6,7)	517
65-74	7,5	7,5 (5,3-10,5)	417
75+	9,9	10,0 (6,5-15,1)	263
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	5,6	1,4 (0,4- 5,3)	74
Enseignement primaire	7,3	1,2 (0,6- 2,4)	476
Secondaire inférieur	2,8	0,8 (0,4- 1,7)	668
Secondaire supérieur	2,0	1,0 (0,5- 2,0)	1106
Enseignement supérieur	1,0	0,6 (0,3- 1,3)	1088
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	3,6	1,2 (0,6- 2,3)	818
Zone semi-urbaine	2,5	0,8 (0,4- 1,5)	1742
Zone rurale	2,1	0,7 (0,4- 1,4)	901
ANNEE			
1997	2,1	1,4 (0,9- 2,2)	2982
2001	2,7	1,4 (1,0- 2,0)	3461

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.2.7 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes de migraine au cours des douze derniers mois, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

MA0120 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	4,0	3,1 (2,4- 4,1)	2047
Femme	10,4	8,6 (7,1-10,4)	2027
GROUPE D'ÂGE			
0-14	1,3	1,2 (0,5- 2,7)	599
15-24	4,9	4,5 (2,7- 7,4)	454
25-34	11,3	10,4 (7,9-13,5)	572
35-44	9,7	8,9 (6,8-11,6)	653
45-54	11,6	10,7 (8,3-13,7)	590
55-64	7,7	6,9 (5,0- 9,5)	517
65-74	6,2	5,4 (3,4- 8,3)	422
75+	4,0	3,2 (1,7- 5,7)	267
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	3,2	2,7 (0,9- 8,1)	78
Enseignement primaire	8,0	7,1 (4,7-10,7)	492
Secondaire inférieur	8,1	6,0 (4,4- 8,1)	752
Secondaire supérieur	8,1	5,7 (4,4- 7,5)	1335
Enseignement supérieur	5,9	4,1 (3,0- 5,4)	1359
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	10,3	7,5 (5,8- 9,6)	939
Zone semi-urbaine	7,2	5,3 (4,2- 6,7)	2043
Zone rurale	4,9	3,6 (2,6- 5,0)	1092
ANNEE			
1997	7,1	4,7 (3,9- 5,7)	3527
2001	7,2	5,1 (4,2- 6,1)	4074

Tableau 1.2.1.2.8 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes de dos de longue durée au cours des douze derniers mois, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0124 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	10,8	9,6 (8,0-11,5)	1737
Femme	11,0	9,3 (7,8-11,2)	1735
GROUPE D'ÂGE			
15-24	2,1	2,1 (1,1- 3,9)	454
25-34	6,7	6,7 (4,4- 9,9)	573
35-44	12,4	12,4 (9,7-15,8)	652
45-54	14,0	14,0 (11,0-17,6)	591
55-64	11,3	11,3 (8,7-14,5)	515
65-74	16,4	16,5 (12,8-20,9)	422
75+	16,3	16,3 (10,5-24,4)	265
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	22,4	22,0 (9,8-42,4)	73
Enseignement primaire	17,8	13,7 (10,1-18,4)	479
Secondaire inférieur	12,4	10,6 (8,2-13,7)	671
Secondaire supérieur	8,7	7,8 (6,2- 9,8)	1110
Enseignement supérieur	8,3	7,8 (6,0-10,0)	1091
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	12,3	10,8 (8,5-13,7)	824
Zone semi-urbaine	11,0	9,5 (7,9-11,4)	1748
Zone rurale	9,6	8,2 (6,3-10,6)	900
ANNEE			
1997	10,5	9,9 (8,6-11,3)	2979
2001	10,9	9,7 (8,6-11,1)	3472

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.2.9 : Nombre de personnes (en %) qui ont souffert de problèmes d'arthrose au cours des douze derniers mois, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0125 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	11,3	6,0 (4,5- 8,0)	1735
Femme	18,3	9,4 (7,3-12,0)	1737
GROUPE D'ÂGE			
15-24	0,3	0,3 (0,1- 1,3)	454
25-34	2,3	2,3 (1,2- 4,2)	572
35-44	9,4	9,3 (6,9-12,3)	652
45-54	11,0	10,9 (8,2-14,2)	588
55-64	21,4	21,3 (17,2-26,1)	517
65-74	40,8	40,4 (35,0-46,0)	422
75+	39,6	38,0 (30,9-45,6)	267
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	20,1	8,7 (3,1-21,9)	73
Enseignement primaire	32,1	9,7 (6,8-13,6)	478
Secondaire inférieur	18,9	9,3 (6,8-12,7)	671
Secondaire supérieur	10,3	6,5 (4,8- 8,9)	1110
Enseignement supérieur	8,2	6,6 (4,8- 8,9)	1091
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	13,5	6,6 (4,9- 9,0)	825
Zone semi-urbaine	15,6	8,0 (6,2-10,4)	1750
Zone rurale	14,7	7,6 (5,5-10,4)	897
ANNEE			
1997	13,2	10,4 (8,6-12,6)	2983
2001	14,9	9,5 (8,2-11,1)	3472

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.2.10 : Nombre moyen de maladies chroniques au cours des douze derniers mois, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA01_1 - Région Flamande	Moyenne	Taux standardisé (95% BI)	N
SEXE			
Homme	0,9	1,0 (0,9- 1,0)	2057
Femme	1,3	1,3 (1,2- 1,4)	2043
GROUPE D'ÂGE			
0-14	0,3	0,3 (0,2- 0,3)	602
15-24	0,6	0,6 (0,5- 0,7)	459
25-34	0,7	0,7 (0,6- 0,9)	576
35-44	1,0	1,0 (0,9- 1,1)	655
45-54	1,3	1,3 (1,1- 1,4)	594
55-64	1,4	1,4 (1,2- 1,6)	524
65-74	2,4	2,4 (2,1- 2,6)	423
75+	2,8	2,8 (2,4- 3,2)	267
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	1,7	1,4 (0,6- 2,2)	79
Enseignement primaire	2,2	1,4 (1,2- 1,7)	493
Secondaire inférieur	1,3	1,2 (1,1- 1,4)	755
Secondaire supérieur	0,9	1,1 (1,0- 1,2)	1342
Enseignement supérieur	0,8	1,0 (0,9- 1,1)	1372
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	1,2	1,2 (1,1- 1,3)	948
Zone semi-urbaine	1,2	1,2 (1,1- 1,3)	2052
Zone rurale	1,0	1,0 (0,9- 1,1)	1100

* Sur une liste de 32 maladies chroniques

Tableau 1.2.1.1.11 : Nombre de personnes (en %) avec deux maladies chroniques ou plus (co-morbidité) au cours des douze derniers mois, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA01_3 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	21,7	18,3 (16,1-20,6)	2057
Femme	30,7	25,4 (23,0-28,0)	2043
GROUPE D'ÂGE			
0-14	4,2	4,2 (2,7-6,3)	602
15-24	12,0	11,9 (8,9-15,8)	459
25-34	17,3	17,1 (13,8-21,0)	576
35-44	24,0	23,9 (20,2-28,1)	655
45-54	31,3	31,3 (26,9-36,1)	594
55-64	33,1	33,0 (28,5-37,9)	524
65-74	57,4	57,2 (51,4-62,7)	423
75+	64,1	63,0 (55,7-69,7)	267
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	34,2	22,6 (12,7-37,0)	79
Enseignement primaire	50,6	27,4 (22,4-33,0)	493
Secondaire inférieur	32,2	25,3 (21,3-29,6)	755
Secondaire supérieur	21,6	20,4 (17,5-23,7)	1342
Enseignement supérieur	18,0	19,1 (16,6-21,8)	1372
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	27,9	22,6 (19,4-26,1)	948
Zone semi-urbaine	27,0	22,2 (19,7-24,9)	2052
Zone rurale	23,7	20,2 (17,3-23,5)	1100

* Sur une liste de 32 maladies chroniques

V.3. Région Bruxelloise

V.3.1. Prévalence des maladies chroniques ou maladies de longue durée (MA01 – MA04)

Un aperçu de la prévalence des maladies spécifiques est donné dans le Tableau 1.2.1.3.1. La prévalence est souvent plus élevée chez les femmes mais le classement des maladies dans l'ordre de leur fréquence est environ le même pour les deux sexes.

Les maladies avec une prévalence de plus de 10% sont les allergies (15%) et l'hypertension (10%) chez les hommes, et les allergies (18%), les migraines (18%), l'arthrose (14%), l'hypertension (13%) et les problèmes de dos de longue durée (12%) chez les femmes.

Les maladies avec une prévalence entre 5% et 10% sont les problèmes de dos de longue durée (9%), les migraines (9%), la sinusite (8%), l'asthme (7%), l'arthrose (7%) et bronchite chronique (6%) chez les hommes, et le rhumatisme inflammatoire (10%), la sinusite (9%), la dépression (9%), la fatigue chronique (8%), l'ostéoporose (8%), la bronchite chronique (7%), les autres formes d'arthrose (6%) et les troubles thyroïdiens (5%) chez les femmes.

Chez les 65 ans et plus, les maladies les plus fréquentes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, sont les maladies du système locomoteur et les maladies cardiovasculaires.

33% des hommes de 65 ans et plus déclarent souffrir d'hypertension, 26% d'arthrose. La prévalence se situe chez les hommes 65 ans et plus entre 10% et 25% pour les troubles cardiaques graves (21%), les troubles prostatiques (18%), le rhumatisme inflammatoire (17%), la bronchite chronique (16%), la cataracte (15%) et problèmes de dos de longue durée (14%). La prévalence est entre 5% et 10% pour les allergies (10%), l'asthme (9%), l'ulcère de l'estomac ou du duodénum (9%), le diabète (9%), la dépression (8%), la migraine (8%), la sinusite (8%), la fatigue chronique (7%), les vertiges avec chute (6%), les tumeurs malignes ou cancers (6%), les autres formes d'arthrose (6%) et l'ostéoporose (5%).

Chez les femmes de 65 ans et plus la prévalence de l'arthrose (44%) et de l'hypertension (30%) est élevée, mais aussi la prévalence de l'ostéoporose (28%) et du rhumatisme inflammatoire (27%). La prévalence est entre 10% et 25 % pour les problèmes de dos de longue durée (22%), l'allergie (18%), les autres formes d'arthrose (18%), la cataracte (16%), la bronchite chronique (15%), la dépression (15%), la fatigue chronique (13%), la migraine (12%) et les vertiges avec chute (11%). La prévalence chez les femmes de 65 ans et plus est entre 5% et 10% pour les maladies cardiaques graves ou infarctus (10%), le diabète (9%), l'ulcère de l'estomac ou du duodénum (9%), les troubles intestinaux graves (9%), l'asthme (8%), les troubles thyroïdiens (8%), le glaucome (7%), la sinusite (7%), les maladies graves ou chroniques de la peau (6%) et la descente de matrice (5%).

L'information sur les personnes présentant une maladie chronique et qui sont suivies par un médecin (généraliste et/ou spécialiste) ou prennent des médicaments, est disponible dans les tableaux à la fin du chapitre.

Un résumé des prévalences mesurées en 1997 et en 2001 est présenté dans le Tableau 1.2.1.3.2. et le Tableau 1.2.1.3.3. Les résultats détaillés sont dans les tableaux à la fin du chapitre.

Tableau 1.2.1.3.1 Maladies avec une prévalence de 5% au moins (MA01), par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.			
Hommes	Prévalence	Femmes	Prévalence
Tous âges confondus		Tous âges confondus	
Maladies du système locomoteur		Maladies du système locomoteur	
Douleurs au niveau du dos	9,0	Arthrose	14,4
Arthrose	7,2	Douleurs au niveau du dos	11,8
		Rhumatisme inflammatoire	9,6
		Ostéoporose	7,8
		Autres formes de rhumatisme	6,2
Maladies cardiovasculaires		Maladies cardiovasculaires	
Hypertension	10,0	Hypertension	13,0
Maladies des voies respiratoires		Maladies des voies respiratoires	
Allergie	9,8	Allergie	18,0
Sinusite	8,0	Sinusite	8,9
Asthme	9,2	Bronchite chronique	6,8
Bronchite chronique	6,1		
Autres maladies		Autres maladies	
Migraine	8,5	Migraine	17,5
		Dépression	8,5
		Fatigue chronique	8,2
		Troubles thyroïdiens	5,6
<u>Groupe d'âge de 65 ans ou plus</u>		<u>Groupe d'âge de 65 ans ou plus</u>	
Maladies du système locomoteur		Maladies du système locomoteur	
Arthrose	25,9	Arthrose	43,5
Rhumatisme inflammatoire	16,5	Ostéoporose	27,5
Douleurs au niveau du dos	13,5	Rhumatisme inflammatoire	27,2
Autres formes de rhumatisme	5,6	Douleurs au niveau du dos	21,8
Ostéoporose	5,2	Autres formes de rhumatisme	18,0
Maladies cardiovasculaires		Maladies cardiovasculaires	
Hypertension	33,4	Hypertension	30,3
Troubles cardiaques, infarctus	20,7	Troubles cardiaques, infarctus	9,9
Maladies des voies respiratoires		Maladies des voies respiratoires	
Bronchite chronique	16,1	Allergie	18,2
Asthme	8,5	Bronchite chronique	15,4
Allergie	7,8	Asthme	8,4
Sinusite	7,6	Sinusite	6,6
Autres maladies		Autres maladies	
Troubles prostatiques	17,8	Cataracte	16,4
Cataracte	15,0	Dépression	14,5
Diabète	8,8	Fatigue chronique	13,1
Ulcère de l'estomac	8,8	Migraine	12,4
Dépression	8,4	Vertiges avec chute	11,2
Migraine	8,0	Diabète	9,4
Fatigue chronique	7,3	Ulcère de l'estomac	9,4
Vertiges avec chute	6,0	Troubles intestinaux graves	8,8
Tumeurs malignes	5,8	Troubles thyroïdiens	8,1
		Glaucome	6,9
		Troubles cutanés graves ou chroniques	6,2
		Descente de matrice	5,0

Tableau 1.2.1.3.2. Différence* dans la prévalence des maladies chroniques entre 2001 et 1997, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Hommes		Femmes	
	Tous âges confondus	65 ans et plus	Tous âges confondus	65 ans et plus
Allergie	0	0	0	0
Sinusite	0	0	0	0
Maladies cardiaques graves ou infarctus	0	0	0	0
Hypertension	0	0	0	0
Troubles intestinaux graves	0	-	0	0
Hépatite, cirrhose du foie	0	0	0	0
Calcul rénal	0	0	0	0
Maladie rénale grave	0	-	0	0
Inflammation chronique de la vessie	0	0	0	0
Diabète	0	0	0	0
Troubles thyroïdiens	0	0	0	0
Glaucome	0	0	0	+
Cataracte	0	0	0	0
Maladie de Parkinson	0	0	0	0
Dépression	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	+	0
Vertiges avec chute	-	0	0	0
Migraine	0	0	0	0
Troubles cutanés graves	0	0	0	0
Tumeur maligne ou cancer	0	0	0	0
Problèmes de dos de longue durée	0	0	0	0
Arthrose	0	0	0	0
Rhumatisme inflammatoire	0	0	0	0
Autres formes d'arthrose	0	0	0	0
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	0	0	0	0
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	0	0	0	0
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	0	0	0	0
Ostéoporose	0	0	0	0
Fracture du poignet	0	0	0	0
Fracture de la hanche	0	0	0	0
Fracture de la colonne vertébrale	0	0	0	0
Troubles prostatiques (hommes)	0	+	0	0
Descente de matrice (femmes)			0	0

* Le signe (+) = augmentation significative ($p < 0.01$) par rapport à 1997; le signe (-) = diminution significative par rapport à 1997; 0 = pas de différence significative ($p > 0.01$) par rapport à 1997

Tableau 1.2.1.3.3. Différence* dans la prévalence des maladies chroniques entre 2001 et 1997, taux standardisé pour l'âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Hommes		Femmes	
	Tous âges confondus	65 ans et plus	Tous âges confondus	65 ans et plus
Allergie	0	0	0	0
Sinusite	0	0	0	0
Maladies cardiaques graves ou infarctus	0	0	0	0
Hypertension	0	0	0	0
Troubles intestinaux graves	0	-	0	0
Hépatite, cirrhose du foie	0	0	0	0
Calcul rénal	0	0	0	0
Maladie rénale grave	-	-	0	0
Inflammation chronique de la vessie	0	0	0	0
Diabète	0	0	0	0
Troubles thyroïdiens	0	0	0	0
Glaucome	0	0	0	0
Cataracte	0	0	0	0
Maladie de Parkinson	0	0	0	0
Dépression	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	+	0
Vertiges avec chute	-	0	0	0
Migraine	0	0	0	0
Troubles cutanés graves	0	0	0	0
Tumeur maligne ou cancer	0	0	0	0
Problèmes de dos de longue durée	0	0	0	0
Arthrose	0	0	0	0
Rhumatisme inflammatoire	0	0	0	0
Autres formes d'arthrose	0	0	0	0
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	0	0	0	0
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	0	0	0	0
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	0	0	0	0
Ostéoporose	0	0	0	0
Fracture du poignet	0	0	0	0
Fracture de la hanche	0	0	0	0
Fracture de la colonne vertébrale	0	0	0	0
Troubles prostatiques (hommes)	0	+	0	0
Descente de matrice (femmes)			0	0

* Le signe (+) = augmentation significative ($p < 0.01$) par rapport à 1997; le signe (-) = diminution significative par rapport à 1997; 0 = pas de différence significative ($p > 0.01$) par rapport à 1997

On trouve, sur base des taux bruts, une augmentation significative ($p < 0.01$) de la prévalence des troubles chez les hommes de 65 ans et plus de 9% en 1997 à 18% en 2001. Après standardisation pour l'âge, cette augmentation est significative

Chez les femmes on observe une diminution significative après standardisation pour l'âge de la prévalence de l'épilepsie (de 0,1% en 1997 à 0,7% en 2001).

Chez les hommes on observe une diminution significative de la prévalence des vertiges avec chute (aussi après standardisation pour l'âge).

Chez les hommes de 65 ans et plus observe après standardisation pour l'âge une diminution significative de la prévalence des troubles intestinaux graves et des maladies rénales graves.


V.3.2. Prévalence des problèmes d'allergie (MA0103)

17% de la population déclare avoir souffert de problèmes d'allergie au cours de la dernière année : 15% chez les hommes et 18% chez les femmes. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge ($p=0,04$).

27% des hommes consultent un médecin généraliste pour leurs problèmes d'allergie, 16% un spécialiste et 14% aussi bien un médecin généraliste qu'un spécialiste. 60% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes d'allergie. 31% des femmes avec des problèmes d'allergie sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 16% par un spécialiste et 15% aussi bien par un médecin généraliste que par un spécialiste. 57% des femmes déclarent prendre des médicaments pour leurs problèmes d'allergie.

Le nombre de personnes ayant souffert de problèmes d'allergie ne varie pas à Bruxelles en fonction de l'âge, contrairement aux deux autres régions où l'on observe une diminution avec l'âge (Figure 1.2.1.3.1).

Figure 1.2.1.3.1 : Nombre de personnes (en %) qui ont eu des problèmes d'allergie au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec des problèmes d'allergie ne varie pas en fonction du niveau d'éducation, ni en fonction du niveau d'urbanisation.

Il n'y a pas d'augmentation significative des problèmes d'allergie entre 1997 et 2001 dans la population générale.


V.3.3. Prévalence de l'hypertension artérielle (MA0106)

12% de la population à Bruxelles déclare avoir souffert d'hypertension au cours des douze derniers mois. Chez les hommes ce taux est de 10% et chez les femmes de 13%. Cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge.

41% des hommes sont suivis pour leurs problèmes d'hypertension par un médecin généraliste, 14% par un spécialiste et 32% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 74% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes d'hypertension et 21% suivent un régime. 56% des femmes avec hypertension sont suivies par un médecin généraliste, 9% par un spécialiste et 20% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 76% des femmes déclarent prendre des médicaments pour leurs problèmes d'hypertension et 31% suivent un régime.

Le nombre de personnes avec hypertension augmente progressivement avec l'âge de moins de 1% chez les 15-24 ans à 30% chez les 65 ans et plus (Figure 1.2.1.3.2).

Figure 1.2.1.3.2 : Nombre de personnes (en %) qui ont souffert d'hypertension au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec hypertension diminue avec le niveau d'éducation: 18% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 14% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 12% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 9% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ce gradient n'est pas significatif.

La prévalence de l'hypertension artérielle a augmenté de 10% en 1997 à 12% en 2001. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative.


V.3.4. Prévalence du diabète (MA0112)

3,0% de la population déclare souffrir de diabète à Bruxelles. Chez les hommes ce taux est de 2,7%, chez les femmes 3,3%. Cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge.

54% des hommes sont suivis pour leurs problèmes de diabète par un médecin généraliste, 17% par un spécialiste et 26% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 71% des hommes prennent des médicaments per os pour leurs problèmes de diabète, 24% sont sous Insuline et 44% suivent un régime. Les femmes avec un diabète sont suivies dans 58% des cas par un médecin généraliste, 18% par un spécialiste et 15% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 57% des femmes déclarent prendre un médicament per os, 24% sont sous Insuline et 68% suivent un régime.

Le nombre de personnes avec un diabète est de moins de 1 % chez les moins de 35 ans, mais augmente ensuite à partir de 45 ans (Figure 1.2.1.3.3). Chez les 64-75 ans et plus, le taux est de 10% de la population. On remarque aussi une baisse de la prévalence chez les hommes de 75 ans et plus.

Figure 1.2.1.3.3 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de diabète au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec un diabète diminue en fonction du niveau d'éducation: 4% chez les personnes avec au maximum un certificat de l'enseignement primaire contre 2% chez les personnes avec au moins un diplôme secondaire supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences ne sont pas significatives.

La prévalence du diabète a augmenté légèrement à Bruxelles de 2,8% en 1997 à 3,0% en 2001. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative.


V.3.5. Prévalence des problèmes de migraine (MA0120)

13% de la population à Bruxelles déclare avoir eu des problèmes de migraine au cours des douze derniers mois. Chez les hommes ce taux est de 9%, chez les femmes de 17%. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

28% des hommes consultent un médecin généraliste pour leurs problèmes de migraine, 7% un spécialiste et 7% aussi bien un généraliste qu'un spécialiste. 64% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes de migraine. 38% des femmes avec des problèmes de migraine sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 6% par un spécialiste et 90% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 74% des femmes déclarent qu'elles prennent un médicament pour leurs problèmes de migraine.

Le nombre de personnes avec des problèmes de migraine est plus élevé chez les 15-54 ans et le plus bas chez les 0 à 14 ans (Figure 1.2.1.3.4). Chez les femmes 45-54 ans, le taux est presque de 15%.

Figure 1.2.1.3.4 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes de migraine au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec des problèmes de migraine ne varie pas en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes avec des problèmes de migraine est resté similaire en 1997 et en 2001.


V.3.6. Prévalence des douleurs au dos de longue durée (MA0124)

11% de la population à Bruxelles déclare avoir souffert au cours des douze derniers mois de douleurs au dos de longue durée. Ce taux est de 12% chez les hommes et 9% chez les femmes.

34% des hommes sont suivis pour leurs problèmes de douleurs au dos par un médecin généraliste, 15% par un spécialiste et 22% aussi bien par un médecin généraliste qu'un spécialiste. 51% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes de douleurs au dos. 39% des femmes avec des douleurs au dos de longue durée sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 18% par un spécialiste et 25% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 62% des femmes déclarent prendre des médicaments pour leurs problèmes de douleurs au dos de longue durée.

Le nombre de personnes avec des douleurs au dos de longue durée augmente progressivement avec l'âge chez les femmes de 4% chez les 15-24 ans à 22% chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.3.5). Chez les hommes, l'association avec l'âge est moins nette : entre 35 ans et 74 ans, le pourcentage reste stable (15%).

Figure 1.2.1.3.5 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de douleurs au dos de longue durée au cours des douze derniers mois, Région Bruxelloise, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec des douleurs au dos de longue durée diminue en fonction du niveau d'éducation: il est plus élevé chez les personnes avec au maximum un certificat de l'enseignement primaire que chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

La prévalence en 2001 est la même que celle mesurée en 1997.


V.3.7. Prévalence des problèmes d'arthrose (MA0125)

11% de la population à Bruxelles déclare avoir eu des problèmes d'arthrose au cours des douze derniers mois. Chez les hommes ce taux est de 7% et chez les femmes de 14%. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

41% des hommes sont suivis pour leurs problèmes d'arthrose par un médecin généraliste, 16% par un spécialiste et 21% aussi bien par un généraliste que par un spécialiste. 59% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes d'arthrose. 35% des femmes avec arthrose sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 16% par un spécialiste et 15% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 53% des femmes déclarent prendre un médicament pour leurs problèmes d'arthrose

Le nombre de personnes avec arthrose augmente avec l'âge, de moins de 1% chez les 15-24 ans à 45% chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.3.6).

Figure 1.2.1.3.6 : Nombre de personnes (en %) qui ont souffert de problèmes d'arthrose au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec arthrose ne varie pas de manière significative en fonction du niveau d'éducation.

La prévalence des problèmes d'arthrose a augmenté de 9% en 1997 à 11% en 2001. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative.

V.3.8. Nombre de maladies chroniques ou de longue durée (MA01_1, MA01_2)

45% de la population à Bruxelles ne souffre pas de maladies chroniques, 22% souffre d'une maladie chronique, 13% de 2 maladies, 7% de trois maladies et 13% de quatre maladies ou plus. La Figure 1.2.1.3.7. donne un aperçu de la distribution par âge et par sexe.

Le nombre moyen de maladies chroniques par an (sur base d'une liste de 32 maladies différentes) est de 1,4. Cette moyenne est plus élevée chez les femmes (1,7) que chez les hommes (1,1). Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

Le nombre moyen de maladies chroniques augmente en fonction de l'âge (Figure 1.2.1.3.8) de 0,3 chez les 0-14 ans à 3,5 chez les 75 ans et plus.

On observe aussi un gradient socio-économique important. Chez les personnes avec au maximum un certificat de l'enseignement secondaire inférieur la moyenne est de 1,8, chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, elle est de 1,4 et chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur, la moyenne est de 1,1. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ce gradient persiste.

Figure 1.2.1.3.7 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de maladies chroniques au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.





Figure 1.2.1.3.8 : Moyenne du nombre de maladies chroniques présentes au cours des douze derniers mois*, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.




* Sur une liste de 32 maladies chroniques

V.3.9. Co-morbidité (MA01_2 – MA01_3)

33% de la population à Bruxelles déclare avoir souffert de deux maladies chroniques ou plus au cours des douze derniers mois. Le pourcentage de personnes avec co-morbidité est plus élevé chez les femmes (38%) que chez les hommes (28%) et cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

Le pourcentage de personnes avec co-morbidité augmente en fonction de l'âge jusqu'à 65% chez les hommes de 75 ans et plus et 78% chez les femmes de 75 ans et plus (Figure 1.2.1.3.9).

Figure 1.2.1.3.9 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de 2 maladies chroniques ou plus (co-morbidité) au cours des douze derniers mois*, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



*Sur une liste de 32 maladies chroniques

Les personnes avec seulement un certificat d'enseignement primaire déclarent dans 39% des cas souffrir au moins de deux maladies chroniques. Ce pourcentage diminue en fonction du niveau d'éducation : il est de 28% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences ne sont pas significatives.

Tableau 1.2.1.3.4 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes d'allergie au cours des douze derniers mois, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

MA0103 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	15,3	15,1 (13,0-17,4)	1386
Femme	18,0	18,0 (15,9-20,4)	1545
GROUPE D'ÂGE			
0-14	14,1	14,1 (10,6-18,5)	496
15-24	17,3	17,4 (12,3-23,8)	266
25-34	20,4	20,4 (16,6-24,8)	480
35-44	18,3	18,3 (14,8-22,4)	502
45-54	16,1	16,1 (12,0-21,1)	360
55-64	17,1	17,1 (12,9-22,2)	293
65-74	17,0	16,8 (12,4-22,3)	271
75+	12,3	11,9 (8,3-16,8)	263
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	20,4	20,7 (12,9-31,6)	130
Enseignement primaire	12,5	12,7 (9,2-17,2)	394
Secondaire inférieur	17,4	17,4 (13,3-22,5)	401
Secondaire supérieur	14,2	14,1 (10,8-18,1)	669
Enseignement supérieur	18,6	18,2 (15,7-21,0)	1207
ANNEE			
1997	16,2	15,7 (13,8-17,9)	3041
2001	16,7	16,5 (14,9-18,3)	2931

Tableau 1.2.1.3.5 : Nombre de personnes (en %) ayant eu des problèmes d'hypertension au cours des douze derniers mois, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0106 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	12,2	8,8 (6,7-11,4)	1145
Femme	15,6	10,2 (8,0-12,8)	1309
GROUPE D'ÂGE			
15-24	1,5	1,5 (0,4- 5,3)	264
25-34	3,7	3,7 (2,2- 6,1)	483
35-44	7,1	7,1 (4,9-10,2)	507
45-54	13,4	13,4 (10,1-17,6)	363
55-64	23,3	23,2 (18,5-28,8)	297
65-74	32,9	32,8 (27,1-39,0)	275
75+	29,8	29,3 (23,7-35,6)	265
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	10,4	6,6 (3,4-12,4)	108
Enseignement primaire	21,4	12,4 (9,0-17,0)	341
Secondaire inférieur	16,3	9,8 (6,3-14,8)	340
Secondaire supérieur	13,9	9,2 (6,6-12,6)	558
Enseignement supérieur	11,0	8,6 (6,5-11,3)	991
ANNEE			
1997	11,7	8,7 (7,2-10,4)	2562
2001	13,9	9,4 (7,9-11,1)	2454

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.3.6 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de diabète au cours des douze derniers mois, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0112 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	3,3	0,4 (0,3- 0,6)	1123
Femme	3,9	0,4 (0,3- 0,6)	1280
GROUPE D'ÂGE			
15-24	0,0	0,0 (0,0- 0,0)	264
25-34	1,0	1,0 (0,4- 2,4)	474
35-44	2,3	2,3 (1,1- 4,6)	502
45-54	3,0	3,0 (1,7- 5,5)	353
55-64	5,0	5,0 (3,0- 8,1)	285
65-74	9,7	9,7 (6,7-13,7)	266
75+	8,6	8,5 (5,6-12,8)	259
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	11,7	1,1 (0,6- 2,2)	106
Enseignement primaire	4,8	0,3 (0,2- 0,6)	330
Secondaire inférieur	4,3	0,3 (0,2- 0,6)	328
Secondaire supérieur	2,6	0,2 (0,1- 0,4)	549
Enseignement supérieur	2,5	0,2 (0,2- 0,4)	974
ANNEE			
1997	3,3	2,3 (1,7- 3,2)	2562
2001	3,6	2,3 (1,7- 3,1)	2403

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.3.7 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes de migraine au cours des douze derniers mois, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

MA0120 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	8,5	6,8 (5,3- 8,7)	1397
Femme	17,4	14,9 (12,6-17,5)	1561
GROUPE D'ÂGE			
0-14	1,9	1,8 (0,8- 3,9)	503
15-24	17,0	16,5 (11,4-23,2)	264
25-34	18,6	17,9 (14,5-21,9)	483
35-44	18,4	17,7 (14,2-21,7)	509
45-54	16,8	16,1 (12,2-20,9)	364
55-64	11,7	10,9 (7,9-15,0)	295
65-74	10,6	9,6 (6,4-14,2)	274
75+	10,6	8,9 (5,9-13,2)	266
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	10,9	9,3 (5,3-15,9)	134
Enseignement primaire	16,2	13,6 (9,9-18,5)	398
Secondaire inférieur	11,5	9,5 (6,7-13,3)	403
Secondaire supérieur	15,4	12,3 (9,2-16,3)	681
Enseignement supérieur	11,2	8,3 (6,5-10,5)	1211
ANNEE			
1997	12,7	9,3 (7,8-11,1)	3041
2001	13,1	10,1 (8,6-11,8)	2958

Tableau 1.2.1.3.8 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes de dos de longue durée au cours des douze derniers mois, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0124 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	11,1	10,1 (8,2-12,5)	1148
Femme	14,2	12,5 (10,0-15,5)	1306
GROUPE D'ÂGE			
15-24	3,8	3,8 (1,5- 9,3)	264
25-34	6,4	6,4 (4,4- 9,2)	483
35-44	14,0	14,0 (10,9-17,7)	510
45-54	15,9	15,9 (11,7-21,2)	364
55-64	15,4	15,3 (11,4-20,2)	295
65-74	17,3	17,2 (13,0-22,3)	273
75+	19,8	19,2 (14,5-24,9)	265
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	17,9	16,4 (10,5-24,7)	109
Enseignement primaire	15,1	12,8 (9,6-16,7)	341
Secondaire inférieur	16,7	14,4 (10,5-19,5)	338
Secondaire supérieur	14,1	12,5 (8,3-18,3)	558
Enseignement supérieur	8,7	8,1 (6,2-10,4)	992
ANNEE			
1997	11,9	11,3 (9,6-13,1)	2562
2001	12,7	11,4 (9,7-13,3)	2454

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.3.9 : Nombre de personnes (en %) qui ont souffert de problèmes d'arthrose au cours des douze derniers mois, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

ma0125 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	8,8	4,6 (3,2- 6,7)	1146
Femme	17,3	8,4 (6,2-11,3)	1308
GROUPES D'AGE			
15-24	0,3	0,3 (0,0- 2,0)	264
25-34	2,3	2,2 (1,1- 4,2)	482
35-44	5,4	5,2 (3,4- 7,8)	508
45-54	12,3	11,9 (8,8-16,0)	363
55-64	16,0	15,6 (11,7-20,5)	296
65-74	29,2	28,3 (22,7-34,6)	275
75+	45,2	42,8 (36,4-49,4)	266
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	17,1	8,2 (4,1-15,8)	107
Enseignement primaire	18,0	6,7 (4,4-10,2)	339
Secondaire inférieur	20,2	9,3 (5,9-14,2)	339
Secondaire supérieur	13,4	6,5 (4,3- 9,6)	558
Enseignement supérieur	8,2	4,8 (3,3- 6,9)	995
ANNEE			
1997	10,6	7,1 (5,7- 8,8)	2562
2001	13,2	8,0 (6,7- 9,6)	2454

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.3.10 : Nombre moyen de maladies chroniques au cours des douze derniers mois, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA01_1 - Région Bruxelloise	Moyenne	Taux standardisé(95% BI)	N
SEXE			
Homme	1,1	1,2 (1,1- 1,3)	1419
Femme	1,7	1,6 (1,5- 1,8)	1587
GROUPE D'ÂGE			
0-14	0,3	0,3 (0,2- 0,4)	509
15-24	0,8	0,8 (0,6- 0,9)	270
25-34	1,0	1,0 (0,8- 1,1)	487
35-44	1,3	1,3 (1,1- 1,5)	518
45-54	1,6	1,6 (1,4- 1,8)	371
55-64	1,9	1,9 (1,6- 2,1)	302
65-74	2,9	2,8 (2,5- 3,2)	279
75+	3,5	3,4 (3,0- 3,8)	270
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	1,8	1,8 (1,3- 2,3)	134
Enseignement primaire	1,8	1,6 (1,4- 1,8)	407
Secondaire inférieur	1,8	1,7 (1,4- 1,9)	408
Secondaire supérieur	1,4	1,4 (1,2- 1,5)	693
Enseignement supérieur	1,1	1,3 (1,1- 1,4)	1231

* Sur une liste de 32 maladies chroniques

Tableau 1.2.1.3.11 : Nombre de personnes (en %) avec deux maladies chroniques ou plus (co-morbidité) au cours des douze derniers mois, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA01_3 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	28,2	25,8 (22,7-29,3)	1419
Femme	37,9	33,4 (30,2-36,7)	1587
GROUPE D'ÂGE			
0-14	6,7	6,6 (4,2-10,3)	509
15-24	20,6	20,7 (15,1-27,6)	270
25-34	23,8	23,7 (19,7-28,4)	487
35-44	29,0	28,9 (24,8-33,5)	518
45-54	37,8	37,8 (32,1-43,8)	371
55-64	45,7	45,6 (39,0-52,3)	302
65-74	63,4	63,1 (56,6-69,2)	279
75+	73,8	72,9 (66,6-78,4)	270
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	31,4	29,1 (20,9-38,8)	134
Enseignement primaire	38,8	30,4 (25,0-36,5)	407
Secondaire inférieur	38,3	32,6 (27,0-38,6)	408
Secondaire supérieur	34,4	30,6 (25,1-36,6)	693
Enseignement supérieur	28,0	26,8 (23,2-30,8)	1231

* Sur une liste de 32 maladies chroniques

V.4. Région Wallonne

V.4.1. Prévalence des maladies chroniques ou maladies de longue durée (MA01 – MA04)

Un aperçu de la prévalence des maladies spécifiques est donné dans le Tableau 1.2.1.4.1. La prévalence est souvent plus élevée chez les femmes mais le classement des maladies dans l'ordre de leur fréquence est environ le même pour les deux sexes.

Les maladies avec une prévalence de plus de 10% sont les allergies (13%), l'hypertension (12%) et problèmes de dos de longue durée (10%) chez les hommes, et chez les femmes les migraines (15%), l'allergie (15%), arthrose (14%), les problèmes de dos de longue durée (13%) et l'hypertension (12%).

Chez les hommes on observe une prévalence entre de 5% et 10% pour la sinusite (9%), arthrose (8%), la migraine (7%), l'asthme (6%), la bronchite chronique (6%) et les troubles cardiaques (5%). Chez les femmes, il s'agit de la sinusite (9%), la dépression (9%), le rhumatisme inflammatoire (8%), les troubles thyroïdiens (8%), la fatigue chronique (8%), la bronchite chronique (7%), l'asthme (6%), l'ostéoporose (5%), les autres formes d'arthrose (5%) et les vertiges avec chute (5%).

Chez les 65 ans et plus, les maladies les plus fréquentes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, sont les maladies du système locomoteur et les maladies cardiovasculaires.

24% des hommes de 65 ans et plus déclarent souffrir d'hypertension et 24% d'arthrose. La prévalence chez les hommes de 65 ans et plus se situe entre 10% et 25% pour les troubles prostatiques (19%), les troubles cardiaques (18%), la bronchite chronique (16%), les problèmes de dos de longue durée (13%), l'asthme (12%), le rhumatisme inflammatoire (11%), les autres formes d'arthrose (11%) et l'allergie (11%). On observe une prévalence entre de 5% et 10% pour les tumeurs malignes ou cancers (9%), le diabète (8%), la cataracte (8%), la sinusite (8%), la migraine (7%) et l'ulcère de l'estomac ou du duodénum (5%).

Chez les femmes de 65 ans et plus, 43% déclarent souffrir d'arthrose et 36% d'hypertension. La prévalence est entre 10% et 25% pour le rhumatisme inflammatoire (25%), les problèmes de dos de longue durée (23%), l'ostéoporose (18%), les autres formes d'arthrose (14%), le diabète (14%), les vertiges avec chute (13%), l'allergie (13%), les troubles thyroïdiens (13%), la dépression (12%), les maladies cardiaques graves ou infarctus (12%), la migraine (12%), la cataracte (12%), la fatigue chronique (11%), la bronchite chronique (10%) et l'asthme (10%). La prévalence chez les femmes de 65 ans et plus est entre 5% et 10% pour les troubles intestinaux graves (8%), l'ulcère de l'estomac ou du duodénum (7%), le glaucome (7%), la sinusite (6%), l'inflammation chronique de la vessie (6%) et la descente de matrice (6%).

L'information sur les personnes présentant une maladie chronique et qui sont suivies par un médecin (généraliste et/ou spécialiste) ou prennent des médicaments, est disponible dans les tableaux à la fin du chapitre.

Un résumé des prévalences mesurées en 1997 et en 2001 est présenté dans le Tableau 1.2.1.4.2. et le Tableau 1.2.1.4.3. Les résultats détaillés sont dans les tableaux à la fin du chapitre.

Tableau 1.2.1.4.1 Maladies avec une prévalence de 5% au moins (MA01), par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.			
Hommes	Prévalence	Femmes	Prévalence
Tous âges confondus		Tous âges confondus	
Maladies du système locomoteur		Maladies du système locomoteur	
Douleurs au niveau du dos	10,3	Arthrose	13,5
Arthrose	7,8	Douleurs au niveau du dos	12,8
		Rhumatisme inflammatoire	8,2
		Ostéoporose	5,4
		Autres formes de rhumatisme	5,4
Maladies cardiovasculaires		Maladies cardiovasculaires	
Hypertension	11,6	Hypertension	12,4
Troubles cardiaques, infarctus	5,2		
Maladies des voies respiratoires		Maladies des voies respiratoires	
Allergie	13,1	Allergie	14,6
Sinusite	8,8	Sinusite	9,4
Asthme	5,9	Bronchite chronique	7,3
Bronchite chronique	5,7	Asthme	6,1
Autres maladies		Autres maladies	
Migraine	6,5	Migraine	14,8
		Dépression	8,6
		Troubles thyroïdiens	8,1
		Fatigue chronique	7,8
		Vertiges avec chute	5,2
<u>Groupe d'âge de 65 ans ou plus</u>		<u>Groupe d'âge de 65 ans ou plus</u>	
Maladies du système locomoteur		Maladies du système locomoteur	
Arthrose	23,8	Arthrose	42,7
Douleurs au niveau du dos	12,6	Rhumatisme inflammatoire	24,5
Rhumatisme inflammatoire	11,3	Douleurs au niveau du dos	22,5
Autres formes de rhumatisme	10,7	Ostéoporose	18,3
		Autres formes de rhumatisme	13,6
Maladies cardiovasculaires		Maladies cardiovasculaires	
Hypertension	23,8	Hypertension	36,2
Troubles cardiaques, infarctus	17,9	Troubles cardiaques, infarctus	12,2
Maladies des voies respiratoires		Maladies des voies respiratoires	
Bronchite chronique	15,6	Allergie	13,1
Asthme	12,2	Bronchite chronique	10,3
Allergie	10,7	Asthme	10,1
Sinusite	7,8	Sinusite	6,2
Autres maladies		Autres maladies	
Troubles prostatiques	18,9	Diabète	13,5
Tumeurs malignes	8,5	Vertiges avec chute	13,4
Diabète	8,4	Troubles thyroïdiens	12,8
Cataracte	7,9	Dépression	12,3
Migraine	7,2	Migraine	11,9
Ulcère de l'estomac	5,2	Cataracte	11,7
		Fatigue chronique	11,4
		Troubles intestinaux graves	7,8
		Ulcère de l'estomac	7,4
		Glaucome	6,9
		Inflammation chronique de la vessie	5,9
		Descente de matrice	5,5

Tableau 1.2.1.4.2. Différence* dans la prévalence des maladies chroniques entre 2001 et 1997, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Hommes		Femmes	
	Tous âges confondus	65 ans et plus	Tous âges confondus	65 ans et plus
Allergie	0	0	0	0
Sinusite	0	0	0	0
Maladies cardiaques graves ou infarctus	0	0	0	0
Hypertension	+	0	0	0
Troubles intestinaux graves	0	0	0	0
Hépatite, cirrhose du foie	0	0	0	0
Calcul rénal	0	0	0	0
Maladie rénale grave	0	0	0	0
Inflammation chronique de la vessie	0	0	0	0
Diabète	0	0	0	0
Troubles thyroïdiens	0	0	0	0
Glaucome	0	0	0	0
Cataracte	+	0	0	0
Maladie de Parkinson	0	0	0	0
Dépression	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	0	0
Vertiges avec chute	0	0	0	0
Migraine	0	0	0	0
Troubles cutanés graves	0	0	0	0
Tumeur maligne ou cancer	0	0	0	0
Problèmes de dos de longue durée	0	0	0	0
Arthrose	0	0	0	0
Rhumatisme inflammatoire	0	0	0	0
Autres formes d'arthrose	0	0	0	0
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	0	0	0	0
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	0	0	0	0
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	0	0	0	0
Ostéoporose	0	0	0	0
Fracture du poignet	0	0	0	0
Fracture de la hanche	0	0	0	0
Fracture de la colonne vertébrale	0	0	0	0
Troubles prostatiques (hommes)	-	0		
Descente de matrice (femmes)			0	0

* Le signe (+) = augmentation significative ($p < 0.01$) par rapport à 1997; le signe (-) = diminution significative par rapport à 1997; 0 = pas de différence significative ($p > 0.01$) par rapport à 1997

Tableau 1.2.1.4.3. Différence* dans la prévalence des maladies chroniques entre 2001 et 1997, taux standardisé pour l'âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Hommes		Femmes	
	Tous âges confondus	65 ans et plus	Tous âges confondus	65 ans et plus
Allergie	0	0	0	0
Sinusite	0	0	0	0
Maladies cardiaques graves ou infarctus	0	0	0	0
Hypertension	0	0	0	0
Troubles intestinaux graves	0	0	0	0
Hépatite, cirrhose du foie	0	0	0	0
Calcul rénal	0	0	0	0
Maladie rénale grave	0	0	0	0
Inflammation chronique de la vessie	0	0	0	0
Diabète	0	0	0	0
Troubles thyroïdiens	0	0	0	0
Glaucome	0	0	0	0
Cataracte	0	0	0	0
Maladie de Parkinson	0	0	0	0
Dépression	0	0	0	0
Epilepsie	0	0	0	0
Vertiges avec chute	0	0	0	0
Migraine	0	0	0	0
Troubles cutanés graves	0	0	0	0
Tumeur maligne ou cancer	0	0	0	0
Problèmes de dos de longue durée	0	0	0	0
Arthrose	0	0	0	0
Rhumatisme inflammatoire	0	0	-	0
Autres formes d'arthrose	0	0	0	0
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	0	0	0	0
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	0	0	0	0
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	0	0	0	0
Ostéoporose	0	0	0	0
Fracture du poignet	0	0	0	0
Fracture de la hanche	0	0	0	0
Fracture de la colonne vertébrale	0	0	0	0
Troubles prostatiques (hommes)	0	0		
Descente de matrice (femmes)			0	0

* Le signe (+) = augmentation significative ($p < 0.01$) par rapport à 1997; le signe (-) = diminution significative par rapport à 1997; 0 = pas de différence significative ($p > 0.01$) par rapport à 1997

On trouve, sur base des taux bruts, une augmentation significative ($p < 0.01$) chez les hommes de la prévalence de l'hypertension (de 8% en 1997 à 12% en 2001) et de la cataracte (de 0,4% en 1997 à 1,3% en 2001).

On observe aussi une baisse non significative de la prévalence des troubles prostatiques (de 9,3% en 1997 à 4,2% en 2001).

On n'observe pas de différence significative dans la prévalence des maladies chroniques entre 1997 et 2001.


V.4.2. Prévalence des problèmes d'allergie (MA0103)

14% de la population en Wallonie déclare avoir souffert de problèmes d'allergie au cours de la dernière année : 13% chez les hommes et 15% chez les femmes. Cette différence n'est pas significative.

28% des hommes consultent un médecin généraliste pour leurs problèmes d'allergie, 16% un spécialiste et 17% aussi bien un médecin généraliste qu'un spécialiste. 58% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes d'allergie. 36% des femmes avec des problèmes d'allergie sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 13% par un spécialiste et 22% aussi bien par un médecin généraliste que par un spécialiste. 62% des femmes déclarent prendre des médicaments pour leurs problèmes d'allergie.

Le nombre de personnes ayant souffert de problèmes d'allergie est plus élevé (20%) dans le groupe d'âge 25-34 ans chez les hommes et le groupe 25-44 ans chez les femmes (Figure 1.2.1.4.1).

Figure 1.2.1.4.1 : Nombre de personnes (en %) qui ont eu des problèmes d'allergie au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec des problèmes d'allergie varie en fonction du niveau d'éducation : 10% chez les moins scolarisés, 11% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 14% chez les personnes avec un diplôme du secondaire supérieur et 17% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Ces différences ne sont pas significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Le pourcentage de personnes ayant souffert de problèmes d'allergie ne varie pas de manière significative en fonction du niveau d'urbanisation.

Les problèmes d'allergie ont augmenté entre 1997 (13%) et 2001 (14%). Après standardisation pour l'âge toutefois, cette augmentation n'est pas significative.


V.4.3. Prévalence de l'hypertension artérielle (MA0106)

12% de la population en Wallonie déclare avoir souffert d'hypertension au cours des douze derniers mois. Ce taux est pareil chez les hommes et les femmes.

58% des hommes sont suivis pour leurs problèmes d'hypertension par un médecin généraliste, 7% par un spécialiste et 22% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 76% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes d'hypertension et 23% suivent un régime. 62% des femmes avec hypertension sont suivies par un médecin généraliste, 3% par un spécialiste et 22% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 79% des femmes déclarent prendre des médicaments pour leurs problèmes d'hypertension et 21% suivent un régime.

Le nombre de personnes avec hypertension augmente progressivement avec l'âge de moins de 1% chez les 15-24 ans à 35% chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.4.2).

Figure 1.2.1.4.2 : Nombre de personnes (en %) qui ont souffert d'hypertension au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec hypertension diminue avec le niveau d'éducation: 20% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 18% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 12% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 6% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ce gradient n'est pas significatif.

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation.

La prévalence de l'hypertension artérielle a augmenté de 11% en 1997 à 12% en 2001. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative.


V.4.4. Prévalence du diabète (MA0112)

3,5% de la population déclare souffrir de diabète en Wallonie. Chez les hommes ce taux est de 3,0%, chez les femmes 4,1%. Cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge.

47% des hommes sont suivis pour leurs problèmes de diabète par un médecin généraliste, 14% par un spécialiste et 35% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 74% des hommes prennent des médicaments per os pour leurs problèmes de diabète, 40% sont sous Insuline et 63% suivent un régime. Les femmes avec un diabète sont suivies dans 43% des cas par un médecin généraliste, 1% par un spécialiste et 50% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 70% des femmes déclarent prendre un médicament per os, 30% sont sous Insuline et 74% suivent un régime.

Le nombre de personnes avec un diabète est de moins de 2% chez les moins de 45 ans, mais augmente ensuite avec l'âge (Figure 1.2.1.4.3). Chez les 75 ans et plus, le taux atteint 15% de la population.

Figure 1.2.1.4.3 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de diabète au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec un diabète diminue en fonction du niveau d'éducation: 8% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 4% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 4% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 2% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences ne sont pas significatives.

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation.

La prévalence du diabète a augmenté légèrement de 2,9% en 1997 à 3,5% en 2001. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative.


V.4.5. Prévalence des problèmes de migraine (MA0120)

11% de la population en Wallonie déclare avoir eu des problèmes de migraine au cours des douze derniers mois. Chez les hommes ce taux est de 7%, chez les femmes de 15%. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

22% des hommes consultent un médecin généraliste pour leurs problèmes de migraine, 1% un spécialiste et 15% aussi bien un généraliste qu'un spécialiste. 71% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes de migraine. 36% des femmes avec des problèmes de migraine sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 3% par un spécialiste et 14% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 78% des femmes déclarent qu'elles prennent un médicament pour leurs problèmes de migraine.

Le nombre de personnes avec des problèmes de migraine est plus élevé chez les 25-34 ans (16%) et le plus bas chez les 0 à 14 ans et les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.4.4).

Figure 1.2.1.4.4 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes de migraine au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec des problèmes de migraine diminue en fonction du niveau d'éducation: 14% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 12% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 11% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 8% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences ne sont pas significatives.

Le pourcentage de personnes avec des problèmes de migraine est plus élevé dans les grandes villes (13%) que dans les zones rurales (9%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences ne sont pas significatives.

Le pourcentage de personnes avec des problèmes de migraine a diminué en 2001 (11%) par rapport à 1997 (13%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative.


V.4.6. Prévalence des douleurs au dos de longue durée (MA0124)

12% de la population en Wallonie déclare avoir souffert au cours des douze derniers mois de douleurs au dos de longue durée. Ce pourcentage est de 13% chez les hommes et de 10% chez les femmes. Après standardisation pour l'âge, cette différence n'est pas significative.

33% des hommes sont suivis pour leurs problèmes de douleurs au dos par un médecin généraliste, 12% par un spécialiste et 35% aussi bien par un médecin généraliste qu'un spécialiste. 66% des hommes prennent des médicaments pour leurs problèmes de douleurs au dos. 31% des femmes avec des douleurs au dos de longue durée sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 10% par un spécialiste et 42% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 67% des femmes déclarent prendre des médicaments pour leurs problèmes de douleurs au dos de longue durée.

Le nombre de personnes avec des douleurs au dos de longue durée augmente progressivement avec l'âge chez les femmes de 4% chez les 15-24 ans à 20% chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.4.5). Chez les hommes, on observe une augmentation de la prévalence chez les 45-54 ans (22%) pour diminuer ensuite. (12% chez les 75 ans et plus).

Figure 1.2.1.4.5 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de douleurs au dos de longue durée au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec des douleurs au dos de longue durée diminue en fonction du niveau d'éducation: 18% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 14% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 10% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 9% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Ce gradient n'est pas significatif après standardisation pour l'âge et le sexe.

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation ou entre les régions. La prévalence en 2001 est la même que celle mesurée en 1997.


V.4.7. Prévalence des problèmes d'arthrose (MA0125)

11% de la population en Wallonie déclare avoir eu des problèmes d'arthrose au cours des douze derniers mois. Chez les hommes ce taux est de 8% et chez les femmes de 14%. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

27% des hommes sont suivis pour leur problème d'arthrose par un médecin généraliste, 8% par un spécialiste et 33% aussi bien par un généraliste que par un spécialiste. 46% des hommes prennent des médicaments pour leur problème d'arthrose. 36% des femmes avec arthrose sont suivies pour cela par un médecin généraliste, 6% par un spécialiste et 33% aussi bien par un généraliste qu'un spécialiste. 60% des femmes déclarent prendre un médicament pour leur problème d'arthrose.

Le nombre de personnes avec arthrose augmente avec l'âge, de moins de 2% chez les 15-24 ans à 45% chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.4.6).

Figure 1.2.1.4.6 : Nombre de personnes (en %) qui ont souffert de problèmes d'arthrose au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes avec arthrose diminue en fonction du niveau d'éducation: 23% chez les personnes avec seulement un certificat de l'enseignement primaire, 16% chez les personnes avec un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, 10% chez les personnes avec un niveau d'enseignement secondaire supérieur et 4% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe ces différences ne sont pas significatives.

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation.

La prévalence des problèmes d'arthrose a augmenté de 9% en 1997 à 11% en 2001. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative.

V.4.8 Nombre de maladies chroniques ou de longue durée (MA01_1, MA01_2)

44% de la population en Wallonie ne souffre pas de maladies chroniques, 23% souffre d'une maladie chronique, 14% de 2 maladies, 7% de trois maladies et 12% de 4 maladies ou plus. La Figure 1.2.1.4.7. donne un aperçu de la distribution par âge et par sexe.

Le nombre moyen de maladies chroniques par an (sur base d'une liste de 32 maladies différentes) est de 1,4. Cette moyenne est plus élevée chez les femmes (1,7) que chez les hommes (1,1). Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

Le nombre moyen de maladies chroniques augmente en fonction de l'âge (Figure 1.2.1.4.8) de 0,4 chez les 0-14 ans à 3,3 chez les 75 ans et plus.

On observe aussi un gradient socio-économique important. Chez les personnes avec au maximum un certificat de l'enseignement primaire on observe une moyenne de 2,3 maladies chroniques, chez les personnes avec au maximum un certificat de l'enseignement secondaire inférieur une moyenne de 1,7 chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur une moyenne de 1,3 et chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur une moyenne de 1,0. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ce gradient persiste.

Figure 1.2.1.4.7 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de maladies chroniques au cours des douze derniers mois, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.





Figure 1.2.1.4.8 : Nombre moyen de maladies chroniques présentes au cours des douze derniers mois*, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



* Sur une liste de 32 maladies chroniques


Le nombre moyen de maladies chroniques ne varie pas en fonction du niveau d'urbanisation.

V.4.9. Co-morbidité (MA01_2 – MA01_3)

34% de la population en Wallonie déclare avoir souffert de deux maladies chroniques ou plus au cours des douze derniers mois. Le pourcentage de personnes avec co-morbidité est plus élevé (39%) chez les femmes que chez les hommes (28%) et cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

Le pourcentage de personnes avec co-morbidité augmente en fonction de l'âge jusqu'à 61% chez les hommes et 78% chez les femmes chez les 75 ans et plus (Figure 1.2.1.4.9).

Figure 1.2.1.4.9 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de 2 maladies chroniques ou plus (co-morbidité) au cours des douze derniers mois*, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



*Sur une liste de 32 maladies chroniques

Les personnes avec seulement un certificat d'enseignement primaire déclarent dans 56% des cas souffrir au moins de deux maladies chroniques. Ce pourcentage diminue en fonction du niveau d'éducation : 24% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences sont moins nettes mais la différence entre les niveaux extrêmes reste significative.

Le pourcentage de personnes avec co-morbidité ne varie pas en fonction du niveau d'urbanisation.

Tableau 1.2.1.4.4 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes d'allergie au cours des douze derniers mois, Enquête de santé, Région Wallonne, Belgique, 2001.

MA0103 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	13,1	12,8 (10,8-15,1)	2430
Femme	14,6	14,4 (12,2-16,9)	2547
GROUPE D'ÂGE			
0-14	12,6	12,6 (9,7-16,3)	836
15-24	18,3	18,2 (13,3-24,5)	566
25-34	20,0	20,0 (15,1-26,1)	671
35-44	12,9	12,9 (9,8-16,7)	758
45-54	10,8	10,8 (8,0-14,5)	713
55-64	11,7	11,7 (7,8-17,2)	538
65-74	14,1	14,0 (8,0-23,2)	531
75+	9,6	9,4 (6,1-14,4)	364
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	20,4	19,8 (7,4-43,1)	59
Enseignement primaire	9,6	9,6 (6,7-13,6)	665
Secondaire inférieur	10,8	10,7 (7,9-14,4)	1035
Secondaire supérieur	13,5	13,2 (10,9-15,8)	1482
Enseignement supérieur	16,6	16,4 (13,1-20,4)	1539
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	15,5	15,0 (11,3-19,7)	982
Zone semi-urbaine	15,9	15,5 (12,6-18,9)	1839
Zone rurale	12,0	11,8 (10,0-14,0)	2156
ANNEE			
1997	13,0	12,2 (10,8-13,9)	3625
2001	13,9	13,5 (12,0-15,3)	4977

Tableau 1.2.1.4.5 : Nombre de personnes (en %) ayant eu des problèmes d'hypertension au cours des douze derniers mois, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0106 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	14,4	10,8 (8,7-13,4)	2000
Femme	14,9	10,1 (8,2-12,4)	2133
GROUPE D'ÂGE			
15-24	1,4	1,4 (0,6-3,4)	565
25-34	4,4	4,4 (2,5-7,5)	671
35-44	8,1	8,1 (5,7-11,3)	757
45-54	15,8	15,8 (11,8-20,7)	713
55-64	27,1	27,0 (21,5-33,4)	538
65-74	28,0	28,0 (22,1-34,8)	528
75+	35,4	35,6 (28,6-43,4)	361
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	15,1	8,1 (2,7-21,4)	56
Enseignement primaire	21,2	9,9 (6,9-13,9)	630
Secondaire inférieur	21,3	13,5 (10,0-18,0)	877
Secondaire supérieur	15,0	12,8 (9,9-16,3)	1196
Enseignement supérieur	8,3	7,0 (5,0-9,8)	1212
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	13,4	9,4 (7,1-12,5)	833
Zone semi-urbaine	15,8	11,5 (9,1-14,6)	1515
Zone rurale	14,1	9,8 (7,8-12,4)	1785
ANNEE			
1997	12,9	10,8 (9,1-12,7)	3000
2001	14,7	10,8 (9,2-12,6)	4133

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.4.6 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de diabète au cours des douze derniers mois, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0112 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	3,7	1,9 (1,2- 2,9)	1986
Femme	4,9	2,2 (1,4- 3,5)	2118
GROUPE D'ÂGE			
15-24	0,0	0,0 (0,0- 0,3)	561
25-34	1,6	1,6 (0,6- 4,4)	665
35-44	1,7	1,7 (0,8- 3,8)	754
45-54	4,0	4,0 (2,2- 7,1)	708
55-64	6,4	6,5 (4,1-10,0)	534
65-74	8,8	8,8 (5,1-14,7)	525
75+	15,0	14,7 (9,6-21,9)	357
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	6,3	2,2 (0,7- 6,5)	56
Enseignement primaire	8,4	2,5 (1,2- 5,0)	630
Secondaire inférieur	4,8	2,0 (1,1- 3,7)	871
Secondaire supérieur	4,3	2,6 (1,7- 4,0)	1191
Enseignement supérieur	2,2	1,4 (0,7- 2,7)	1197
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	4,2	1,9 (1,2- 3,1)	820
Zone semi-urbaine	5,0	2,4 (1,4- 3,9)	1516
Zone rurale	3,8	1,8 (1,1- 2,8)	1768
ANNEE			
1997	3,6	2,5 (1,8- 3,4)	3000
2001	4,3	2,6 (1,9- 3,5)	4104

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.4.7 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes de migraine au cours des douze derniers mois, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

MA0120 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	6,5	5,6 (4,3- 7,2)	2429
Femme	14,8	13,2 (11,3-15,3)	2543
GROUPE D'ÂGE			
0-14	2,3	2,1 (1,1- 4,1)	836
15-24	10,9	10,2 (7,2-14,3)	565
25-34	15,8	15,1 (11,3-20,0)	671
35-44	13,6	12,9 (10,0-16,6)	759
45-54	12,1	11,3 (8,7-14,5)	713
55-64	13,8	13,0 (9,0-18,4)	538
65-74	12,0	10,8 (7,1-16,1)	528
75+	7,3	6,0 (3,6- 9,9)	362
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	14,0	10,2 (4,0-23,8)	59
Enseignement primaire	14,1	11,1 (7,9-15,5)	661
Secondaire inférieur	11,9	9,7 (7,2-12,9)	1034
Secondaire supérieur	11,4	9,3 (7,3-11,7)	1483
Enseignement supérieur	8,0	6,7 (5,1- 8,7)	1539
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	12,9	10,3 (7,8-13,4)	980
Zone semi-urbaine	11,8	9,7 (7,7-12,2)	1838
Zone rurale	9,4	7,6 (6,1- 9,5)	2154
ANNEE			
1997	13,4	10,3 (8,7-12,0)	3622
2001	10,7	8,3 (7,1- 9,7)	4972

Tableau 1.2.1.4.8 : Nombre de personnes (en %) ayant souffert de problèmes de dos de longue durée au cours des douze derniers mois, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0124 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	12,7	11,5 (9,5-13,9)	2004
Femme	15,3	13,7 (10,9-17,1)	2133
GROUPE D'ÂGE			
15-24	3,5	3,5 (1,4- 8,3)	565
25-34	9,7	9,7 (6,5-14,3)	671
35-44	13,6	13,6 (10,4-17,7)	758
45-54	18,8	18,8 (14,6-23,7)	714
55-64	19,4	19,4 (15,3-24,3)	538
65-74	19,2	19,1 (14,0-25,6)	528
75+	17,4	17,0 (12,0-23,6)	363
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	21,4	17,9 (7,1-38,5)	55
Enseignement primaire	19,7	15,6 (11,0-21,5)	630
Secondaire inférieur	16,2	13,9 (11,0-17,5)	878
Secondaire supérieur	12,9	12,2 (9,5-15,5)	1199
Enseignement supérieur	11,5	11,0 (7,9-15,1)	1213
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	13,1	11,9 (9,3-15,0)	832
Zone semi-urbaine	15,3	14,0 (10,6-18,1)	1521
Zone rurale	13,3	11,7 (9,7-14,1)	1784
ANNEE			
1997	14,1	13,0 (11,4-14,8)	3000
2001	14,1	12,3 (10,5-14,2)	4137

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.4.9 : Nombre de personnes (en %) qui ont souffert de problèmes d'arthrose au cours des douze derniers mois, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA0125 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	9,7	6,5 (5,0- 8,3)	2000
Femme	16,4	10,2 (8,1-12,8)	2133
GROUPE D'ÂGE			
15-24	1,8	1,7 (0,6- 5,0)	565
25-34	2,6	2,5 (1,3- 5,0)	671
35-44	4,8	4,7 (3,1- 7,1)	758
45-54	8,9	8,8 (6,5-11,8)	712
55-64	25,5	25,3 (20,0-31,5)	537
65-74	27,6	27,0 (21,4-33,5)	527
75+	44,8	43,1 (36,2-50,1)	363
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	19,5	8,9 (3,9-19,1)	56
Enseignement primaire	24,2	8,8 (6,5-11,9)	630
Secondaire inférieur	18,5	10,3 (7,8-13,6)	878
Secondaire supérieur	12,6	10,5 (7,7-14,2)	1197
Enseignement supérieur	5,8	4,7 (3,3- 6,8)	1210
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	13,6	8,4 (6,1-11,3)	831
Zone semi-urbaine	13,7	8,6 (6,3-11,6)	1519
Zone rurale	12,6	7,8 (6,2- 9,8)	1783
ANNEE			
1997	10,5	7,8 (6,5- 9,4)	2997
2001	13,1	8,4 (7,0-10,1)	4133

* Les chiffres dans ce tableau ne concernent que les personnes de 15 ans et plus

Tableau 1.2.1.4.10 : Nombre moyen de maladies chroniques au cours des douze derniers mois, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA01_1 - Région Wallonne	Moyenne	Taux standardisé (95% BI)	N
SEXE			
Homme	1,1	1,2 (1,1- 1,3)	2445
Femme	1,7	1,7 (1,5- 1,8)	2560
GROUPE D'ÂGE			
0-14	0,4	0,4 (0,3- 0,5)	844
15-24	0,8	0,8 (0,6- 1,0)	570
25-34	1,2	1,2 (1,0- 1,4)	675
35-44	1,2	1,2 (1,0- 1,3)	762
45-54	1,5	1,5 (1,3- 1,7)	717
55-64	2,3	2,3 (2,0- 2,6)	539
65-74	2,6	2,5 (2,2- 2,8)	532
75+	3,3	3,2 (2,8- 3,6)	366
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	2,5	2,0 (0,9- 3,2)	59
Enseignement primaire	2,3	1,7 (1,5- 2,0)	668
Secondaire inférieur	1,7	1,6 (1,4- 1,8)	1038
Secondaire supérieur	1,3	1,5 (1,4- 1,6)	1494
Enseignement supérieur	1,0	1,2 (1,1- 1,4)	1548
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	1,5	1,5 (1,3- 1,6)	984
Zone semi-urbaine	1,5	1,6 (1,4- 1,7)	1853
Zone rurale	1,3	1,4 (1,2- 1,5)	2168

* Sur une liste de 32 maladies chroniques

Tableau 1.2.1.4.11 : Nombre de personnes (en %) avec deux maladies chroniques ou plus (co-morbidité) au cours des douze derniers mois, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001. *

MA01_3 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	28,2	26,6 (23,7-29,7)	2445
Femme	38,7	36,2 (32,8-39,8)	2560
GROUPE D'ÂGE			
0-14	8,7	8,6 (5,8-12,6)	844
15-24	16,7	16,5 (12,4-21,6)	570
25-34	30,4	30,6 (25,2-36,5)	675
35-44	29,8	29,8 (25,0-35,1)	762
45-54	37,1	37,0 (31,1-43,4)	717
55-64	55,3	55,5 (49,1-61,7)	539
65-74	60,1	59,8 (52,5-66,6)	532
75+	71,6	70,5 (63,7-76,6)	366
NIVEAU D'ÉDUCATION			
Pas de diplôme	49,3	36,4 (16,5-62,3)	59
Enseignement primaire	56,1	40,8 (33,6-48,5)	668
Secondaire inférieur	40,8	35,0 (30,6-39,7)	1038
Secondaire supérieur	31,8	32,6 (28,6-36,9)	1494
Enseignement supérieur	23,8	25,6 (21,6-30,1)	1548
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	35,2	32,0 (27,1-37,4)	984
Zone semi-urbaine	36,0	34,8 (30,5-39,3)	1853
Zone rurale	31,4	28,6 (25,4-32,0)	2168

* Sur une liste de 32 maladies chroniques

VI. Références

- (1) Verbrugge LM, Patrick DL. Seven chronic conditions: Their impact on US adults' activity levels and use of medical services. *Am J Public Health* 1995; 85:173-182.
- (2) Hoffman C, Rice D, Sung HY. Persons with chronic conditions. Their prevalence and costs. *JAMA* 1996; 276(18):1473-1479.
- (3) Gijsen R, Hoeymans N, Schellevis FG, Ruwaard D, Satariano WA, van den Bos GA. Causes and consequences of comorbidity: a review. *J Clin Epidemiol* 2001; 54(7):661-674.
- (4) Beckett M, Weinstein M, Goldman N, Yu-Hsuan L. Do health interview surveys yield reliable data on chronic illness among older respondents? *Am J Epidemiol* 2000; 151(3):315-323.
- (5) Mootz M, Van den Berg J. [Indicators of health status in the CBS-Health Interview Survey]. *Mndber Gezondheid (CBS)* 1989; 2:4-10.

BELGIQUE

NOMBRE D'HOMMES (EN %) AYANT SOUFFERT DE MALADIES CHRONIQUES AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Allergie	5861	13,3	749	31,0	11,4	17,1	62,9		
Hypertension	5864	10,5	640	58,4	5,5	20,2	74,2		22,8
Problèmes de dos de longue durée	5874	9,3	585	31,0	13,7	29,7	59,3		
Arthrose	5866	8,7	530	28,8	7,3	24,2	39,8		
Sinusite	5855	6,5	407	50,7	4,9	12,9	73,4		
Migraine	5873	5,1	373	25,5	3,1	10,6	67,8		
Bronchite chronique	5859	4,9	375	54,2	4,3	26,1	81,2		
Asthme	5873	4,8	334	44,9	10,4	28,2	82,1		
Dépression	5871	4,2	250	27,2	20,4	26,5	67,6		
Rhumatisme inflammatoire	5873	4,2	276	36,6	7,3	24,8	57,2		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	5872	3,8	278	13,7	13,4	68,4	88,3		
Troubles prostatiques	5849	3,7	248	21,1	19,6	44,6	54,5		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	5870	3,0	201	31,7	21,1	29,0	70,1		
Fatigue chronique	5871	2,6	194	34,2	7,8	21,5	33,6		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	5874	2,5	208	20,8	13,6	50,5	78,1		
Diabète*	5823	2,4	187	55,0	9,0	26,5	70,0	34,2	61,4
Troubles intestinaux graves	5873	2,1	139	22,8	9,1	38,7	67,4		
Autres formes d'arthrose	5868	2,0	165	37,1	14,0	31,5	75,7		
Vertiges avec chute	5872	1,6	109	43,2	8,1	22,3	55,8		
Troubles thyroïdiens	5873	1,4	91	36,6	17,4	30,5	78,6		
Glaucome	5871	1,3	89	0,9	66,5	25,4	65,7		
Ostéoporose	5873	1,2	69	20,2	10,6	36,5	47,6		
Cataracte	5870	1,2	87	2,3	58,5	21,4	34,6		
Tumeur maligne ou cancer	5872	1,2	78	7,7	23,5	62,2	69,0		
Inflammation chronique de la vessie	5867	0,9	59	18,0	8,3	59,7	78,4		
Calcul rénal	5868	0,8	46	35,5	8,6	35,4	45,6		
Epilepsie	5872	0,7	36	21,6	27,5	48,8	97,3		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	5874	0,6	44	27,3	5,6	54,7	82,0		
Fracture du poignet	5873	0,5	36	8,6	17,2	57,2	20,4		
Hépatite, cirrhose du foie	5871	0,5	44	22,5	11,3	45,7	41,8		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	5872	0,5	33	16,3	13,4	50,0	12,0		
Maladie rénale grave	5869	0,4	32	14,4	22,7	30,9	50,8		
Fracture de la hanche	5872	0,4	26	1,6	24,7	54,9	41,3		
Maladie de Parkinson	5869	0,3	23	23,0	12,3	49,9	83,5		
Fracture de la colonne vertébrale	5871	0,2	18	5,9	16,8	51,5	27,2		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

*Diabète: uniquement médicaments per os

BELGIQUE

NOMBRE DE FEMMES (EN %) AYANT SOUFFERT DE MALADIES CHRONIQUES AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Arthrose	6132	14,7	913	34,6	8,8	29,9	53,2		
Allergie	6117	14,3	920	35,2	11,8	18,3	60,7		
Hypertension	6130	13,1	813	65,4	3,0	18,7	80,5		30,7
Migraine	6131	12,3	913	39,1	3,8	11,0	73,8		
Problèmes de dos de longue durée	6128	10,5	685	35,7	10,6	30,4	61,3		
Rhumatisme inflammatoire	6136	8,2	536	45,6	12,1	22,1	62,2		
Sinusite	6105	8,1	540	57,9	9,0	12,4	77,3		
Dépression	6136	6,2	467	49,9	13,1	24,2	77,3		
Fatigue chronique	6131	5,6	395	40,3	8,8	21,4	46,6		
Bronchite chronique	6113	5,4	395	56,2	6,5	22,6	82,6		
Ostéoporose	6136	5,4	393	35,5	14,6	31,3	70,2		
Troubles thyroïdiens	6138	5,1	371	29,8	13,1	44,9	78,8		
Autres formes d'arthrose	6129	4,4	323	42,7	12,6	21,9	60,7		
Asthme	6130	4,2	278	34,2	14,8	37,8	83,0		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	6127	3,6	237	23,8	35,1	23,2	71,9		
Vertiges avec chute	6131	3,6	247	44,4	5,7	21,9	52,9		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	6125	3,3	206	12,4	10,1	66,6	76,9		
Troubles intestinaux graves	6121	3,3	239	37,1	9,6	31,4	72,0		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	6137	3,1	245	22,3	16,6	51,7	82,3		
Diabète*	6076	2,9	211	53,9	9,3	29,2	66,7	31,6	74,3
Inflammation chronique de la vessie	6121	2,4	158	49,1	6,8	30,3	86,0		
Cataracte	6133	2,3	167	6,8	54,1	25,0	50,2		
Glaucome	6126	2,1	148	11,5	44,0	26,0	58,5		
Descente de matrice	6080	1,4	83	15,2	16,1	22,8	14,6		
Tumeur maligne ou cancer	6136	1,4	104	5,8	38,7	49,2	61,0		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	6138	1,1	72	26,5	16,2	33,2	42,2		
Fracture du poignet	6133	1,1	57	5,7	24,0	60,9	47,1		
Hépatite, cirrhose du foie	6124	0,9	51	12,3	5,9	37,6	35,5		
Calcul rénal	6119	0,8	46	32,2	4,4	47,0	39,7		
Maladie rénale grave	6120	0,5	39	18,2	22,5	47,7	49,7		
Epilepsie	6132	0,5	37	26,3	24,8	40,2	81,4		
Fracture de la hanche	6136	0,4	41	0,8	45,4	44,1	63,1		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	6134	0,4	38	10,2	28,3	54,6	90,3		
Maladie de Parkinson	6131	0,3	30	36,5	24,6	33,8	72,0		
Fracture de la colonne vertébrale	6133	0,2	14	27,6	8,7	10,5	42,8		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

BELGIQUE

NOMBRE D'HOMMES DE 65 ANS ET PLUS (EN %) AYANT SOUFFERT D'UNE MALADIE CHRONIQUE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Hypertension	929	27,6	251	62,4	6,5	22,1	84,4		20,9
Arthrose	930	27,3	254	35,9	3,6	19,5	41,8		
Troubles prostatiques	932	18,9	168	19,5	14,0	51,3	55,5		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	931	15,8	168	19,4	12,9	63,9	88,9		
Bronchite chronique	929	13,9	158	46,4	2,5	35,3	79,4		
Problèmes de dos de longue durée	930	12,4	124	39,4	7,1	27,9	57,8		
Rhumatisme inflammatoire	931	12,0	114	45,1	0,5	26,6	61,6		
Diabète*	916	9,1	100	57,1	5,8	24,8	75,7	33,5	60,5
Asthme	927	8,5	81	43,9	2,6	36,0	82,1		
Allergie	929	7,8	70	34,9	3,6	10,6	53,9		
Dépression	929	6,8	56	36,8	17,3	17,0	66,5		
Cataracte	930	6,7	70	2,9	53,0	24,4	38,4		
Sinusite	924	6,0	64	55,4	1,2	18,1	75,2		
Autres formes d'arthrose	928	5,8	71	55,7	0,5	27,4	71,0		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	933	5,6	63	17,2	9,7	62,7	81,3		
Tumeur maligne ou cancer	931	5,5	50	8,7	20,2	68,7	76,4		
Fatigue chronique	931	5,5	59	42,5	2,7	10,1	25,6		
Vertiges avec chute	930	4,4	43	65,2	3,3	13,1	55,5		
Ostéoporose	933	4,4	33	15,6	9,8	45,4	59,0		
Migraine	931	4,3	56	41,2	5,0	17,7	52,9		
Inflammation chronique de la vessie	932	3,7	31	9,4	7,9	77,5	88,1		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	930	3,5	37	45,3	12,0	35,3	81,1		
Troubles intestinaux graves	932	3,4	39	16,5	11,5	59,0	77,1		
Glaucome	929	3,3	43	1,3	48,7	47,9	59,2		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	932	3,2	32	26,4	3,2	54,7	77,1		
Troubles thyroïdiens	930	3,0	35	27,9	16,0	46,3	83,9		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	932	1,8	17	17,0	4,1	60,0	13,3		
Maladie de Parkinson	929	1,8	17	26,2	8,0	52,6	86,8		
Fracture de la hanche	932	1,8	14	0,0	36,7	46,7	53,8		
Calcul rénal	932	1,4	15	30,3	11,8	48,1	56,2		
Epilepsie	930	1,3	8	18,1	5,0	76,8	100,0		
Hépatite, cirrhose du foie	932	0,9	9	21,5	0,0	67,4	53,5		
Maladie rénale grave	932	0,9	10	0,0	10,1	68,8	78,8		
Fracture de la colonne vertébrale	932	0,8	10	11,1	8,0	32,8	11,7		
Fracture du poignet	932	0,6	8	0,0	6,7	36,0	23,1		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

BELGIQUE

NOMBRE DE FEMMES DE 65 ANS ET PLUS (EN %) AYANT SOUFFERT D'UNE MALADIE CHRONIQUE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Arthrose	1190	46,2	530	38,2	8,2	27,7	55,1		
Hypertension	1186	38,1	418	70,5	2,1	17,8	86,1		34,7
Rhumatisme inflammatoire	1188	24,7	284	50,5	10,5	22,1	63,7		
Problèmes de dos de longue durée	1186	20,4	230	42,1	8,5	27,9	62,5		
Ostéoporose	1190	18,9	260	39,4	13,7	31,7	71,0		
Autres formes d'arthrose	1185	12,7	163	51,0	8,5	22,9	58,8		
Allergie	1188	12,1	151	32,5	10,2	22,3	50,4		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	1189	11,0	133	12,8	3,2	78,7	91,2		
Cataracte	1189	11,0	152	7,3	53,0	25,9	51,7		
Troubles thyroïdiens	1190	10,0	119	31,2	14,9	40,9	84,5		
Fatigue chronique	1186	9,6	125	48,6	3,5	23,4	56,3		
Diabète*	1171	9,6	120	55,2	7,2	32,1	74,6	29,3	79,0
Vertiges avec chute	1191	9,4	117	49,2	5,5	24,9	53,0		
Bronchite chronique	1185	9,3	130	52,0	5,9	32,7	83,2		
Migraine	1188	8,9	133	46,7	2,8	15,8	72,4		
Dépression	1190	8,2	122	58,8	6,6	23,2	76,4		
Troubles intestinaux graves	1188	8,0	103	43,9	7,3	30,9	77,9		
Glaucome	1183	6,9	91	10,2	44,7	27,5	62,5		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	1190	6,5	87	16,6	18,3	52,6	78,4		
Asthme	1189	6,5	76	39,2	11,3	44,6	85,1		
Descente de matrice	1179	5,0	50	15,6	10,9	22,6	9,2		
Inflammation chronique de la vessie	1189	4,4	58	42,5	9,1	41,7	90,6		
Sinusite	1185	4,4	70	23,1	11,6	16,8	48,7		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	1189	4,1	48	44,3	14,2	36,3	82,3		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	1191	3,8	39	32,3	14,5	31,1	46,8		
Tumeur maligne ou cancer	1190	3,1	38	2,5	58,6	33,6	64,2		
Hépatite, cirrhose du foie	1190	2,3	19	12,3	0,4	25,4	21,2		
Fracture du poignet	1189	2,1	24	8,7	11,1	60,5	37,4		
Fracture de la hanche	1190	1,8	37	0,9	49,7	38,3	65,7		
Maladie rénale grave	1187	1,5	16	26,7	30,5	27,9	25,5		
Maladie de Parkinson	1187	1,4	25	38,6	20,1	38,7	75,6		
Calcul rénal	1189	1,4	18	26,2	2,0	56,3	58,0		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	1188	1,2	27	16,0	19,2	53,9	92,3		
Epilepsie	1190	0,6	11	27,8	6,6	46,1	51,1		
Fracture de la colonne vertébrale	1188	0,5	6	52,0	16,4	8,3	76,7		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

BELGIQUE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - HOMMES (TOUS LES AGES)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Allergie	13,3	5861	11,1	4974
Tension artérielle élevée	10,5	5864	7,8	4973
Affection persistante au dos	9,3	5874	9,5	4973
Arthrose	8,7	5866	8,0	4972
Sinusite	6,5	5855	5,8	4972
Migraine	5,1	5873	5,9	4970
Bronchite chronique	4,9	5859	,	0
Asthme	4,8	5873	,	0
Dépression	4,2	5871	3,9	4974
Rhumatisme inflammatoire	4,2	5873	3,7	4970
Affection cardiaque grave ou infarctus	3,8	5872	3,8	4973
Troubles prostatiques	3,6	5849	7,9	1588
Affection cutanée grave ou chronique	3,0	5870	3,1	4970
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	2,5	5874	2,5	4973
Diabète	2,4	5823	2,0	4973
Troubles intestinaux graves	2,1	5873	2,4	4974
Fatigue chronique	2,0	5871	,	0
Autres formes de rhumatisme chronique	2,0	5868	2,3	4971
Vertiges avec chute	1,6	5872	1,7	4973
Troubles de la thyroïde	1,4	5873	,8	4971
Glaucome	1,3	5871	1,0	4973
Ostéoporose	1,2	5873	,7	4972
Cataracte	1,2	5870	,6	4973
Tumeur maligne ou cancer	1,2	5872	,6	4972
Cystite chronique	,9	5867	,7	4973
Calculs rénaux	,8	5868	,9	4973
Epilepsie	,7	5872	,5	4971
Accident vasculaire cérébral ou complications	,6	5874	,5	4971
Fracture du poignet	,5	5873	,5	4972
Hépatite, cirrhose	,5	5871	,6	4973
Calculs ou inflammation de la vésicule	,5	5872	,2	4974
Maladie rénale grave	,4	5869	,7	4973
Fracture de la hanche	,4	5872	,2	4971
Maladie de Parkinson	,3	5869	,2	4975
Fracture de la colonne vertébrale	,2	5871	,2	4966
Asthme, bronchite chronique ou BPC0	,	0	7,1	4975

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

BELGIQUE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - FEMMES (TOUS LES AGES)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Arthrose	14,7	6132	12,3	5222
Allergie	14,3	6117	14,7	5221
Tension artérielle élevée	13,1	6130	10,5	5223
Migraine	12,3	6131	13,6	5220
Affection persistante au dos	10,5	6128	10,4	5220
Rhumatisme inflammatoire	8,2	6136	7,4	5220
Sinusite	8,1	6105	9,5	5215
Dépression	6,2	6136	7,0	5222
Ostéoporose	5,4	6136	4,0	5223
Bronchite chronique	5,4	6113	,	0
Troubles de la thyroïde	5,1	6138	4,5	5221
Autres formes de rhumatisme chronique	4,4	6129	3,1	5220
Asthme	4,2	6130	,	0
Affection cutanée grave ou chronique	3,6	6127	3,6	5220
Vertiges avec chute	3,5	6131	3,8	5222
Affection cardiaque grave ou infarctus	3,3	6125	2,9	5220
Troubles intestinaux graves	3,3	6121	3,8	5222
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	3,1	6137	2,7	5224
Diabète	2,9	6076	2,5	5224
Cystite chronique	2,4	6121	2,6	5223
Cataracte	2,2	6133	1,6	5222
Glaucome	2,1	6126	1,3	5222
Fatigue chronique	1,9	6131	,	0
Descente de matrice	1,4	6080	3,8	1824
Tumeur maligne ou cancer	1,4	6136	1,4	5219
Calculs ou inflammation de la vésicule	1,1	6138	1,1	5221
Fracture du poignet	1,0	6133	,9	5225
Hépatite, cirrhose	,9	6124	,9	5223
Calculs rénaux	,8	6119	,8	5224
Maladie rénale grave	,5	6120	,7	5220
Epilepsie	,5	6132	,7	5222
Fracture de la hanche	,4	6136	,2	5220
Accident vasculaire cérébral ou complications	,3	6134	,9	5223
Maladie de Parkinson	,3	6131	,4	5221
Fracture de la colonne vertébrale	,2	6133	,2	5214
Asthme, bronchite chronique ou BPCO	,	0	7,1	5224

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

BELGIQUE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - HOMMES (65 ANS ET PLUS)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Tension artérielle élevée	27,6	929	21,0	756
Arthrose	27,3	930	21,4	756
Troubles prostatiques	18,9	932	13,6	752
Affection cardiaque grave ou infarctus	15,8	931	18,4	756
Bronchite chronique	13,9	929	,	0
Affection persistante au dos	12,4	930	17,3	755
Rhumatisme inflammatoire	12,0	931	13,0	755
Diabète	9,1	916	9,2	755
Asthme	8,5	927	,	0
Allergie	7,8	929	6,8	756
Dépression	6,8	929	4,4	756
Cataracte	6,7	930	5,5	755
Sinusite	6,0	924	6,5	754
Autres formes de rhumatisme chronique	5,8	928	8,3	755
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	5,6	933	5,9	756
Tumeur maligne ou cancer	5,5	931	3,0	755
Vertiges avec chute	4,4	930	5,4	756
Ostéoporose	4,4	933	3,1	756
Migraine	4,3	931	5,3	754
Cystite chronique	3,7	932	3,6	755
Affection cutanée grave ou chronique	3,5	930	4,2	755
Troubles intestinaux graves	3,4	932	4,2	756
Glaucome	3,3	929	3,7	755
Accident vasculaire cérébral ou complications	3,2	932	2,0	756
Troubles de la thyroïde	3,0	930	1,8	755
Fatigue chronique	1,9	931	,	0
Calculs ou inflammation de la vésicule	1,8	932	1,5	756
Maladie de Parkinson	1,8	929	1,3	756
Fracture de la hanche	1,8	932	1,2	756
Calculs rénaux	1,4	932	2,5	755
Epilepsie	1,3	930	2,2	755
Hépatite, cirrhose	,9	932	3,0	756
Maladie rénale grave	,9	932	2,7	755
Fracture de la colonne vertébrale	,8	932	,1	752
Fracture du poignet	,6	932	1,0	756
Asthme, bronchite chronique ou BPC0	,	0	19,2	756

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

BELGIQUE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - FEMMES (65 ANS ET PLUS)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Arthrose	46,2	1190	38,8	1004
Tension artérielle élevée	38,1	1186	32,0	1005
Rhumatisme inflammatoire	24,7	1188	22,2	1003
Affection persistante au dos	20,4	1186	15,2	1004
Ostéoporose	18,9	1190	15,5	1005
Autres formes de rhumatisme chronique	12,7	1185	9,7	1003
Allergie	12,1	1188	9,1	1005
Affection cardiaque grave ou infarctus	11,0	1189	13,2	1005
Cataracte	11,0	1189	10,4	1005
Bronchite chronique	9,3	1185	,	0
Troubles de la thyroïde	10,0	1190	6,2	1003
Diabète	9,6	1171	6,5	1006
Vertiges avec chute	9,4	1191	8,0	1006
Bronchite chronique	9,3	1185	,	0
Migraine	8,9	1188	9,5	1003
Dépression	8,2	1190	11,3	1006
Troubles intestinaux graves	8,0	1188	5,9	1003
Glaucome	6,9	1183	3,2	1004
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	6,5	1190	4,7	1006
Asthme	6,5	1189	,	0
Descente de matrice	5,0	1179	4,2	1004
Cystite chronique	4,4	1189	4,4	1005
Sinusite	4,4	1185	5,1	1003
Affection cutanée grave ou chronique	4,1	1189	3,8	1005
Calculs ou inflammation de la vésicule	3,8	1191	3,1	1003
Tumeur maligne ou cancer	3,1	1190	5,4	1006
Hépatite, cirrhose	2,3	1190	,9	1004
Fracture du poignet	2,1	1189	2,6	1005
Fatigue chronique	1,9	1186	,	0
Fracture de la hanche	1,8	1190	1,6	1003
Maladie rénale grave	1,5	1187	2,1	1004
Maladie de Parkinson	1,4	1187	2,4	1006
Calculs rénaux	1,4	1189	1,4	1005
Accident vasculaire cérébral ou complications	1,2	1188	5,9	1006
Epilepsie	,6	1190	,5	1006
Fracture de la colonne vertébrale	,5	1188	,7	1002
Asthme, bronchite chronique ou BPC0	,	0	11,6	1005

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

BELGIQUE

PREVALENCE DES PROBLEMES D'ALLERGIE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	13,3	5861
	Femme	14,3	6117
Total		13,8	11978
GROUPE D'AGE	0-14	13,5	1931
	15-24	19,1	1286
	25-34	18,9	1724
	35-44	15,0	1910
	45-54	11,0	1662
	55-64	8,9	1348
	65-74	10,6	1223
	75+	10,0	894
Total		13,8	11978
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	9,5	267
	Enseignement primaire	11,4	1552
	Secondaire inférieur	11,1	2187
	Secondaire supérieur	13,7	3482
	Enseignement supérieur	16,1	4105
Total		13,7	11593
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	16,7	2931
	Zone urbaine	13,4	1921
	Zone semi-urbaine	14,5	3882
	Zone rurale	12,2	3244
Total		13,8	11978
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	13,3	4070
	Région Bruxelloise	16,7	2931
	Région Wallonne	13,9	4977
Belgique		13,8	11978
ANNEE	1997	12,9	10195
	2001	13,8	11978
Total 1997 en 2001		13,4	22173

Indicateur ma0103

BELGIQUE

PREVALENCE DES PROBLEMES D'HYPERTENSION AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	10,5	5864
	Femme	13,1	6130
Total		11,8	11994
GROUPE D'AGE	0-14	,1	1939
	15-24	1,2	1283
	25-34	3,9	1725
	35-44	6,0	1916
	45-54	15,2	1665
	55-64	23,9	1351
	65-74	31,9	1222
	75+	36,1	893
Total		11,8	11994
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	17,9	271
	Enseignement primaire	24,8	1550
	Secondaire inférieur	16,6	2188
	Secondaire supérieur	9,6	3494
	Enseignement supérieur	6,5	4105
Total		11,9	11608
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	11,5	2957
	Zone urbaine	12,2	1921
	Zone semi-urbaine	12,4	3871
	Zone rurale	11,0	3245
Total		11,8	11994
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	11,8	4067
	Région Bruxelloise	11,5	2957
	Région Wallonne	12,0	4970
Belgique		11,8	11994
ANNEE	1997	9,2	10196
	2001	11,8	11994
Total 1997 en 2001		10,6	22190

Indicateur ma0106

BELGIQUE

PREVALENCE DES PROBLEMES DE DIABETE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	2,4	5823
	Femme	2,9	6076
Total		2,6	11899
GROUPE D'AGE	0-14	,1	1931
	15-24	,4	1279
	25-34	,5	1711
	35-44	,8	1905
	45-54	2,4	1650
	55-64	5,0	1336
	65-74	8,1	1208
	75+	11,1	879
Total		2,6	11899
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	6,2	269
	Enseignement primaire	7,0	1536
	Secondaire inférieur	3,0	2167
	Secondaire supérieur	2,2	3474
	Enseignement supérieur	1,1	4070
Total		2,7	11516
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	3,0	2904
	Zone urbaine	3,1	1899
	Zone semi-urbaine	2,6	3868
	Zone rurale	2,3	3228
Total		2,6	11899
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	2,2	4056
	Région Bruxelloise	3,0	2904
	Région Wallonne	3,5	4939
Belgique		2,6	11899
ANNEE	1997	2,3	10197
	2001	2,6	11899
Total 1997 en 2001		2,5	22096

Indicateur ma0112

BELGIQUE

PREVALENCE DES PROBLEMES DE MIGRAINE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	5,1	5873
	Femme	12,3	6131
Total		8,8	12004
GROUPE D'AGE	0-14	1,7	1938
	15-24	7,9	1283
	25-34	13,2	1726
	35-44	11,6	1921
	45-54	12,3	1667
	55-64	9,8	1350
	65-74	8,2	1224
	75+	5,5	895
Total		8,8	12004
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	6,3	271
	Enseignement primaire	10,6	1551
	Secondaire inférieur	9,4	2189
	Secondaire supérieur	9,6	3499
	Enseignement supérieur	7,1	4109
Total		8,7	11619
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	13,1	2958
	Zone urbaine	10,7	1919
	Zone semi-urbaine	8,4	3881
	Zone rurale	6,9	3246
Total		8,8	12004
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	7,2	4074
	Région Bruxelloise	13,1	2958
	Région Wallonne	10,7	4972
Belgique		8,8	12004
ANNEE	1997	9,7	10190
	2001	8,8	12004
Total 1997 en 2001		9,2	22194

Indicateur ma0120

BELGIQUE

PREVALENCE DES AFFECTIONS PERSISTANTES AU DOS AU COURS
DES 12 DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	9,3	5874
	Femme	10,5	6128
Total		9,9	12002
GROUPE D'AGE	0-14	,2	1939
	15-24	2,7	1283
	25-34	7,4	1727
	35-44	12,9	1920
	45-54	15,5	1669
	55-64	14,0	1348
	65-74	17,3	1223
	75+	16,9	893
Total		9,9	12002
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	19,5	270
	Enseignement primaire	17,1	1550
	Secondaire inférieur	11,9	2189
	Secondaire supérieur	8,3	3499
	Enseignement supérieur	7,1	4109
Total		9,9	11617
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	10,5	2957
	Zone urbaine	10,7	1920
	Zone semi-urbaine	9,9	3880
	Zone rurale	9,2	3245
Total		9,9	12002
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	9,0	4071
	Région Bruxelloise	10,5	2957
	Région Wallonne	11,6	4974
Belgique		9,9	12002
ANNEE	1997	9,9	10193
	2001	9,9	12002
Total 1997 en 2001		9,9	22195

Indicateur ma0124

BELGIQUE

PREVALENCE DES PROBLEMES D'ARTHROSE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	8,7	5866
	Femme	14,7	6132
Total		11,7	11998
GROUPE D'AGE	0-14	,0	1939
	15-24	,7	1283
	25-34	2,4	1725
	35-44	7,7	1918
	45-54	10,5	1663
	55-64	22,1	1350
	65-74	36,1	1224
	75+	41,5	896
Total		11,7	11998
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	17,7	269
	Enseignement primaire	27,1	1547
	Secondaire inférieur	16,3	2190
	Secondaire supérieur	9,0	3497
	Enseignement supérieur	5,8	4109
Total		11,6	11612
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	10,9	2957
	Zone urbaine	11,6	1920
	Zone semi-urbaine	12,4	3880
	Zone rurale	11,2	3241
Total		11,7	11998
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	12,3	4071
	Région Bruxelloise	10,9	2957
	Région Wallonne	10,7	4970
Belgique		11,7	11998
ANNEE	1997	10,1	10194
	2001	11,7	11998
Total 1997 en 2001		11,0	22192

Indicateur ma0125

BELGIQUE

NOMBRE MOYEN DE MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		Moyenne	P25	P50	P75	P95	N
SEXE	Homme	1,0	,0	,0	1,0	4,0	5921
	Femme	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	6190
Total		1,2	,0	1,0	2,0	5,0	12111
GROUPE D'AGE	0-14	,3	,0	,0	,0	2,0	1955
	15-24	,6	,0	,0	1,0	3,0	1299
	25-34	,9	,0	,0	1,0	3,0	1738
	35-44	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	1935
	45-54	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	1682
	55-64	1,7	,0	1,0	2,0	6,0	1365
	65-74	2,5	1,0	2,0	3,0	7,0	1234
	75+	3,0	1,0	2,0	4,0	8,0	903
Total		1,2	,0	1,0	2,0	5,0	12111
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	1,8	,0	,0	3,0	7,0	272
	Enseignement primaire	2,2	,0	2,0	3,0	7,0	1568
	Secondaire inférieur	1,5	,0	1,0	2,0	5,0	2201
	Secondaire supérieur	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	3529
	Enseignement supérieur	,9	,0	,0	1,0	3,0	4151
Total		1,2	,0	1,0	2,0	5,0	11721
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	1,4	,0	1,0	2,0	6,0	3006
	Zone urbaine	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	1932
	Zone semi-urbaine	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	3905
	Zone rurale	1,1	,0	,0	2,0	4,0	3268
Total		1,2	,0	1,0	2,0	5,0	12111
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	4100
	Région Bruxelloise	1,4	,0	1,0	2,0	6,0	3006
	Région Wallonne	1,4	,0	1,0	2,0	6,0	5005
Belgique		1,2	,0	1,0	2,0	5,0	12111

Indicateur MA01_1

* Sur base d'une liste de 32 maladies ou affections chroniques

BELGIQUE

DISTRIBUTION DE LA POPULATION (EN %) SUIVANT LE NOMBRE DE MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		Pas de maladies	1 maladie	2 maladies	3 maladies	4 maladies ou plus	Total
		%	%	%	%	%	N
SEXE	Homme	50,8	25,1	12,0	6,0	6,2	5921
	Femme	44,5	21,9	12,7	7,5	13,4	6190
Total		47,6	23,5	12,3	6,8	9,9	12111
GROUPE D'AGE	0-14	77,4	16,8	4,2	1,0	,6	1955
	15-24	59,3	26,5	9,1	2,6	2,5	1299
	25-34	52,6	26,1	11,6	5,5	4,2	1738
	35-44	46,8	27,0	12,9	7,5	5,8	1935
	45-54	43,4	23,0	15,0	7,8	10,8	1682
	55-64	32,2	27,3	16,4	9,4	14,6	1365
	65-74	18,4	22,9	19,7	14,1	25,0	1234
	75+	15,1	17,8	17,1	13,8	36,1	903
Total		47,6	23,5	12,3	6,8	9,9	12111
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	50,2	14,1	8,2	3,7	23,9	272
	Enseignement primaire	29,0	20,2	16,1	11,2	23,5	1568
	Secondaire inférieur	41,7	23,3	12,9	9,4	12,7	2201
	Secondaire supérieur	49,6	25,1	12,6	5,3	7,5	3529
	Enseignement supérieur	55,6	23,6	10,6	5,4	4,9	4151
	Total	47,7	23,4	12,3	6,7	9,9	11721
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	44,8	22,1	13,1	7,2	12,9	3006
	Zone urbaine	45,8	25,1	11,5	7,6	10,0	1932
	Zone semi-urbaine	46,4	24,3	12,5	6,7	10,2	3905
	Zone rurale	50,9	22,0	12,3	6,4	8,4	3268
	Total	47,6	23,5	12,3	6,8	9,9	12111
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	49,8	23,9	11,3	6,6	8,4	4100
	Région Bruxelloise	44,8	22,1	13,1	7,2	12,9	3006
	Région Wallonne	43,6	22,9	14,4	7,2	11,9	5005
Belgique		47,6	23,5	12,3	6,8	9,9	12111

Indicateur MA01_2

* Sur base d'une liste de 32 maladies ou affections chroniques

BELGIQUE

POURCENTAGE DE LA POPULATION AVEC 2 MALADIES OU
AFFECTIONS CHRONIQUES OU PLUS AU COURS DES 12 DERNIERS
MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	24,1	5921
	Femme	33,6	6190
Total		29,0	12111
GROUPE D'AGE	0-14	5,8	1955
	15-24	14,2	1299
	25-34	21,3	1738
	35-44	26,2	1935
	45-54	33,6	1682
	55-64	40,5	1365
	65-74	58,8	1234
	75+	67,1	903
Total		29,0	12111
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	35,7	272
	Enseignement primaire	50,8	1568
	Secondaire inférieur	35,0	2201
	Secondaire supérieur	25,3	3529
	Enseignement supérieur	20,8	4151
Total		28,9	11721
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	33,2	3006
	Zone urbaine	29,1	1932
	Zone semi-urbaine	29,4	3905
	Zone rurale	27,1	3268
Total		29,0	12111
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	26,3	4100
	Région Bruxelloise	33,2	3006
	Région Wallonne	33,6	5005
Belgique		29,0	12111

Indicateur MA01_3

* Sur base d'une liste de 32 maladies ou affections chroniques

RÉGION FLAMANDE

NOMBRE D'HOMMES (EN %) AYANT SOUFFERT D'UNE MALADIE CHRONIQUE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Allergie	2045	13,0	245	33,2	8,6	18,1	65,9		
Hypertension	2043	10,1	218	61,1	3,5	17,7	73,4		22,8
Arthrose	2044	9,3	201	28,7	5,9	22,1	35,8		
Problèmes de dos de longue durée	2046	8,9	190	29,7	14,2	28,2	57,1		
Sinusite	2044	5,3	113	46,6	2,6	16,9	73,9		
Bronchite chronique	2047	4,3	102	54,3	2,1	28,9	81,9		
Rhumatisme inflammatoire	2047	4,2	98	36,1	5,8	26,0	55,9		
Dépression	2047	4,0	75	26,5	20,5	27,5	66,3		
Migraine	2047	4,0	92	27,3	3,6	8,5	66,5		
Asthme	2049	3,9	85	44,2	9,0	34,8	90,2		
Troubles prostatiques	2044	3,4	84	22,0	16,8	43,2	52,0		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	2045	3,2	83	15,2	12,1	71,1	90,1		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	2047	2,9	72	27,9	16,5	36,6	65,7		
Fatigue chronique	2047	2,1	44	31,0	7,9	25,7	30,4		
Troubles intestinaux graves	2046	2,1	49	17,7	7,1	48,4	71,3		
Diabète*	2040	2,1	55	60,2	4,1	21,0	67,5	32,3	63,7
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	2047	1,8	46	20,3	14,2	50,6	78,1		
Autres formes d'arthrose	2047	1,4	34	28,5	16,8	44,8	84,4		
Glaucome	2047	1,4	25	0,0	72,3	20,3	64,0		
Vertiges avec chute	2047	1,3	28	55,5	2,2	13,1	53,4		
Ostéoporose	2047	1,2	25	16,6	8,6	36,1	41,3		
Troubles thyroïdiens	2047	1,0	20	27,3	25,7	28,3	74,9		
Cataracte	2047	0,9	18	0,0	51,3	25,7	22,4		
Inflammation chronique de la vessie	2047	0,8	16	17,2	2,7	65,0	78,7		
Tumeur maligne ou cancer	2047	0,8	22	7,0	32,4	54,0	67,3		
Epilepsie	2047	0,7	14	9,0	28,2	59,4	96,6		
Calcul rénal	2045	0,7	18	45,2	13,0	21,6	49,0		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	2048	0,5	12	23,5	5,0	65,2	88,2		
Hépatite, cirrhose du foie	2047	0,4	9	27,8	11,5	43,9	32,2		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	2048	0,4	8	8,7	15,1	52,6	0,0		
Maladie de Parkinson	2046	0,4	12	18,7	13,9	48,3	80,9		
Fracture de la hanche	2047	0,4	6	0,0	26,2	55,4	26,2		
Fracture du poignet	2047	0,3	6	10,4	20,3	50,8	10,4		
Maladie rénale grave	2047	0,3	8	9,6	20,6	19,3	31,4		
Fracture de la colonne vertébrale	2046	0,1	3	0,0	0,0	51,4	23,4		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

RÉGION FLAMANDE

NOMBRE DE FEMMES (EN %) AYANT SOUFFERT DE MALADIES CHRONIQUES AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Arthrose	2027	15,2	306	32,9	8,6	29,8	49,5		
Allergie	2025	13,6	277	35,9	10,5	17,4	60,7		
Hypertension	2024	13,4	277	68,2	2,2	17,1	81,9		34,6
Migraine	2027	10,4	227	41,0	3,5	9,8	70,9		
Problèmes de dos de longue durée	2025	9,2	182	38,1	9,5	24,7	57,9		
Rhumatisme inflammatoire	2030	7,9	151	50,6	9,9	19,8	62,4		
Sinusite	2022	7,4	154	61,1	7,6	8,7	75,1		
Ostéoporose	2030	5,0	92	34,8	14,2	28,7	65,5		
Dépression	2027	4,8	96	55,5	11,5	18,3	75,6		
Bronchite chronique	2026	4,4	87	52,8	9,0	18,6	80,1		
Fatigue chronique	2027	4,2	89	40,0	3,5	20,3	43,5		
Troubles thyroïdiens	2029	3,7	73	32,0	6,9	44,8	77,1		
Autres formes d'arthrose	2028	3,7	69	43,0	13,9	19,9	54,3		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	2024	3,4	64	10,4	10,9	65,6	72,7		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	2027	3,3	65	25,7	30,0	24,3	67,5		
Asthme	2026	3,2	69	31,5	20,1	38,6	84,7		
Troubles intestinaux graves	2025	3,2	63	40,5	10,6	27,5	72,4		
Vertiges avec chute	2028	2,7	52	38,0	8,0	19,6	48,4		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	2030	2,4	45	21,2	18,1	46,0	77,0		
Diabète*	2016	2,3	50	62,0	13,9	15,6	66,3	34,7	75,9
Cataracte	2029	2,0	39	6,4	60,2	22,6	59,8		
Inflammation chronique de la vessie	2025	1,9	43	53,7	2,6	30,8	89,1		
Glaucome	2027	1,8	34	12,3	38,9	28,0	55,2		
Tumeur maligne ou cancer	2030	1,3	29	2,7	44,4	47,2	63,6		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	2030	1,3	27	30,1	12,2	31,8	48,0		
Descente de matrice	2019	1,3	28	12,8	13,4	13,8	16,4		
Fracture du poignet	2030	1,1	18	0,0	27,6	63,3	50,2		
Calcul rénal	2024	0,9	16	35,2	5,5	43,1	38,2		
Hépatite, cirrhose du foie	2026	0,8	17	10,2	8,0	26,4	18,4		
Maladie rénale grave	2024	0,6	9	19,3	24,6	47,8	35,7		
Epilepsie	2028	0,5	10	34,5	18,5	47,0	90,3		
Fracture de la hanche	2030	0,3	8	0,0	55,7	44,3	84,2		
Maladie de Parkinson	2029	0,3	8	40,4	23,0	36,6	68,8		
Fracture de la colonne vertébrale	2030	0,2	6	35,2	11,1	0,0	46,3		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	2030	0,2	5	0,0	60,6	39,5	89,3		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

RÉGION FLAMANDE

NOMBRE D'HOMMES DE 65 ANS ET PLUS (EN %) AYANT SOUFFERT D'UNE MALADIE CHRONIQUE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Arthrose	331	29,0	92	37,1	0,9	17,8	35,0		
Hypertension	331	28,2	86	65,2	5,1	20,7	86,6		22,6
Troubles prostatiques	332	19,0	65	19,5	11,6	49,5	49,4		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	330	14,1	51	22,1	12,3	64,3	88,8		
Bronchite chronique	331	12,9	48	44,7	2,2	36,1	81,1		
Problèmes de dos de longue durée	330	12,2	40	33,6	9,0	29,6	56,1		
Rhumatisme inflammatoire	331	11,6	40	44,4	0,0	25,0	58,9		
Diabète*	330	9,4	37	56,0	6,4	21,3	69,5	33,6	61,3
Dépression	331	8,1	22	33,7	19,9	20,2	66,7		
Asthme	332	6,8	25	44,6	1,5	43,6	95,1		
Allergie	331	6,3	21	42,8	5,6	13,1	67,0		
Fatigue chronique	331	5,5	18	39,4	2,5	8,3	22,5		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	332	5,3	18	12,5	3,9	72,9	81,5		
Sinusite	329	5,0	20	49,2	0,0	20,5	70,8		
Cataracte	331	4,9	15	0,0	40,6	33,1	28,9		
Ostéoporose	332	4,9	14	15,1	5,4	45,4	54,0		
Vertiges avec chute	331	4,3	13	71,2	4,6	8,0	57,4		
Tumeur maligne ou cancer	332	4,3	15	9,6	26,5	63,9	74,3		
Inflammation chronique de la vessie	331	4,2	11	6,3	0,0	86,6	93,7		
Troubles intestinaux graves	330	4,1	17	16,5	4,2	64,8	84,2		
Autres formes d'arthrose	331	3,8	16	39,8	0,0	44,2	80,3		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	331	3,3	11	47,8	8,1	38,8	87,4		
Glaucome	331	3,3	11	0,0	39,0	61,0	55,8		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	332	3,1	11	16,7	5,4	71,0	87,2		
Migraine	331	2,5	13	54,3	10,5	0,0	42,8		
Troubles thyroïdiens	331	2,4	7	27,3	18,3	45,7	81,9		
Maladie de Parkinson	331	2,2	9	24,2	7,8	51,3	83,2		
Fracture de la hanche	332	1,8	4	0,0	36,7	37,6	36,7		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	332	1,7	4	0,0	0,0	70,9	0,0		
Epilepsie	331	1,7	5	0,0	6,4	93,7	100,0		
Calcul rénal	331	1,4	5	29,8	11,0	46,8	49,2		
Hépatite, cirrhose du foie	331	0,8	2	39,5	0,0	60,5	60,5		
Maladie rénale grave	331	0,6	2	0,0	0,0	68,7	68,7		
Fracture du poignet	332	0,4	1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Fracture de la colonne vertébrale	331	0,4	1	0,0	0,0	0,0	0,0		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

RÉGION FLAMANDE

NOMBRE DE FEMMES DE 65 ANS ET PLUS (EN %) AYANT SOUFFERT D'UNE MALADIE CHRONIQUE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Arthrose	358	48,2	167	34,8	8,5	27,5	52,3		
Hypertension	355	40,1	141	74,2	0,9	16,8	87,1		40,4
Rhumatisme inflammatoire	358	24,3	80	56,1	8,0	18,6	65,8		
Problèmes de dos de longue durée	357	19,3	58	43,1	5,7	24,6	60,6		
Ostéoporose	358	17,7	58	40,8	13,7	27,9	70,1		
Autres formes d'arthrose	358	11,4	34	52,2	11,9	18,7	56,5		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	356	10,7	37	9,7	2,4	82,1	91,3		
Allergie	357	10,6	37	23,9	10,5	25,1	54,8		
Cataracte	357	9,8	34	6,8	59,7	24,3	62,6		
Troubles thyroïdiens	357	9,1	31	29,5	7,5	46,6	79,7		
Fatigue chronique	356	8,3	33	51,4	0,0	18,5	54,4		
Diabète*	350	8,0	30	67,5	12,0	13,0	73,4	27,7	79,9
Troubles intestinaux graves	358	7,9	27	48,6	8,4	28,1	82,2		
Bronchite chronique	357	7,9	26	55,1	8,3	28,4	82,6		
Vertiges avec chute	358	7,5	20	48,8	7,3	19,4	53,4		
Migraine	358	7,1	29	46,8	4,9	9,7	76,7		
Glaucome	355	6,9	24	11,9	38,3	29,4	63,4		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	358	5,7	19	13,2	25,5	41,3	67,5		
Dépression	356	5,4	16	69,9	5,2	12,5	65,4		
Descente de matrice	356	4,8	17	17,3	7,9	9,6	8,5		
Asthme	357	4,7	20	39,0	14,3	43,6	80,0		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	358	4,3	14	40,2	10,0	30,1	55,7		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	358	4,1	15	44,3	18,1	32,0	80,0		
Inflammation chronique de la vessie	357	3,8	14	45,4	5,5	45,8	94,5		
Tumeur maligne ou cancer	358	3,5	13	0,0	70,7	25,4	65,7		
Sinusite	354	3,2	15	21,6	9,5	7,9	35,7		
Fracture du poignet	358	2,6	10	0,0	11,5	67,9	32,2		
Hépatite, cirrhose du foie	358	2,4	7	11,4	0,0	15,1	0,0		
Maladie rénale grave	357	1,7	4	33,4	42,5	9,8	0,0		
Calcul rénal	358	1,6	5	28,4	0,0	53,3	62,8		
Fracture de la hanche	358	1,4	6	0,0	68,8	31,2	91,2		
Maladie de Parkinson	358	1,1	6	40,8	10,5	48,7	71,5		
Fracture de la colonne vertébrale	358	0,7	3	61,3	19,3	0,0	80,7		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	358	0,6	3	0,0	44,7	55,3	100,0		
Epilepsie	358	0,2	1	100,0	0,0	0,0	0,0		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

REGION FLAMANDE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - HOMMES (TOUS LES AGES)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Allergie	13,0	2045	9,9	1755
Tension artérielle élevée	10,1	2043	7,7	1754
Arthrose	9,3	2044	9,3	1756
Affection persistante au dos	8,9	2046	8,3	1754
Sinusite	5,3	2044	4,8	1755
Bronchite chronique	4,3	2047	,	0
Rhumatisme inflammatoire	4,2	2047	3,3	1754
Dépression	4,0	2047	3,3	1755
Migraine	4,0	2047	4,0	1753
Asthme	3,9	2049	,	0
Troubles prostatiques	3,4	2044	7,3	553
Affection cardiaque grave ou infarctus	3,2	2045	3,7	1756
Affection cutanée grave ou chronique	2,9	2047	2,9	1752
Troubles intestinaux graves	2,1	2046	2,4	1755
Diabète	2,1	2040	1,8	1754
Fatigue chronique	2,0	2047	,	0
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	1,8	2047	1,5	1754
Autres formes de rhumatisme chronique	1,4	2047	1,2	1753
Glaucome	1,4	2047	,8	1754
Vertiges avec chute	1,3	2047	1,0	1754
Ostéoporose	1,2	2047	,4	1753
Troubles de la thyroïde	1,0	2047	,6	1752
Cataracte	,9	2047	,4	1754
Cystite chronique	,8	2047	,4	1754
Tumeur maligne ou cancer	,8	2047	,3	1754
Epilepsie	,7	2047	,4	1752
Calculs rénaux	,7	2045	1,0	1754
Accident vasculaire cérébral ou complications	,5	2048	,5	1753
Hépatite, cirrhose	,4	2047	,2	1754
Calculs ou inflammation de la vésicule	,4	2048	,1	1755
Maladie de Parkinson	,4	2046	,2	1756
Fracture de la hanche	,4	2047	,0	1752
Fracture du poignet	,3	2047	,2	1753
Maladie rénale grave	,3	2047	,4	1754
Fracture de la colonne vertébrale	,1	2046	,2	1747
Asthme, bronchite chronique ou BPC0	,	0	4,4	1756

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

REGION FLAMANDE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - FEMMES (TOUS LES AGES)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Arthrose	15,2	2027	13,1	1775
Allergie	13,6	2025	14,7	1774
Tension artérielle élevée	13,4	2024	8,8	1775
Migraine	10,4	2027	10,3	1774
Affection persistante au dos	9,2	2025	9,4	1773
Rhumatisme inflammatoire	7,9	2030	5,3	1774
Sinusite	7,4	2022	8,5	1769
Dépression	4,8	2027	5,4	1775
Bronchite chronique	4,4	2026	,	0
Ostéoporose	4,9	2030	3,4	1775
Troubles de la thyroïde	3,7	2029	3,6	1774
Autres formes de rhumatisme chronique	3,7	2028	2,3	1773
Asthme	3,2	2026	,	0
Affection cutanée grave ou chronique	3,2	2027	3,1	1775
Vertiges avec chute	2,7	2028	3,1	1777
Affection cardiaque grave ou infarctus	3,4	2024	3,1	1773
Troubles intestinaux graves	3,1	2025	3,2	1775
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	2,4	2030	1,8	1777
Diabète	2,3	2016	1,8	1776
Cystite chronique	1,9	2025	2,3	1775
Cataracte	2,0	2029	,6	1774
Glaucome	1,8	2027	1,1	1775
Fatigue chronique	2,0	2027	,	0
Descente de matrice	1,3	2019	4,3	605
Tumeur maligne ou cancer	1,3	2030	1,5	1775
Calculs ou inflammation de la vésicule	1,3	2030	1,1	1773
Fracture du poignet	1,1	2030	,7	1776
Hépatite, cirrhose	,8	2026	,9	1776
Calculs rénaux	,9	2024	,9	1776
Maladie rénale grave	,6	2024	,7	1772
Epilepsie	,5	2028	,7	1777
Fracture de la hanche	,3	2030	,1	1772
Accident vasculaire cérébral ou complications	,2	2030	,5	1776
Maladie de Parkinson	,3	2029	,4	1776
Fracture de la colonne vertébrale	,2	2030	,2	1766
Asthme, bronchite chronique ou BPC0	,	0	4,6	1776

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

REGION FLAMANDE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - HOMMES (65 ANS ET PLUS)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Arthrose	29,0	331	22,8	247
Tension artérielle élevée	28,2	331	20,6	247
Troubles prostatiques	19,0	332	11,5	243
Affection cardiaque grave ou infarctus	14,1	330	19,6	247
Bronchite chronique	12,9	331	,	0
Affection persistante au dos	12,2	330	14,4	246
Rhumatisme inflammatoire	11,6	331	10,8	246
Diabète	9,4	330	8,9	246
Dépression	8,1	331	1,8	247
Asthme	6,8	332	,	0
Allergie	6,3	331	4,6	247
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	5,2	332	3,5	247
Sinusite	5,0	329	4,2	247
Cataracte	4,9	331	4,5	246
Ostéoporose	4,9	332	1,6	247
Vertiges avec chute	4,3	331	3,3	247
Tumeur maligne ou cancer	4,3	332	1,5	247
Cystite chronique	4,2	331	1,8	246
Troubles intestinaux graves	4,1	330	3,2	247
Autres formes de rhumatisme chronique	3,8	331	4,1	246
Affection cutanée grave ou chronique	3,3	331	5,0	246
Glaucome	3,3	331	3,7	246
Accident vasculaire cérébral ou complications	3,0	332	2,2	247
Migraine	2,5	331	2,9	246
Troubles de la thyroïde	2,4	331	,7	246
Maladie de Parkinson	2,2	331	2,1	247
Fatigue chronique	1,9	331	,	0
Fracture de la hanche	1,8	332	,3	247
Calculs ou inflammation de la vésicule	1,7	332	,7	247
Epilepsie	1,7	331	3,9	246
Calculs rénaux	1,4	331	3,3	246
Hépatite, cirrhose	,7	331	,6	247
Maladie rénale grave	,6	331	,6	246
Fracture de la colonne vertébrale	,4	331	,0	243
Fracture du poignet	,4	332	,2	247
Asthme, bronchite chronique ou BPCO	,	0	17,2	247

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

REGION FLAMANDE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - FEMMES (65 ANS ET PLUS)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Arthrose	48,2	358	39,4	310
Tension artérielle élevée	40,1	355	25,1	311
Rhumatisme inflammatoire	24,3	358	13,8	309
Affection persistante au dos	19,3	357	11,1	310
Ostéoporose	17,7	358	11,9	311
Autres formes de rhumatisme chronique	11,4	358	7,6	309
Allergie	10,6	357	8,4	311
Affection cardiaque grave ou infarctus	10,7	356	16,0	311
Cataracte	9,8	357	4,4	311
Troubles de la thyroïde	9,1	357	5,9	310
Diabète	8,0	350	4,3	312
Vertiges avec chute	7,5	358	6,3	312
Migraine	7,1	358	4,2	310
Dépression	5,4	356	10,0	312
Troubles intestinaux graves	7,9	358	5,0	310
Bronchite chronique	7,9	357	,	0
Glaucome	6,9	355	2,5	311
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	5,7	358	2,7	312
Asthme	4,7	357	,	0
Descente de matrice	4,8	356	3,0	310
Cystite chronique	3,8	357	2,8	311
Sinusite	3,2	354	3,1	310
Affection cutanée grave ou chronique	4,1	358	2,3	312
Calculs ou inflammation de la vésicule	4,3	358	3,8	309
Tumeur maligne ou cancer	3,5	358	6,9	312
Hépatite, cirrhose	2,4	358	,8	311
Fracture du poignet	2,6	358	1,9	311
Fatigue chronique	1,9	356	,	0
Fracture de la hanche	1,4	358	,5	309
Maladie rénale grave	1,7	357	2,8	310
Maladie de Parkinson	1,1	358	2,4	312
Calculs rénaux	1,6	358	1,7	311
Accident vasculaire cérébral ou complications	,6	358	4,4	312
Epilepsie	,2	358	,3	312
Fracture de la colonne vertébrale	,7	358	1,0	308
Asthme, bronchite chronique ou BPC0	,	0	6,0	311

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

REGION FLAMANDE

PREVALENCE DES PROBLEMES D'ALLERGIE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	13,0	2045
	Femme	13,6	2025
Total		13,3	4070
GROUPE D'AGE	0-14	13,8	599
	15-24	19,8	454
	25-34	18,3	573
	35-44	15,5	650
	45-54	10,3	589
	55-64	6,4	517
	65-74	8,1	421
	75+	9,8	267
Total		13,3	4070
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	3,7	78
	Enseignement primaire	12,1	493
	Secondaire inférieur	10,5	751
	Secondaire supérieur	13,8	1331
	Enseignement supérieur	15,3	1359
Total		13,2	4012
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	13,0	939
	Zone semi-urbaine	13,9	2043
	Zone rurale	12,4	1088
Total		13,3	4070
ANNEE	1997	12,3	3529
	2001	13,3	4070
Total 1997 en 2001		12,8	7599

Indicateur ma0103

REGION FLAMANDE

PREVALENCE DES PROBLEMES D'HYPERTENSION AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	10,1	2043
	Femme	13,4	2024
Total		11,8	4067
GROUPE D'AGE	0-14	,0	599
	15-24	1,0	454
	25-34	3,8	571
	35-44	4,9	652
	45-54	15,3	589
	55-64	22,6	516
	65-74	33,5	419
	75+	37,3	267
Total		11,8	4067
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	21,8	79
	Enseignement primaire	28,2	490
	Secondaire inférieur	16,3	750
	Secondaire supérieur	8,3	1333
	Enseignement supérieur	6,2	1357
Total		11,8	4009
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	12,4	939
	Zone semi-urbaine	12,3	2037
	Zone rurale	10,4	1091
Total		11,8	4067
ANNEE	1997	8,2	3529
	2001	11,8	4067
Total 1997 en 2001		10,2	7596

Indicateur ma0106

REGION FLAMANDE

PREVALENCE DES PROBLEMES DE DIABETE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	2,1	2040
	Femme	2,3	2016
Total		2,2	4056
GROUPE D'AGE	0-14	,0	595
	15-24	,6	454
	25-34	,0	572
	35-44	,1	649
	45-54	1,6	589
	55-64	4,3	517
	65-74	7,5	417
	75+	9,9	263
Total		2,2	4056
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	5,2	79
	Enseignement primaire	7,1	487
	Secondaire inférieur	2,4	748
	Secondaire supérieur	1,6	1329
	Enseignement supérieur	,7	1355
Total		2,2	3998
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	3,0	930
	Zone semi-urbaine	2,1	2033
	Zone rurale	1,7	1093
Total		2,2	4056
ANNEE	1997	1,8	3530
	2001	2,2	4056
Total 1997 en 2001		2,0	7586

Indicateur ma0112

REGION FLAMANDE

PREVALENCE DES PROBLEMES DE MIGRAINE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	4,0	2047
	Femme	10,4	2027
Total		7,2	4074
GROUPE D'AGE	0-14	1,3	599
	15-24	4,9	454
	25-34	11,3	572
	35-44	9,7	653
	45-54	11,6	590
	55-64	7,7	517
	65-74	6,2	422
	75+	4,0	267
Total		7,2	4074
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	3,2	78
	Enseignement primaire	8,0	492
	Secondaire inférieur	8,1	752
	Secondaire supérieur	8,1	1335
	Enseignement supérieur	5,9	1359
Total		7,3	4016
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	10,3	939
	Zone semi-urbaine	7,2	2043
	Zone rurale	4,9	1092
Total		7,2	4074
ANNEE	1997	7,1	3527
	2001	7,2	4074
Total 1997 en 2001		7,2	7601

Indicateur ma0120

REGION FLAMANDE

PREVALENCE DES AFFECTIONS PERSISTANTES AU DOS AU COURS
DES 12 DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	8,9	2046
	Femme	9,2	2025
Total		9,0	4071
GROUPE D'AGE	0-14	,2	599
	15-24	2,1	454
	25-34	6,7	573
	35-44	12,4	652
	45-54	14,0	591
	55-64	11,3	515
	65-74	16,4	422
	75+	16,3	265
Total		9,0	4071
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	21,0	78
	Enseignement primaire	17,3	490
	Secondaire inférieur	10,8	752
	Secondaire supérieur	7,0	1335
	Enseignement supérieur	6,4	1359
Total		9,1	4014
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	10,6	939
	Zone semi-urbaine	9,1	2040
	Zone rurale	7,8	1092
Total		9,0	4071
ANNEE	1997	8,9	3527
	2001	9,0	4071
Total 1997 en 2001		9,0	7598

Indicateur ma0124

REGION FLAMANDE

PREVALENCE DES PROBLEMES D'ARTHROSE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	9,3	2044
	Femme	15,2	2027
Total		12,3	4071
GROUPE D'AGE	0-14	,0	599
	15-24	,3	454
	25-34	2,3	572
	35-44	9,4	652
	45-54	11,0	588
	55-64	21,4	517
	65-74	40,8	422
	75+	39,6	267
Total		12,3	4071
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	18,9	78
	Enseignement primaire	31,3	489
	Secondaire inférieur	16,4	752
	Secondaire supérieur	8,2	1335
	Enseignement supérieur	6,3	1359
Total		12,2	4013
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	11,6	940
	Zone semi-urbaine	13,0	2042
	Zone rurale	11,7	1089
Total		12,3	4071
ANNEE	1997	11,2	3531
	2001	12,3	4071
Total 1997 en 2001		11,8	7602

Indicateur ma0125

REGION FLAMANDE

NOMBRE MOYEN DE MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		Moyenne	P25	P50	P75	P95	N
SEXE	Homme	,9	,0	,0	1,0	4,0	2057
	Femme	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	2043
Total		1,1	,0	1,0	2,0	4,0	4100
GROUPE D'AGE	0-14	,3	,0	,0	,0	1,0	602
	15-24	,6	,0	,0	1,0	2,0	459
	25-34	,7	,0	,0	1,0	3,0	576
	35-44	1,0	,0	1,0	1,0	3,0	655
	45-54	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	594
	55-64	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	524
	65-74	2,4	1,0	2,0	3,0	7,0	423
	75+	2,8	1,0	2,0	4,0	7,0	267
Total		1,1	,0	1,0	2,0	4,0	4100
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	1,7	,0	,0	3,0	7,0	79
	Enseignement primaire	2,2	,0	2,0	3,0	7,0	493
	Secondaire inférieur	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	755
	Secondaire supérieur	,9	,0	,0	1,0	4,0	1342
	Enseignement supérieur	,8	,0	,0	1,0	3,0	1372
Total		1,1	,0	1,0	2,0	5,0	4041
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	1,2	,0	1,0	2,0	5,0	948
	Zone semi-urbaine	1,2	,0	1,0	2,0	5,0	2052
	Zone rurale	1,0	,0	,0	1,0	4,0	1100
Total		1,1	,0	1,0	2,0	4,0	4100

Indicateur MA01_1

* Sur base d'une liste de 32 maladies ou affections chroniques

REGION FLAMANDE

DISTRIBUTION DE LA POPULATION (EN %) SUIVANT LE NOMBRE DE MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		Pas de maladies	1 maladie	2 maladies	3 maladies	4 maladies ou plus	Total
		%	%	%	%	%	N
SEXE	Homme	52,5	25,8	10,6	6,0	5,0	2057
	Femme	47,2	22,1	11,9	7,0	11,7	2043
Total		49,8	23,9	11,3	6,6	8,4	4100
GROUPE D'AGE	0-14	79,1	16,7	2,7	1,1	,4	602
	15-24	60,7	27,4	8,2	2,3	1,4	459
	25-34	57,3	25,4	10,0	4,4	3,0	576
	35-44	48,3	27,6	12,1	7,9	4,0	655
	45-54	44,9	23,8	14,3	7,7	9,4	594
	55-64	37,8	29,1	14,7	7,3	11,0	524
	65-74	19,8	22,8	20,3	13,8	23,3	423
	75+	16,7	19,2	15,0	15,0	34,1	267
Total		49,8	23,9	11,3	6,6	8,4	4100
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	52,0	13,8	7,3	2,4	24,6	79
	Enseignement primaire	28,6	20,8	15,1	11,5	24,1	493
	Secondaire inférieur	43,7	24,1	11,8	9,8	10,6	755
	Secondaire supérieur	53,0	25,4	11,0	4,9	5,6	1342
	Enseignement supérieur	58,0	24,0	9,8	4,7	3,5	1372
Total		50,0	23,8	11,2	6,5	8,5	4041
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	46,8	25,3	10,9	7,7	9,3	948
	Zone semi-urbaine	48,8	24,2	11,3	6,5	9,3	2052
	Zone rurale	53,9	22,4	11,6	5,8	6,4	1100
Total		49,8	23,9	11,3	6,6	8,4	4100

Indicateur MA01_2

* Sur base d'une liste de 32 maladies ou affections chroniques

REGION FLAMANDE

POURCENTAGE DE LA POPULATION AVEC 2 MALADIES OU
AFFECTIONS CHRONIQUES OU PLUS AU COURS DES 12 DERNIERS
MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	21,7	2057
	Femme	30,7	2043
Total		26,3	4100
GROUPE D'AGE	0-14	4,2	602
	15-24	12,0	459
	25-34	17,3	576
	35-44	24,0	655
	45-54	31,3	594
	55-64	33,1	524
	65-74	57,4	423
	75+	64,1	267
Total		26,3	4100
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	34,2	79
	Enseignement primaire	50,6	493
	Secondaire inférieur	32,2	755
	Secondaire supérieur	21,6	1342
	Enseignement supérieur	18,0	1372
Total		26,2	4041
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	27,9	948
	Zone semi-urbaine	27,0	2052
	Zone rurale	23,7	1100
Total		26,3	4100

Indicateur MA01_3

* Sur base d'une liste de 32 maladies ou affections chroniques

RÉGION BRUXELLOISE
NOMBRE D'HOMMES (EN %) AYANT SOUFFERT D'UNE MALADIE CHRONIQUE AU COURS DES DOUZE
DERNIERS MOIS
 Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Allergie	1386	15,3	208	26,7	16,3	13,5	59,2		
Hypertension	1394	10,0	142	41,4	13,6	32,0	73,8		21,2
Problèmes de dos de longue durée	1397	9,0	125	33,5	15,2	21,7	50,8		
Migraine	1397	8,5	120	27,6	7,1	7,3	64,4		
Sinusite	1380	8,0	108	33,7	12,8	16,2	63,0		
Asthme	1395	7,2	103	38,4	19,8	23,3	73,3		
Arthrose	1395	7,2	103	34,6	16,2	15,2	52,5		
Bronchite chronique	1380	6,1	83	60,7	7,3	18,6	74,4		
Dépression	1395	4,6	71	34,3	27,1	11,8	70,3		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	1395	4,3	52	42,8	27,0	13,2	84,0		
Rhumatisme inflammatoire	1394	4,2	54	36,7	4,5	16,9	44,0		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	1397	4,1	62	13,1	25,8	53,8	81,4		
Fatigue chronique	1395	4,1	61	36,9	10,4	9,2	37,1		
Troubles prostatiques	1386	3,9	60	17,7	28,3	35,0	58,5		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	1395	3,2	45	26,9	25,2	34,9	89,7		
Diabète*	1371	2,7	40	54,2	17,2	26,4	70,6	24,3	44,3
Cataracte	1394	2,6	37	6,7	54,8	12,4	39,7		
Autres formes d'arthrose	1391	2,2	31	52,8	12,5	18,3	66,3		
Troubles intestinaux graves	1397	2,1	28	38,6	28,1	15,6	55,5		
Vertiges avec chute	1395	1,8	26	29,2	8,5	30,7	49,6		
Glaucome	1395	1,6	24	2,5	61,1	25,2	61,4		
Tumeur maligne ou cancer	1395	1,3	21	5,6	27,5	65,0	62,1		
Troubles thyroïdiens	1396	1,3	19	8,1	40,1	47,1	63,7		
Hépatite, cirrhose du foie	1394	1,2	17	14,7	21,6	29,8	63,1		
Ostéoporose	1394	1,2	16	50,1	14,6	22,6	64,8		
Inflammation chronique de la vessie	1390	1,0	14	25,1	32,8	28,9	81,3		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	1394	0,7	11	23,8	0,0	47,2	62,8		
Fracture du poignet	1394	0,7	10	0,0	46,0	43,0	21,8		
Calcul rénal	1394	0,7	11	23,2	13,1	52,4	61,2		
Epilepsie	1395	0,6	7	36,2	63,8	0,0	100,0		
Fracture de la hanche	1393	0,6	8	10,4	56,1	33,5	81,1		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	1392	0,5	9	20,0	30,6	25,9	54,1		
Maladie rénale grave	1393	0,4	7	0,0	12,8	76,0	67,6		
Fracture de la colonne vertébrale	1393	0,4	6	33,0	42,8	24,3	47,6		
Maladie de Parkinson	1394	0,4	7	37,7	13,5	48,9	85,0		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

RÉGION BRUXELLOISE
NOMBRE DE FEMMES (EN %) AYANT SOUFFERT DE MALADIES CHRONIQUES AU COURS DES DOUZE
DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Allergie	1545	18,0	279	31,2	16,3	15,3	56,5		
Migraine	1561	17,5	269	38,2	5,8	8,9	74,3		
Arthrose	1562	14,4	234	41,4	16,4	21,3	58,8		
Hypertension	1563	13,0	206	56,0	8,5	19,8	75,9		30,5
Problèmes de dos de longue durée	1560	11,8	191	38,7	17,6	24,5	62,4		
Rhumatisme inflammatoire	1561	9,6	151	32,1	15,6	26,1	62,7		
Sinusite	1542	8,9	144	48,2	14,0	18,3	80,8		
Dépression	1565	8,5	142	41,9	12,6	25,5	77,2		
Fatigue chronique	1561	8,2	122	45,2	12,3	18,0	47,8		
Ostéoporose	1559	7,8	122	29,4	27,5	29,1	73,7		
Bronchite chronique	1541	6,8	106	51,6	9,2	29,1	80,5		
Autres formes d'arthrose	1558	6,2	100	29,7	15,3	26,6	66,8		
Troubles thyroïdiens	1563	5,6	91	22,1	43,7	20,8	75,3		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	1560	4,8	77	29,2	28,9	36,7	88,7		
Asthme	1554	4,8	79	37,3	14,6	29,9	82,5		
Vertiges avec chute	1561	4,4	79	41,1	8,3	17,2	54,6		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	1561	4,1	60	30,6	28,9	27,7	73,7		
Troubles intestinaux graves	1554	4,0	74	30,5	13,0	35,8	71,8		
Cataracte	1561	3,7	58	7,5	47,8	19,9	34,7		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	1558	3,5	62	23,7	25,4	39,6	79,8		
Diabète*	1533	3,3	60	57,8	17,5	14,9	56,5	24,2	67,5
Glaucome	1559	2,4	44	6,5	38,2	35,7	62,4		
Tumeur maligne ou cancer	1561	2,3	34	4,0	44,1	41,9	37,0		
Inflammation chronique de la vessie	1554	1,9	31	27,4	16,4	30,9	74,3		
Descente de matrice	1542	1,5	23	3,6	25,0	27,1	24,4		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	1561	1,2	19	25,5	26,0	40,0	49,5		
Hépatite, cirrhose du foie	1556	1,1	17	17,5	8,0	32,0	44,5		
Maladie rénale grave	1554	0,8	13	13,2	37,3	33,8	69,8		
Fracture de la hanche	1560	0,8	14	0,0	36,5	49,8	33,4		
Fracture du poignet	1557	0,7	11	16,7	39,8	35,6	41,4		
Epilepsie	1561	0,7	11	5,4	33,4	25,7	59,0		
Maladie de Parkinson	1561	0,6	10	40,7	0,0	37,2	69,2		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	1558	0,6	11	18,2	20,0	53,0	75,0		
Calcul rénal	1554	0,5	9	42,7	7,0	23,8	48,7		
Fracture de la colonne vertébrale	1559	0,2	2	0,0	0,0	37,8	37,8		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

RÉGION BRUXELLOISE
NOMBRE D'HOMMES DE 65 ANS ET PLUS (EN %) AYANT SOUFFERT D'UNE MALADIE CHRONIQUE AU
COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS
 Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Hypertension	213	33,4	71	46,2	13,0	33,5	76,3		15,0
Arthrose	214	25,9	56	39,6	11,0	14,9	64,2		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	215	20,7	46	15,9	18,0	60,7	92,5		
Troubles prostatiques	214	17,8	41	20,0	26,8	38,1	60,2		
Rhumatisme inflammatoire	213	16,5	30	42,0	3,7	20,7	46,4		
Bronchite chronique	210	16,1	34	57,9	0,0	33,1	74,6		
Cataracte	213	15,0	30	8,2	56,3	5,7	43,2		
Problèmes de dos de longue durée	214	13,5	28	48,8	13,5	18,5	57,2		
Allergie	211	9,8	21	35,6	4,4	10,9	64,4		
Asthme	209	9,2	22	40,6	7,4	38,7	73,4		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	214	8,8	17	33,4	27,7	27,0	89,8		
Diabète*	206	8,8	20	42,8	7,4	49,8	83,4	33,1	59,8
Dépression	213	8,4	19	44,7	16,2	10,1	77,0		
Migraine	214	8,0	17	20,8	5,8	24,1	36,1		
Sinusite	208	7,6	15	18,9	0,0	35,0	50,6		
Fatigue chronique	214	7,3	18	47,7	8,1	11,6	51,1		
Vertiges avec chute	213	6,0	11	35,5	0,0	42,5	42,2		
Tumeur maligne ou cancer	213	5,8	14	8,8	15,4	75,9	48,4		
Autres formes d'arthrose	212	5,6	14	82,1	5,2	12,8	72,1		
Ostéoporose	214	5,2	11	29,0	23,0	28,0	53,4		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	213	4,8	8	62,9	23,9	0,0	100,0		
Glaucome	213	4,7	11	0,0	86,6	13,4	55,5		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	213	4,6	9	26,6	0,0	41,1	58,5		
Inflammation chronique de la vessie	214	4,5	9	38,5	31,9	29,6	91,6		
Troubles thyroïdiens	213	3,6	8	9,6	36,6	42,1	71,4		
Calcul rénal	214	3,4	7	32,1	18,2	42,8	58,5		
Fracture de la hanche	213	2,9	5	0,0	79,0	21,0	100,0		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	213	1,7	5	45,6	20,4	34,1	72,4		
Hépatite, cirrhose du foie	214	1,5	2	0,0	0,0	36,9	36,9		
Fracture de la colonne vertébrale	214	1,5	4	58,0	42,0	0,0	41,0		
Maladie de Parkinson	213	1,5	5	20,1	22,8	57,2	100,0		
Fracture du poignet	213	1,5	3	0,0	28,9	32,0	0,0		
Maladie rénale grave	214	1,1	3	0,0	30,9	41,9	72,8		
Epilepsie	213	1,0	1	100,0	0,0	0,0	100,0		
Troubles intestinaux graves	215	0,9	3	33,3	0,0	66,7	33,3		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

RÉGION BRUXELLOISE
NOMBRE DE FEMMES DE 65 ANS ET PLUS (EN %) AYANT SOUFFERT D'UNE MALADIE CHRONIQUE AU
COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS
Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Arthrose	327	43,5	147	47,1	14,9	21,2	59,9		
Hypertension	327	30,3	99	57,9	5,8	23,4	80,5		33,1
Ostéoporose	326	27,5	89	33,7	23,8	28,0	69,5		
Rhumatisme inflammatoire	324	27,2	85	36,8	17,4	24,5	62,0		
Problèmes de dos de longue durée	324	21,8	73	47,6	14,6	20,9	63,6		
Allergie	323	18,2	53	39,0	7,8	11,8	50,8		
Autres formes d'arthrose	323	18,0	56	32,7	11,4	30,3	68,6		
Cataracte	327	16,4	53	8,3	44,2	20,0	30,8		
Bronchite chronique	321	15,4	43	52,5	6,4	27,0	77,4		
Dépression	328	14,5	46	48,2	8,3	25,2	74,1		
Fatigue chronique	325	13,1	40	52,1	13,0	21,3	56,9		
Migraine	326	12,4	41	49,4	2,1	5,1	58,6		
Vertiges avec chute	327	11,2	39	47,5	6,0	16,8	51,1		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	325	9,9	35	22,7	15,8	47,8	81,8		
Diabète*	319	9,4	34	71,2	9,4	16,6	63,5	21,5	66,6
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	326	9,4	29	25,5	25,2	42,9	90,8		
Troubles intestinaux graves	324	8,8	30	28,3	10,3	43,1	73,7		
Asthme	324	8,4	27	55,7	8,5	29,6	97,1		
Troubles thyroïdiens	327	8,1	25	18,3	44,9	21,6	80,3		
Glaucome	325	6,9	26	6,0	52,7	28,9	70,7		
Sinusite	323	6,6	22	26,9	15,1	18,7	69,9		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	327	6,2	18	54,9	13,0	28,2	84,2		
Descente de matrice	321	5,0	16	5,3	25,1	25,5	28,8		
Inflammation chronique de la vessie	326	4,6	14	33,2	12,4	36,1	81,7		
Fracture de la hanche	326	3,4	13	0,0	30,2	54,7	36,7		
Tumeur maligne ou cancer	326	3,3	10	0,0	62,7	37,3	51,1		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	327	2,6	8	41,5	9,3	30,7	67,9		
Epilepsie	326	2,5	7	7,7	11,4	36,7	48,1		
Maladie de Parkinson	326	2,4	8	54,0	0,0	30,8	73,3		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	324	2,3	9	21,8	19,4	48,2	70,0		
Hépatite, cirrhose du foie	326	2,1	6	12,1	0,0	55,4	67,5		
Fracture du poignet	325	1,9	6	32,1	26,0	26,9	26,9		
Calcul rénal	325	1,4	6	49,2	11,9	19,3	61,7		
Maladie rénale grave	324	1,1	3	21,4	0,0	78,6	75,5		
Fracture de la colonne vertébrale	325	0,3	1	0,0	0,0	100,0	100,0		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

REGION BRUXELLOISE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - HOMMES (TOUS LES AGES)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Allergie	15,3	1386	14,4	1470
Tension artérielle élevée	10,0	1394	8,1	1470
Affection persistante au dos	9,0	1397	9,1	1470
Migraine	8,5	1397	9,4	1470
Sinusite	8,0	1380	5,8	1470
Arthrose	7,2	1395	6,5	1470
Asthme	7,2	1395	,	0
Bronchite chronique	6,1	1380	,	0
Dépression	4,6	1395	5,1	1470
Affection cutanée grave ou chronique	4,3	1395	3,4	1470
Rhumatisme inflammatoire	4,2	1394	4,6	1470
Affection cardiaque grave ou infarctus	4,1	1397	6,1	1469
Troubles prostatiques	3,9	1386	6,8	483
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	3,2	1395	5,1	1470
Diabète	2,7	1371	2,7	1470
Cataracte	2,6	1394	2,5	1470
Autres formes de rhumatisme chronique	2,2	1391	4,1	1470
Troubles intestinaux graves	2,1	1397	3,8	1470
Fatigue chronique	2,0	1395	,	0
Vertiges avec chute	1,8	1395	3,8	1470
Glaucome	1,6	1395	1,9	1470
Tumeur maligne ou cancer	1,3	1395	1,6	1469
Troubles de la thyroïde	1,3	1396	,9	1470
Hépatite, cirrhose	1,2	1394	2,7	1470
Ostéoporose	1,2	1394	1,4	1470
Cystite chronique	1,0	1390	1,4	1470
Fracture du poignet	,7	1394	,5	1470
Accident vasculaire cérébral ou complications	,7	1394	1,0	1470
Calculs rénaux	,7	1394	,8	1470
Epilepsie	,6	1395	1,0	1470
Fracture de la hanche	,6	1393	,7	1470
Calculs ou inflammation de la vésicule	,5	1392	,9	1470
Fracture de la colonne vertébrale	,4	1393	,6	1470
Maladie rénale grave	,4	1393	2,0	1470
Maladie de Parkinson	,4	1394	,2	1470
Asthme, bronchite chronique ou BPCO	,	0	12,1	1470

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

REGION BRUXELLOISE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - FEMMES (TOUS LES AGES)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Allergie	18,0	1545	17,8	1571
Migraine	17,4	1561	15,9	1571
Arthrose	14,4	1562	11,6	1571
Tension artérielle élevée	13,0	1563	11,8	1571
Affection persistante au dos	11,8	1560	11,3	1571
Rhumatisme inflammatoire	9,6	1561	8,2	1571
Sinusite	8,9	1542	10,4	1571
Dépression	8,5	1565	9,1	1571
Ostéoporose	7,8	1559	6,1	1571
Bronchite chronique	6,8	1541	,	0
Autres formes de rhumatisme chronique	6,2	1558	5,0	1571
Troubles de la thyroïde	5,6	1563	4,2	1571
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	4,8	1560	3,4	1571
Asthme	4,8	1554	,	0
Vertiges avec chute	4,4	1561	5,7	1570
Affection cutanée grave ou chronique	4,1	1561	3,3	1570
Troubles intestinaux graves	3,9	1554	5,6	1570
Cataracte	3,7	1561	4,5	1571
Affection cardiaque grave ou infarctus	3,5	1558	2,9	1570
Diabète	3,3	1533	2,9	1571
Glaucome	2,4	1559	1,2	1571
Tumeur maligne ou cancer	2,3	1561	1,2	1570
Fatigue chronique	1,9	1561	,	0
Cystite chronique	1,9	1554	2,0	1571
Descente de matrice	1,5	1542	2,3	566
Calculs ou inflammation de la vésicule	1,2	1561	1,1	1571
Hépatite, cirrhose	1,1	1556	1,5	1571
Maladie rénale grave	,8	1554	,8	1571
Fracture de la hanche	,8	1560	,5	1571
Fracture du poignet	,7	1557	1,2	1571
Epilepsie	,7	1561	,1	1570
Maladie de Parkinson	,6	1561	,2	1569
Accident vasculaire cérébral ou complications	,6	1558	1,2	1571
Calculs rénaux	,5	1554	1,2	1571
Fracture de la colonne vertébrale	,2	1559	,6	1571
Asthme, bronchite chronique ou BPC0	,	0	10,4	1571

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

REGION BRUXELLOISE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - HOMMES (65 ANS ET PLUS)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Tension artérielle élevée	33,3	213	24,6	246
Arthrose	25,9	214	17,5	246
Affection cardiaque grave ou infarctus	20,7	215	24,2	246
Troubles prostatiques	17,8	214	8,6	246
Rhumatisme inflammatoire	16,4	213	15,3	246
Bronchite chronique	16,1	210	,	0
Cataracte	14,9	213	16,2	246
Affection persistante au dos	13,4	214	13,5	246
Allergie	9,7	211	9,5	246
Asthme	9,2	209	,	0
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	8,8	214	10,0	246
Diabète	8,8	206	8,3	246
Dépression	8,4	213	6,0	246
Migraine	7,9	214	7,8	246
Sinusite	7,6	208	4,2	246
Vertiges avec chute	5,9	213	7,4	246
Tumeur maligne ou cancer	5,8	213	10,1	245
Autres formes de rhumatisme chronique	5,6	212	16,7	246
Ostéoporose	5,2	214	2,3	246
Affection cutanée grave ou chronique	4,8	213	4,7	246
Glaucome	4,7	213	8,9	246
Accident vasculaire cérébral ou complications	4,6	213	4,2	246
Cystite chronique	4,5	214	5,3	246
Troubles de la thyroïde	3,6	213	1,5	246
Calculs rénaux	3,4	214	2,3	246
Fracture de la hanche	2,9	213	4,1	246
Fatigue chronique	1,9	214	,	0
Calculs ou inflammation de la vésicule	1,7	213	3,3	246
Hépatite, cirrhose	1,5	214	15,4	246
Fracture de la colonne vertébrale	1,5	214	,0	246
Maladie de Parkinson	1,5	213	1,4	246
Fracture du poignet	1,4	213	,7	246
Maladie rénale grave	1,1	214	14,5	246
Epilepsie	1,0	213	,6	246
Troubles intestinaux graves	,8	215	6,4	246
Asthme, bronchite chronique ou BPCO	,	0	20,4	246

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

REGION BRUXELLOISE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - FEMMES (65 ANS ET PLUS)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Arthrose	43,5	327	33,3	319
Tension artérielle élevée	30,3	327	28,2	319
Ostéoporose	27,5	326	22,6	319
Rhumatisme inflammatoire	27,2	324	23,5	319
Affection persistante au dos	21,8	324	21,7	319
Allergie	18,2	323	12,8	319
Autres formes de rhumatisme chronique	18,0	323	13,3	319
Cataracte	16,4	327	21,7	319
Bronchite chronique	15,4	321	,	0
Dépression	14,5	328	9,3	319
Migraine	12,4	326	18,8	319
Vertiges avec chute	11,2	327	11,1	319
Affection cardiaque grave ou infarctus	9,9	325	10,1	319
Diabète	9,4	319	7,8	319
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	9,4	326	5,4	319
Troubles intestinaux graves	8,8	324	9,9	318
Asthme	8,4	324	,	0
Troubles de la thyroïde	8,1	327	8,0	319
Glaucome	6,9	325	3,8	319
Sinusite	6,6	323	8,5	319
Affection cutanée grave ou chronique	6,2	327	5,1	319
Descente de matrice	5,0	321	2,4	319
Cystite chronique	4,6	326	2,5	319
Fracture de la hanche	3,4	326	2,3	319
Tumeur maligne ou cancer	3,3	326	2,4	319
Calculs ou inflammation de la vésicule	2,6	327	3,0	319
Epilepsie	2,5	326	,3	319
Maladie de Parkinson	2,4	326	1,3	319
Accident vasculaire cérébral ou complications	2,3	324	6,2	319
Hépatite, cirrhose	2,1	326	1,4	319
Fracture du poignet	1,9	325	3,3	319
Fatigue chronique	1,9	325	,	0
Calculs rénaux	1,4	325	1,1	319
Maladie rénale grave	1,1	324	1,3	319
Fracture de la colonne vertébrale	,3	325	1,5	319
Asthme, bronchite chronique ou BPC0	,	0	13,4	319

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

REGION BRUXELLOISE

PREVALENCE DES PROBLEMES D'ALLERGIE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	15,3	1386
	Femme	18,0	1545
Total		16,7	2931
GROUPE D'AGE	0-14	14,1	496
	15-24	17,3	266
	25-34	20,4	480
	35-44	18,3	502
	45-54	16,1	360
	55-64	17,1	293
	65-74	17,0	271
	75+	12,3	263
Total		16,7	2931
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	20,4	130
	Enseignement primaire	12,5	394
	Secondaire inférieur	17,4	401
	Secondaire supérieur	14,2	669
	Enseignement supérieur	18,6	1207
Total		16,6	2801
ANNEE	1997	16,2	3041
	2001	16,7	2931
Total 1997 en 2001		16,4	5972

Indicateur ma0103

REGION BRUXELLOISE

PREVALENCE DES PROBLEMES D'HYPERTENSION AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	10,0	1394
	Femme	13,0	1563
Total		11,5	2957
GROUPE D'AGE	0-14	,2	503
	15-24	1,5	264
	25-34	3,7	483
	35-44	7,1	507
	45-54	13,4	363
	55-64	23,3	297
	65-74	32,9	275
	75+	29,8	265
Total		11,5	2957
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	8,0	133
	Enseignement primaire	18,1	398
	Secondaire inférieur	13,6	405
	Secondaire supérieur	11,6	679
	Enseignement supérieur	9,0	1211
Total		11,6	2826
ANNEE	1997	10,0	3041
	2001	11,5	2957
Total 1997 en 2001		10,8	5998

Indicateur ma0106

REGION BRUXELLOISE

PREVALENCE DES PROBLEMES DE DIABETE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	2,7	1371
	Femme	3,3	1533
Total		3,0	2904
GROUPE D'AGE	0-14	,1	501
	15-24	,0	264
	25-34	1,0	474
	35-44	2,3	502
	45-54	3,0	353
	55-64	5,0	285
	65-74	9,7	266
	75+	8,6	259
Total		3,0	2904
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	9,4	131
	Enseignement primaire	4,1	387
	Secondaire inférieur	3,6	392
	Secondaire supérieur	2,1	669
	Enseignement supérieur	2,0	1194
Total		2,9	2773
ANNEE	1997	2,8	3041
	2001	3,0	2904
Total 1997 en 2001		2,9	5945

Indicateur ma0112

REGION BRUXELLOISE

PREVALENCE DES PROBLEMES DE MIGRAINE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	8,5	1397
	Femme	17,4	1561
Total		13,1	2958
GROUPE D'AGE	0-14	1,9	503
	15-24	17,0	264
	25-34	18,6	483
	35-44	18,4	509
	45-54	16,8	364
	55-64	11,7	295
	65-74	10,6	274
	75+	10,6	266
Total		13,1	2958
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	10,9	134
	Enseignement primaire	16,2	398
	Secondaire inférieur	11,5	403
	Secondaire supérieur	15,4	681
	Enseignement supérieur	11,2	1211
Total		13,0	2827
ANNEE	1997	12,7	3041
	2001	13,1	2958
Total 1997 en 2001		12,9	5999

Indicateur ma0120

REGION BRUXELLOISE

PREVALENCE DES AFFECTIONS PERSISTANTES AU DOS AU COURS
DES 12 DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	9,0	1397
	Femme	11,8	1560
Total		10,5	2957
GROUPE D'AGE	0-14	,0	503
	15-24	3,8	264
	25-34	6,4	483
	35-44	14,0	510
	45-54	15,9	364
	55-64	15,4	295
	65-74	17,3	273
	75+	19,8	265
Total		10,5	2957
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	13,7	134
	Enseignement primaire	12,7	398
	Secondaire inférieur	13,9	403
	Secondaire supérieur	11,6	679
	Enseignement supérieur	7,1	1212
Total		10,4	2826
ANNEE	1997	10,2	3041
	2001	10,5	2957
Total 1997 en 2001		10,3	5998

Indicateur ma0124

REGION BRUXELLOISE

PREVALENCE DES PROBLEMES D'ARTHROSE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	7,2	1395
	Femme	14,4	1562
Total		10,9	2957
GROUPE D'AGE	0-14	,0	503
	15-24	,3	264
	25-34	2,3	482
	35-44	5,4	508
	45-54	12,3	363
	55-64	16,0	296
	65-74	29,2	275
	75+	45,2	266
Total		10,9	2957
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	13,0	132
	Enseignement primaire	15,3	396
	Secondaire inférieur	16,8	404
	Secondaire supérieur	11,0	679
	Enseignement supérieur	6,7	1215
Total		10,8	2826
ANNEE	1997	9,1	3041
	2001	10,9	2957
Total 1997 en 2001		10,0	5998

Indicateur ma0125

REGION BRUXELLOISE

NOMBRE MOYEN DE MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		Moyenne	P25	P50	P75	P95	N
SEXE	Homme	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	1419
	Femme	1,7	,0	1,0	3,0	6,0	1587
Total		1,4	,0	1,0	2,0	6,0	3006
GROUPE D'AGE	0-14	,3	,0	,0	,0	2,0	509
	15-24	,8	,0	,0	1,0	3,0	270
	25-34	1,0	,0	1,0	1,0	3,0	487
	35-44	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	518
	45-54	1,6	,0	1,0	2,0	5,0	371
	55-64	1,9	,0	1,0	3,0	6,0	302
	65-74	2,9	1,0	2,0	4,0	8,0	279
	75+	3,5	1,0	3,0	5,0	10,0	270
Total		1,4	,0	1,0	2,0	6,0	3006
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	1,8	,0	,0	2,0	10,0	134
	Enseignement primaire	1,8	,0	1,0	3,0	7,0	407
	Secondaire inférieur	1,8	,0	1,0	2,0	7,0	408
	Secondaire supérieur	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	693
	Enseignement supérieur	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	1231
Total		1,4	,0	1,0	2,0	5,0	2873

Indicateur MA01_1

* Sur base d'une liste de 32 maladies ou affections chroniques

REGION BRUXELLOISE

DISTRIBUTION DE LA POPULATION (EN %) SUIVANT LE NOMBRE DE MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		Pas de maladies	1 maladie	2 maladies	3 maladies	4 maladies ou plus	Total
		%	%	%	%	%	N
SEXE	Homme	48,9	23,0	13,5	6,3	8,3	1419
	Femme	40,9	21,2	12,6	8,0	17,3	1587
Total		44,8	22,1	13,1	7,2	12,9	3006
GROUPE D'AGE	0-14	77,1	16,3	4,1	1,9	,7	509
	15-24	56,4	22,9	12,2	5,9	2,6	270
	25-34	48,1	28,1	12,5	6,4	4,9	487
	35-44	44,1	26,9	12,4	7,2	9,4	518
	45-54	37,6	24,6	15,9	7,2	14,7	371
	55-64	34,6	19,7	15,8	9,9	20,0	302
	65-74	16,8	19,8	17,5	12,3	33,6	279
	75+	11,0	15,2	22,4	12,8	38,5	270
Total		44,8	22,1	13,1	7,2	12,9	3006
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	56,2	12,4	9,1	5,9	16,4	134
	Enseignement primaire	41,3	19,9	10,8	6,3	21,7	407
	Secondaire inférieur	41,2	20,4	14,4	4,9	19,1	408
	Secondaire supérieur	44,1	21,5	13,4	8,7	12,2	693
	Enseignement supérieur	46,6	25,4	13,5	7,2	7,3	1231
Total		44,9	22,3	13,0	7,0	12,8	2873

Indicateur MA01_2

* Sur base d'une liste de 32 maladies ou affections chroniques

REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE DE LA POPULATION AVEC 2 MALADIES OU
AFFECTIONS CHRONIQUES OU PLUS AU COURS DES 12 DERNIERS
MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	28,2	1419
	Femme	37,9	1587
Total		33,2	3006
GROUPE D'AGE	0-14	6,7	509
	15-24	20,6	270
	25-34	23,8	487
	35-44	29,0	518
	45-54	37,8	371
	55-64	45,7	302
	65-74	63,4	279
	75+	73,8	270
Total		33,2	3006
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	31,4	134
	Enseignement primaire	38,8	407
	Secondaire inférieur	38,3	408
	Secondaire supérieur	34,4	693
	Enseignement supérieur	28,0	1231
Total		32,8	2873

Indicateur MA01_3

* Sur base d'une liste de 32 maladies ou affections chroniques

RÉGION WALLONNE
NOMBRE D'HOMMES (EN %) AYANT SOUFFERT D'UNE MALADIE CHRONIQUE AU COURS DES DOUZE
DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Allergie	2430	13,1	296	28,1	15,7	16,5	57,8		
Hypertension	2427	11,6	280	58,1	6,9	21,5	75,9		23,4
Problèmes de dos de longue durée	2431	10,3	270	32,9	12,3	35,2	66,1		
Sinusite	2431	8,8	186	61,5	5,5	6,5	75,8		
Arthrose	2427	7,8	226	27,2	8,0	32,5	46,2		
Migraine	2429	6,5	161	22,2	0,5	15,0	71,2		
Asthme	2429	5,9	146	48,8	8,6	20,3	73,6		
Bronchite chronique	2432	5,7	190	51,5	6,8	24,1	82,3		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	2430	5,2	133	11,8	11,8	68,6	87,8		
Dépression	2429	4,5	104	26,1	17,8	29,7	69,1		
Troubles prostatiques	2419	4,2	104	20,7	21,8	50,2	57,5		
Rhumatisme inflammatoire	2432	4,1	124	37,8	11,6	24,7	64,8		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	2432	3,8	117	19,5	9,7	54,9	74,7		
Autres formes d'arthrose	2430	3,2	100	41,9	11,7	21,7	69,4		
Fatigue chronique	2429	3,1	89	37,8	6,4	21,0	36,7		
Diabète*	2412	3,0	92	47,3	14,1	35,1	73,8	40,3	63,2
Les maladies graves ou chroniques de la peau	2428	2,7	77	34,6	28,7	19,7	72,8		
Troubles thyroïdiens	2430	2,2	52	52,2	3,9	29,4	85,4		
Troubles intestinaux graves	2430	2,2	62	28,6	7,2	25,5	62,9		
Vertiges avec chute	2430	2,1	55	30,9	15,8	32,2	61,1		
Tumeur maligne ou cancer	2430	1,8	35	8,9	13,5	69,7	72,4		
Cataracte	2429	1,3	32	2,7	72,3	21,0	49,9		
Ostéoporose	2432	1,3	28	18,1	13,5	41,6	55,0		
Glaucome	2429	1,1	40	2,4	53,4	39,3	72,5		
Fracture du poignet	2432	0,9	20	9,6	7,2	65,9	27,5		
Calcul rénal	2429	0,9	17	22,3	0,0	54,2	35,8		
Inflammation chronique de la vessie	2430	0,9	29	16,8	10,5	60,5	76,7		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	2432	0,7	21	34,0	8,5	42,5	79,7		
Maladie rénale grave	2429	0,7	17	21,4	26,4	33,2	65,3		
Epilepsie	2430	0,7	15	47,1	14,1	38,8	98,2		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	2432	0,5	16	28,7	3,9	54,2	18,2		
Hépatite, cirrhose du foie	2430	0,5	18	18,4	1,8	63,7	42,8		
Fracture de la hanche	2432	0,3	12	0,0	2,5	66,4	53,1		
Fracture de la colonne vertébrale	2432	0,3	9	0,0	20,0	62,1	22,2		
Maladie de Parkinson	2429	0,1	4	38,5	0,0	61,5	100,0		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

RÉGION WALLONNE
NOMBRE DE FEMMES (EN %) AYANT SOUFFERT DE MALADIES CHRONIQUES AU COURS DES DOUZE
DERNIERS MOIS
Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Migraine	2543	14,8	417	36,3	3,4	13,7	78,1		
Allergie	2547	14,6	364	35,6	12,6	21,8	62,4		
Arthrose	2543	13,5	373	36,4	6,2	33,2	60,2		
Problèmes de dos de longue durée	2543	12,8	312	30,8	10,1	41,6	66,5		
Hypertension	2543	12,4	330	62,2	3,1	22,1	79,0		21,4
Sinusite	2541	9,4	242	55,5	9,8	17,1	80,2		
Dépression	2544	8,6	229	45,8	15,2	31,0	79,6		
Rhumatisme inflammatoire	2545	8,2	234	40,1	15,4	25,4	61,6		
Troubles thyroïdiens	2546	8,1	207	29,4	12,0	50,8	81,4		
Fatigue chronique	2543	7,8	184	38,8	14,0	24,1	49,8		
Bronchite chronique	2546	7,3	202	62,2	2,1	25,7	86,6		
Asthme	2550	6,1	130	36,5	8,7	39,0	81,2		
Ostéoporose	2547	5,4	179	39,9	8,9	37,9	78,0		
Autres formes d'arthrose	2543	5,4	154	47,5	9,5	23,1	68,0		
Vertiges avec chute	2542	5,2	116	52,8	2,2	26,1	57,6		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	2539	4,4	112	18,3	45,8	19,8	78,7		
Diabète*	2527	4,1	101	42,7	1,1	50,3	70,0	29,7	74,1
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	2547	4,0	123	20,8	9,5	65,8	86,6		
Inflammation chronique de la vessie	2542	3,7	84	47,8	9,9	29,5	84,5		
Troubles intestinaux graves	2542	3,5	102	32,9	6,2	37,6	71,1		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	2543	3,1	80	12,6	2,1	79,7	86,1		
Glaucome	2540	2,9	70	11,9	52,8	20,4	62,0		
Cataracte	2543	2,2	70	7,4	45,3	32,8	39,5		
Descente de matrice	2519	1,6	32	23,0	18,1	36,9	8,4		
Tumeur maligne ou cancer	2545	1,1	41	15,4	20,1	59,6	71,5		
Fracture du poignet	2546	1,0	28	17,0	10,8	61,1	40,9		
Hépatite, cirrhose du foie	2542	0,9	17	14,1	0,8	61,9	64,7		
Calcul rénal	2541	0,7	21	21,8	1,0	63,2	41,7		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	2547	0,7	26	13,0	26,4	35,0	14,8		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	2546	0,5	22	17,1	0,0	69,9	97,0		
Epilepsie	2543	0,5	16	19,9	33,7	33,4	74,1		
Fracture de la hanche	2546	0,4	19	2,6	32,7	40,3	44,8		
Maladie rénale grave	2542	0,4	17	18,1	3,4	58,2	83,8		
Maladie de Parkinson	2541	0,3	12	24,9	46,0	25,5	80,9		
Fracture de la colonne vertébrale	2544	0,1	6	0,0	0,0	54,9	25,2		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

RÉGION WALLONNE
NOMBRE D'HOMMES DE 65 ANS ET PLUS (EN %) AYANT SOUFFERT D'UNE MALADIE CHRONIQUE AU
COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS
 Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Hypertension	385	23,8	94	63,0	7,1	19,9	82,5		19,5
Arthrose	385	23,8	106	30,8	8,6	26,7	52,4		
Troubles prostatiques	386	18,9	62	19,3	15,0	60,5	68,8		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	386	17,9	71	15,9	11,7	64,7	87,6		
Bronchite chronique	388	15,6	76	45,2	4,0	34,5	77,9		
Problèmes de dos de longue durée	386	12,6	56	49,0	0,0	27,7	62,0		
Asthme	386	12,2	34	43,9	2,7	24,9	66,9		
Rhumatisme inflammatoire	387	11,3	44	48,5	0,0	33,8	76,8		
Autres formes d'arthrose	385	10,7	41	64,1	0,0	15,8	62,7		
Allergie	387	10,7	28	23,4	0,6	7,1	31,7		
Tumeur maligne ou cancer	386	8,5	21	7,6	13,5	72,9	86,5		
Diabète*	380	8,4	43	66,1	3,4	24,6	90,1	33,2	58,7
Cataracte	386	7,9	25	3,5	69,4	24,9	49,5		
Sinusite	387	7,8	29	78,4	3,4	8,1	91,0		
Migraine	386	7,2	26	38,7	0,0	30,2	68,9		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	387	5,2	28	18,3	12,3	60,8	75,2		
Fatigue chronique	386	4,7	23	48,3	0,0	14,5	19,5		
Troubles thyroïdiens	386	4,2	20	34,7	6,3	48,5	90,8		
Vertiges avec chute	386	4,0	19	66,1	1,7	9,8	58,1		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	386	3,6	18	30,4	14,4	45,6	57,2		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	387	3,2	12	48,9	0,0	24,5	63,9		
Glaucome	385	3,0	21	5,3	51,8	33,8	70,3		
Dépression	385	2,8	15	50,2	0,0	2,5	52,9		
Troubles intestinaux graves	387	2,7	19	14,5	39,5	37,1	56,5		
Ostéoporose	387	2,7	8	7,7	19,1	58,6	85,3		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	387	2,0	8	43,3	7,6	45,3	22,3		
Inflammation chronique de la vessie	387	2,0	11	0,0	27,4	72,6	56,5		
Maladie rénale grave	387	1,5	5	0,0	13,8	76,6	90,3		
Fracture de la colonne vertébrale	387	1,5	5	0,0	0,0	68,1	8,0		
Fracture de la hanche	387	1,3	5	0,0	0,0	100,0	72,8		
Hépatite, cirrhose du foie	387	0,9	5	0,0	0,0	100,0	50,3		
Maladie de Parkinson	385	0,9	3	42,4	0,0	57,6	100,0		
Fracture du poignet	387	0,8	4	0,0	0,0	81,9	66,3		
Epilepsie	386	0,7	2	79,8	0,0	20,2	100,0		
Calcul rénal	387	0,5	3	28,0	0,0	72,0	100,0		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

RÉGION WALLONNE
NOMBRE DE FEMMES DE 65 ANS ET PLUS (EN %) AYANT SOUFFERT D'UNE MALADIE CHRONIQUE AU
COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS
Enquête de Santé, Belgique, 2001.

	Nombre de répondants	Prévalence	Nombre de cas	% suivi par généraliste seulement	% suivi par spécialiste seulement	% suivi par généraliste et spécialiste	% prenant des médicaments	% sous insuline	% suivant un régime
Arthrose	505	42,7	216	43,6	4,4	30,8	60,7		
Hypertension	504	36,2	178	65,1	3,8	18,5	85,2		20,4
Rhumatisme inflammatoire	506	24,5	119	43,2	13,4	29,4	59,4		
Problèmes de dos de longue durée	505	22,5	99	37,9	11,8	37,4	66,0		
Ostéoporose	506	18,3	113	39,4	7,7	42,6	74,0		
Autres formes d'arthrose	504	13,6	73	58,2	0,0	27,6	58,4		
Diabète*	502	13,5	56	33,9	0,0	63,0	79,4	33,6	81,1
Vertiges avec chute	506	13,4	58	50,4	2,9	35,0	53,0		
Allergie	508	13,1	61	45,5	11,1	22,7	41,8		
Troubles thyroïdiens	506	12,8	63	37,3	19,9	36,2	93,7		
Dépression	506	12,3	60	52,3	7,3	33,4	88,9		
Maladies cardiaques graves ou infarctus	508	12,2	61	16,1	1,0	81,7	94,1		
Migraine	504	11,9	63	45,6	0,0	28,9	72,0		
Cataracte	505	11,7	65	7,8	44,7	32,3	41,4		
Fatigue chronique	505	11,4	52	42,2	5,3	32,8	59,4		
Bronchite chronique	507	10,3	61	46,0	1,3	44,2	87,8		
Asthme	508	10,1	29	33,9	8,8	50,6	86,9		
Troubles intestinaux graves	506	7,8	46	39,3	3,0	32,4	69,1		
Ulcère de l'estomac ou du duodénum	506	7,4	39	18,2	1,7	78,2	92,1		
Glaucome	503	6,9	41	7,7	56,6	22,4	57,2		
Sinusite	508	6,2	33	23,4	12,9	26,9	55,7		
Inflammation chronique de la vessie	506	5,9	30	40,9	13,5	37,2	87,4		
Descente de matrice	502	5,5	17	15,6	12,3	48,9	3,7		
Les maladies graves ou chroniques de la peau	504	3,1	15	35,5	2,4	56,9	87,9		
Calculs vésiculaires of inflammation de la vésicule	506	3,1	17	2,0	31,8	34,7	9,2		
Hépatite, cirrhose du foie	506	2,4	6	14,4	1,6	39,2	55,2		
Fracture de la hanche	506	2,3	18	2,7	33,4	39,0	45,8		
Tumeur maligne ou cancer	506	2,1	15	14,0	7,5	64,1	66,5		
Accidents vasculaires cérébraux et conséquences	506	2,0	15	25,3	0,0	55,5	96,9		
Maladie de Parkinson	503	1,7	11	25,8	47,7	26,5	83,9		
Maladie rénale grave	506	1,3	9	7,6	3,0	67,7	88,9		
Fracture du poignet	506	1,2	8	37,4	0,0	44,2	69,8		
Calcul rénal	506	0,8	7	0,0	4,7	95,3	32,9		
Epilepsie	506	0,7	3	0,0	5,2	94,8	94,8		
Fracture de la colonne vertébrale	505	0,2	2	0,0	0,0	27,5	27,5		

Sur base d'une liste de 35 maladies : Indicateurs MA01-MA04

* Diabète: uniquement médicaments per os

REGION WALLONNE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - HOMMES (TOUS LES AGES)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Allergie	13,1	2430	12,2	1749
Tension artérielle élevée	11,6	2427	8,0	1749
Affection persistante au dos	10,3	2431	11,6	1749
Sinusite	8,8	2431	7,5	1747
Arthrose	7,8	2427	6,2	1746
Migraine	6,5	2429	8,3	1747
Asthme	5,9	2429	,	0
Bronchite chronique	5,7	2432	,	0
Affection cardiaque grave ou infarctus	5,2	2430	3,3	1748
Dépression	4,5	2429	4,6	1749
Troubles prostatiques	4,2	2419	9,3	552
Rhumatisme inflammatoire	4,1	2432	4,1	1746
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	3,8	2432	3,5	1749
Autres formes de rhumatisme chronique	3,2	2430	3,6	1748
Diabète	3,0	2412	2,3	1749
Affection cutanée grave ou chronique	2,7	2428	3,2	1748
Troubles de la thyroïde	2,2	2430	1,1	1749
Troubles intestinaux graves	2,2	2430	2,0	1749
Vertiges avec chute	2,1	2430	2,3	1749
Fatigue chronique	2,0	2429	,	0
Tumeur maligne ou cancer	1,8	2430	,9	1749
Cataracte	1,3	2429	,4	1749
Ostéoporose	1,3	2432	1,0	1749
Glaucome	1,1	2429	,9	1749
Fracture du poignet	,9	2432	1,0	1749
Cystite chronique	,9	2430	1,0	1749
Calculs rénaux	,9	2429	,8	1749
Accident vasculaire cérébral ou complications	,7	2432	,3	1748
Maladie rénale grave	,7	2429	,7	1749
Epilepsie	,7	2430	,5	1749
Calculs ou inflammation de la vésicule	,5	2432	,2	1749
Hépatite, cirrhose	,5	2430	,7	1749
Fracture de la colonne vertébrale	,3	2432	,1	1749
Fracture de la hanche	,3	2432	,3	1749
Maladie de Parkinson	,1	2429	,1	1749
Asthme, bronchite chronique ou BPC0	,	0	10,5	1749

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

REGION WALLONNE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - FEMMES (TOUS LES AGES)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Migraine	14,8	2543	18,5	1875
Allergie	14,6	2547	13,7	1876
Arthrose	13,5	2543	11,1	1876
Affection persistante au dos	12,8	2543	11,7	1876
Tension artérielle élevée	12,4	2543	13,2	1877
Sinusite	9,4	2541	10,8	1875
Dépression	8,6	2544	9,1	1876
Rhumatisme inflammatoire	8,2	2545	10,7	1875
Troubles de la thyroïde	8,1	2546	6,1	1876
Bronchite chronique	7,3	2546	,	0
Asthme	6,1	2550	,	0
Ostéoporose	5,4	2547	4,5	1877
Autres formes de rhumatisme chronique	5,4	2543	4,0	1876
Vertiges avec chute	5,2	2542	4,4	1875
Affection cutanée grave ou chronique	4,4	2539	4,5	1875
Diabète	4,1	2527	3,5	1877
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	4,0	2547	4,0	1876
Cystite chronique	3,7	2542	3,3	1877
Troubles intestinaux graves	3,5	2542	4,0	1877
Affection cardiaque grave ou infarctus	3,1	2543	2,4	1877
Glaucome	2,9	2540	1,7	1876
Cataracte	2,2	2543	2,3	1877
Fatigue chronique	1,9	2543	,	0
Descente de matrice	1,6	2519	3,6	653
Tumeur maligne ou cancer	1,1	2545	1,2	1874
Fracture du poignet	1,0	2546	1,1	1878
Hépatite, cirrhose	,9	2542	,6	1876
Calculs ou inflammation de la vésicule	,7	2547	1,0	1877
Calculs rénaux	,7	2541	,5	1877
Accident vasculaire cérébral ou complications	,5	2546	1,5	1876
Epilepsie	,5	2543	,8	1875
Fracture de la hanche	,4	2546	,4	1877
Maladie rénale grave	,4	2542	,8	1877
Maladie de Parkinson	,3	2541	,5	1876
Fracture de la colonne vertébrale	,1	2544	,1	1877
Asthme, bronchite chronique ou BPC0	,	0	10,2	1877

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

REGION WALLONNE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - HOMMES (65 ANS ET PLUS)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Arthrose	23,8	385	20,7	263
Tension artérielle élevée	23,8	385	20,3	263
Troubles prostatiques	18,9	386	18,8	263
Affection cardiaque grave ou infarctus	17,9	386	14,3	263
Bronchite chronique	15,6	388	,	0
Affection persistante au dos	12,6	386	23,4	263
Asthme	12,2	386	,	0
Rhumatisme inflammatoire	11,3	387	15,6	263
Autres formes de rhumatisme chronique	10,7	385	11,6	263
Allergie	10,7	387	9,2	263
Tumeur maligne ou cancer	8,5	386	2,6	263
Diabète	8,3	380	10,1	263
Cataracte	7,9	386	3,0	263
Sinusite	7,8	387	10,9	261
Migraine	7,2	386	8,0	262
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	5,2	387	8,2	263
Troubles de la thyroïde	4,2	386	3,8	263
Vertiges avec chute	4,0	386	7,9	263
Affection cutanée grave ou chronique	3,6	386	2,8	263
Accident vasculaire cérébral ou complications	3,2	387	,9	263
Glaucome	3,0	385	1,7	263
Dépression	2,8	385	7,8	263
Troubles intestinaux graves	2,7	387	4,8	263
Ostéoporose	2,7	387	5,6	263
Calculs ou inflammation de la vésicule	2,0	387	2,0	263
Cystite chronique	2,0	387	5,7	263
Fatigue chronique	2,0	386	,	0
Fracture de la colonne vertébrale	1,5	387	,2	263
Maladie rénale grave	1,5	387	1,4	263
Fracture de la hanche	1,3	387	1,5	263
Hépatite, cirrhose	,9	387	2,1	263
Maladie de Parkinson	,9	385	,0	263
Fracture du poignet	,8	387	2,4	263
Epilepsie	,7	386	,0	263
Calculs rénaux	,5	387	1,5	263
Asthme, bronchite chronique ou BPC0	,	0	21,8	263

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

REGION WALLONNE

PREVALENCE DES MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES* - FEMMES (65 ANS ET PLUS)
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

	2001		1997	
	%	N	%	N
Arthrose	42,7	505	40,2	375
Tension artérielle élevée	36,2	504	43,7	375
Rhumatisme inflammatoire	24,5	506	34,1	375
Affection persistante au dos	22,5	505	18,6	375
Ostéoporose	18,3	506	17,8	375
Autres formes de rhumatisme chronique	13,5	504	11,4	375
Diabète	13,5	502	9,2	375
Vertiges avec chute	13,4	506	9,3	375
Allergie	13,1	508	8,5	375
Troubles de la thyroïde	12,8	506	5,9	374
Dépression	12,3	506	14,1	375
Affection cardiaque grave ou infarctus	12,2	508	10,4	375
Migraine	11,9	504	13,4	374
Cataracte	11,7	505	14,5	375
Bronchite chronique	10,3	507	,	0
Asthme	10,1	508	,	0
Troubles intestinaux graves	7,8	506	5,7	375
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	7,4	506	7,5	375
Glaucome	6,9	503	3,9	374
Sinusite	6,2	508	6,5	374
Cystite chronique	5,9	506	7,4	375
Descente de matrice	5,5	502	6,5	375
Affection cutanée grave ou chronique	3,1	504	5,4	374
Calculs ou inflammation de la vésicule	3,1	506	2,2	375
Hépatite, cirrhose	2,4	506	,8	374
Fracture de la hanche	2,3	506	3,0	375
Tumeur maligne ou cancer	2,1	506	4,5	375
Accident vasculaire cérébral ou complications	2,0	506	8,1	375
Fatigue chronique	1,9	505	,	0
Maladie de Parkinson	1,7	503	2,7	375
Maladie rénale grave	1,3	506	1,5	375
Fracture du poignet	1,2	506	3,3	375
Calculs rénaux	,8	506	1,2	375
Epilepsie	,7	506	,8	375
Fracture de la colonne vertébrale	,2	505	,0	375
Asthme, bronchite chronique ou BPC0	,	0	19,1	375

Sur base d'une liste de 35 maladies ou affections chroniques
Indicateur ma01

REGION WALLONNE

PREVALENCE DES PROBLEMES D'ALLERGIE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	13,1	2430
	Femme	14,6	2547
Total		13,9	4977
GROUPE D'AGE	0-14	12,6	836
	15-24	18,3	566
	25-34	20,0	671
	35-44	12,9	758
	45-54	10,8	713
	55-64	11,7	538
	65-74	14,1	531
	75+	9,6	364
Total		13,9	4977
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	20,4	59
	Enseignement primaire	9,6	665
	Secondaire inférieur	10,8	1035
	Secondaire supérieur	13,5	1482
	Enseignement supérieur	16,6	1539
Total		13,8	4780
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	15,5	982
	Zone semi-urbaine	15,9	1839
	Zone rurale	12,0	2156
Total		13,9	4977
ANNEE	1997	13,0	3625
	2001	13,9	4977
Total 1997 en 2001		13,4	8602

Indicateur ma0103

REGION WALLONNE

PREVALENCE DES PROBLEMES D'HYPERTENSION AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	11,6	2427
	Femme	12,4	2543
Total		12,0	4970
GROUPE D'AGE	0-14	,2	837
	15-24	1,4	565
	25-34	4,4	671
	35-44	8,1	757
	45-54	15,8	713
	55-64	27,1	538
	65-74	28,0	528
	75+	35,4	361
Total		12,0	4970
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	14,8	59
	Enseignement primaire	20,0	662
	Secondaire inférieur	18,4	1033
	Secondaire supérieur	12,2	1482
	Enseignement supérieur	6,3	1537
Total		12,1	4773
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	11,3	982
	Zone semi-urbaine	12,7	1834
	Zone rurale	11,7	2154
Total		12,0	4970
ANNEE	1997	10,6	3626
	2001	12,0	4970
Total 1997 en 2001		11,3	8596

Indicateur ma0106

REGION WALLONNE

PREVALENCE DES PROBLEMES DE DIABETE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	3,0	2412
	Femme	4,1	2527
Total		3,5	4939
GROUPE D'AGE	0-14	,2	835
	15-24	,0	561
	25-34	1,6	665
	35-44	1,7	754
	45-54	4,0	708
	55-64	6,4	534
	65-74	8,8	525
	75+	15,0	357
Total		3,5	4939
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	6,2	59
	Enseignement primaire	7,9	662
	Secondaire inférieur	4,3	1027
	Secondaire supérieur	3,6	1476
	Enseignement supérieur	1,7	1521
Total		3,6	4745
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	3,6	969
	Zone semi-urbaine	4,0	1835
	Zone rurale	3,2	2135
Total		3,5	4939
ANNEE	1997	2,9	3626
	2001	3,5	4939
Total 1997 en 2001		3,2	8565

Indicateur ma0112

REGION WALLONNE

PREVALENCE DES PROBLEMES DE MIGRAINE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	6,5	2429
	Femme	14,8	2543
Total		10,7	4972
GROUPE D'AGE	0-14	2,3	836
	15-24	10,9	565
	25-34	15,8	671
	35-44	13,6	759
	45-54	12,1	713
	55-64	13,8	538
	65-74	12,0	528
	75+	7,3	362
Total		10,7	4972
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	14,0	59
	Enseignement primaire	14,1	661
	Secondaire inférieur	11,9	1034
	Secondaire supérieur	11,4	1483
	Enseignement supérieur	8,0	1539
Total		10,6	4776
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	12,9	980
	Zone semi-urbaine	11,8	1838
	Zone rurale	9,4	2154
Total		10,7	4972
ANNEE	1997	13,4	3622
	2001	10,7	4972
Total 1997 en 2001		12,1	8594

Indicateur ma0120

REGION WALLONNE

PREVALENCE DES AFFECTIONS PERSISTANTES AU DOS AU COURS
DES 12 DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	10,3	2431
	Femme	12,8	2543
Total		11,6	4974
GROUPE D'AGE	0-14	,5	837
	15-24	3,5	565
	25-34	9,7	671
	35-44	13,6	758
	45-54	18,8	714
	55-64	19,4	538
	65-74	19,2	528
	75+	17,4	363
Total		11,6	4974
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	21,0	58
	Enseignement primaire	18,4	662
	Secondaire inférieur	14,1	1034
	Secondaire supérieur	10,4	1485
	Enseignement supérieur	8,7	1538
Total		11,5	4777
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	11,6	981
	Zone semi-urbaine	12,3	1840
	Zone rurale	11,0	2153
Total		11,6	4974
ANNEE	1997	11,7	3625
	2001	11,6	4974
Total 1997 en 2001		11,6	8599

Indicateur ma0124

REGION WALLONNE

PREVALENCE DES PROBLEMES D'ARTHROSE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	7,8	2427
	Femme	13,5	2543
Total		10,7	4970
GROUPE D'AGE	0-14	,2	837
	15-24	1,8	565
	25-34	2,6	671
	35-44	4,8	758
	45-54	8,9	712
	55-64	25,5	537
	65-74	27,6	527
	75+	44,8	363
Total		10,7	4970
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	19,1	59
	Enseignement primaire	22,9	662
	Secondaire inférieur	16,0	1034
	Secondaire supérieur	10,2	1483
	Enseignement supérieur	4,4	1535
Total		10,7	4773
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	11,5	980
	Zone semi-urbaine	11,0	1838
	Zone rurale	10,4	2152
Total		10,7	4970
ANNEE	1997	8,6	3622
	2001	10,7	4970
Total 1997 en 2001		9,7	8592

Indicateur ma0125

REGION WALLONNE

NOMBRE MOYEN DE MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		Moyenne	P25	P50	P75	P95	N
SEXE	Homme	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	2445
	Femme	1,7	,0	1,0	2,0	6,0	2560
Total		1,4	,0	1,0	2,0	6,0	5005
GROUPE D'AGE	0-14	,4	,0	,0	1,0	2,0	844
	15-24	,8	,0	,0	1,0	3,0	570
	25-34	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	675
	35-44	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	762
	45-54	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	717
	55-64	2,3	1,0	2,0	3,0	7,0	539
	65-74	2,6	1,0	2,0	4,0	7,0	532
	75+	3,3	1,0	3,0	5,0	9,0	366
Total		1,4	,0	1,0	2,0	6,0	5005
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	2,5	,0	1,0	4,0	8,0	59
	Enseignement primaire	2,3	1,0	2,0	3,0	7,0	668
	Secondaire inférieur	1,7	,0	1,0	3,0	6,0	1038
	Secondaire supérieur	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	1494
	Enseignement supérieur	1,0	,0	,0	1,0	4,0	1548
Total		1,4	,0	1,0	2,0	6,0	4807
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	1,5	,0	1,0	2,0	5,0	984
	Zone semi-urbaine	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	1853
	Zone rurale	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	2168
Total		1,4	,0	1,0	2,0	6,0	5005

Indicateur MA01_1

* Sur base d'une liste de 32 maladies ou affections chroniques

REGION WALLONNE

DISTRIBUTION DE LA POPULATION (EN %) SUIVANT LE NOMBRE DE MALADIES OU AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		Pas de maladies	1 maladie	2 maladies	3 maladies	4 maladies ou plus	Total
		%	%	%	%	%	N
SEXE	Homme	47,7	24,0	14,4	5,8	8,0	2445
	Femme	39,6	21,7	14,5	8,5	15,8	2560
Total		43,6	22,9	14,4	7,2	11,9	5005
GROUPE D'AGE	0-14	74,1	17,2	7,3	,3	1,1	844
	15-24	57,4	25,9	9,8	2,1	4,9	570
	25-34	42,2	27,3	15,4	8,1	6,9	675
	35-44	44,5	25,7	14,8	6,6	8,4	762
	45-54	42,1	20,7	16,3	8,3	12,5	717
	55-64	18,8	25,9	20,5	14,1	20,7	539
	65-74	15,7	24,2	19,3	15,3	25,5	532
	75+	13,0	15,4	20,3	11,3	40,0	366
Total		43,6	22,9	14,4	7,2	11,9	5005
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	32,2	18,5	10,7	6,2	32,5	59
	Enseignement primaire	24,8	19,1	20,6	12,4	23,1	668
	Secondaire inférieur	37,0	22,3	15,3	9,6	15,9	1038
	Secondaire supérieur	42,7	25,4	16,0	5,1	10,7	1494
	Enseignement supérieur	54,1	22,1	11,0	6,0	6,8	1548
Total		43,6	22,7	14,5	7,2	12,0	4807
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	40,6	24,2	14,8	7,1	13,3	984
	Zone semi-urbaine	39,6	24,3	16,0	7,3	12,8	1853
	Zone rurale	47,2	21,5	13,2	7,1	11,0	2168
Total		43,6	22,9	14,4	7,2	11,9	5005

Indicateur MA01_2

* Sur base d'une liste de 32 maladies ou affections chroniques

REGION WALLONNE

POURCENTAGE DE LA POPULATION AVEC 2 MALADIES OU
AFFECTIONS CHRONIQUES OU PLUS AU COURS DES 12 DERNIERS
MOIS

Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	28,2	2445
	Femme	38,7	2560
Total		33,6	5005
GROUPE D'AGE	0-14	8,7	844
	15-24	16,7	570
	25-34	30,4	675
	35-44	29,8	762
	45-54	37,1	717
	55-64	55,3	539
	65-74	60,1	532
	75+	71,6	366
Total		33,6	5005
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	49,3	59
	Enseignement primaire	56,1	668
	Secondaire inférieur	40,8	1038
	Secondaire supérieur	31,8	1494
	Enseignement supérieur	23,8	1548
Total		33,7	4807
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	35,2	984
	Zone semi-urbaine	36,0	1853
	Zone rurale	31,4	2168
Total		33,6	5005

Indicateur MA01_3

* Sur base d'une liste de 32 maladies ou affections chroniques