

5.4.1. Introduction

Un des avantages de l'Enquête de Santé en comparaison avec les collectes traditionnelles de données dans le domaine de la santé, est notamment qu'elle permet de recueillir de l'information sur des problèmes qui n'amènent pas forcément la personne à consulter. Il s'agit de symptômes somatiques typique mais aussi de plaintes psychiques ou somatiques vagues (on soumet aux gens une liste de 23 items), ou de douleurs ressenties par la personne (on demande si les douleurs physiques ont un impact sur la vie quotidienne).

Pour appréhender précisément ces plaintes, il a été fait usage dans la présente enquête de deux instruments distincts:

- le VOEG (Vragenlijst voor Onderzoek naar de Ervaren Gezondheid - questionnaire pour l'étude de la santé perçue), qui est constitué d'une liste de 23 questions sur des plaintes ou des situation de "mal-être", au sujet desquels il est difficile de dire si elles sont de courte ou de longue durée. Il est demandé tout simplement au répondant s'il est oui ou non fréquemment confronté avec ce genre de problème (des maux d'estomac, par exemple). Les plaintes spécifiques peuvent être regroupées en une série de groupes {6616}:
 - maux d'estomac (plaintes spécifiques ou douleurs localisées dans cette région)
 - fatigue versus se sentir en bonne forme, problèmes d'insomnie
 - nervosité
 - plaintes dans la région de la poitrine et du cœur (palpitations, ...)
 - plaintes de type locomoteur
 - plaintes de type allergique des voie respiratoires supérieures
 - toux
 - maux de tête

Un score global est aussi construit à partir des 23 items, par la simple somme du nombre de plaintes mentionnées par chaque personne, sans pondération spécifique pour l'un ou l'autre item: le score varie donc de 0 à 23.

Une autre approche dans l'analyse du VOEG score, sera de vérifier si le répondant a répondu positivement à au moins un des items de la liste.

- Deux questions qui provienne du questionnaire standard S(hort) F(orm)-36 au sujet de l'intensité des douleurs physique au cours des 4 dernières semaines, de la mesure dans laquelle ces douleurs ont un impact dans la vie quotidienne (sur le travail professionnel et à la maison).

L'ensemble de ces questions (reprises dans l'auto-questionnaire) ne sont posées qu'aux personnes âgées de 15 ans ou plus.


5.4.2. Belgique

5.4.2.1. Nombre moyen de plaintes en matière de santé (MO01_2)

En Belgique 5,7 plaintes sont rapportées en moyenne. 50% de la population rapporte au moins 5 plaintes et 14% de la population n'a aucune plainte en matière de santé.

Les femmes mentionnent plus de plaintes (6,5) que les hommes (5). Cette différence est significative après standardisation par âge. Le nombre moyen de plaintes augmente avec l'âge: 4,8 plaintes chez les 15 - 24 ans, 6,9 plaintes chez les 75 ans et plus. Dans chaque groupe d'âge les femmes mentionnent en moyenne plus de plaintes que les hommes (Figure 5.4.1.).

Figure 5.4.1. Nombre moyen de plaintes en matière de santé (MO01_2), par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 1997.



Différences en fonction des caractéristiques individuelles (Tableau 5.4.4)

Même si les personnes avec un niveau d'éducation plus faible semblent rapporter en moyenne plus de plaintes, cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Par contre, les personnes qui ont un revenu mensuel de plus de 40.000,-FB rapportent en moyenne moins de plaintes que les autres.

Les personnes qui déclarent un mauvais état de santé subjective, ont plus de plaintes (10,1) que les autres (4,6). De même, les gros fumeurs, suivi des anciens fumeurs, mentionnent aussi plus de plaintes que les autres (7,1 contre 6 plaintes). Ces différences persistent après standardisation pour l'âge et le sexe.

Les personnes interrogées en Flandre rapportent en moyenne moins de plaintes (5,1) qu'à Bruxelles (6,9) ou en Wallonie (6,8). Même après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence persiste entre la Flandre et les deux autres régions.

Tableau 5.4.4 Nombre moyen de plaintes en matière de santé (MO01_2), standardisé pour le sexe et l'âge, Belgique, Enquête de Santé, 1997.

		MOYENNE	I.C. 95%
SEXE	Homme	5,1	(5,0- 5,3)
	Femme	6,6	(6,4- 6,7)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	6,8	(6,2- 7,4)
	Ecole primaire	6,7	(6,3- 7,1)
	Secondaire inférieur	6,3	(6,1- 6,6)
	Secondaire supérieur	5,7	(5,5- 5,8)
	Supérieur	5,4	(5,2- 5,5)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	6,5	(6,0- 6,9)
	20.000-30.000	6,6	(6,3- 6,8)
	30.000-40.000	6,1	(5,9- 6,3)
	40.000-60.000	5,6	(5,4- 5,8)
	>60.000	5,0	(4,8- 5,3)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	4,6	(4,5- 4,7)
	Très mauvaise à moyenne	9,9	(9,6-10,1)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	5,2	(5,0- 5,4)
	Dans le passé	6,1	(5,8- 6,3)
	Modéré (<20)	6,1	(5,9- 6,4)
	Gros fumeur	7,6	(7,1- 8,2)
VERBLIJFPLAATS	Région Flamande	5,1	(4,9- 5,2)
	Région Bruxelloise	6,9	(6,7- 7,1)
	Région Wallonne	6,8	(6,6- 7,0)
	Belgique	5,8	(5,7- 5,9)

5.4.2.2. Maux d'estomac (MO01_3)

La prévalence des maux d'estomac est mesurée par l'intermédiaire de trois plaintes spécifiques: des plaintes de l'estomac, ou parfois des maux vagues à l'estomac ou des douleurs dans la région de l'estomac.

En Belgique, un peu plus de 30% des répondants mentionnent avoir eu au moins un de ces plaintes au niveau de l'estomac ces derniers temps. Les femmes s'en plaignent plus (34%) que les hommes (27%). Cette différence est significative après standardisation par âge, et cela se vérifie dans toutes les tranches d'âge.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de maux d'estomac chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 49% versus 26%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.5).

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de maux d'estomac est plus élevée (36%) mais cette différence n'est pas significative. Il y a par contre bien une différence, même après standardisation pour l'âge et le sexe, entre les régions: plus de plaintes de maux d'estomac à Bruxelles (38%) par rapport à la Flandre (27%) et à la Wallonie (34%).

Tableau 5.4.5 Pourcentage de personnes qui se plaignent de maux d'estomac (MO01_3), standardisé pour le sexe et l'âge, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION (%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	26,9	(24,9-28,9)
	Femme	33,9	(31,8-36,1)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	37,9	(30,5-45,4)
	Ecole primaire	31,2	(26,5-35,9)
	Secondaire inférieur	32,6	(29,1-36,1)
	Secondaire supérieur	28,8	(26,2-31,5)
	Supérieur	30,6	(27,8-33,4)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	33,9	(28,7-39,1)
	20.000-30.000	33,7	(30,3-37,0)
	30.000-40.000	31,1	(28,2-34,1)
	40.000-60.000	28,7	(26,1-31,4)
	>60.000	31,0	(26,8-35,3)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	24,2	(22,6-25,9)
	Très mauvaise à moyenne	50,4	(46,7-54,0)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	29,1	(26,8-31,4)
	Dans le passé	30,1	(26,7-33,4)
	Modéré (<20)	32,4	(28,9-35,9)
	Gros fumeur	36,5	(30,7-42,2)
VERBLIJFPLAATS	Région Flamande	27,1	(25,0-29,1)
	Région Bruxelloise	37,9	(35,2-40,5)
	Région Wallonne	34,0	(31,5-36,4)
	Belgique	30,4	(29,0-31,9)

5.4.2.3. Fatigue (MO01_4)

Afin d'évaluer la prévalence des plaintes de fatigue, il a été fait usage des questions suivantes: "avez-vous l'impression de manquer de sommeil", "avez-vous souvent le sentiment d'être fatigué", "vous sentez-vous encore bien sans entrain" et "vous sentez-vous parfois plus fatigué que d'habitude".

En Belgique, 56% des personnes interrogées répondent positivement à au moins une de ces 4 questions. Les femmes se plaignent plus souvent de fatigue (63%) que les hommes (49%); cette différence persiste après standardisation pour l'âge.

Les sensations de fatigue ne sont pas associées avec l'âge, à part pour les personnes âgées, mais les femmes se plaignent plus souvent que les hommes pour l'ensemble des classes d'âges.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de sensations de fatigue chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 86% versus 49%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.6).

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de fatigue est plus élevée (65%) que chez les personnes qui n'ont jamais fumé (52%); cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe. On observe aussi une différence (entre la Flandre et les deux autres régions) régionale: plus de plaintes de fatigue à Bruxelles (67%) et en Wallonie (66%) par rapport à la Flandre (48%).

Tableau 5.4.6 *Pourcentage de personnes qui se plaignent de fatigue (MO01_4), standardisé pour le sexe et l'âge, Enquête de Santé, Belgique, 1997.*

		PROPORTION(%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	50,3	(48,0-52,5)
	Femme	64,1	(61,9-66,2)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	64,2	(56,5-71,9)
	Ecole primaire	60,7	(55,9-65,4)
	Secondaire inférieur	60,2	(56,6-63,7)
	Secondaire supérieur	54,2	(51,1-57,2)
	Supérieur	55,8	(52,9-58,8)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	58,6	(53,1-64,1)
	20.000-30.000	63,6	(60,2-67,0)
	30.000-40.000	60,1	(57,0-63,1)
	40.000-60.000	55,0	(52,1-57,9)
	>60.000	52,8	(48,3-57,3)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	48,8	(46,9-50,8)
	Très mauvaise à moyenne	84,5	(81,8-87,3)
CONSUMMATION DE TABAC	Jamais	52,2	(49,7-54,7)
	Dans le passé	57,4	(53,8-61,1)
	Modéré (<20)	60,4	(56,8-64,0)
	Gros fumeur	68,4	(63,4-73,4)
VERBLIJFPLAATS	Région Flamande	49,8	(47,5-52,1)
	Région Bruxelloise	67,8	(65,2-70,3)
	Région Wallonne	66,6	(64,2-69,0)
	Belgique	57,2	(55,6-58,7)

5.4.2.4. Nervosité (MO01_5)

La nervosité a été mesurée par le biais des questions suivantes: 'vous sentez-vous "souvent énervé", "souvent nerveux" et 'vite irrité'.

En Belgique, 48% de la population a répondu positivement au moins à une de ces 3 questions. Les femmes se plaignent plus souvent de nervosité (52%) que les hommes (43%); cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.5). Il n'y a pas de variation en fonction de l'âge, ni chez les femmes, ni chez les hommes.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de sensations de nervosité chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 69% versus 42%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.7).

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de nervosité est nettement plus élevée (56%) que chez les personnes qui n'ont jamais fumé; cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. On observe aussi une différence entre la Flandre (43% des personnes se plaignent de nervosité) et les deux autres régions (52 et 54%).

Tableau 5.4.7. Pourcentage de personnes qui se plaignent de nervosité (MO01_5), standardisé pour le sexe et l'âge, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION(%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	42,4	(40,1-44,6)
	Femme	52,3	(50,1-54,6)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	47,7	(39,4-56,0)
	Ecole primaire	51,7	(46,8-56,6)
	Secondaire inférieur	50,2	(46,4-53,9)
	Secondaire supérieur	47,6	(44,6-50,6)
	Supérieur	44,2	(41,2-47,1)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	46,0	(40,7-51,3)
	20.000-30.000	52,3	(48,7-55,8)
	30.000-40.000	48,9	(45,8-52,1)
	40.000-60.000	46,6	(43,7-49,5)
	>60.000	42,9	(38,3-47,4)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	41,2	(39,3-43,2)
	Très mauvaise à moyenne	71,2	(68,0-74,4)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	41,4	(38,9-43,9)
	Dans le passé	48,2	(44,5-51,9)
	Modéré (<20)	50,9	(47,1-54,6)
	Gros fumeur	54,4	(48,4-60,5)
VERBLIJFPLAATS	Région Flamande	42,9	(40,6-45,2)
	Région Bruxelloise	51,6	(48,9-54,4)
	Région Wallonne	53,7	(51,1-56,3)
	Belgique	47,4	(45,8-48,9)

5.4.2.5. Douleurs dans la région de la poitrine et du cœur (MO01_6)

La prévalence des douleurs dans la région de la poitrine et du cœur a été mesurée à l'aide des questions suivantes: "parfois oppressé" et "parfois des douleurs dans la poitrine ou la région du cœur".

En Belgique, 32% de la population a répondu positivement au moins à une de ces 2 questions. Les femmes se plaignent plus souvent de douleurs au niveau de la poitrine (38%) que les hommes (29%); cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.6) et se vérifie pour toutes les classes d'âge. Il y a une variation aussi en fonction de l'âge: les personnes âgées rapportent plus souvent des douleurs au niveau de la poitrine (43%) que les jeunes.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de douleurs dans la poitrine chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 61% versus 25%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.8).

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de douleurs au niveau de la poitrine est nettement plus élevée que chez les personnes qui n'ont jamais fumé (29%); cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. On observe aussi une différence entre la Flandre (23% des personnes se plaignent de douleurs au niveau de la poitrine) et les deux autres régions (43 et 45%).

Tableau 5.4.8 *Pourcentage de personnes qui se plaignent de douleurs au niveau de la poitrine ou de la région du cœur (MO01_6), standardisé pour le sexe et l'âge, Enquête de Santé, Belgique, 1997.*

		PROPORTION (%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	29,1	(27,0-31,2)
	Femme	37,8	(35,6-40,0)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	37,1	(29,3-44,9)
	Ecole primaire	38,5	(33,7-43,2)
	Secondaire inférieur	34,6	(31,1-38,1)
	Secondaire supérieur	33,1	(30,3-36,0)
	Supérieur	31,2	(28,3-34,1)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	42,1	(36,5-47,6)
	20.000-30.000	37,6	(34,2-41,0)
	30.000-40.000	34,6	(31,6-37,6)
	40.000-60.000	31,7	(28,9-34,4)
	>60.000	29,7	(25,5-33,9)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	25,1	(23,3-26,8)
	Très mauvaise à moyenne	58,6	(55,0-62,2)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	29,3	(27,0-31,6)
	Dans le passé	36,1	(32,6-39,7)
	Modéré (<20)	34,8	(31,2-38,4)
	Gros fumeur	45,0	(39,2-50,9)
VERBLIJFPLAATS	Région Flamande	24,4	(22,3-26,4)
	Région Bruxelloise	43,3	(40,6-46,1)
	Région Wallonne	46,0	(43,4-48,5)
	Belgique	33,5	(32,0-35,0)

5.4.2.6. **Plaintes au niveau locomoteur (MO01_7)**

Pour l'évaluation des plaintes au niveau locomoteur, il a été fait usage des questions suivantes: "vous plaignez-vous de douleurs dans les os et les muscles", "avez-vous parfois mal au dos", "avez-vous parfois une sensation de picotements dans les membres" et "souffrez-vous de rhumatismes".

En Belgique, 47% de la population a répondu positivement au moins à une de ces questions. Les femmes se plaignent plus souvent de problèmes locomoteurs (51%) que les hommes (43%); cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.7) et se vérifie pour toutes les classes d'âge. Il y a une variation aussi en fonction de l'âge: les personnes âgées rapportent plus souvent des problèmes locomoteurs (68%) que les jeunes (32%).

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de problèmes locomoteurs chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 78% versus 39%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.9).

Chez les non fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de problèmes locomoteurs est nettement plus faibles que chez les autres (43%); cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. On observe aussi une différence entre la Flandre (39% des personnes se plaignent de problèmes locomoteurs) et les deux autres régions (56 et 58%).

Tableau 5.4.9.. Pourcentage de personnes qui se plaignent de problèmes locomoteurs (MO01_7), standardisé pour le sexe et l'âge, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION(%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	44,9	(42,7-47,1)
	Femme	53,2	(51,0-55,3)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	57,3	(49,7-65,0)
	Ecole primaire	54,6	(49,8-59,5)
	Secondaire inférieur	52,5	(48,9-56,1)
	Secondaire supérieur	49,2	(46,2-52,1)
	Supérieur	42,8	(39,8-45,8)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	56,7	(51,3-62,1)
	20.000-30.000	55,2	(51,8-58,7)
	30.000-40.000	50,0	(47,0-53,1)
	40.000-60.000	48,3	(45,5-51,0)
	>60.000	40,0	(35,5-44,4)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	41,2	(39,3-43,1)
	Très mauvaise à moyenne	74,6	(71,3-77,9)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	43,8	(41,3-46,3)
	Dans le passé	50,6	(47,1-54,0)
	Modéré (<20)	52,8	(49,3-56,3)
	Gros fumeur	58,0	(52,5-63,4)
VERBLIJFPLAATS	Région Flamande	41,6	(39,4-43,8)
	Région Bruxelloise	56,8	(54,1-59,4)
	Région Wallonne	59,5	(57,1-61,9)
	Belgique	49,0	(47,5-50,6)

5.4.2.7. Troubles allergiques des voies respiratoires supérieures (MO01_8)

Les troubles allergiques des voies respiratoires supérieures ont été investigués à l'aide des questions suivantes: "avez-vous souvent des crises d'éternuement", "est-ce que votre nez est fréquemment bouché" et "êtes-vous parfois gêné par des picotements dans le nez".

En Belgique, 35% de la population a répondu positivement au moins à une de ces questions. Les femmes ne se plaignent pas plus souvent de troubles allergiques des voies respiratoires supérieures que les hommes.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de troubles allergiques des voies respiratoires supérieures chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 44% versus 33%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.10).

Chez les non fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de troubles allergiques des voies respiratoires supérieures est nettement plus faibles que chez les autres (32%); cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. On n'observe pas de différence par contre à ce sujet entre les régions.

Tableau 5.4.10.. *Pourcentage de personnes qui se plaignent de troubles allergiques des voies respiratoires supérieures (MO01_8), standardisé pour le sexe et l'âge, Enquête de Santé, Belgique, 1997.*

		PROPORTION(%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	36,0	(33,8-38,2)
	Femme	32,9	(30,8-35,0)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	34,5	(26,8-42,1)
	Ecole primaire	36,7	(31,9-41,5)
	Secondaire inférieur	37,7	(34,0-41,3)
	Secondaire supérieur	32,0	(29,2-34,8)
	Supérieur	34,5	(31,6-37,3)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	30,9	(25,8-36,0)
	20.000-30.000	33,6	(30,2-37,0)
	30.000-40.000	33,9	(30,9-36,9)
	40.000-60.000	36,1	(33,3-39,0)
	>60.000	32,4	(28,2-36,6)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	31,1	(29,4-32,9)
	Très mauvaise à moyenne	46,3	(42,7-50,0)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	31,0	(28,7-33,3)
	Dans le passé	37,7	(34,1-41,4)
	Modéré (<20)	33,8	(30,5-37,0)
	Gros fumeur	40,5	(34,9-46,1)
VERBLIJFPLAATS	Région Flamande	35,5	(33,3-37,7)
	Région Bruxelloise	34,7	(32,1-37,3)
	Région Wallonne	32,7	(30,2-35,1)
	Belgique	34,4	(32,9-36,0)

5.4.2.8. Toux (MO01_9)

Une seule question a été posée sur les problèmes de toux: "avez-vous souvent des problèmes de toux".

En Belgique, 15% de la population a répondu positivement à cette question. Les femmes se plaignent moins souvent de problèmes de toux (14%) que les hommes (16%); cette différence ne persiste pas après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.11). Il n'y a pas de variation en fonction de l'âge.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de problèmes de toux chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 25% versus 12%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.11).

Chez les non fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de problèmes de toux est nettement plus basse (9%) pour augmenter ensuite: 12% chez les anciens fumeurs, 20% chez les fumeurs modérés et 37% chez les gros fumeurs; ces différences ne sont pas significative toutefois après standardisation pour l'âge et le sexe. On n'observe pas par contre de différences en fonction de la région de résidence.

Tableau 5.4.11.. Pourcentage de personnes qui se plaignent de problèmes de toux (MO01_9), standardisé pour le sexe et l'âge, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION(%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	16,9	(15,2-18,6)
	Femme	13,9	(12,3-15,4)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	16,2	(10,2-22,2)
	Ecole primaire	19,7	(15,8-23,6)
	Secondaire inférieur	17,9	(15,1-20,8)
	Secondaire supérieur	14,9	(12,7-17,1)
	Supérieur	12,8	(10,7-15,0)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	16,6	(12,4-20,8)
	20.000-30.000	18,7	(15,9-21,4)
	30.000-40.000	14,9	(12,7-17,2)
	40.000-60.000	16,0	(13,7-18,2)
	>60.000	11,3	(8,3-14,2)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	11,6	(10,3-12,8)
	Très mauvaise à moyenne	26,4	(23,2-29,6)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	10,0	(8,4-11,6)
	Dans le passé	12,9	(10,3-15,4)
	Modéré (<20)	20,4	(17,3-23,5)
	Gros fumeur	37,6	(32,0-43,3)
VERBLIJFPLAATS	Région Flamande	15,2	(13,5-16,8)
	Région Bruxelloise	16,3	(14,2-18,4)
	Région Wallonne	15,5	(13,6-17,4)
	Belgique	15,4	(14,2-16,5)

5.4.2.9. Maux de tête (MO01_10)

Une question a été posée au sujet des maux de tête: "avez-vous parfois mal de tête".

En Belgique, 34% de la population a répondu positivement au moins à cette question. Les femmes se plaignent plus souvent de maux de tête (44%) que les hommes (25%); cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.12.) et se vérifie pour toutes les classes d'âge (sauf pour les 75 ans et plus).

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (moins de maux de tête chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 30% versus 48%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.12.).

Tableau 5.4.12.. Pourcentage de personnes qui se plaignent de maux de tête (MO01_10), standardisé pour le sexe et l'âge, Enquête de Santé, Belgique, 1997.


		PROPORTION (%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	24,5	(22,6-26,5)
	Femme	42,5	(40,3-44,7)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	42,9	(34,9-51,0)
	Ecole primaire	33,6	(28,9-38,3)
	Secondaire inférieur	37,2	(33,7-40,7)
	Secondaire supérieur	30,7	(28,1-33,4)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	38,1	(32,8-43,3)
	20.000-30.000	37,0	(33,7-40,4)
	30.000-40.000	34,2	(31,2-37,1)
	40.000-60.000	32,9	(30,3-35,5)
	>60.000	27,2	(23,1-31,2)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	28,9	(27,2-30,5)
	Très mauvaise à moyenne	49,7	(46,1-53,3)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	33,9	(31,6-36,2)
	Dans le passé	29,6	(26,2-33,0)
	Modéré (<20)	34,8	(31,3-38,3)
	Gros fumeur	36,8	(31,5-42,1)
VERBLIJFPLAATS	Région Flamande	30,6	(28,5-32,7)
	Région Bruxelloise	39,0	(36,4-41,5)
	Région Wallonne	37,3	(34,9-39,7)
	Belgique	33,5	(32,0-35,0)

5.4.2.10. Score moyen (tiré du SF-36) pour les douleurs physiques (MO26_3)

Pour l'interprétation de ces résultats, il faut se rappeler qu'un score élevé tend à démontrer l'absence de douleurs physiques et/ou de leurs conséquences sur les activités habituelles, tandis qu'un score faible tend à démontrer la présence de douleurs plus ou moins importantes.

En Belgique, le score moyen pour les douleurs physiques est de 77 (sur un maximum de 100). Le score moyen chez les femmes (74) est plus bas que chez les hommes (80); cela indique que les femmes ont plus de problèmes de douleur physique ou ressentent plus l'impact de ceux-ci dans leur vie quotidienne. Cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.13) et se vérifie dans toutes les tranches d'âge. Le score diminue aussi régulièrement avec l'âge.

Figure 5.4.13. Score moyen (tiré du SF-36) pour la douleur physique, par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 1997.



Différences en fonction des caractéristiques individuelles (Tableau 5.4.11)

Le score pour la douleur est plus bas chez les personnes avec un faible niveau de scolarité (70) pour augmenter ensuite parmi les personnes avec un niveau secondaire supérieur ou plus. De même, le score monte avec le niveau de revenu (73 pour des revenus < 20.000,-FB à 82 pour 60.000,-FB et plus). Ces différences persistent après standardisation pour l'âge et le sexe (entre les revenus < 40.000,-FB et 40.000,-FB ou plus).

On n'observe des différences à ce sujet suivant le niveau de santé subjective (plus de douleurs chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: score de 53 versus 84 chez les autres). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de douleurs est plus élevée (score de 74); cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Le score est aussi plus en Wallonie qu'en Flandre mais cette différence n'est pas significative.

Tableau 5.4.13. valeur moyenne du score (tiré du SF-36) pour la douleur physique, standardisé pour l'âge et le sexe, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		MOYENNE	I.C. 95%
		-----	-----
SEXE	Homme	78,9	(78,2-79,6)
	Femme	73,6	(72,8-74,3)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	70,5	(67,1-73,8)
	Ecole primaire	73,0	(71,2-74,8)
	Secondaire inférieur	74,3	(72,9-75,6)
	Secondaire supérieur	76,6	(75,6-77,7)
	Supérieur	78,2	(77,3-79,2)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	72,4	(70,1-74,6)
	20.000-30.000	72,9	(71,6-74,2)
	30.000-40.000	74,1	(73,0-75,2)
	40.000-60.000	77,8	(76,9-78,7)
	>60.000	80,9	(79,6-82,3)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	83,3	(82,7-83,8)
	Très mauvaise à moyenne	54,7	(53,4-56,1)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	78,1	(77,3-78,9)
	Dans le passé	74,5	(73,2-75,7)
	Modéré (<20)	75,6	(74,2-77,0)
	Gros fumeur	71,1	(68,0-74,2)
VERBLIJFPLAATS	Région Flamande	78,5	(77,7-79,4)
	Région Bruxelloise	73,4	(72,4-74,5)
	Région Wallonne	72,9	(72,0-73,8)
	Belgique	76,2	(75,7-76,8)


5.4.3. Wallonie

5.4.3.1. Nombre moyen de plaintes en matière de santé (MO01_2)

En Wallonie, 6,9 plaintes sont rapportées en moyenne. 50% de la population rapporte au moins 6 plaintes et 10% de la population n'a aucune plainte en matière de santé.

Les femmes mentionnent plus de plaintes (7,5) que les hommes (6,1). Cette différence est significative après standardisation par âge. Le nombre moyen de plaintes augmente avec l'âge: 5,4 plaintes chez les 15 - 24 ans, 7,3 plaintes chez les 75 ans et plus. Dans presque chaque groupe d'âge les femmes mentionnent en moyenne plus de plaintes que les hommes (Figure 5.4.3.).

Figure 5.4.3. Nombre moyen de plaintes en matière de santé (MO01_2), par sexe et par âge, Wallonie, Enquête de Santé, Belgique, 1997.



Différences en fonction des caractéristiques individuelles (Tableau 5.4.14.)

Même si les personnes avec un niveau d'éducation plus faible semblent rapporter en moyenne plus de plaintes, cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Les personnes qui déclarent un mauvais état de santé subjective, ont plus de plaintes (10,5) que les autres (5,5). De même, les gros fumeurs, suivi des anciens fumeurs, mentionnent aussi plus de plaintes que les autres (respectivement 8,3 et 7,1 plaintes). Ces différences persistent après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.14. Nombre moyen de plaintes en matière de santé (MO01_2), standardisé pour le sexe et l'âge, Belgique, Enquête de Santé, 1997.

		MOYENNE	I.C. 95%
SEXE	Homme	6,1	(5,8- 6,3)
	Femme	7,6	(7,3- 7,8)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	7,5	(6,5- 8,4)
	Ecole primaire	7,4	(6,7- 8,1)
	Secondaire inférieur	7,4	(7,0- 7,8)
	Secondaire supérieur	7,2	(6,8- 7,5)
	Supérieur	5,9	(5,6- 6,2)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	7,2	(6,4- 7,9)
	20.000-30.000	7,4	(7,0- 7,8)
	30.000-40.000	7,0	(6,6- 7,3)
	40.000-60.000	6,6	(6,4- 6,9)
	>60.000	6,2	(5,7- 6,8)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	5,4	(5,2- 5,6)
	Très mauvaise à moyenne	10,4	(9,9-10,8)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	6,1	(5,8- 6,3)
	Dans le passé	7,2	(6,8- 7,6)
	Modéré (<20)	7,0	(6,6- 7,4)
	Gros fumeur	8,1	(7,5- 8,7)

5.4.3.2. Maux d'estomac (MO01_3)

La prévalence des maux d'estomac est mesurée par l'intermédiaire de trois plaintes spécifiques: des plaintes de l'estomac, ou parfois des maux vagues à l'estomac ou des douleurs dans la région de l'estomac..

En Wallonie, 34% des répondants mentionnent avoir eu au moins un de ces plaintes au niveau de l'estomac ces derniers temps. Les femmes s'en plaignent plus (37%) que les hommes (32%). Cette différence est significative après standardisation par âge, et cela se vérifie dans presque toutes les tranches d'âge.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de maux d'estomac chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 49% versus 29%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.15.).

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de maux d'estomac est plus élevée (40%) mais cette différence n'est pas significative.

Tableau 5.4.15. Pourcentage de personnes qui se plaignent de maux d'estomac (MO01_3), standardisé pour le sexe et l'âge, Wallonie, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION(%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	31,2	(27,9-34,6)
	Femme	36,7	(33,1-40,3)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	35,2	(24,2-46,1)
	Ecole primaire	35,0	(27,5-42,4)
	Secondaire inférieur	36,9	(31,4-42,4)
	Secondaire supérieur	34,0	(29,8-38,2)
	Supérieur	31,7	(27,1-36,3)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	31,6	(24,2-39,0)
	20.000-30.000	36,9	(31,8-42,0)
	30.000-40.000	31,9	(27,2-36,6)
	40.000-60.000	34,0	(29,6-38,4)
	>60.000	38,2	(31,7-44,8)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	28,2	(25,2-31,1)
	Très mauvaise à moyenne	49,7	(44,3-55,1)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	32,0	(28,3-35,7)
	Dans le passé	33,5	(28,4-38,6)
	Modéré (<20)	30,9	(25,8-36,0)
	Gros fumeur	40,4	(33,3-47,5)

5.4.3.3. Fatigue (MO01_4)

Afin d'évaluer la prévalence des plaintes de fatigue, il a été fait usage des questions suivantes: "avez-vous l'impression de manquer de sommeil", "avez-vous souvent le sentiment d'être fatigué", "vous sentez-vous encore bien sans entrain" et "vous sentez-vous parfois plus fatigué que d'habitude".

En Wallonie, 66% des personnes interrogées répondent positivement à au moins une de ces 4 questions. Les femmes se plaignent plus souvent de fatigue (74%) que les hommes (58%); cette différence persiste après standardisation pour l'âge.

Les sensations de fatigue ne sont pas associées avec l'âge, à part pour les personnes âgées, mais les femmes se plaignent plus souvent que les hommes pour l'ensemble des classes d'âges.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de sensations de fatigue chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 88% versus 59%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.16.). Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de fatigue est plus élevée (75%) que chez les personnes qui n'ont jamais fumé; cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.16. *Pourcentage de personnes qui se plaignent de fatigue (MO01_4), standardisé pour le sexe et l'âge, Wallonie, Enquête de Santé, Belgique, 1997.*

		PROPORTION(%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	58,9	(55,3-62,5)
	Femme	74,3	(71,0-77,5)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	72,6	(63,2-82,0)
	Ecole primaire	63,8	(56,4-71,1)
	Secondaire inférieur	70,3	(65,1-75,5)
	Secondaire supérieur	66,9	(62,7-71,0)
	Supérieur	63,6	(59,0-68,2)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	63,8	(56,2-71,3)
	20.000-30.000	68,2	(63,4-73,0)
	30.000-40.000	69,6	(65,0-74,3)
	40.000-60.000	67,0	(62,8-71,1)
	>60.000	64,0	(57,0-71,0)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	58,7	(55,4-62,1)
	Très mauvaise à moyenne	87,6	(83,9-91,3)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	59,9	(56,0-63,8)
	Dans le passé	69,2	(63,9-74,4)
	Modéré (<20)	70,5	(65,5-75,6)
	Gros fumeur	77,3	(70,8-83,9)

5.4.3.4. Nervosité (MO01_5)

La nervosité a été mesurée par le biais des questions suivantes: 'vous sentez-vous "souvent énervé", "souvent nerveux" et 'vite irrité'.

En Wallonie, 54e% de la population a répondu positivement au moins à une de ces 3 questions. Les femmes se plaignent plus souvent de nervosité (59%) que les hommes (50%); cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.16) et s'observe pour toutes les tranches d'âge (mais la différence n'est significative que chez les 25-34 ans) .

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de sensations de nervosité chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 70% versus 49%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.17).

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de nervosité est nettement plus élevée (65%) que chez les personnes qui n'ont jamais fumé (49%); cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.17. Pourcentage de personnes qui se plaignent de nervosité (MO01_5), standardisé pour le sexe et l'âge, Wallonie, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION (%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	49,2	(45,6-52,8)
	Femme	58,2	(54,5-61,9)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	54,2	(42,2-66,1)
	Ecole primaire	57,6	(50,0-65,3)
	Secondaire inférieur	54,6	(48,9-60,3)
	Secondaire supérieur	57,9	(53,4-62,5)
	Supérieur	47,0	(42,3-51,8)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	54,9	(47,1-62,6)
	20.000-30.000	56,0	(50,8-61,2)
	30.000-40.000	55,9	(50,7-61,1)
	40.000-60.000	53,2	(48,8-57,7)
	>60.000	51,4	(43,9-58,9)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	47,1	(43,6-50,5)
	Très mauvaise à moyenne	73,1	(68,5-77,6)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	46,5	(42,6-50,4)
	Dans le passé	58,0	(52,4-63,7)
	Modéré (<20)	58,9	(53,6-64,3)
	Gros fumeur	64,0	(57,5-70,5)

5.4.3.5. Douleurs dans la région de la poitrine et du cœur (MO01_6)

La prévalence des douleurs dans la région de la poitrine et du cœur a été mesurée à l'aide des questions suivantes: "parfois oppressé" et "parfois des douleurs dans la poitrine ou la région du cœur".

En Wallonie, 46% de la population a répondu positivement au moins à une de ces 2 questions. Les femmes se plaignent plus souvent de douleurs au niveau de la poitrine que les hommes; cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.18) et se vérifie pour toutes les classes d'âge (mais de manière significative uniquement pour les 25-34 ans). Il y a une variation aussi en fonction de l'âge: les personnes âgées rapportent plus souvent des douleurs au niveau de la poitrine (52%) que les jeunes (36%).

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de douleurs dans la poitrine chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 68% versus 38%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.18.).

Chez les gros fumeurs, ainsi que les anciens fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de douleurs au niveau de la poitrine est plus élevée que chez les personnes qui n'ont jamais fumé; cette différence n'est pas significative toutefois après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.18. *Pourcentage de personnes qui se plaignent de douleurs au niveau de la poitrine ou de la région du cœur (MO01_6), standardisé pour le sexe et l'âge, Wallonie, Enquête de Santé, Belgique, 1997.*

		PROPORTION(%)	I.C. 95%
		—————	—————
SEXE	Homme	39,5	(35,9-43,0)
	Femme	52,5	(48,8-56,2)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	42,8	(30,4-55,2)
	Ecole primaire	51,7	(43,9-59,6)
	Secondaire inférieur	48,8	(43,2-54,4)
	Secondaire supérieur	49,5	(45,0-54,1)
	Supérieur	40,8	(36,1-45,5)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	48,1	(40,2-56,0)
	20.000-30.000	48,6	(43,5-53,8)
	30.000-40.000	45,3	(40,2-50,4)
	40.000-60.000	44,2	(39,8-48,6)
	>60.000	46,1	(38,8-53,4)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	37,5	(34,2-40,8)
	Très mauvaise à moyenne	63,8	(58,7-68,9)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	41,9	(38,0-45,8)
	Dans le passé	49,7	(44,0-55,4)
	Modéré (<20)	49,1	(43,6-54,6)
	Gros fumeur	50,8	(43,5-58,1)

5.4.3.6. Plaintes au niveau locomoteur (MO01_7)

Pour l'évaluation des plaintes au niveau locomoteur, il a été fait usage des questions suivantes: "vous plaignez-vous de douleurs dans les os et les muscles", "avez-vous parfois mal au dos", "avez-vous parfois une sensation de picotements dans les membres" et "souffrez-vous de rhumatismes".

En Wallonie, 58% de la population a répondu positivement au moins à une de ces questions. Les femmes se plaignent plus souvent de problèmes locomoteurs (62%) que les hommes (54%); cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.6). Il y a une variation aussi en fonction de l'âge: les personnes âgées rapportent plus souvent des problèmes locomoteurs (78%) que les jeunes (44%).

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de problèmes locomoteurs chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 82% versus 50%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.19).

Chez les non fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de problèmes locomoteurs est nettement plus faibles que chez les autres (53%); cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.19. *Pourcentage de personnes qui se plaignent de problèmes locomoteurs (MO01_7), standardisé pour le sexe et l'âge, Wallonie, Enquête de Santé, Belgique, 1997.*

		PROPORTION (%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	55,3	(51,8-58,8)
	Femme	63,7	(60,4-67,1)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	66,6	(56,9-76,3)
	Ecole primaire	62,9	(55,5-70,4)
	Secondaire inférieur	62,1	(56,8-67,3)
	Secondaire supérieur	64,3	(60,2-68,4)
	Supérieur	51,6	(46,7-56,4)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	62,3	(54,8-69,9)
	20.000-30.000	62,8	(58,1-67,6)
	30.000-40.000	59,6	(54,7-64,6)
	40.000-60.000	60,0	(55,8-64,2)
	>60.000	52,0	(44,7-59,4)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	52,6	(49,2-55,9)
	Très mauvaise à moyenne	79,1	(74,6-83,7)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	53,5	(49,7-57,4)
	Dans le passé	63,0	(57,4-68,5)
	Modéré (<20)	62,4	(56,9-67,9)
	Gros fumeur	67,7	(61,3-74,0)

5.4.3.7. Troubles allergiques des voies respiratoires supérieures (MO01_8)

Les troubles allergiques des voies respiratoires supérieures ont été investigués à l'aide des questions suivantes: "avez-vous souvent des crises d'éternuement", "est-ce que votre nez est fréquemment bouché" et "êtes-vous parfois gêné par des picotements dans le nez".

En Wallonie, 33% de la population a répondu positivement au moins à une de ces questions. Les femmes ne se plaignent pas plus souvent de troubles allergiques des voies respiratoires supérieures que les hommes.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de troubles allergiques des voies respiratoires supérieures chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 44% versus 29%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.20).

Chez les non fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de troubles allergiques des voies respiratoires supérieures est nettement plus faibles que chez les autres (31%); cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.20. *Pourcentage de personnes qui se plaignent de troubles allergiques des voies respiratoires supérieures (MO01_8), standardisé pour le sexe et l'âge, Wallonie, Enquête de Santé, Belgique, 1997.*

		PROPORTION(%)	I.C. 95%
		—————	—————
SEXE	Homme	33,5	(30,1-36,9)
	Femme	31,8	(28,4-35,2)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	35,9	(24,3-47,5)
	Ecole primaire	31,3	(24,0-38,5)
	Secondaire inférieur	41,6	(36,0-47,2)
	Secondaire supérieur	30,3	(26,4-34,1)
	Supérieur	31,3	(26,8-35,9)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	35,3	(28,0-42,7)
	20.000-30.000	30,7	(25,9-35,5)
	30.000-40.000	33,1	(28,4-37,8)
	40.000-60.000	32,8	(28,5-37,2)
	>60.000	33,0	(25,8-40,1)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	27,5	(24,6-30,5)
	Très mauvaise à moyenne	49,3	(44,1-54,5)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	30,6	(27,0-34,3)
	Dans le passé	32,2	(26,9-37,6)
	Modéré (<20)	32,1	(27,2-37,0)
	Gros fumeur	40,1	(33,1-47,2)

5.4.3.8. Toux (MO01_9)

Une seule question a été posée sur les problèmes de toux: "avez-vous souvent des problèmes de toux".

En Wallonie, 15% de la population a répondu positivement à cette question. Les femmes se plaignent moins souvent de problèmes de toux (15%) que les hommes (14%); cette différence ne persiste pas après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.21). Il n'y a pas de variation en fonction de l'âge.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de problèmes de toux chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 25% versus 11%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.21).

Chez les non fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de problèmes de toux est nettement plus basse (10%) pour augmenter ensuite: 11% chez les anciens fumeurs, 19% chez les fumeurs modérés et 32% chez les gros fumeurs; ces différences ne sont pas significative toutefois après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.21. Pourcentage de personnes qui se plaignent de problèmes de toux (MO01_9), standardisé pour le sexe et l'âge, Wallonie, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION (%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	17,1	(14,3-19,9)
	Femme	13,9	(11,3-16,4)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	16,2	(7,1-25,3)
	Ecole primaire	14,3	(9,1-19,5)
	Secondaire inférieur	20,9	(16,4-25,4)
	Secondaire supérieur	15,1	(11,9-18,3)
	Supérieur	14,0	(10,5-17,6)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	15,4	(9,6-21,3)
	20.000-30.000	19,0	(14,9-23,0)
	30.000-40.000	12,2	(8,8-15,5)
	40.000-60.000	17,7	(14,1-21,3)
	>60.000	12,0	(7,0-17,0)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	10,8	(8,7-12,9)
	Très mauvaise à moyenne	25,6	(21,0-30,1)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	11,3	(8,7-14,0)
	Dans le passé	11,9	(8,1-15,7)
	Modéré (<20)	19,2	(14,8-23,7)
	Gros fumeur	36,5	(29,3-43,8)

5.4.3.9. Maux de tête (MO01_10)

Une question a été posée au sujet des maux de tête: "avez-vous parfois mal de tête".

En Wallonie, 39% de la population a répondu positivement au moins à cette question. Les femmes se plaignent plus souvent de maux de tête (47%) que les hommes (30%); cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.9) et se vérifie presque pour toutes les classes d'âge.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (moins de maux de tête chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 48% versus 35%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.22).

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de maux de tête est plus élevée (46%) mais cette différence n'est pas significative toutefois après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.22. Pourcentage de personnes qui se plaignent de maux de tête (MO01_10), standardisé pour le sexe et l'âge, Wallonie, Enquête de Santé, Belgique, 1997.


		PROPORTION(%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	28,2	(25,0-31,4)
	Femme	46,3	(42,7-50,0)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	45,8	(34,5-57,1)
	Ecole primaire	40,9	(33,9-47,9)
	Secondaire inférieur	39,2	(33,8-44,5)
	Secondaire supérieur	37,7	(33,7-41,8)
	Supérieur	32,6	(28,4-36,8)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	37,3	(30,2-44,4)
	20.000-30.000	42,6	(37,6-47,6)
	30.000-40.000	37,6	(32,7-42,4)
	40.000-60.000	36,8	(32,6-40,9)
	>60.000	32,2	(25,7-38,8)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	32,0	(29,1-34,9)
	Très mauvaise à moyenne	51,6	(46,4-56,7)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	37,5	(33,8-41,1)
	Dans le passé	33,7	(28,2-39,1)
	Modéré (<20)	34,7	(29,5-39,9)
	Gros fumeur	42,2	(35,6-48,8)

5.4.3.10. Score moyen (tiré du SF-36) pour les douleurs physiques (MO26_3)

Pour l'interprétation de ces résultats, il faut se rappeler qu'un score élevé tend à démontrer l'absence de douleurs physiques et/ou de leurs conséquences sur les activités habituelles, tandis qu'un score faible tend à démontrer la présence de douleurs plus ou moins importantes.

En Wallonie, le score moyen pour les douleurs physiques est de 74 (sur un maximum de 100). Le score moyen chez les femmes (77) est plus bas que chez les hommes (80); cela indique que les femmes ont plus de problèmes de douleur physique ou ressentent plus l'impact de ceux-ci dans leur vie quotidienne. Cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.23). Le score diminue aussi régulièrement avec l'âge.

Figure 5.4.4. Score moyen (tiré du SF-36) pour la douleur physique, par sexe et par âge, Wallonie, Enquête de Santé, Belgique, 1997.



Différences en fonction des caractéristiques individuelles (Tableau 5.4.23)

Le score pour la douleur est plus bas chez les personnes avec un faible niveau de scolarité (62) pour augmenter ensuite parmi les personnes avec un niveau secondaire supérieur ou plus. Ces différences ne sont pas significatives après standardisation pour l'âge et le sexe. De même, le score monte avec le niveau de revenu (71 pour des revenus < 20.000,-FB à 79 pour 60.000,-FB et plus). Ces différences persistent après standardisation pour l'âge et le sexe (entre les revenus < 40.000,-FB et 40.000,-FB ou plus).

On n'observe des différences à ce sujet suivant le niveau de santé subjective (plus de douleurs chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: score de 52 versus 82 chez les autres). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de douleurs est plus élevée (score de 68); cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.21. valeur moyenne du score (tiré du SF-36) pour la douleur physique, standardisé pour l'âge et le sexe, Wallonie, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		MOYENNE	I.C. 95%
SEXE	Homme	75,4	(74,1-76,7)
	Femme	70,4	(69,2-71,6)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	64,6	(56,7-72,4)
	Ecole primaire	69,3	(66,0-72,6)
	Secondaire inférieur	71,5	(69,3-73,8)
	Secondaire supérieur	70,4	(68,5-72,3)
	Supérieur	77,5	(76,0-79,1)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	69,6	(66,0-73,2)
	20.000-30.000	68,9	(66,9-70,9)
	30.000-40.000	71,4	(69,5-73,4)
	40.000-60.000	75,1	(73,6-76,5)
	>60.000	77,1	(74,3-79,8)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	81,1	(80,2-82,1)
	Très mauvaise à moyenne	53,5	(51,4-55,7)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	74,9	(73,5-76,3)
	Dans le passé	71,9	(69,7-74,0)
	Modéré (<20)	73,4	(70,8-75,9)
	Gros fumeur	69,8	(66,8-72,8)


5.4.4. Bruxelles

5.4.4.1. Nombre moyen de plaintes en matière de santé (MO01_2)

A Bruxelles, 6,9 plaintes sont rapportées en moyenne. 50% de la population rapporte au moins 6 plaintes et 10% de la population n'a aucune plainte en matière de santé.

Les femmes mentionnent plus de plaintes (7,5) que les hommes (6,2). Cette différence est significative après standardisation par âge. Le nombre moyen de plaintes augmente avec l'âge: 6,1 plaintes chez les 15 - 24 ans, 7,8 plaintes chez les 75 ans et plus (Figure 5.4.5.).

Figure 5.4.5. Nombre moyen de plaintes en matière de santé (MO01_2), par sexe et par âge, Bruxelles, Enquête de Santé, Belgique, 1997.



Différences en fonction des caractéristiques individuelles (Tableau 5.4.22.)

Même si les personnes avec un niveau d'éducation plus faible semblent rapporter en moyenne plus de plaintes, cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Les personnes avec un revenu de 60.000,-FB ou plus déclarent moins de plaintes que les autres.

Les personnes qui déclarent un mauvais état de santé subjective, ont plus de plaintes (11,2) que les autres (5,4). De même, les gros fumeurs, suivi des anciens fumeurs, mentionnent aussi plus de plaintes que les autres (respectivement 8,5 et 7,3 plaintes). Ces différences persistent après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.22. Nombre moyen de plaintes en matière de santé (MO01_2), standardisé pour le sexe et l'âge, Belgique, Enquête de Santé, 1997.

		MOYENNE	I.C. 95%
SEXE	Homme	6,3	(6,0- 6,6)
	Femme	7,6	(7,3- 7,8)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	7,7	(6,7- 8,7)
	Ecole primaire	7,9	(7,2- 8,7)
	Secondaire inférieur	8,0	(7,4- 8,6)
	Secondaire supérieur	6,8	(6,4- 7,2)
	Supérieur	6,1	(5,8- 6,4)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	7,4	(6,6- 8,2)
	20.000-30.000	8,2	(7,8- 8,7)
	30.000-40.000	7,3	(6,8- 7,7)
	40.000-60.000	6,6	(6,2- 6,9)
	>60.000	5,7	(5,3- 6,1)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	5,4	(5,2- 5,6)
	Très mauvaise à moyenne	10,9	(10,4-11,4)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	6,4	(6,1- 6,7)
	Dans le passé	6,9	(6,5- 7,4)
	Modéré (<20)	7,3	(6,9- 7,8)
	Gros fumeur	9,1	(8,3- 9,8)

5.4.4.2. Maux d'estomac (MO01_3)

La prévalence des maux d'estomac est mesurée par l'intermédiaire de trois plaintes spécifiques: des plaintes de l'estomac, ou parfois des maux vagues à l'estomac ou des douleurs dans la région de l'estomac.

A Bruxelles, 38% des répondants mentionnent avoir eu au moins un de ces plaintes au niveau de l'estomac ces derniers temps. Les femmes ne s'en plaignent pas plus que les hommes.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de maux d'estomac chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 53% versus 33%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.23.).

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de maux d'estomac est plus élevée (40%) mais cette différence n'est pas significative.

Tableau 5.4.23. Pourcentage de personnes qui se plaignent de maux d'estomac (MO01_3), standardisé pour le sexe et l'âge, Bruxelles, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION (%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	37,5	(33,6-41,5)
	Femme	38,2	(34,5-41,8)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	41,6	(31,8-51,5)
	Ecole primaire	37,1	(30,3-43,9)
	Secondaire inférieur	38,8	(32,4-45,1)
	Secondaire supérieur	33,7	(28,8-38,6)
	Supérieur	37,3	(33,1-41,4)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	40,2	(33,4-47,0)
	20.000-30.000	42,1	(36,5-47,7)
	30.000-40.000	39,9	(34,5-45,3)
	40.000-60.000	35,7	(30,8-40,6)
	>60.000	34,0	(28,2-39,8)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	31,8	(28,7-34,9)
	Très mauvaise à moyenne	52,4	(46,8-57,9)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	38,7	(33,9-43,5)
	Dans le passé	36,4	(31,2-41,7)
	Modéré (<20)	38,2	(32,6-43,7)
	Gros fumeur	40,1	(33,0-47,2)

5.4.4.3. Fatigue (MO01_4)

Afin d'évaluer la prévalence des plaintes de fatigue, il a été fait usage des questions suivantes: "avez-vous l'impression de manquer de sommeil", "avez-vous souvent le sentiment d'être fatigué", "vous sentez-vous encore bien sans entrain" et "vous sentez-vous parfois plus fatigué que d'habitude".

A Bruxelles, 67% des personnes interrogées répondent positivement à au moins une de ces 4 questions. Les femmes se plaignent plus souvent de fatigue (72%) que les hommes (62%); cette différence ne persiste pas après standardisation pour l'âge.

Les sensations de fatigue ne sont pas associées avec l'âge, à part pour les personnes âgées, mais les femmes (35-44 ans) se plaignent plus souvent que les hommes.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de sensations de fatigue chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 89% versus 60%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.24.). Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de fatigue est plus élevée (76%) que chez les personnes qui n'ont jamais fumé (60%); cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.24. Pourcentage de personnes qui se plaignent de fatigue (MO01_4), standardisé pour le sexe et l'âge, Bruxelles, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION (%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	63,4	(59,7-67,2)
	Femme	72,1	(68,7-75,5)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	67,2	(58,7-75,7)
	Ecole primaire	68,3	(61,8-74,8)
	Secondaire inférieur	76,2	(70,7-81,7)
	Secondaire supérieur	69,8	(65,1-74,5)
	Supérieur	63,9	(60,0-67,9)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	65,8	(59,2-72,5)
	20.000-30.000	80,2	(75,4-85,1)
	30.000-40.000	66,8	(61,6-72,0)
	40.000-60.000	64,3	(59,6-69,0)
	>60.000	62,3	(56,4-68,2)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	60,2	(57,0-63,5)
	Très mauvaise à moyenne	86,1	(81,8-90,4)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	60,4	(55,9-64,9)
	Dans le passé	67,3	(62,2-72,5)
	Modéré (<20)	76,9	(72,3-81,6)
	Gros fumeur	79,0	(73,2-84,8)

5.4.4.4. Nervosité (MO01_5)

La nervosité a été mesurée par le biais des questions suivantes: 'vous sentez-vous "souvent énervé", "souvent nerveux" et 'vite irrité'.

A Bruxelles, 52% de la population a répondu positivement au moins à une de ces 3 questions. Les femmes se plaignent plus souvent de nervosité (56%) que les hommes (47%); cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.25).

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les groupes d'âges ou les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de sensations de nervosité chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 73% versus 45%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.25.).

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de nervosité est nettement plus élevée (63%) que chez les personnes qui n'ont jamais fumé; cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.25. Pourcentage de personnes qui se plaignent de nervosité (MO01_5), standardisé pour le sexe et l'âge, Bruxelles, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION(%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	46,9	(42,9-50,9)
	Femme	56,3	(52,6-60,1)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	41,5	(32,2-50,9)
	Ecole primaire	58,8	(52,1-65,6)
	Secondaire inférieur	64,8	(58,7-70,9)
	Secondaire supérieur	53,3	(48,1-58,5)
	Supérieur	45,3	(41,1-49,5)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	49,4	(41,9-56,9)
	20.000-30.000	59,1	(53,1-65,0)
	30.000-40.000	54,6	(49,2-60,0)
	40.000-60.000	47,4	(42,4-52,4)
	>60.000	45,9	(39,9-51,8)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	44,5	(41,1-47,8)
	Très mauvaise à moyenne	72,2	(67,2-77,2)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	44,1	(39,4-48,8)
	Dans le passé	52,3	(46,8-57,7)
	Modéré (<20)	57,5	(52,1-62,8)
	Gros fumeur	59,8	(52,2-67,3)

5.4.4.5. Douleurs dans la région de la poitrine et du cœur (MO01_6)

La prévalence des douleurs dans la région de la poitrine et du cœur a été mesurée à l'aide des questions suivantes: "parfois oppressé" et "parfois des douleurs dans la poitrine ou la région du cœur".

A Bruxelles, 43% de la population a répondu positivement au moins à une de ces 2 questions. Les femmes se plaignent plus souvent de douleurs au niveau de la poitrine que les hommes; cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.16) et se vérifie pour toutes les classes d'âge (mais de manière significative uniquement pour les 25-34 ans). Il y a une variation aussi en fonction de l'âge: les personnes âgées (75 ans et plus) rapportent plus souvent des douleurs au niveau de la poitrine (50%) que les jeunes (40%).

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de douleurs dans la poitrine chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 70% versus 34%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.26.).

Chez les gros fumeurs, ainsi que les anciens fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de douleurs au niveau de la poitrine est plus élevée que chez les personnes qui n'ont jamais fumé; cette différence n'est pas significative toutefois après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.26. *Pourcentage de personnes qui se plaignent de douleurs au niveau de la poitrine ou de la région du cœur (MO01_6), standardisé pour le sexe et l'âge, Bruxelles, Enquête de Santé, Belgique, 1997.*

		PROPORTION (%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	38,4	(34,4-42,3)
	Femme	48,3	(44,5-52,1)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	48,8	(38,8-58,8)
	Ecole primaire	44,7	(37,7-51,6)
	Secondaire inférieur	52,2	(45,9-58,5)
	Secondaire supérieur	45,3	(40,2-50,4)
	Supérieur	37,4	(33,3-41,5)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	48,3	(40,8-55,9)
	20.000-30.000	51,4	(45,5-57,3)
	30.000-40.000	46,4	(40,8-51,9)
	40.000-60.000	37,8	(33,0-42,7)
	>60.000	37,8	(31,8-43,8)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	33,8	(30,6-37,0)
	Très mauvaise à moyenne	67,0	(61,6-72,4)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	38,7	(34,1-43,2)
	Dans le passé	45,7	(40,6-50,9)
	Modéré (<20)	47,2	(41,3-53,0)
	Gros fumeur	59,0	(52,6-65,4)

5.4.4.6. Plaintes au niveau locomoteur (MO01_7)

Pour l'évaluation des plaintes au niveau locomoteur, il a été fait usage des questions suivantes: "vous plaignez-vous de douleurs dans les os et les muscles", "avez-vous parfois mal au dos", "avez-vous parfois une sensation de picotements dans les membres" et "souffrez-vous de rhumatismes".

A Bruxelles, 56% de la population a répondu positivement au moins à une de ces questions. Les femmes se plaignent plus souvent de problèmes locomoteurs (60%) que les hommes (51%); cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.27) ainsi que pour toutes les tranches d'âge prises séparément (sauf chez les 75 ans et plus). Il y a une variation aussi en fonction de l'âge: les personnes âgées rapportent plus souvent des problèmes locomoteurs (69%) que les jeunes (48%).

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de problèmes locomoteurs chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 77% versus 48%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.27).

Chez les non fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de problèmes locomoteurs est nettement plus faibles que chez les autres (52%); cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.27. Pourcentage de personnes qui se plaignent de problèmes locomoteurs (MO01_7), standardisé pour le sexe et l'âge, Bruxelles, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION (%)	I. C. 95%
SEXE	Homme	52,3	(48,4-56,3)
	Femme	61,2	(57,6-64,8)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	64,0	(55,8-72,2)
	Ecole primaire	64,0	(57,3-70,8)
	Secondaire inférieur	63,3	(57,7-68,9)
	Secondaire supérieur	56,5	(51,4-61,6)
	Supérieur	50,6	(46,5-54,6)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	61,4	(54,6-68,2)
	20.000-30.000	62,3	(56,8-67,7)
	30.000-40.000	60,3	(55,1-65,4)
	40.000-60.000	56,4	(51,6-61,2)
	>60.000	47,9	(42,0-53,9)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	50,2	(46,9-53,6)
	Très mauvaise à moyenne	73,2	(68,2-78,1)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	52,7	(48,3-57,1)
	Dans le passé	53,4	(48,1-58,7)
	Modéré (<20)	62,8	(57,5-68,1)
	Gros fumeur	68,2	(61,2-75,1)

5.4.4.7. Troubles allergiques des voies respiratoires supérieures (MO01_8)

Les troubles allergiques des voies respiratoires supérieures ont été investigués à l'aide des questions suivantes: "avez-vous souvent des crises d'éternuement", "est-ce que votre nez est fréquemment bouché" et "êtes-vous parfois gêné par des picotements dans le nez".

A Bruxelles, 35% de la population a répondu positivement au moins à une de ces questions. Les femmes ne se plaignent pas plus souvent de troubles allergiques des voies respiratoires supérieures que les hommes.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de troubles allergiques des voies respiratoires supérieures chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 43% versus 33%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.28).

Chez les non fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de troubles allergiques des voies respiratoires supérieures est nettement plus faibles que chez les autres (33%); cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.28. *Pourcentage de personnes qui se plaignent de troubles allergiques des voies respiratoires supérieures (MO01_8), standardisé pour le sexe et l'âge, Bruxelles, Enquête de Santé, Belgique, 1997.*

		PROPORTION(%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	35,4	(31,5-39,2)
	Femme	34,1	(30,5-37,6)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	31,6	(22,5-40,6)
	Ecole primaire	35,2	(28,4-42,0)
	Secondaire inférieur	33,9	(28,0-39,8)
	Secondaire supérieur	36,1	(31,3-41,0)
	Supérieur	34,4	(30,5-38,3)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	35,4	(28,2-42,6)
	20.000-30.000	38,6	(32,9-44,3)
	30.000-40.000	34,9	(29,6-40,1)
	40.000-60.000	38,9	(34,0-43,8)
	>60.000	27,3	(22,1-32,6)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	31,5	(28,5-34,5)
	Très mauvaise à moyenne	45,3	(39,7-50,9)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	33,7	(29,3-38,2)
	Dans le passé	38,8	(33,4-44,3)
	Modéré (<20)	33,6	(28,5-38,8)
	Gros fumeur	41,1	(34,3-47,9)

5.4.4.8. Toux (MO01_9)

Une seule question a été posée sur les problèmes de toux: "avez-vous souvent des problèmes de toux".

A Bruxelles, 16% de la population a répondu positivement à cette question. Les femmes ne se plaignent pas plus souvent de problèmes de toux que les hommes. Il n'y a pas de variation en fonction de l'âge.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (plus de problèmes de toux chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 29% versus 11%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.29).

Chez les non fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de problèmes de toux est nettement plus basse (13%) pour augmenter ensuite: 18% chez les fumeurs modérés et 33% chez les gros fumeurs; ces différences ne sont pas significative toutefois après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.29. *Pourcentage de personnes qui se plaignent de problèmes de toux (MO01_9), standardisé pour le sexe et l'âge, Bruxelles, Enquête de Santé, Belgique, 1997.*

		PROPORTION(%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	35,4	(31,5-39,2)
	Femme	34,1	(30,5-37,6)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	31,6	(22,5-40,6)
	Ecole primaire	35,2	(28,4-42,0)
	Secondaire inférieur	33,9	(28,0-39,8)
	Secondaire supérieur	36,1	(31,3-41,0)
	Supérieur	34,4	(30,5-38,3)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	35,4	(28,2-42,6)
	20.000-30.000	38,6	(32,9-44,3)
	30.000-40.000	34,9	(29,6-40,1)
	40.000-60.000	38,9	(34,0-43,8)
	>60.000	27,3	(22,1-32,6)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	31,5	(28,5-34,5)
	Très mauvaise à moyenne	45,3	(39,7-50,9)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	33,7	(29,3-38,2)
	Dans le passé	38,8	(33,4-44,3)
	Modéré (<20)	33,6	(28,5-38,8)
	Gros fumeur	41,1	(34,3-47,9)

5.4.4.9. Maux de tête (MO01_10)

Une question a été posée au sujet des maux de tête: "avez-vous parfois mal de tête".

A Bruxelles, 40% de la population a répondu positivement au moins à cette question. Les femmes se plaignent plus souvent de maux de tête (48%) que les hommes (31%); cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.30) et se vérifie presque pour les tranches spécifiques de 25 à 564 ans.

On n'observe pas de différences à ce sujet suivant les niveaux socio-économiques, mais bien suivant le niveau de santé subjective (moins de maux de tête chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: 52% versus 36%). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.30).

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de maux de tête est plus élevée (44%) mais cette différence n'est pas significative toutefois après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.30. Pourcentage de personnes qui se plaignent de maux de tête (MO01_10), standardisé pour le sexe et l'âge, Bruxelles, Enquête de Santé, Belgique, 1997.


		PROPORTION(%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	29,8	(26,2-33,4)
	Femme	48,2	(44,6-51,8)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	46,5	(36,7-56,3)
	Ecole primaire	39,5	(33,0-46,1)
	Secondaire inférieur	41,9	(36,2-47,6)
	Secondaire supérieur	38,0	(33,3-42,7)
	Supérieur	35,0	(31,3-38,8)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	41,3	(34,6-48,0)
	20.000-30.000	44,1	(38,7-49,5)
	30.000-40.000	37,7	(32,4-43,0)
	40.000-60.000	38,1	(33,5-42,6)
	>60.000	35,1	(29,7-40,4)
SANTÉ SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	33,2	(30,3-36,1)
	Très mauvaise à moyenne	56,2	(50,8-61,7)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	38,9	(34,5-43,4)
	Dans le passé	38,7	(33,4-44,0)
	Modéré (<20)	37,8	(32,7-43,0)
	Gros fumeur	44,0	(37,1-50,8)

5.4.4.10. Score moyen (tiré du SF-36) pour les douleurs physiques (MO26_3)

Pour l'interprétation de ces résultats, il faut se rappeler qu'un score élevé tend à démontrer l'absence de douleurs physiques et/ou de leurs conséquences sur les activités habituelles, tandis qu'un score faible tend à démontrer la présence de douleurs plus ou moins importantes.

A Bruxelles, le score moyen pour les douleurs physiques est de 74 (sur un maximum de 100). Le score moyen chez les femmes (72) est plus bas que chez les hommes (76); cela indique que les femmes ont plus de problèmes de douleur physique ou ressentent plus l'impact de ceux-ci dans leur vie quotidienne. Cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.31). Le score diminue aussi régulièrement avec l'âge.

Figure 5.4.6. Score moyen (tiré du SF-36) pour la douleur physique, par sexe et par âge, Bruxelles, Enquête de Santé, Belgique, 1997.



Différences en fonction des caractéristiques individuelles (Tableau 5.4.21)

Le score pour la douleur est plus bas chez les personnes avec un faible niveau de scolarité (70) pour augmenter ensuite parmi les personnes avec un niveau secondaire supérieur ou plus (76). Ces différences ne sont pas significatives après standardisation pour l'âge et le sexe. De même, le score monte avec le niveau de revenu (68 pour des revenus < 20.000,-FB à 80 pour 60.000,-FB et plus). Ces différences persistent après standardisation pour l'âge et le sexe (entre les revenus < 40.000,-FB et 40.000,-FB ou plus).

On n'observe des différences à ce sujet suivant le niveau de santé subjective (plus de douleurs chez les personnes qui déclarent une mauvaise santé subjective: score de 49 versus 82 chez les autres). Cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Chez les gros fumeurs, la proportion de personnes qui se plaignent de douleurs est plus élevée (score de 72); cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.21. valeur moyenne du score (tiré du SF-36) pour la douleur physique, standardisé pour l'âge et le sexe, Bruxelles, Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		MOYENNE	C.I. 95%
SEXE	Homme	75,0	(73,5-76,5)
	Femme	71,9	(70,4-73,3)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	68,2	(62,9-73,5)
	Ecole primaire	66,2	(63,0-69,3)
	Secondaire inférieur	68,7	(65,8-71,7)
	Secondaire supérieur	76,2	(74,1-78,4)
	Supérieur	76,6	(75,0-78,2)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	73,0	(69,5-76,5)
	20.000-30.000	66,2	(63,6-68,8)
	30.000-40.000	72,0	(69,7-74,4)
	40.000-60.000	75,4	(73,4-77,4)
	>60.000	80,6	(78,5-82,7)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	82,0	(81,0-83,0)
	Très mauvaise à moyenne	49,8	(47,3-52,4)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	76,1	(74,4-77,7)
	Dans le passé	72,7	(70,3-75,1)
	Modéré (<20)	71,9	(69,5-74,4)
	Gros fumeur	66,7	(62,8-70,5)

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

PLAINTES DE SANTE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	N
SEXE					
Homme	5,1	2,0	4,0	8,0	3991
Femme	6,5	3,0	6,0	10,0	4263
Total	5,8	2,0	5,0	9,0	8254
GROUPES AGE					
15-24	4,9	1,0	4,0	7,0	1100
25-34	5,0	1,0	4,0	8,0	1586
35-44	6,1	2,0	5,0	9,0	1572
45-54	6,1	2,0	5,0	9,0	1259
55-64	6,5	3,0	6,0	9,0	1068
65-74	6,7	2,0	5,0	10,0	1044
75 +	7,0	4,0	6,0	10,0	625
Total	5,8	2,0	5,0	9,0	8254
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	7,2	3,0	7,0	10,0	270
Primaire	6,8	2,0	6,0	10,0	1165
Secondaire inférieur	6,4	3,0	6,0	9,0	1408
Secondaire supérieur	5,6	2,0	5,0	9,0	2354
Supérieur	5,2	2,0	4,0	8,0	2724
Total	5,8	2,0	5,0	9,0	7921
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	6,5	2,0	6,0	10,0	590
20.000-30.000	6,6	3,0	6,0	10,0	1631
30.000-40.000	6,2	2,0	5,0	9,0	1933
40.000-60.000	5,4	2,0	4,0	8,0	2627
>60.000	4,9	2,0	4,0	7,0	1097
Total	5,8	2,0	5,0	9,0	7878
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	4,6	1,0	4,0	7,0	5920
Très mauvaise à moyenne	10,0	6,0	10,0	14,0	2028
Total	5,8	2,0	5,0	9,0	7948
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	5,3	2,0	4,0	8,0	3722
Dans le passé	6,1	2,0	5,0	9,0	1926
Modéré (< 20)	5,9	2,0	5,0	9,0	1571
Gros fumeur	7,1	3,0	6,0	11,0	837
Total	5,8	2,0	5,0	9,0	8056
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	5,1	2,0	4,0	8,0	2918
Région Bruxelloise	6,9	3,0	6,0	10,0	2415
Région Wallonne	6,8	3,0	6,0	10,0	2921
Belgique	5,8	2,0	5,0	9,0	8254

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

PLAINTES DE SANTE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	N
SEXE					
Homme	4,4	1,0	3,0	7,0	1448
Femme	5,8	2,0	5,0	9,0	1470
Total	5,1	2,0	4,0	8,0	2918
GROUPES AGE					
15-24	4,3	1,0	3,0	7,0	417
25-34	4,3	1,0	3,0	7,0	580
35-44	5,4	2,0	5,0	8,0	528
45-54	5,3	2,0	4,0	8,0	458
55-64	5,6	2,0	5,0	8,0	401
65-74	5,8	2,0	4,0	9,0	353
75 +	6,4	4,0	6,0	9,0	181
Total	5,1	2,0	4,0	8,0	2918
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	4,6	1,0	3,0	9,0	55
Primaire	6,0	2,0	5,0	9,0	392
Secondaire inférieur	5,6	2,0	5,0	8,0	536
Secondaire supérieur	4,9	1,0	4,0	7,0	964
Supérieur	4,7	1,0	4,0	7,0	862
Total	5,1	2,0	4,0	8,0	2809
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	5,5	1,0	4,0	9,0	97
20.000-30.000	5,8	2,0	5,0	9,0	523
30.000-40.000	5,5	2,0	5,0	8,0	718
40.000-60.000	4,7	1,0	4,0	7,0	1025
>60.000	4,4	1,0	4,0	6,0	391
Total	5,1	2,0	4,0	8,0	2754
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	4,1	1,0	3,0	6,0	2278
Très mauvaise à moyenne	9,4	5,0	9,0	13,0	569
Total	5,1	2,0	4,0	8,0	2847
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	4,6	1,0	4,0	7,0	1375
Dans le passé	5,4	2,0	5,0	8,0	703
Modéré (< 20)	5,2	2,0	4,0	8,0	560
Gros fumeur	5,9	2,0	5,0	9,0	240
Total	5,1	2,0	4,0	8,0	2878

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

PLAINTES DE SANTE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	N
SEXE					
Homme	6,1	2,0	5,0	9,0	1388
Femme	7,5	4,0	7,0	11,0	1533
Total	6,8	3,0	6,0	10,0	2921
GROUPE AGE					
15-24	5,5	2,0	5,0	8,0	393
25-34	6,1	3,0	5,0	9,0	536
35-44	7,3	3,0	6,0	11,0	579
45-54	7,0	3,0	6,0	10,0	433
55-64	7,8	4,0	8,0	11,0	368
65-74	7,6	4,0	7,0	11,0	382
75 +	7,3	4,0	7,0	11,0	230
Total	6,8	3,0	6,0	10,0	2921
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	8,6	5,0	10,0	11,0	99
Primaire	7,7	3,0	7,0	12,0	461
Secondaire inférieur	7,5	4,0	7,0	11,0	531
Secondaire supérieur	7,0	3,0	6,0	10,0	833
Supérieur	5,9	2,0	5,0	8,0	896
Total	6,8	3,0	6,0	10,0	2820
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	7,2	3,0	7,0	11,0	232
20.000-30.000	7,3	4,0	7,0	11,0	635
30.000-40.000	7,1	3,0	6,0	10,0	720
40.000-60.000	6,4	3,0	6,0	9,0	953
>60.000	6,1	3,0	6,0	9,0	285
Total	6,8	3,0	6,0	10,0	2825
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	5,5	2,0	5,0	8,0	1957
Très mauvaise à moyenne	10,5	7,0	10,0	14,0	833
Total	6,9	3,0	6,0	10,0	2790
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	6,2	2,0	6,0	9,0	1329
Dans le passé	7,1	3,0	6,0	11,0	660
Modéré (< 20)	6,8	3,0	6,0	9,0	551
Gros fumeur	8,3	4,0	8,0	12,0	317
Total	6,8	3,0	6,0	10,0	2857

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

PLAINTES DE SANTE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	N
SEXE					
Homme	6,2	2,0	5,0	9,0	1155
Femme	7,5	3,0	7,0	11,0	1260
Total	6,9	3,0	6,0	10,0	2415
GROUPES AGE					
15-24	6,1	3,0	6,0	9,0	290
25-34	6,1	2,0	5,0	9,0	470
35-44	6,8	2,0	6,0	10,0	465
45-54	7,4	3,0	7,0	11,0	368
55-64	7,6	3,0	6,0	12,0	299
65-74	7,7	4,0	7,0	11,0	309
75 +	7,8	3,0	8,0	11,0	214
Total	6,9	3,0	6,0	10,0	2415
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	8,3	4,0	7,0	12,0	116
Primaire	7,8	2,0	6,0	12,0	312
Secondaire inférieur	8,0	4,0	8,0	11,0	341
Secondaire supérieur	6,8	3,0	7,0	10,0	557
Supérieur	5,9	2,0	5,0	9,0	966
Total	6,8	3,0	6,0	10,0	2292
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	6,6	2,0	5,0	10,0	261
20.000-30.000	8,1	4,0	8,0	12,0	473
30.000-40.000	7,3	3,0	6,0	11,0	495
40.000-60.000	6,5	3,0	6,0	10,0	649
>60.000	5,5	2,0	5,0	8,0	421
Total	6,9	3,0	6,0	10,0	2299
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	5,4	2,0	5,0	8,0	1685
Très mauvaise à moyenne	11,2	7,0	11,0	15,0	626
Total	6,9	3,0	6,0	10,0	2311
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	6,3	2,0	5,0	10,0	1018
Dans le passé	6,8	3,0	6,0	10,0	563
Modéré (< 20)	7,3	3,0	7,0	10,0	460
Gros fumeur	8,5	4,0	8,0	12,0	280
Total	6,9	3,0	6,0	10,0	2321

Personnes âgées de 15 ans ou plus

Total ----- N	GROUPES					
	PLAINTES GASTRIQUES	PLAINTES DE FATIGUE	PLAINTES NERVEUSES	PLAINTES THORACIQUE ET CARDIAQUES	PLAINTES DE SYSTEME LOCO-MOTEUR	PLAINTES ALLERGIE
	%	%	%	%	%	%

SEXE						
Homme 3997	27,8	49,5	43,1	28,5	43,3	36,8
Femme 4266	34,6	63,8	52,8	37,0	51,9	33,9
Total 8263	31,2	56,7	48,0	32,8	47,6	35,3
GROUPES AGE						
15-24 1103	31,9	48,9	47,4	26,9	31,7	41,9
25-34 1586	30,3	51,3	47,3	24,3	34,6	35,9
35-44 1572	32,5	60,0	50,2	35,4	47,3	35,6
45-54 1262	33,2	56,3	48,4	34,4	53,0	31,3
55-64 1068	30,4	61,6	49,6	36,2	65,2	35,1
65-74 1046	27,0	65,1	44,3	44,7	64,6	34,1
75 + 626	29,9	67,3	44,5	43,2	67,5	26,5
Total 8263	31,2	56,7	48,0	32,8	47,6	35,3
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme 271	39,9	66,1	49,3	38,1	60,4	33,1
Primaire 1167	28,9	62,1	50,0	41,5	58,9	35,5
Secondaire inférieur 1410	33,5	61,5	50,7	34,9	55,1	39,3
Secondaire supérieur 2358	30,3	54,0	49,4	32,0	46,1	33,1
Supérieur 2724	31,0	53,9	44,5	29,2	40,1	36,0
Total 7930	31,2	56,6	48,0	32,8	47,5	35,5
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000 591	34,3	59,0	46,2	42,2	56,2	32,0
20.000-30.000 1635	33,8	63,9	53,2	37,2	55,3	34,8

30.000-40.000	31,9	60,6	49,7	35,8	50,1	34,1
1934						
40.000-60.000	29,4	52,9	46,8	28,8	44,5	37,2
2629						
>60.000	30,4	50,7	41,8	28,4	38,0	33,5
1097						
Total	31,3	57,0	48,0	32,9	47,8	35,2
7886						
SANTÉ SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	26,3	48,9	42,6	25,1	39,2	33,0
5923						
Très mauvaise à moyenne	49,1	85,2	68,4	60,0	78,4	44,6
2030						
Total	31,2	56,8	48,2	32,7	47,7	35,5
7953						
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	29,6	53,1	43,7	29,6	43,4	32,5
3725						
Dans le passé	31,0	57,2	49,5	36,4	50,9	38,6
1926						
Modéré (< 20)	32,1	59,2	51,3	32,5	49,0	36,5
1574						
Gros fumeur	36,6	64,5	56,1	40,0	53,8	38,3
838						
Total	31,2	56,5	47,9	32,8	47,4	35,3
8063						
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	28,3	49,3	43,7	23,8	40,2	36,7
2921						
Région Bruxelloise	37,7	67,3	51,5	42,9	55,7	34,9
2418						
Région Wallonne	34,4	66,6	54,6	45,8	58,3	33,0
2924						
Belgique	31,2	56,7	48,0	32,8	47,6	35,3
8263						

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

GROUPES

Total

N	PLAINTES GASTRIQUES	PLAINTES DE FATIGUE	PLAINTES NERVEUSES	PLAINTES THORACIQUE ET SYSTEME	PLAINTES DE	PLAINTES ALLERGIE
---	------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-------------	-------------------

	CARDIAQUES			LOCO-MOTEUR		
	%	%	%	%	%	%
SEXE						
1450 Homme	23,9	42,5	38,8	21,1	36,2	38,5
1471 Femme	32,8	56,3	48,8	26,5	44,3	34,9
Total 2921	28,3	49,3	43,7	23,8	40,2	36,7
GROUPES AGE						
417 15-24	32,5	39,9	44,7	18,8	21,7	42,3
580 25-34	26,9	43,7	43,6	15,4	25,7	37,0
528 35-44	29,0	53,7	45,2	26,2	40,1	37,8
460 45-54	30,9	48,0	43,1	25,2	48,1	31,1
401 55-64	23,5	56,2	45,0	27,0	59,9	37,4
353 65-74	22,5	56,1	38,7	36,9	59,1	35,3
182 75 +	30,6	66,7	42,2	34,3	59,8	33,2
Total 2921	28,3	49,3	43,7	23,8	40,2	36,7
NIVEAU INSTRUCTION						
55 Pas de diplôme	26,7	40,0	37,6	22,7	40,0	30,1
393 Primaire	25,0	57,9	44,3	33,2	53,3	39,6
536 Secondaire inférieur	29,8	54,0	46,2	24,0	49,5	38,2
966 Secondaire supérieur	27,8	47,2	44,3	23,1	38,6	33,7
862 Supérieur	29,3	45,7	41,5	20,9	31,4	39,2
Total 2812	28,3	49,1	43,7	23,8	40,0	36,9
REVENU EQUIVALENT (FB)						
97 < 20.000	33,2	50,3	32,2	29,3	51,2	26,2
524 20.000-30.000	30,3	57,7	49,2	26,9	51,1	35,7
718 30.000-40.000	30,0	53,0	44,5	27,7	42,4	34,4
1026 40.000-60.000	26,4	45,5	43,7	20,9	36,3	39,3
391 >60.000	27,8	44,6	38,3	20,5	31,5	35,7

Total 2756	28,4	49,5	43,7	23,8	40,3	36,5
SANTÉ SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne 2279	23,7	42,0	39,1	17,5	32,1	34,9
Très mauvaise à moyenne 570	48,2	82,1	65,8	51,4	75,9	44,6
Total 2849	28,2	49,4	44,0	23,7	40,1	36,6
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais 1376	26,6	47,0	40,8	21,0	36,8	32,9
Dans le passé 703	29,0	50,3	45,2	28,2	44,2	42,3
Modéré (< 20) 561	30,7	50,3	46,6	22,0	40,0	38,0
Gros fumeur 241	30,1	53,8	47,7	30,3	45,2	37,8
Total 2881	28,3	49,1	43,6	23,8	40,0	36,6

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

N	GROUPES					
	PLAINTES GASTRIQUES	PLAINTES DE FATIGUE	PLAINTES NERVEUSES	PLAINTES THORACIQUE ET CARDIAQUES	PLAINTES DE SYSTEME LOCO-MOTEUR	PLAINTES ALLERGIE
	%	%	%	%	%	%
Total						
SEXE						
1389 Homme	32,1	58,7	50,1	39,4	54,1	33,9
1535 Femme	36,6	74,3	58,8	51,9	62,5	32,1
Total 2924	34,4	66,6	54,6	45,8	58,3	33,0
GROUPES AGE						
394 15-24	29,3	59,0	51,7	36,9	44,0	40,9
536 25-34	33,0	62,5	54,4	37,6	49,1	33,5
579 35-44	37,7	69,0	58,6	49,8	58,7	32,1
434 45-54	37,2	68,3	57,2	48,1	59,0	30,4
368 55-64	40,8	72,3	55,8	52,2	75,7	32,0
383 65-74	31,1	74,8	50,7	54,5	71,6	33,1
230 75 +	26,2	64,3	42,6	52,1	77,6	19,2
Total 2924	34,4	66,6	54,6	45,8	58,3	33,0
NIVEAU INSTRUCTION						
100 Pas de diplôme	45,7	82,0	61,3	44,6	74,5	35,4
462 Primaire	32,8	67,4	57,2	54,8	66,8	28,6
531 Secondaire inférieur	38,6	71,5	55,4	50,1	62,9	42,6
834 Secondaire supérieur	34,8	65,1	59,2	47,4	59,8	30,9
896 Supérieur	31,3	64,3	49,2	39,8	51,1	31,2

Total	34,4	66,9	54,8	46,0	58,6	33,0
2823						
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	32,8	63,7	55,6	51,0	61,5	36,0
232						
20.000-30.000	36,8	67,8	57,3	48,1	59,6	31,7
638						
30.000-40.000	33,1	70,9	56,3	45,9	59,8	33,8
720						
40.000-60.000	33,6	64,9	52,7	42,1	57,5	32,9
953						
>60.000	36,4	62,5	49,9	45,9	51,5	31,9
285						
Total	34,4	66,7	54,6	45,5	58,3	33,0
2828						
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	29,6	59,4	49,1	37,8	50,7	29,4
1958						
Très mauvaise à moyenne	49,0	88,0	70,2	67,7	81,8	44,9
834						
Total	34,8	67,1	54,8	45,9	59,1	33,5
2792						
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	32,7	61,8	49,0	42,7	53,2	31,5
1330						
Dans le passé	33,6	67,5	57,4	50,4	63,3	32,0
660						
Modéré (< 20)	31,8	69,6	57,6	46,2	61,1	33,7
551						
Gros fumeur	45,0	76,1	65,7	49,9	63,2	39,3
317						
Total	34,2	66,4	54,6	46,0	58,3	33,0
2858						

 Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

Total N	GROUPES					
	PLAINTES	PLAINTES DE	PLAINTES	PLAINTES	PLAINTES DE	PLAINTES ALLERGIE
	GASTRIQUES	FATIGUE	NERVEUSES	THORACIQUE ET CARDIAQUES	SYSTEME LOCO-MOTEUR	
	%	%	%	%	%	%
SEXE						
Homme 1158	37,2	62,0	46,5	37,3	50,7	35,7
Femme 1260	38,1	71,9	56,0	47,9	60,3	34,1
Total 2418	37,7	67,3	51,5	42,9	55,7	34,9
GROUPES AGE						
15-24 292	37,5	66,6	48,4	39,6	47,6	43,3
25-34 470	41,1	61,8	47,4	36,2	43,6	36,6
35-44 465	35,7	67,1	52,5	41,2	51,6	34,1
45-54 368	34,2	69,2	52,5	46,4	64,2	36,2
55-64 299	43,0	63,9	59,9	47,5	67,5	30,1
65-74 310	34,8	75,8	50,0	50,3	67,8	31,7
75 + 214	35,4	75,5	55,3	50,3	68,9	21,8
Total 2418	37,7	67,3	51,5	42,9	55,7	34,9
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme 116	48,6	74,9	44,6	48,5	64,5	33,5
Primaire 312	36,9	68,0	57,4	44,3	63,5	35,1
Secondaire inférieur 343	40,4	76,0	64,6	52,7	64,1	32,3
Secondaire supérieur 558	33,8	68,0	53,0	45,9	55,1	35,7
Supérieur 966	37,0	61,9	45,1	36,2	48,0	35,3

Total	37,4	66,9	51,2	42,7	55,0	34,8
2295						
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	39,1	61,7	46,9	42,5	52,5	32,1
262						
20.000-30.000	41,0	80,4	58,9	51,5	61,9	40,0
473						
30.000-40.000	39,8	66,8	55,5	46,2	60,4	33,6
496						
40.000-60.000	36,1	62,7	47,5	37,1	55,6	39,1
650						
>60.000	33,0	60,4	45,0	37,4	46,5	26,1
421						
Total	37,8	67,0	51,2	43,0	55,9	34,9
2302						
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	32,7	60,1	44,5	34,2	48,4	32,7
1686						
Très mauvaise à moyenne	53,3	88,8	73,4	70,1	77,0	43,2
626						
Total	37,9	67,3	51,8	43,2	55,6	35,4
2312						
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	37,8	61,6	45,0	39,1	52,1	33,2
1019						
Dans le passé	35,4	67,4	51,5	43,2	53,7	36,4
563						
Modéré (< 20)	39,6	75,4	56,8	46,6	60,4	36,6
462						
Gros fumeur	39,6	76,5	63,6	51,8	63,2	37,3
280						
Total	37,9	67,6	51,2	43,1	55,6	35,1
2324						

 Personnes âgées de 15 ans ou plus

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO26_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

DOULEUR PHYSIQUE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	Total

SEXE					
Homme	79,8	62,0	84,0	100,0	3925
Femme	74,2	61,0	80,0	100,0	4166
Total	77,0	62,0	84,0	100,0	8091
GROUPES AGE					
15-24	81,9	72,0	84,0	100,0	1078
25-34	81,7	72,0	84,0	100,0	1566
35-44	77,0	62,0	84,0	100,0	1545
45-54	76,2	62,0	84,0	100,0	1228
55-64	73,3	52,0	74,0	100,0	1045
65-74	69,5	42,0	74,0	100,0	1024
75 +	64,5	41,0	72,0	100,0	605
Total	77,0	62,0	84,0	100,0	8091
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	69,8	51,0	74,0	100,0	258
Primaire	71,5	51,0	74,0	100,0	1142
Secondaire inférieur	74,1	52,0	80,0	100,0	1377
Secondaire supérieur	78,1	62,0	84,0	100,0	2323
Supérieur	79,7	62,0	84,0	100,0	2662
Total	76,9	62,0	84,0	100,0	7762
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	73,3	51,0	84,0	100,0	559
20.000-30.000	73,1	52,0	74,0	100,0	1597
30.000-40.000	74,3	61,0	80,0	100,0	1901
40.000-60.000	79,0	62,0	84,0	100,0	2586
>60.000	82,2	72,0	84,0	100,0	1079
Total	76,8	62,0	84,0	100,0	7722
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	83,6	72,0	84,0	100,0	5807
Très mauvaise à moyenne	53,5	41,0	51,0	72,0	1993
Total	77,0	62,0	84,0	100,0	7800
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	78,4	62,0	84,0	100,0	3657
Dans le passé	75,6	62,0	84,0	100,0	1894
Modéré (< 20)	77,4	62,0	84,0	100,0	1540
Gros fumeur	73,6	52,0	80,0	100,0	815
Total	77,1	62,0	84,0	100,0	7906
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	79,2	62,0	84,0	100,0	2904
Région Bruxelloise	74,0	61,0	84,0	100,0	2359
Région Wallonne	73,9	52,0	80,0	100,0	2828
Belgique	77,0	62,0	84,0	100,0	8091

Personnes âgées de 15 ans ou plus					

REGIO: 1 Région Flamande

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO26_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

DOULEUR PHYSIQUE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	Total
SEXE					
Homme	82,1	72,0	84,0	100,0	1445
Femme	76,3	62,0	84,0	100,0	1459
Total	79,2	62,0	84,0	100,0	2904
GROUPES AGE					
15-24	81,9	72,0	84,0	100,0	417
25-34	83,8	72,0	100,0	100,0	577
35-44	79,2	62,0	84,0	100,0	525
45-54	77,5	62,0	84,0	100,0	455
55-64	76,9	62,0	84,0	100,0	399
65-74	73,6	51,0	84,0	100,0	350
75 +	69,7	51,0	74,0	100,0	181
Total	79,2	62,0	84,0	100,0	2904
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	78,6	62,0	84,0	100,0	55
Primaire	75,8	62,0	84,0	100,0	389
Secondaire inférieur	76,1	62,0	84,0	100,0	534
Secondaire supérieur	80,2	62,0	84,0	100,0	961
Supérieur	80,8	72,0	84,0	100,0	857
Total	79,1	62,0	84,0	100,0	2796
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	73,6	60,0	84,0	100,0	95
20.000-30.000	75,5	62,0	80,0	100,0	522
30.000-40.000	76,4	62,0	84,0	100,0	712
40.000-60.000	80,7	62,0	84,0	100,0	1021
>60.000	83,6	74,0	84,0	100,0	390
Total	78,9	62,0	84,0	100,0	2740
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	84,4	74,0	100,0	100,0	2266
Très mauvaise à moyenne	55,3	41,0	52,0	74,0	566
Total	79,1	62,0	84,0	100,0	2832
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	80,3	62,0	84,0	100,0	1369
Dans le passé	77,6	62,0	84,0	100,0	701
Modéré (< 20)	79,4	62,0	84,0	100,0	555
Gros fumeur	77,7	62,0	84,0	100,0	240
Total	79,3	62,0	84,0	100,0	2865

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO26_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

DOULEUR PHYSIQUE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	Total
SEXE					
Homme	76,6	62,0	84,0	100,0	1350
Femme	71,2	51,0	74,0	100,0	1478
Total	73,9	52,0	80,0	100,0	2828
GROUPES AGE					
15-24	82,7	72,0	84,0	100,0	373
25-34	79,2	62,0	84,0	100,0	525
35-44	72,9	54,0	74,0	100,0	562
45-54	74,9	62,0	84,0	100,0	419
55-64	67,2	51,0	72,0	84,0	358
65-74	64,1	41,0	62,0	100,0	370
75 +	55,9	32,0	61,0	72,0	221
Total	73,9	52,0	80,0	100,0	2828
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	62,0	41,0	62,0	80,0	92
Primaire	65,6	41,0	62,0	100,0	445
Secondaire inférieur	71,7	51,0	74,0	100,0	512
Secondaire supérieur	73,8	61,0	80,0	100,0	817
Supérieur	78,5	62,0	84,0	100,0	864
Total	73,7	52,0	80,0	100,0	2730
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	71,2	51,0	74,0	100,0	212
20.000-30.000	71,1	51,0	74,0	100,0	612
30.000-40.000	71,6	51,0	74,0	100,0	703
40.000-60.000	76,4	62,0	84,0	100,0	927
>60.000	78,9	70,0	84,0	100,0	282
Total	73,9	52,0	80,0	100,0	2736
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	82,2	72,0	84,0	100,0	1893
Très mauvaise à moyenne	52,5	41,0	51,0	72,0	814
Total	74,1	61,0	84,0	100,0	2707
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	75,4	61,0	84,0	100,0	1292
Dans le passé	72,7	52,0	74,0	100,0	640
Modéré (< 20)	75,1	61,0	84,0	100,0	535
Gros fumeur	68,4	42,0	74,0	100,0	304
Total	73,9	52,0	80,0	100,0	2771

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO26_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

DOULEUR PHYSIQUE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	Total

SEXE					
Homme	76,0	62,0	84,0	100,0	1130
Femme	72,2	52,0	74,0	100,0	1229
Total	74,0	61,0	84,0	100,0	2359
GROUPES AGE					
15-24	79,7	62,0	84,0	100,0	288
25-34	77,3	62,0	84,0	100,0	464
35-44	77,0	62,0	84,0	100,0	458
45-54	71,3	51,0	80,0	100,0	354
55-64	68,4	41,0	72,0	100,0	288
65-74	67,0	41,0	62,0	100,0	304
75 +	67,0	41,0	74,0	100,0	203
Total	74,0	61,0	84,0	100,0	2359
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	69,5	41,0	72,0	100,0	111
Primaire	66,6	41,0	72,0	100,0	308
Secondaire inférieur	68,7	42,0	72,0	100,0	331
Secondaire supérieur	76,4	62,0	84,0	100,0	545
Supérieur	77,7	62,0	84,0	100,0	941
Total	74,2	61,0	84,0	100,0	2236
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	77,0	61,0	84,0	100,0	252
20.000-30.000	67,5	41,0	72,0	100,0	463
30.000-40.000	71,4	51,0	74,0	100,0	486
40.000-60.000	76,0	62,0	84,0	100,0	638
>60.000	81,2	72,0	84,0	100,0	407
Total	74,2	61,0	84,0	100,0	2246
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	82,4	72,0	84,0	100,0	1648
Très mauvaise à moyenne	49,3	31,0	41,0	62,0	613
Total	74,0	61,0	84,0	100,0	2261
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	76,3	62,0	84,0	100,0	996
Dans le passé	72,0	52,0	74,0	100,0	553
Modéré (< 20)	73,3	61,0	80,0	100,0	450
Gros fumeur	70,7	51,0	74,0	100,0	271
Total	74,1	61,0	84,0	100,0	2270

Personnes âgées de 15 ans ou plus