

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES			Total
	1-2X/sem.	3-5X/sem.	6-7X/sem.	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	1,6	12,2	86,2	4880
Femme	1,5	11,1	87,4	5139
Total	1,6	11,6	86,8	10019
GROUPES AGE				
0-14	,7	7,8	91,5	1564
15-24	2,8	13,3	83,9	1126
25-34	2,1	18,0	79,9	1631
35-44	2,5	14,5	83,0	1598
45-54	,9	9,7	89,4	1279
55-64	,7	5,7	93,6	1084
65-74	,6	8,9	90,5	1068
75 +	,5	6,6	92,9	669
Total	1,6	11,6	86,8	10019
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	1,2	8,5	90,4	346
Primaire	1,7	8,7	89,6	1277
Secondaire inférieur	2,5	14,0	83,5	1637
Secondaire supérieur	1,4	11,4	87,2	2894
Supérieur	1,2	11,0	87,8	3446
Total	1,5	11,3	87,1	9600
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	2,7	8,8	88,5	781
20.000-30.000	3,1	11,3	85,6	2000
30.000-40.000	,9	10,7	88,4	2326
40.000-60.000	1,0	11,8	87,2	3197
>60.000	1,4	14,3	84,2	1263
Total	1,6	11,6	86,8	9567
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	1,4	12,8	85,9	5865
Très mauvaise à moyenne	2,5	10,1	87,4	2000
Total	1,6	12,2	86,2	7865
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	1,3	11,2	87,5	3693
Dans le passé	1,3	10,1	88,6	1911
Modéré (< 20)	2,6	15,3	82,1	1551
Gros fumeur	3,1	15,7	81,2	821
Total	1,7	12,2	86,0	7976
REGION DE RESIDENCE				
Région Flamande	1,1	13,3	85,7	3447
Région Bruxelloise	2,8	11,6	85,7	2991
Wallonie	2,1	8,8	89,2	3581
Belgique	1,6	11,6	86,8	10019

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES			Total
	1-2X/sem.	3-5X/sem.	6-7X/sem.	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	1,3	13,9	84,8	1706
Femme	,8	12,6	86,5	1741
Total	1,1	13,3	85,7	3447
GROUPE AGE				
0-14	,4	8,1	91,5	498
15-24	2,0	15,0	82,9	422
25-34	1,5	19,3	79,2	583
35-44	1,7	17,5	80,8	527
45-54	,2	11,0	88,7	462
55-64	,9	6,4	92,6	404
65-74	,1	12,0	87,8	359
75 +	,0	8,2	91,8	192
Total	1,1	13,3	85,7	3447
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	,0	4,4	95,6	63
Primaire	,9	10,2	88,8	422
Secondaire inférieur	1,5	17,6	80,9	596
Secondaire supérieur	1,0	12,5	86,5	1146
Supérieur	,9	12,1	87,0	1100
Total	1,0	12,9	86,1	3327
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	,6	6,2	93,3	118
20.000-30.000	2,1	11,0	86,9	599
30.000-40.000	,6	13,0	86,4	836
40.000-60.000	,8	13,6	85,6	1258
>60.000	,8	17,2	81,9	445
Total	1,0	13,2	85,7	3256
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	1,0	14,3	84,7	2256
Très mauvaise à moyenne	2,2	11,3	86,5	564
Total	1,2	13,7	85,1	2820
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	,5	12,6	86,9	1365
Dans le passé	1,0	11,0	88,0	700
Modéré (< 20)	2,6	17,3	80,1	554
Gros fumeur	2,7	20,7	76,6	233
Total	1,2	13,9	84,9	2852

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES			Total
	1-2X/sem.	3-5X/sem.	6-7X/sem.	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	2,9	11,3	85,8	1447
Femme	2,7	11,8	85,5	1544
Total	2,8	11,6	85,7	2991
GROUPE AGE				
0-14	,5	5,2	94,2	464
15-24	4,7	19,8	75,5	306
25-34	3,8	18,7	77,6	493
35-44	3,9	13,0	83,2	485
45-54	3,3	8,7	88,0	379
55-64	1,1	6,1	92,9	309
65-74	1,8	6,3	91,9	322
75 +	,8	5,7	93,5	233
Total	2,8	11,6	85,7	2991
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	1,6	4,5	93,9	163
Primaire	4,4	8,1	87,5	360
Secondaire inférieur	4,1	13,0	82,9	420
Secondaire supérieur	2,4	12,3	85,3	698
Supérieur	2,1	12,2	85,7	1187
Total	2,7	11,3	86,0	2828
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	4,6	15,3	80,1	366
20.000-30.000	4,6	9,8	85,6	608
30.000-40.000	1,3	12,5	86,2	598
40.000-60.000	1,3	11,3	87,3	784
>60.000	2,5	10,4	87,1	491
Total	2,8	11,6	85,6	2847
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	2,7	13,6	83,8	1665
Très mauvaise à moyenne	4,8	10,4	84,8	610
Total	3,2	12,8	84,0	2275
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	1,5	11,1	87,4	1006
Dans le passé	4,2	12,9	83,0	555
Modéré (< 20)	5,2	15,0	79,8	451
Gros fumeur	4,4	15,0	80,7	276
Total	3,2	12,8	84,0	2288

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES			Total
	1-2X/sem.	3-5X/sem.	6-7X/sem.	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	1,8	9,4	88,8	1727
Femme	2,3	8,2	89,5	1854
Total	2,1	8,8	89,2	3581
GROUPE AGE				
0-14	1,3	8,1	90,7	602
15-24	3,5	8,3	88,2	398
25-34	2,5	15,4	82,1	555
35-44	3,5	9,7	86,8	586
45-54	1,5	7,4	91,1	438
55-64	,1	4,0	95,9	371
65-74	,9	5,1	94,0	387
75 +	1,2	4,7	94,1	244
Total	2,1	8,8	89,2	3581
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	1,9	14,8	83,3	120
Primaire	2,1	6,4	91,5	495
Secondaire inférieur	3,7	8,1	88,2	621
Secondaire supérieur	2,1	8,9	89,0	1050
Supérieur	1,2	8,8	89,9	1159
Total	2,1	8,7	89,3	3445
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	3,2	6,9	89,8	297
20.000-30.000	4,0	12,3	83,7	793
30.000-40.000	1,1	7,0	91,9	892
40.000-60.000	1,2	8,6	90,2	1155
>60.000	2,5	8,5	89,0	327
Total	2,1	8,9	89,0	3464
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	1,7	9,3	88,9	1944
Très mauvaise à moyenne	2,2	8,6	89,2	826
Total	1,9	9,1	89,0	2770
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	2,9	8,6	88,5	1322
Dans le passé	1,0	7,6	91,4	656
Modéré (< 20)	1,7	11,8	86,5	546
Gros fumeur	3,3	8,7	88,0	312
Total	2,3	9,0	88,7	2836

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU07_1)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PETITS DEJEUNERS			Total
	1-2X/sem.	3-5X/sem.	6-7X/sem.	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	6,7	5,9	87,3	4359
Femme	4,9	5,4	89,8	4699
Total	5,8	5,6	88,6	9058
GROUPE AGE				
0-14	3,3	4,4	92,4	1522
15-24	11,0	13,1	76,0	980
25-34	10,4	8,9	80,6	1409
35-44	7,6	5,6	86,7	1380
45-54	3,8	3,7	92,6	1122
55-64	2,0	1,4	96,6	992
65-74	,6	1,1	98,3	1004
75 +	,2	,4	99,4	649
Total	5,8	5,6	88,6	9058
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	4,3	7,9	87,8	313
Primaire	4,7	2,8	92,6	1131
Secondaire inférieur	5,4	6,1	88,5	1451
Secondaire supérieur	7,1	5,9	87,0	2565
Supérieur	5,1	5,9	89,0	3223
Total	5,8	5,6	88,6	8683
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	7,0	4,2	88,8	680
20.000-30.000	4,8	5,6	89,6	1751
30.000-40.000	5,3	5,8	88,9	2096
40.000-60.000	6,2	5,9	88,0	2927
>60.000	7,6	6,4	86,0	1177
Total	5,9	5,8	88,3	8631
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	6,6	6,0	87,4	5255
Très mauvaise à moyenne	6,0	4,2	89,8	1760
Total	6,5	5,6	87,9	7015
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	4,3	4,9	90,8	3450
Dans le passé	5,4	4,0	90,6	1779
Modéré (< 20)	11,3	8,9	79,8	1317
Gros fumeur	11,4	9,3	79,2	554
Total	6,4	5,8	87,8	7100
REGION DE RESIDENCE				
Région Flamande	5,5	5,5	88,9	3196
Région Bruxelloise	7,1	5,4	87,5	2709
Wallonie	5,8	6,0	88,2	3153
Belgique	5,8	5,6	88,6	9058

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PETITS DEJEUNERS			Total
	1-2X/sem.	3-5X/sem.	6-7X/sem.	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	6,3	5,4	88,3	1557
Femme	4,8	5,6	89,6	1639
Total	5,5	5,5	88,9	3196
GROUPES AGE				
0-14	3,6	4,7	91,7	493
15-24	11,1	13,3	75,6	373
25-34	10,1	8,8	81,0	516
35-44	7,6	4,4	87,9	471
45-54	2,1	4,1	93,7	434
55-64	1,5	1,3	97,3	379
65-74	,5	,0	99,5	341
75 +	,0	,3	99,7	189
Total	5,5	5,5	88,9	3196
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	2,1	15,5	82,3	58
Primaire	5,1	2,1	92,8	394
Secondaire inférieur	4,7	4,5	90,8	552
Secondaire supérieur	8,0	6,0	86,0	1036
Supérieur	3,7	5,9	90,5	1049
Total	5,5	5,5	89,0	3089
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	2,5	2,7	94,7	111
20.000-30.000	4,3	5,5	90,2	537
30.000-40.000	5,1	6,3	88,6	779
40.000-60.000	6,2	5,2	88,6	1167
>60.000	7,3	6,7	86,0	421
Total	5,7	5,7	88,7	3015
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	6,3	5,6	88,1	2077
Très mauvaise à moyenne	4,9	3,4	91,7	516
Total	6,0	5,2	88,7	2593
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	3,7	5,0	91,3	1299
Dans le passé	5,7	3,7	90,6	666
Modéré (< 20)	11,6	8,0	80,4	482
Gros fumeur	8,4	8,6	83,0	168
Total	6,0	5,5	88,5	2615

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PETITS DEJEUNERS			Total
	1-2X/sem.	3-5X/sem.	6-7X/sem.	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	8,2	6,2	85,6	1296
Femme	6,0	4,7	89,3	1413
Total	7,1	5,4	87,5	2709
GROUPE AGE				
0-14	2,1	5,0	92,9	448
15-24	8,4	9,7	81,9	270
25-34	13,8	7,6	78,6	445
35-44	10,5	7,6	81,9	421
45-54	8,6	4,4	87,0	321
55-64	2,1	2,3	95,6	277
65-74	1,5	1,0	97,6	300
75 +	1,2	,0	98,8	227
Total	7,1	5,4	87,5	2709
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	,5	,0	99,5	150
Primaire	5,2	3,3	91,5	311
Secondaire inférieur	7,0	7,2	85,7	370
Secondaire supérieur	9,4	4,3	86,3	618
Supérieur	7,7	7,2	85,1	1111
Total	7,2	5,4	87,4	2560
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	5,4	6,3	88,2	329
20.000-30.000	6,0	4,8	89,3	537
30.000-40.000	10,3	3,2	86,5	537
40.000-60.000	7,4	7,1	85,5	712
>60.000	6,7	6,1	87,2	459
Total	7,3	5,5	87,3	2574
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	8,3	5,9	85,8	1500
Très mauvaise à moyenne	7,7	2,8	89,4	533
Total	8,1	5,2	86,7	2033
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	7,5	3,5	89,1	941
Dans le passé	6,3	4,8	88,9	520
Modéré (< 20)	10,7	7,9	81,4	383
Gros fumeur	13,1	10,1	76,8	200
Total	8,4	5,3	86,3	2044

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PETITS DEJEUNERS			Total
	1-2X/sem.	3-5X/sem.	6-7X/sem.	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	7,0	6,8	86,2	1506
Femme	4,7	5,2	90,2	1647
Total	5,8	6,0	88,2	3153
GROUPES AGE				
0-14	3,0	3,7	93,3	581
15-24	11,5	13,8	74,7	337
25-34	9,7	9,6	80,7	448
35-44	6,7	7,3	86,0	488
45-54	6,0	2,4	91,7	367
55-64	3,1	1,5	95,4	336
65-74	,4	2,8	96,7	363
75 +	,0	,8	99,2	233
Total	5,8	6,0	88,2	3153
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	9,5	6,0	84,6	105
Primaire	3,6	3,8	92,6	426
Secondaire inférieur	6,5	8,6	84,9	529
Secondaire supérieur	4,5	6,0	89,5	911
Supérieur	6,6	5,5	87,9	1063
Total	5,7	6,0	88,3	3034
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	11,6	4,0	84,4	240
20.000-30.000	5,2	5,9	88,9	677
30.000-40.000	4,2	5,7	90,1	780
40.000-60.000	5,7	7,0	87,3	1048
>60.000	9,1	5,6	85,3	297
Total	6,0	6,1	88,0	3042
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	6,8	6,9	86,4	1678
Très mauvaise à moyenne	6,8	5,7	87,4	711
Total	6,8	6,6	86,7	2389
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	4,4	5,2	90,5	1210
Dans le passé	4,6	4,3	91,1	593
Modéré (< 20)	10,9	11,0	78,1	452
Gros fumeur	15,7	10,3	74,1	186
Total	6,6	6,5	86,9	2441

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU08_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES			Total
	Moins que hebdomadaire	Au moins hebdomadaire	Quotidien ou presque	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	14,3	23,2	62,5	4912
Femme	15,3	27,9	56,7	5165
Total	14,8	25,6	59,6	10077
GROUPES AGE				
0-14	9,4	10,2	80,4	1595
15-24	3,8	19,3	76,9	1141
25-34	7,0	27,2	65,8	1630
35-44	13,1	30,0	56,9	1603
45-54	23,0	30,7	46,3	1285
55-64	28,6	31,8	39,6	1088
65-74	27,2	33,2	39,5	1067
75 +	28,9	31,4	39,8	668
Total	14,8	25,6	59,6	10077
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	24,5	19,1	56,5	347
Primaire	18,9	24,9	56,2	1280
Secondaire inférieur	15,3	22,2	62,5	1649
Secondaire supérieur	13,2	24,1	62,7	2919
Supérieur	13,8	29,5	56,7	3460
Total	14,7	25,6	59,6	9655
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	13,5	25,5	61,0	784
20.000-30.000	15,9	22,3	61,8	2023
30.000-40.000	14,8	24,2	60,9	2343
40.000-60.000	13,9	26,2	59,9	3206
>60.000	15,3	31,0	53,6	1272
Total	14,7	25,5	59,8	9628
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	13,8	28,9	57,3	5887
Très mauvaise à moyenne	21,9	27,2	50,9	2015
Total	15,6	28,5	55,9	7902
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	14,6	30,5	54,9	3692
Dans le passé	17,2	29,0	53,8	1918
Modéré (< 20)	15,0	27,1	58,0	1562
Gros fumeur	16,6	21,7	61,7	834
Total	15,5	28,5	56,0	8006
REGION DE RESIDENCE				
Région Flamande	13,4	26,2	60,4	3467
Région Bruxelloise	16,0	27,4	56,6	3009
Wallonie	16,9	23,9	59,2	3601
Belgique	14,8	25,6	59,6	10077

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU08_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES			Total
	Moins que hebdomadaire	Au moins hebdomadaire	Quotidien ou presque	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	13,4	23,5	63,2	1719
Femme	13,5	28,9	57,6	1748
Total	13,4	26,2	60,4	3467
GROUPES AGE				
0-14	10,3	10,1	79,5	510
15-24	2,2	21,6	76,2	426
25-34	5,9	26,7	67,3	585
35-44	11,0	31,2	57,7	528
45-54	22,7	30,5	46,8	464
55-64	24,6	30,5	45,0	404
65-74	25,6	34,0	40,3	360
75 +	22,2	37,2	40,6	190
Total	13,4	26,2	60,4	3467
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	25,2	19,5	55,3	63
Primaire	17,9	26,3	55,8	419
Secondaire inférieur	13,7	20,7	65,7	599
Secondaire supérieur	11,5	26,4	62,1	1154
Supérieur	12,8	29,6	57,6	1110
Total	13,3	26,3	60,4	3345
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	18,9	26,6	54,5	117
20.000-30.000	13,8	21,6	64,6	601
30.000-40.000	13,1	23,6	63,4	842
40.000-60.000	11,9	27,5	60,5	1264
>60.000	15,3	32,0	52,8	454
Total	13,3	26,1	60,6	3278
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	13,1	29,2	57,6	2268
Très mauvaise à moyenne	18,1	25,6	56,3	565
Total	14,0	28,6	57,4	2833
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	12,5	31,3	56,2	1365
Dans le passé	16,0	28,7	55,3	702
Modéré (< 20)	12,1	27,1	60,8	556
Gros fumeur	15,2	22,4	62,4	240
Total	13,5	29,0	57,5	2863

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU08_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES			Total
	Moins que hebdomadaire	Au moins hebdomadaire	Quotidien ou presque	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	14,7	27,0	58,4	1455
Femme	17,2	27,8	55,0	1554
Total	16,0	27,4	56,6	3009
GROUPES AGE				
0-14	6,7	18,8	74,6	468
15-24	2,3	16,1	81,5	311
25-34	7,1	28,8	64,1	494
35-44	15,5	31,8	52,8	488
45-54	25,3	36,0	38,7	380
55-64	31,2	34,8	34,1	312
65-74	28,1	26,0	45,8	321
75 +	34,7	29,3	36,1	235
Total	16,0	27,4	56,6	3009
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	22,5	15,5	62,0	164
Primaire	15,8	26,3	57,9	366
Secondaire inférieur	12,7	23,4	63,9	424
Secondaire supérieur	17,2	23,1	59,6	702
Supérieur	15,0	34,2	50,8	1189
Total	15,9	27,4	56,7	2845
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	8,7	25,7	65,5	369
20.000-30.000	16,9	25,3	57,8	624
30.000-40.000	17,2	25,9	56,8	600
40.000-60.000	13,9	26,7	59,4	781
>60.000	19,1	33,9	46,9	492
Total	15,5	27,3	57,2	2866
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	15,3	29,8	54,9	1671
Très mauvaise à moyenne	23,9	28,1	47,9	620
Total	17,5	29,4	53,1	2291
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	17,0	30,5	52,5	1007
Dans le passé	20,5	31,4	48,1	561
Modéré (< 20)	17,4	26,9	55,7	455
Gros fumeur	17,2	23,1	59,8	277
Total	17,8	29,0	53,2	2300

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU08_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES			Total
	Moins que hebdomadaire	Au moins hebdomadaire	Quotidien ou presque	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	15,8	21,6	62,6	1738
Femme	17,9	26,2	55,8	1863
Total	16,9	23,9	59,2	3601
GROUPES AGE				
0-14	8,7	8,2	83,1	617
15-24	7,0	16,3	76,7	404
25-34	9,0	27,6	63,4	551
35-44	15,9	27,4	56,7	587
45-54	22,8	29,7	47,5	441
55-64	36,2	33,7	30,1	372
65-74	29,3	34,5	36,2	386
75 +	35,0	24,4	40,6	243
Total	16,9	23,9	59,2	3601
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	25,2	21,0	53,8	120
Primaire	21,7	22,1	56,2	495
Secondaire inférieur	18,7	24,5	56,8	626
Secondaire supérieur	15,5	19,6	64,9	1063
Supérieur	15,0	27,8	57,2	1161
Total	16,9	23,8	59,3	3465
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	12,7	24,6	62,8	298
20.000-30.000	18,5	22,2	59,3	798
30.000-40.000	16,9	24,8	58,3	901
40.000-60.000	17,7	23,6	58,8	1161
>60.000	13,2	26,5	60,3	326
Total	16,9	23,9	59,2	3484
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	14,7	27,9	57,4	1948
Très mauvaise à moyenne	26,0	28,9	45,1	830
Total	17,8	28,1	54,1	2778
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	17,8	28,9	53,3	1320
Dans le passé	18,5	28,8	52,6	655
Modéré (< 20)	19,2	27,1	53,7	551
Gros fumeur	18,5	20,3	61,3	317
Total	18,3	27,5	54,2	2843

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_2)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PRODUITS LAITIERS		Total
	Quotidienne ou presque	Peu fréquente	N
	%	%	
SEXE			
Homme	74,5	25,5	4861
Femme	78,8	21,2	5123
Total	76,7	23,3	9984
GROUPES AGE			
0-14	85,5	14,5	1591
15-24	78,0	22,0	1123
25-34	75,3	24,7	1602
35-44	73,4	26,6	1583
45-54	72,9	27,1	1267
55-64	74,7	25,3	1082
65-74	76,7	23,3	1065
75 +	76,2	23,8	671
Total	76,7	23,3	9984
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	78,4	21,6	347
Primaire	74,0	26,0	1278
Secondaire inférieur	73,0	27,0	1635
Secondaire supérieur	74,5	25,5	2883
Supérieur	81,0	19,0	3422
Total	76,6	23,4	9565
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	78,8	21,2	775
20.000-30.000	77,3	22,7	2001
30.000-40.000	75,2	24,8	2339
40.000-60.000	75,9	24,1	3166
>60.000	78,0	22,0	1259
Total	76,5	23,5	9540
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	75,2	24,8	5817
Très mauvaise à moyenne	74,9	25,1	2002
Total	75,1	24,9	7819
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	77,4	22,6	3659
Dans le passé	75,4	24,6	1900
Modéré (< 20)	73,2	26,8	1542
Gros fumeur	67,7	32,3	822
Total	75,0	25,0	7923
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	72,7	27,3	3436
Région Bruxelloise	78,9	21,1	2970
Wallonie	83,0	17,0	3578

Belgique 76,7 23,3 9984

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PRODUITS LAITIERS		Total
	Quotidienne ou presque	Peu fréquente	N
	%	%	
SEXE			
Homme	69,4	30,6	1703
Femme	76,0	24,0	1733
Total	72,7	27,3	3436
GROUPES AGE			
0-14	83,2	16,8	507
15-24	73,4	26,6	421
25-34	69,3	30,7	576
35-44	69,5	30,5	522
45-54	67,2	32,8	458
55-64	72,2	27,8	401
65-74	74,9	25,1	359
75 +	79,1	20,9	192
Total	72,7	27,3	3436
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	79,7	20,3	64
Primaire	71,5	28,5	419
Secondaire inférieur	70,6	29,4	595
Secondaire supérieur	69,3	30,7	1136
Supérieur	77,0	23,0	1101
Total	72,6	27,4	3315
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	80,1	19,9	117
20.000-30.000	72,3	27,7	595
30.000-40.000	71,8	28,2	839
40.000-60.000	70,8	29,2	1248
>60.000	74,3	25,7	448
Total	72,2	27,8	3247
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	70,4	29,6	2240
Très mauvaise à moyenne	73,3	26,7	565
Total	70,9	29,1	2805
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	73,1	26,9	1354
Dans le passé	72,4	27,6	693
Modéré (< 20)	67,8	32,2	554
Gros fumeur	61,6	38,4	236
Total	70,8	29,2	2837

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PRODUITS LAITIERS		Total
	Quotidienne ou presque	Peu fréquente	N
	%	%	
SEXE			
Homme	78,1	21,9	1432
Femme	79,7	20,3	1538
Total	78,9	21,1	2970
GROUPES AGE			
0-14	85,1	14,9	469
15-24	76,0	24,0	305
25-34	79,5	20,5	480
35-44	77,4	22,6	479
45-54	77,6	22,4	372
55-64	74,7	25,3	309
65-74	84,4	15,6	321
75 +	75,3	24,7	235
Total	78,9	21,1	2970
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	83,7	16,3	166
Primaire	73,6	26,4	365
Secondaire inférieur	72,2	27,8	416
Secondaire supérieur	78,1	21,9	695
Supérieur	82,9	17,1	1165
Total	79,0	21,0	2807
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	78,1	21,9	363
20.000-30.000	77,7	22,3	614
30.000-40.000	78,4	21,6	600
40.000-60.000	78,3	21,7	767
>60.000	84,0	16,0	485
Total	79,1	20,9	2829
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	79,0	21,0	1640
Très mauvaise à moyenne	77,2	22,8	614
Total	78,5	21,5	2254
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	79,3	20,7	993
Dans le passé	79,0	21,0	552
Modéré (< 20)	79,8	20,2	446
Gros fumeur	67,5	32,5	273
Total	77,9	22,1	2264

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PRODUITS LAITIERS		Total
	Quotidienne ou presque	Peu fréquente	N
	%	%	
SEXE			
Homme	82,4	17,6	1726
Femme	83,5	16,5	1852
Total	83,0	17,0	3578
GROUPES AGE			
0-14	89,3	10,7	615
15-24	86,5	13,5	397
25-34	85,3	14,7	546
35-44	79,2	20,8	582
45-54	82,0	18,0	437
55-64	80,1	19,9	372
65-74	77,0	23,0	385
75 +	72,5	27,5	244
Total	83,0	17,0	3578
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	73,5	26,5	117
Primaire	78,3	21,7	494
Secondaire inférieur	77,3	22,7	624
Secondaire supérieur	84,1	15,9	1052
Supérieur	86,7	13,3	1156
Total	82,9	17,1	3443
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	78,4	21,6	295
20.000-30.000	84,4	15,6	792
30.000-40.000	79,5	20,5	900
40.000-60.000	85,0	15,0	1151
>60.000	85,1	14,9	326
Total	82,9	17,1	3464
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	83,8	16,2	1937
Très mauvaise à moyenne	76,2	23,8	823
Total	81,8	18,2	2760
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	84,7	15,3	1312
Dans le passé	80,1	19,9	655
Modéré (< 20)	80,6	19,4	542
Gros fumeur	76,3	23,7	313
Total	81,8	18,2	2822

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PRODUITS LAITIERS ECREMES DE PREFERENCE		Total
	Entiers	Ecrémés	N
	%	%	
SEXE			
Homme	29,5	70,5	4849
Femme	25,0	75,0	5101
Total	27,3	72,7	9950
GROUPE AGE			
0-14	36,6	63,4	1564
15-24	27,0	73,0	1130
25-34	27,0	73,0	1605
35-44	26,4	73,6	1593
45-54	21,9	78,1	1266
55-64	25,1	74,9	1073
65-74	23,4	76,6	1056
75 +	29,5	70,5	663
Total	27,3	72,7	9950
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	46,7	53,3	347
Primaire	31,8	68,2	1257
Secondaire inférieur	33,0	67,0	1631
Secondaire supérieur	24,9	75,1	2888
Supérieur	23,2	76,8	3422
Total	27,1	72,9	9545
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	42,1	57,9	759
20.000-30.000	31,5	68,5	2008
30.000-40.000	28,2	71,8	2322
40.000-60.000	23,9	76,1	3168
>60.000	20,1	79,9	1255
Total	27,0	73,0	9512
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	25,1	74,9	5818
Très mauvaise à moyenne	27,1	72,9	1994
Total	25,5	74,5	7812
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	24,4	75,6	3654
Dans le passé	24,2	75,8	1890
Modéré (< 20)	27,0	73,0	1549
Gros fumeur	33,0	67,0	825
Total	25,8	74,2	7918
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	21,3	78,7	3432
Région Bruxelloise	38,0	62,0	2960
Wallonie	34,3	65,7	3558
Belgique	27,3	72,7	9950

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PRODUITS LAITIERS ECREMES DE PREFERENCE		Total
	Entiers	Ecrémés	N
	%	%	
SEXE			
Homme	23,1	76,9	1701
Femme	19,5	80,5	1731
Total	21,3	78,7	3432
GROUPES AGE			
0-14	30,8	69,2	500
15-24	18,7	81,3	421
25-34	20,2	79,8	585
35-44	22,0	78,0	526
45-54	15,6	84,4	458
55-64	22,5	77,5	397
65-74	16,6	83,4	354
75 +	24,8	75,2	191
Total	21,3	78,7	3432
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	45,0	55,0	64
Primaire	27,4	72,6	419
Secondaire inférieur	28,5	71,5	592
Secondaire supérieur	18,7	81,3	1138
Supérieur	16,6	83,4	1100
Total	21,1	78,9	3313
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	34,6	65,4	114
20.000-30.000	26,7	73,3	599
30.000-40.000	18,8	81,2	836
40.000-60.000	20,0	80,0	1254
>60.000	15,1	84,9	445
Total	20,7	79,3	3248
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	19,4	80,6	2247
Très mauvaise à moyenne	21,8	78,2	562
Total	19,8	80,2	2809
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	17,9	82,1	1356
Dans le passé	21,2	78,8	692
Modéré (< 20)	20,8	79,2	553
Gros fumeur	26,1	73,9	239
Total	20,0	80,0	2840

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PRODUITS LAITIERS ECREMES DE PREFERENCE		Total
	Entiers	Ecrémés	N
	%	%	
SEXE			
Homme	40,5	59,5	1428
Femme	35,7	64,3	1532
Total	38,0	62,0	2960
GROUPES AGE			
0-14	46,4	53,6	456
15-24	44,8	55,2	308
25-34	36,5	63,5	482
35-44	33,6	66,4	481
45-54	35,0	65,0	375
55-64	38,4	61,6	307
65-74	31,5	68,5	319
75 +	34,0	66,0	232
Total	38,0	62,0	2960
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	57,8	42,2	164
Primaire	38,0	62,0	354
Secondaire inférieur	46,8	53,2	419
Secondaire supérieur	38,9	61,1	699
Supérieur	30,0	70,0	1169
Total	37,7	62,3	2805
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	55,6	44,4	356
20.000-30.000	40,2	59,8	616
30.000-40.000	41,0	59,0	596
40.000-60.000	35,4	64,6	765
>60.000	23,4	76,6	488
Total	38,5	61,5	2821
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	35,0	65,0	1644
Très mauvaise à moyenne	35,6	64,4	613
Total	35,1	64,9	2257
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	40,1	59,9	992
Dans le passé	26,0	74,0	549
Modéré (< 20)	34,4	65,6	451
Gros fumeur	40,7	59,3	275
Total	36,0	64,0	2267

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PRODUITS LAITIERS ECREMES DE PREFERENCE		Total
	Entiers	Ecrémés	N
	%	%	
SEXE			
Homme	37,3	62,7	1720
Femme	31,2	68,8	1838
Total	34,3	65,7	3558
GROUPES AGE			
0-14	42,8	57,2	608
15-24	35,4	64,6	401
25-34	37,0	63,0	538
35-44	31,8	68,2	586
45-54	30,0	70,0	433
55-64	25,8	74,2	369
65-74	30,9	69,1	383
75 +	33,6	66,4	240
Total	34,3	65,7	3558
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	41,0	59,0	119
Primaire	36,9	63,1	484
Secondaire inférieur	37,4	62,6	620
Secondaire supérieur	33,7	66,3	1051
Supérieur	31,4	68,6	1153
Total	34,1	65,9	3427
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	39,7	60,3	289
20.000-30.000	35,3	64,7	793
30.000-40.000	39,1	60,9	890
40.000-60.000	28,7	71,3	1149
>60.000	32,8	67,2	322
Total	34,1	65,9	3443
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	33,8	66,2	1927
Très mauvaise à moyenne	31,2	68,8	819
Total	33,1	66,9	2746
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	31,6	68,4	1306
Dans le passé	29,7	70,3	649
Modéré (< 20)	35,3	64,7	545
Gros fumeur	40,6	59,4	311
Total	33,0	67,0	2811

	CONSOMMATION DE POISSON		Total
	Au moins hebdomadaire	Moins que hebdomadaire	N
	%	%	
SEXE			
Homme	70,3	29,7	4927
Femme	71,6	28,4	5175
Total	71,0	29,0	10102
GROUPE AGE			
0-14	71,0	29,0	1597
15-24	61,6	38,4	1143
25-34	63,8	36,2	1635
35-44	69,5	30,5	1604
45-54	77,2	22,8	1284
55-64	83,0	17,0	1093
65-74	76,2	23,8	1072
75 +	78,6	21,4	674
Total	71,0	29,0	10102
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	69,7	30,3	351
Primaire	66,9	33,1	1286
Secondaire inférieur	65,9	34,1	1650
Secondaire supérieur	70,3	29,7	2925
Supérieur	74,8	25,2	3468
Total	70,8	29,2	9680
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	67,4	32,6	787
20.000-30.000	68,1	31,9	2030
30.000-40.000	72,8	27,2	2350
40.000-60.000	70,0	30,0	3210
>60.000	76,2	23,8	1276
Total	70,9	29,1	9653
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	70,5	29,5	5900
Très mauvaise à moyenne	73,1	26,9	2020
Total	71,1	28,9	7920
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	74,5	25,5	3704
Dans le passé	74,5	25,5	1923
Modéré (< 20)	65,1	34,9	1566
Gros fumeur	58,2	41,8	834
Total	70,9	29,1	8027
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	71,0	29,0	3471
Région Bruxelloise	77,6	22,4	3021
Wallonie	68,8	31,2	3610
Belgique	71,0	29,0	10102

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0904_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE POISSON		Total
	Au moins hebdomadaire	Moins que hebdomadaire	N
	%	%	
SEXE			
Homme	70,6	29,4	1725
Femme	71,4	28,6	1746
Total	71,0	29,0	3471
GROUPES AGE			
0-14	70,1	29,9	510
15-24	58,5	41,5	426
25-34	64,4	35,6	587
35-44	69,3	30,7	527
45-54	78,6	21,4	462
55-64	85,8	14,2	406
65-74	77,5	22,5	361
75 +	75,8	24,2	192
Total	71,0	29,0	3471
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	60,8	39,2	65
Primaire	66,9	33,1	421
Secondaire inférieur	67,4	32,6	599
Secondaire supérieur	70,2	29,8	1153
Supérieur	74,6	25,4	1111
Total	70,7	29,3	3349
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	66,4	33,6	118
20.000-30.000	66,8	33,2	602
30.000-40.000	74,1	25,9	843
40.000-60.000	69,7	30,3	1265
>60.000	75,6	24,4	452
Total	71,0	29,0	3280
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	70,8	29,2	2270
Très mauvaise à moyenne	72,7	27,3	566
Total	71,1	28,9	2836
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	74,3	25,7	1368
Dans le passé	74,6	25,4	702
Modéré (< 20)	65,4	34,6	558
Gros fumeur	57,2	42,8	240
Total	71,0	29,0	2868

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0904_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE POISSON		Total
	Au moins hebdomadaire	Moins que hebdomadaire	N
	%	%	
SEXE			
Homme	77,5	22,5	1459
Femme	77,7	22,3	1562
Total	77,6	22,4	3021
GROUPE AGE			
0-14	81,2	18,8	470
15-24	68,0	32,0	312
25-34	69,9	30,1	495
35-44	77,9	22,1	489
45-54	81,6	18,4	381
55-64	84,1	15,9	313
65-74	87,6	12,4	324
75 +	80,8	19,2	237
Total	77,6	22,4	3021
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	82,8	17,2	167
Primaire	77,2	22,8	368
Secondaire inférieur	66,1	33,9	424
Secondaire supérieur	75,7	24,3	707
Supérieur	80,9	19,1	1191
Total	77,2	22,8	2857
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	78,0	22,0	369
20.000-30.000	74,4	25,6	625
30.000-40.000	80,1	19,9	606
40.000-60.000	74,7	25,3	783
>60.000	83,1	16,9	495
Total	77,6	22,4	2878
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	77,0	23,0	1676
Très mauvaise à moyenne	78,2	21,8	623
Total	77,3	22,7	2299
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	82,2	17,8	1011
Dans le passé	77,6	22,4	561
Modéré (< 20)	73,2	26,8	459
Gros fumeur	66,5	33,5	277
Total	77,4	22,6	2308

REGIO: 3 Wallonie

 HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0904_2)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE POISSON		Total
	Au moins hebdomadaire	Moins que hebdomadaire	N
	%	%	
SEXE			
Homme	67,7	32,3	1743
Femme	69,9	30,1	1867
Total	68,8	31,2	3610
GROUPES AGE			
0-14	69,6	30,4	617
15-24	64,9	35,1	405
25-34	60,6	39,4	553
35-44	67,6	32,4	588
45-54	73,2	26,8	441
55-64	76,8	23,2	374
65-74	70,2	29,8	387
75 +	81,2	18,8	245
Total	68,8	31,2	3610
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	69,2	30,8	119
Primaire	63,3	36,7	497
Secondaire inférieur	63,4	36,6	627
Secondaire supérieur	69,2	30,8	1065
Supérieur	73,0	27,0	1166
Total	68,9	31,1	3474
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	62,2	37,8	300
20.000-30.000	67,8	32,2	803
30.000-40.000	68,9	31,1	901
40.000-60.000	69,4	30,6	1162
>60.000	73,7	26,3	329
Total	68,7	31,3	3495
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	67,8	32,2	1954
Très mauvaise à moyenne	72,1	27,9	831
Total	68,9	31,1	2785
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	72,7	27,3	1325
Dans le passé	73,3	26,7	660
Modéré (< 20)	61,9	38,1	549
Gros fumeur	57,1	42,9	317
Total	68,7	31,3	2851

HABITUDES ALIMENTAIRES(NU0908_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	FRUITS ET LEGUMES		Total
	>=2 portions par jour	<2 portions par jour	N
	%	%	
SEXE			
Homme	44,3	55,7	4918
Femme	53,9	46,1	5162
Total	49,1	50,9	10080
GROUPES AGE			
0-14	53,9	46,1	1593
15-24	42,0	58,0	1135
25-34	41,1	58,9	1632
35-44	41,6	58,4	1601
45-54	49,9	50,1	1282
55-64	62,0	38,0	1091
65-74	59,4	40,6	1072
75 +	68,3	31,7	674
Total	49,1	50,9	10080
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	50,5	49,5	350
Primaire	51,0	49,0	1280
Secondaire inférieur	47,0	53,0	1647
Secondaire supérieur	48,8	51,2	2918
Supérieur	49,9	50,1	3466
Total	49,2	50,8	9661
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	47,2	52,8	784
20.000-30.000	48,1	51,9	2024
30.000-40.000	48,6	51,4	2343
40.000-60.000	48,7	51,3	3203
>60.000	51,3	48,7	1277
Total	48,8	51,2	9631
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	47,7	52,3	5891
Très mauvaise à moyenne	49,7	50,3	2017
Total	48,2	51,8	7908
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	54,4	45,6	3696
Dans le passé	51,4	48,6	1921
Modéré (< 20)	40,5	59,5	1563
Gros fumeur	25,1	74,9	835
Total	47,8	52,2	8015
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	51,9	48,1	3470
Région Bruxelloise	45,4	54,6	3006
Wallonie	45,4	54,6	3604

Belgique	49,1	50,9	10080
-----------------	-------------	-------------	--------------

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0908_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	FRUITS ET LEGUMES		Total
	>=2 portions par jour	<2 portions par jour	N
	%	%	
SEXE			
Homme	47,5	52,5	1722
Femme	56,4	43,6	1748
Total	51,9	48,1	3470
GROUPES AGE			
0-14	55,9	44,1	511
15-24	44,2	55,8	422
25-34	45,9	54,1	586
35-44	43,9	56,1	528
45-54	52,1	47,9	463
55-64	65,4	34,6	406
65-74	62,8	37,2	362
75 +	72,4	27,6	192
Total	51,9	48,1	3470
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	50,3	49,7	65
Primaire	54,4	45,6	422
Secondaire inférieur	52,6	47,4	597
Secondaire supérieur	50,2	49,8	1152
Supérieur	53,2	46,8	1112
Total	52,1	47,9	3348
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	58,6	41,4	118
20.000-30.000	51,4	48,6	599
30.000-40.000	51,9	48,1	844
40.000-60.000	50,9	49,1	1264
>60.000	52,4	47,6	454
Total	51,7	48,3	3279
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	50,0	50,0	2269
Très mauvaise à moyenne	56,2	43,8	566
Total	51,1	48,9	2835
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	56,4	43,6	1367
Dans le passé	56,0	44,0	703
Modéré (< 20)	43,8	56,2	556
Gros fumeur	26,3	73,7	240
Total	50,9	49,1	2866

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0908_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	FRUITS ET LEGUMES		Total
	>=2 portions par jour	<2 portions par jour	N
	%	%	
SEXE			
Homme	39,4	60,6	1455
Femme	51,0	49,0	1551
Total	45,4	54,6	3006
GROUPES AGE			
0-14	53,4	46,6	466
15-24	33,2	66,8	308
25-34	36,7	63,3	493
35-44	42,4	57,6	486
45-54	45,1	54,9	380
55-64	47,9	52,1	313
65-74	62,7	37,3	324
75 +	58,4	41,6	236
Total	45,4	54,6	3006
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	63,4	36,6	165
Primaire	46,8	53,2	365
Secondaire inférieur	32,0	68,0	421
Secondaire supérieur	43,9	56,1	704
Supérieur	47,3	52,7	1189
Total	45,4	54,6	2844
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	40,1	59,9	366
20.000-30.000	43,1	56,9	621
30.000-40.000	46,2	53,8	601
40.000-60.000	44,0	56,0	782
>60.000	53,6	46,4	494
Total	45,3	54,7	2864
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	42,7	57,3	1670
Très mauvaise à moyenne	44,0	56,0	622
Total	43,1	56,9	2292
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	52,6	47,4	1007
Dans le passé	41,5	58,5	560
Modéré (< 20)	34,6	65,4	458
Gros fumeur	24,4	75,6	278
Total	42,9	57,1	2303

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0908_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	FRUITS ET LEGUMES		Total
	>=2 portions par jour	<2 portions par jour	N
	%	%	
SEXE			
Homme	40,3	59,7	1741
Femme	50,6	49,4	1863
Total	45,4	54,6	3604
GROUPES AGE			
0-14	50,9	49,1	616
15-24	41,1	58,9	405
25-34	33,5	66,5	553
35-44	37,2	62,8	587
45-54	47,4	52,6	439
55-64	59,6	40,4	372
65-74	53,0	47,0	386
75 +	68,0	32,0	246
Total	45,4	54,6	3604
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	42,1	57,9	120
Primaire	46,9	53,1	493
Secondaire inférieur	41,1	58,9	629
Secondaire supérieur	47,5	52,5	1062
Supérieur	45,5	54,5	1165
Total	45,4	54,6	3469
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	43,5	56,5	300
20.000-30.000	45,0	55,0	804
30.000-40.000	44,1	55,9	898
40.000-60.000	45,7	54,3	1157
>60.000	47,0	53,0	329
Total	45,1	54,9	3488
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	44,7	55,3	1952
Très mauvaise à moyenne	43,4	56,6	829
Total	44,3	55,7	2781
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	51,3	48,7	1322
Dans le passé	45,3	54,7	658
Modéré (< 20)	36,9	63,1	549
Gros fumeur	23,6	76,4	317
Total	43,6	56,4	2846

HABITUDES ALIMENTAIRES(NU0910_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE DE PAIN CONSOMME		Total
	Pain gris prédominant	Pain blanc prédominant	N
	%	%	
SEXE			
Homme	47,2	52,8	4842
Femme	51,0	49,0	5098
Total	49,1	50,9	9940
GROUPE AGE			
0-14	39,3	60,7	1574
15-24	38,6	61,4	1117
25-34	50,7	49,3	1618
35-44	52,1	47,9	1574
45-54	56,7	43,3	1265
55-64	59,3	40,7	1074
65-74	52,2	47,8	1056
75 +	44,2	55,8	662
Total	49,1	50,9	9940
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	31,5	68,5	350
Primaire	41,5	58,5	1266
Secondaire inférieur	44,4	55,6	1622
Secondaire supérieur	48,3	51,7	2875
Supérieur	57,0	43,0	3415
Total	49,5	50,5	9528
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	31,1	68,9	765
20.000-30.000	44,0	56,0	1994
30.000-40.000	46,1	53,9	2311
40.000-60.000	52,2	47,8	3165
>60.000	62,9	37,1	1262
Total	49,3	50,7	9497
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	53,1	46,9	5809
Très mauvaise à moyenne	44,9	55,1	1984
Total	51,3	48,7	7793
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	53,3	46,7	3650
Dans le passé	54,8	45,2	1885
Modéré (< 20)	48,7	51,3	1545
Gros fumeur	38,9	61,1	820
Total	51,2	48,8	7900
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	59,7	40,3	3425
Région Bruxelloise	42,5	57,5	2965
Wallonie	32,8	67,2	3550
Belgique	49,1	50,9	9940

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0910_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE DE PAIN CONSOMME		Total
	Pain gris prédominant	Pain blanc prédominant	N
	%	%	
SEXE			
Homme	58,9	41,1	1699
Femme	60,5	39,5	1726
Total	59,7	40,3	3425
GROUPES AGE			
0-14	50,1	49,9	504
15-24	48,4	51,6	418
25-34	61,1	38,9	584
35-44	61,6	38,4	519
45-54	68,1	31,9	455
55-64	65,3	34,7	396
65-74	67,1	32,9	359
75 +	57,0	43,0	190
Total	59,7	40,3	3425
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	42,9	57,1	65
Primaire	53,5	46,5	418
Secondaire inférieur	57,7	42,3	587
Secondaire supérieur	57,3	42,7	1138
Supérieur	67,5	32,5	1096
Total	60,1	39,9	3304
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	54,6	45,4	109
20.000-30.000	56,7	43,3	593
30.000-40.000	59,1	40,9	833
40.000-60.000	60,3	39,7	1258
>60.000	68,2	31,8	445
Total	60,4	39,6	3238
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	62,7	37,3	2244
Très mauvaise à moyenne	56,1	43,9	556
Total	61,5	38,5	2800
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	63,7	36,3	1355
Dans le passé	62,8	37,2	689
Modéré (< 20)	59,5	40,5	551
Gros fumeur	47,4	52,6	235
Total	61,1	38,9	2830

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0910_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE DE PAIN CONSOMME		Total
	Pain gris prédominant	Pain blanc prédominant	N
	%	%	
SEXE			
Homme	38,5	61,5	1432
Femme	46,2	53,8	1533
Total	42,5	57,5	2965
GROUPES AGE			
0-14	32,3	67,7	457
15-24	25,2	74,8	305
25-34	42,1	57,9	489
35-44	47,9	52,1	476
45-54	49,3	50,7	377
55-64	50,6	49,4	310
65-74	56,5	43,5	319
75 +	44,3	55,7	232
Total	42,5	57,5	2965
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	31,4	68,6	166
Primaire	38,7	61,3	363
Secondaire inférieur	32,9	67,1	419
Secondaire supérieur	41,9	58,1	691
Supérieur	51,1	48,9	1167
Total	43,1	56,9	2806
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	28,4	71,6	362
20.000-30.000	37,1	62,9	613
30.000-40.000	40,5	59,5	588
40.000-60.000	48,7	51,3	770
>60.000	53,9	46,1	491
Total	42,3	57,7	2824
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	44,9	55,1	1647
Très mauvaise à moyenne	43,2	56,8	615
Total	44,5	55,5	2262
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	44,7	55,3	996
Dans le passé	51,0	49,0	549
Modéré (< 20)	43,1	56,9	452
Gros fumeur	36,1	63,9	276
Total	44,6	55,4	2273

REGIO: 3 Wallonie

 HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0910_3)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE DE PAIN CONSOMME		Total
	Pain gris prédominant	Pain blanc prédominant	N
	%	%	
SEXE			
Homme	29,3	70,7	1711
Femme	36,3	63,7	1839
Total	32,8	67,2	3550
GROUPES AGE			
0-14	25,1	74,9	613
15-24	26,1	73,9	394
25-34	33,7	66,3	545
35-44	36,7	63,3	579
45-54	37,4	62,6	433
55-64	49,9	50,1	368
65-74	27,7	72,3	378
75 +	26,2	73,8	240
Total	32,8	67,2	3550
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	21,1	78,9	119
Primaire	22,5	77,5	485
Secondaire inférieur	24,7	75,3	616
Secondaire supérieur	31,8	68,2	1046
Supérieur	42,3	57,7	1152
Total	33,0	67,0	3418
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	17,9	82,1	294
20.000-30.000	28,3	71,7	788
30.000-40.000	28,0	72,0	890
40.000-60.000	37,3	62,7	1137
>60.000	53,1	46,9	326
Total	32,7	67,3	3435
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	35,6	64,4	1918
Très mauvaise à moyenne	31,6	68,4	813
Total	34,5	65,5	2731
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	36,3	63,7	1299
Dans le passé	40,2	59,8	647
Modéré (< 20)	31,6	68,4	542
Gros fumeur	27,8	72,2	309
Total	35,2	64,8	2797

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1001_4)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	Corps gras sur le pain							Total
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE								
Homme	20,6	32,8	23,1	20,6	,6	1,6	,7	4895
Femme	21,3	32,1	19,7	24,7	,4	1,1	,6	5159
Total	20,9	32,5	21,4	22,7	,5	1,3	,6	10054
GROUPES AGE								
0-14	28,7	31,9	23,4	13,8	,3	1,2	,8	1567
15-24	29,4	29,7	23,5	15,5	,4	1,3	,3	1134
25-34	21,9	30,3	27,8	17,9	,6	1,2	,4	1630
35-44	22,7	28,5	22,0	24,2	,4	1,6	,6	1602
45-54	13,6	32,7	17,7	33,3	,6	1,1	,9	1282
55-64	16,6	34,7	15,3	30,1	,3	2,1	,8	1094
65-74	11,8	40,3	14,8	29,2	1,3	1,3	1,2	1071
75 +	5,8	50,4	17,5	25,6	,4	,4	,0	674
Total	20,9	32,5	21,4	22,7	,5	1,3	,6	10054
NIVEAU INSTRUCTION								
Pas de diplôme	12,3	34,2	26,4	23,0	2,1	2,1	,0	350
Primaire	14,7	37,9	21,2	23,8	,8	,6	1,0	1283
Secondaire inférieur	17,7	34,3	22,3	24,0	,3	,8	,6	1647
Secondaire supérieur	21,4	32,8	21,8	21,9	,4	1,4	,3	2915
Supérieur	24,4	30,0	20,4	22,0	,5	1,6	1,0	3440
Total	20,8	32,7	21,5	22,5	,5	1,3	,7	9635
REVENU EQUIVALENT (FB)								
< 20.000	13,7	46,7	22,7	14,3	,5	1,6	,6	786
20.000-30.000	19,6	32,1	23,2	23,7	,7	,7	,1	2015
30.000-40.000	21,1	34,0	20,0	22,8	,4	1,2	,5	2340
40.000-60.000	23,0	30,4	21,6	22,2	,3	1,4	1,0	3198
>60.000	23,0	28,6	19,8	24,9	1,2	1,9	,6	1266
Total	21,3	32,3	21,4	22,6	,5	1,3	,6	9605
SANTE SUBJECTIVE								
Bonne à très bonne	20,6	30,8	22,5	23,5	,5	1,5	,6	5886
Très mauvaise à moyenne	15,4	37,9	16,1	28,6	,8	,5	,7	2020
Total	19,5	32,3	21,1	24,6	,6	1,3	,6	7906
CONSOMMATION DE TABAC								
Jamais	20,9	31,3	19,9	25,6	,4	1,4	,5	3697
Dans le passé	18,7	30,9	20,5	26,7	1,0	1,2	1,1	1921
Modéré (< 20)	19,3	34,3	23,1	21,1	,5	1,3	,4	1560
Gros fumeur	18,7	36,7	23,3	18,6	,3	1,5	,8	834
Total	19,8	32,4	21,0	24,2	,6	1,4	,6	8012
REGION DE RESIDENCE								
Région Flamande	23,7	22,5	23,9	28,0	,3	1,4	,3	3462
Région Bruxelloise	17,5	40,3	23,6	14,1	1,4	2,4	,7	2994
Wallonie	17,3	47,5	16,5	16,1	,6	,9	1,2	3598
Belgique	20,9	32,5	21,4	22,7	,5	1,3	,6	10054

légende: 3= Margarine 6= Beurre ou margarine
1= Pas de corps gras 4= Margarine de régime 7= Beurre allégé
2= Beurre 5= Autre

REGIO: 1 Région Flamande

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1001_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	Corps gras sur le pain							Total
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE								
Homme	22,7	23,2	26,4	25,4	,4	1,7	,3	1716
Femme	24,7	21,7	21,4	30,6	,3	1,0	,3	1746
Total	23,7	22,5	23,9	28,0	,3	1,4	,3	3462
GROUPES AGE								
0-14	36,1	19,5	25,2	17,9	,1	1,2	,0	503
15-24	33,5	22,0	25,6	16,8	,2	1,6	,2	422
25-34	24,4	22,0	31,6	20,8	,6	,7	,0	586
35-44	25,4	18,0	24,2	29,7	,2	2,1	,4	528
45-54	13,4	25,0	18,8	40,3	,7	1,2	,5	463
55-64	17,0	24,7	18,6	37,5	,0	2,0	,3	406
65-74	14,4	26,1	19,1	37,5	,0	1,3	1,7	362
75 +	4,6	36,4	16,9	41,5	,6	,0	,0	192
Total	23,7	22,5	23,9	28,0	,3	1,4	,3	3462
NIVEAU INSTRUCTION								
Pas de diplôme	9,4	26,7	29,4	33,3	,0	1,2	,0	65
Primaire	15,4	26,9	22,8	33,0	,0	,8	1,2	422
Secondaire inférieur	21,2	22,9	23,9	30,4	,2	,6	,8	599
Secondaire supérieur	24,1	25,0	23,9	25,3	,2	1,5	,1	1152
Supérieur	27,2	18,0	24,7	27,7	,5	1,7	,1	1102
Total	23,4	22,5	24,1	28,0	,3	1,3	,3	3340
REVENU EQUIVALENT (FB)								
< 20.000	13,3	41,6	22,4	22,7	,0	,0	,0	118
20.000-30.000	20,3	22,6	23,7	32,8	,0	,7	,0	600
30.000-40.000	24,2	23,6	23,4	26,2	,4	1,6	,6	844
40.000-60.000	27,1	20,1	24,3	26,5	,3	1,2	,5	1260
>60.000	24,6	18,4	24,2	29,8	,8	2,2	,0	450
Total	24,3	21,8	23,9	28,0	,3	1,3	,3	3272
SANTE SUBJECTIVE								
Bonne à très bonne	22,6	21,5	25,8	27,8	,4	1,6	,3	2268
Très mauvaise à moyenne	15,2	26,5	17,4	39,8	,0	,2	,8	566
Total	21,3	22,4	24,3	30,0	,4	1,4	,4	2834
CONSOMMATION DE TABAC								
Jamais	23,2	21,8	22,4	30,9	,2	1,2	,2	1366
Dans le passé	19,4	22,1	22,9	32,4	,7	1,3	1,2	703
Modéré (< 20)	20,4	23,0	27,4	27,1	,6	1,5	,0	557
Gros fumeur	22,5	27,2	27,6	20,2	,0	2,6	,0	240
Total	21,7	22,6	24,0	29,5	,4	1,4	,4	2866

légende:

1= Pas de corps gras
2= Beurre3= Margarine
4= Margarine de régime
5= Autre6= Beurre ou margarine
7= Beurre allégé

REGIO: 2 Région Bruxelloise

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1001_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	Corps gras sur le pain							Total
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE								
Homme	17,4	40,0	24,0	13,0	1,8	3,0	,8	1442
Femme	17,5	40,5	23,2	15,1	1,1	1,9	,6	1552
Total	17,5	40,3	23,6	14,1	1,4	2,4	,7	2994
GROUPES AGE								
0-14	25,4	39,5	24,1	5,5	1,2	4,0	,3	457
15-24	14,6	42,7	25,8	13,1	1,6	1,6	,6	309
25-34	16,9	37,3	28,1	14,4	,5	2,2	,7	492
35-44	19,3	40,2	24,5	11,9	1,0	2,9	,3	487
45-54	14,8	37,9	23,2	19,7	1,4	2,2	,8	378
55-64	25,1	36,3	15,3	17,3	2,0	2,1	1,8	314
65-74	10,7	44,8	14,8	20,8	5,0	2,7	1,2	322
75 +	6,9	49,9	27,1	14,8	,2	1,1	,0	235
Total	17,5	40,3	23,6	14,1	1,4	2,4	,7	2994
NIVEAU INSTRUCTION								
Pas de diplôme	15,2	40,9	28,5	7,8	1,3	6,3	,0	165
Primaire	12,9	38,6	30,9	11,4	4,5	1,6	,1	365
Secondaire inférieur	12,4	43,7	26,4	14,6	,0	2,7	,3	422
Secondaire supérieur	16,9	38,8	26,8	13,4	1,6	2,2	,3	705
Supérieur	20,8	40,4	18,0	16,2	1,1	2,1	1,4	1176
Total	17,2	40,2	23,9	14,0	1,5	2,4	,7	2833
REVENU EQUIVALENT (FB)								
< 20.000	13,4	37,0	34,5	7,0	1,7	6,1	,3	369
20.000-30.000	17,6	35,9	29,1	13,8	2,4	1,1	,2	616
30.000-40.000	20,0	42,2	19,7	14,8	,3	2,2	,7	600
40.000-60.000	17,3	40,4	21,0	18,0	,5	1,3	1,4	778
>60.000	19,5	44,2	15,8	15,0	2,9	1,9	,6	488
Total	17,7	39,8	23,8	14,3	1,5	2,2	,7	2851
SANTE SUBJECTIVE								
Bonne à très bonne	17,1	41,3	22,2	15,6	,8	2,0	,9	1668
Très mauvaise à moyenne	15,6	38,2	23,5	17,7	2,8	1,7	,4	622
Total	16,7	40,5	22,5	16,2	1,3	1,9	,8	2290
CONSOMMATION DE TABAC								
Jamais	18,2	38,2	23,4	16,0	,9	2,2	1,1	1005
Dans le passé	17,9	34,8	22,5	18,2	3,5	2,0	1,2	560
Modéré (< 20)	13,2	51,3	19,8	13,2	,5	1,6	,3	455
Gros fumeur	17,4	42,5	23,0	13,9	1,5	1,6	,1	278
Total	16,9	40,9	22,4	15,6	1,4	1,9	,8	2298

légende:

1= Pas de corps gras
2= Beurre3= Margarine
4= Margarine de régime
5= Autre6= Beurre ou margarine
7= Beurre allégé

REGIO: 3 Wallonie

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1001_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	Corps gras sur le pain							Total
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE								
Homme	18,0	47,6	17,1	14,4	,6	,9	1,3	1737
Femme	16,6	47,4	15,8	17,8	,5	1,0	1,0	1861
Total	17,3	47,5	16,5	16,1	,6	,9	1,2	3598
GROUPE AGE								
0-14	18,3	48,5	20,4	9,7	,3	,6	2,2	607
15-24	27,0	38,4	19,3	14,0	,5	,6	,2	403
25-34	18,9	43,8	20,2	13,6	,7	1,8	1,0	552
35-44	18,9	43,4	17,5	18,2	,4	,3	1,2	587
45-54	13,7	45,8	14,0	24,2	,2	,7	1,5	441
55-64	12,9	55,4	8,4	19,2	,3	2,2	1,5	374
65-74	8,3	60,7	8,2	19,3	2,1	,9	,5	387
75 +	6,9	70,2	13,2	8,9	,3	,4	,0	247
Total	17,3	47,5	16,5	16,1	,6	,9	1,2	3598
NIVEAU INSTRUCTION								
Pas de diplôme	12,9	36,6	22,3	23,7	4,6	,0	,0	120
Primaire	14,2	56,0	15,1	12,9	,8	,0	,9	496
Secondaire inférieur	13,2	51,4	18,7	15,3	,4	,8	,2	626
Secondaire supérieur	17,3	46,9	16,4	17,1	,5	1,0	,8	1058
Supérieur	21,1	45,8	14,5	14,9	,3	1,4	2,2	1162
Total	17,4	47,9	16,2	15,7	,6	,9	1,2	3462
REVENU EQUIVALENT (FB)								
< 20.000	14,0	55,3	16,5	12,7	,2	,1	1,2	299
20.000-30.000	19,3	44,4	20,6	14,1	1,0	,4	,2	799
30.000-40.000	16,7	47,6	15,0	19,7	,4	,4	,2	896
40.000-60.000	16,5	47,9	16,6	15,1	,4	1,7	1,7	1160
>60.000	20,2	48,9	9,5	16,8	1,1	1,2	2,3	328
Total	17,3	47,7	16,5	16,0	,6	,9	1,0	3482
SANTE SUBJECTIVE								
Bonne à très bonne	17,6	46,6	15,8	17,1	,5	1,2	1,2	1950
Très mauvaise à moyenne	15,6	52,0	12,4	17,8	1,0	,6	,5	832
Total	17,0	48,1	14,9	17,3	,7	1,1	1,0	2782
CONSOMMATION DE TABAC								
Jamais	17,4	47,1	14,0	18,6	,8	1,5	,7	1326
Dans le passé	17,4	47,0	15,1	18,0	,8	,8	1,0	658
Modéré (< 20)	19,5	48,3	16,9	13,2	,2	,9	1,0	548
Gros fumeur	13,8	48,4	17,3	17,9	,3	,0	2,3	316
Total	17,4	47,5	15,2	17,3	,6	1,0	1,0	2848

légende:

1= Pas de corps gras
2= Beurre3= Margarine
4= Margarine de régime
5= Autre6= Beurre ou margarine
7= Beurre allégé

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1002_4)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	GRAISSES DE CUISSON								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE									
Homme	2,0	16,3	53,6	17,6	,1	4,2	4,7	1,5	4871
Femme	1,9	15,5	52,9	17,9	,0	4,5	5,7	1,7	5137
Total	1,9	15,9	53,2	17,7	,1	4,4	5,2	1,6	10008
GROUPES AGE									
0-14	4,2	14,1	53,9	17,6	,1	4,1	4,7	1,4	1553
15-24	1,3	19,2	52,9	17,0	,1	4,1	4,6	,9	1132
25-34	1,5	17,9	54,0	19,2	,0	3,6	3,6	,2	1632
35-44	1,6	14,1	51,6	18,7	,1	5,0	7,4	1,6	1602
45-54	1,9	15,0	51,7	18,8	,0	4,7	5,5	2,5	1283
55-64	1,3	14,3	54,8	16,9	,3	2,5	5,9	4,0	1090
65-74	1,6	14,4	54,2	15,7	,2	6,8	4,9	2,3	1062
75 +	1,4	20,0	55,6	11,3	,1	6,3	4,8	,5	654
Total	1,9	15,9	53,2	17,7	,1	4,4	5,2	1,6	10008
NIVEAU INSTRUCTION									
Pas de diplôme	1,6	13,7	49,7	25,3	,0	4,7	5,0	,0	348
Primaire	1,1	15,4	60,3	15,3	,0	4,0	2,2	1,7	1271
Secondaire inférieur	,7	14,8	62,2	14,2	,1	2,7	3,0	2,4	1634
Secondaire supérieur	1,9	16,3	56,0	14,6	,1	4,7	4,8	1,6	2909
Supérieur	2,8	16,8	44,7	22,4	,1	4,7	7,1	1,4	3432
Total	2,0	16,0	53,3	17,7	,1	4,3	5,0	1,6	9594
REVENU EQUIVALENT (FB)									
< 20.000	,6	19,6	44,5	24,0	,2	4,3	5,9	,7	777
20.000-30.000	1,6	15,6	55,5	20,3	,1	2,5	2,7	1,7	2005
30.000-40.000	1,0	18,4	55,1	15,8	,1	4,5	3,0	2,1	2331
40.000-60.000	2,5	15,0	54,5	15,0	,0	4,9	6,9	1,3	3187
>60.000	3,2	14,9	45,9	23,2	,1	5,9	5,9	,9	1263
Total	1,9	16,2	53,1	17,9	,1	4,4	4,9	1,5	9563
SANTE SUBJECTIVE									
Bonne à très bonne	1,3	15,9	53,5	17,9	,1	4,3	5,7	1,3	5885
Très mauvaise à moyenne	2,0	16,8	54,2	16,8	,1	3,8	4,0	2,2	1993
Total	1,5	16,1	53,6	17,7	,1	4,2	5,4	1,5	7878
CONSOMMATION DE TABAC									
Jamais	1,3	17,2	52,7	18,3	,1	3,4	5,5	1,6	3690
Dans le passé	1,9	12,2	52,3	19,2	,1	6,4	6,5	1,5	1905
Modéré (< 20)	1,7	18,2	53,1	16,9	,1	4,4	4,9	,7	1558
Gros fumeur	1,3	14,7	59,3	13,3	,2	3,6	3,6	3,9	831
Total	1,5	16,0	53,4	17,7	,1	4,3	5,4	1,6	7984
REGION DE RESIDENCE									
Région Flamande	2,0	14,9	55,8	15,1	,0	4,3	5,7	2,2	3454
Région Bruxelloise	1,5	12,3	34,8	38,8	,0	6,6	5,5	,6	2966
Wallonie	2,0	18,7	54,7	15,5	,2	3,8	4,2	,9	3588
Belgique	1,9	15,9	53,2	17,7	,1	4,4	5,2	1,6	10008

légende: 1 = Aucune 4 = Huile 7 = Huile, marg.et/ou beurre
2 = Beurre 5 = Autre 8 = Produit de régime
3 = Margarine 6 = Beur.et marg.

REGIO: 1 Région Flamande

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1002_4)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	GRAISSES DE CUISSON								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE									
Homme	1,9	15,6	56,8	14,5	,0	4,2	4,9	2,1	1714
Femme	2,1	14,2	54,7	15,8	,0	4,3	6,5	2,3	1740
Total	2,0	14,9	55,8	15,1	,0	4,3	5,7	2,2	3454
GROUPES AGE									
0-14	4,5	13,3	54,3	15,8	,0	4,5	5,3	2,3	502
15-24	1,3	19,5	56,9	12,3	,1	4,0	5,4	,6	426
25-34	1,8	18,4	55,2	17,4	,0	4,0	3,1	,2	587
35-44	1,6	12,6	54,1	14,3	,0	5,4	9,8	2,2	528
45-54	2,2	13,2	55,7	16,2	,0	3,9	5,2	3,6	462
55-64	,8	13,6	59,5	14,4	,0	2,0	4,5	5,3	404
65-74	,8	10,9	56,6	15,4	,0	6,7	5,9	3,6	360
75 +	2,0	16,7	57,3	11,9	,0	4,2	7,6	,4	185
Total	2,0	14,9	55,8	15,1	,0	4,3	5,7	2,2	3454
NIVEAU INSTRUCTION									
Pas de diplôme	4,0	32,9	50,4	1,3	,0	1,2	10,1	,0	63
Primaire	1,4	13,2	66,0	9,6	,0	4,8	3,2	1,8	418
Secondaire inférieur	,8	16,3	64,1	10,7	,0	1,9	2,2	4,1	597
Secondaire supérieur	2,0	15,3	57,2	13,3	,0	4,9	5,8	1,6	1150
Supérieur	2,8	13,4	47,8	22,0	,0	4,7	7,1	2,3	1105
Total	2,1	14,9	56,0	15,2	,0	4,2	5,4	2,2	3333
REVENU EQUIVALENT (FB)									
< 20.000	,0	21,6	48,9	11,8	,0	2,1	13,0	2,6	113
20.000-30.000	1,8	16,6	59,6	15,6	,0	2,1	2,3	2,0	598
30.000-40.000	1,0	19,9	54,7	14,4	,0	4,1	3,1	2,8	840
40.000-60.000	2,3	13,3	57,7	13,0	,0	5,1	6,8	1,8	1263
>60.000	3,8	10,7	47,4	23,6	,1	6,7	6,5	1,3	451
Total	2,1	15,3	55,5	15,4	,0	4,4	5,2	2,0	3265
SANTE SUBJECTIVE									
Bonne à très bonne	1,4	14,4	56,7	15,3	,0	4,3	6,2	1,7	2270
Très mauvaise à moyenne	1,8	17,0	55,7	14,7	,0	2,5	4,4	4,1	558
Total	1,5	14,8	56,5	15,2	,0	4,0	5,8	2,1	2828
CONSOMMATION DE TABAC									
Jamais	1,5	16,3	56,0	15,2	,0	2,7	6,5	1,8	1366
Dans le passé	2,2	9,9	54,9	18,3	,0	6,4	5,9	2,3	699
Modéré (< 20)	1,6	17,9	55,8	13,3	,0	5,2	5,5	,9	557
Gros fumeur	,8	12,4	63,5	11,1	,0	2,7	3,7	5,8	239
Total	1,6	14,7	56,4	15,1	,0	4,1	5,9	2,1	2861

légende: 1 = Aucune

2 = Beurre

3 = Margarine

4 = Huile

5 = Autre

6 = Beurre et margarine.

7 = Huile, margarine et/ou beurre

8 = Produit de régime

REGIO: 2 Région Bruxelloise

 UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1002_4)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

	GRAISSES DE CUISSON								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE									
Homme	1,7	12,8	32,6	40,5	,0	7,0	5,0	,5	1428
Femme	1,4	11,8	36,8	37,2	,0	6,2	6,0	,7	1538
Total	1,5	12,3	34,8	38,8	,0	6,6	5,5	,6	2966
GROUPES AGE									
0-14	3,1	12,0	36,1	35,5	,0	6,5	6,8	,0	445
15-24	,0	18,7	29,7	41,2	,0	6,2	3,4	,7	303
25-34	,9	11,4	33,0	43,2	,0	6,0	5,1	,3	492
35-44	,7	11,6	29,3	44,3	,0	8,9	5,1	,1	488
45-54	,2	10,1	35,7	39,0	,0	6,2	7,9	,9	381
55-64	6,1	8,4	33,9	39,4	,0	4,9	6,5	,8	312
65-74	1,1	14,4	35,1	37,5	,2	7,7	2,5	1,5	319
75 +	1,2	11,7	58,8	15,4	,1	5,1	6,7	1,0	226
Total	1,5	12,3	34,8	38,8	,0	6,6	5,5	,6	2966
NIVEAU INSTRUCTION									
Pas de diplôme	,8	5,9	12,5	61,0	,0	16,2	3,6	,0	165
Primaire	1,3	15,1	30,5	47,9	,0	3,0	1,8	,4	361
Secondaire inférieur	1,2	13,8	46,1	28,9	,0	5,4	4,5	,2	413
Secondaire supérieur	1,1	12,0	47,7	26,8	,0	5,3	6,6	,4	698
Supérieur	2,2	12,8	29,7	40,9	,1	6,7	6,6	1,0	1169
Total	1,6	12,5	35,4	38,0	,0	6,4	5,5	,6	2806
REVENU EQUIVALENT (FB)									
< 20.000	,8	9,2	20,9	50,0	,0	11,4	7,7	,0	365
20.000-30.000	1,2	15,1	30,7	45,3	,0	2,6	5,1	,0	608
30.000-40.000	,9	12,1	44,3	32,5	,0	4,5	5,1	,5	598
40.000-60.000	2,9	9,2	43,2	30,7	,0	8,5	4,2	1,4	768
>60.000	1,4	16,0	29,0	39,1	,2	7,5	6,1	,8	485
Total	1,6	12,4	34,8	38,8	,0	6,5	5,4	,6	2824
SANTE SUBJECTIVE									
Bonne à très bonne	1,3	12,8	35,1	38,3	,0	6,6	5,3	,5	1665
Très mauvaise à moyenne	1,5	12,0	37,0	39,0	,0	4,0	5,3	1,2	611
Total	1,3	12,6	35,6	38,5	,0	6,0	5,3	,7	2276
CONSOMMATION DE TABAC									
Jamais	2,0	12,2	33,1	41,3	,0	6,3	4,3	,7	1001
Dans le passé	,6	11,6	37,0	36,3	,2	6,8	6,6	,9	552
Modéré (< 20)	,6	16,4	30,6	40,1	,0	5,0	6,7	,6	454
Gros fumeur	1,6	11,6	43,6	33,5	,0	5,8	3,6	,4	277
Total	1,4	12,9	34,7	39,1	,0	6,0	5,2	,7	2284

légende: 1 = Aucune 4 = Huile 7 = Huile, marg.et/ou beurre
 2 = Beurre 5 = Autre 8 = Produit de régime
 3 = Margarine 6 = Beur.et marg.

REGIO: 3 Wallonie

 UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1002_4)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

	GRAISSES DE CUISSON								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE									
Homme	2,3	18,7	54,5	15,8	,3	3,3	4,4	,8	1729
Femme	1,6	18,8	55,0	15,1	,1	4,4	4,1	1,0	1859
Total	2,0	18,7	54,7	15,5	,2	3,8	4,2	,9	3588
GROUPES AGE									
0-14	4,0	15,9	57,9	15,5	,2	2,8	3,4	,3	606
15-24	1,7	18,9	53,4	17,5	,1	3,5	3,5	1,5	403
25-34	1,0	19,5	59,4	14,2	,0	1,9	3,9	,2	553
35-44	1,7	17,5	53,9	18,7	,3	3,1	3,8	1,0	586
45-54	1,7	19,7	49,0	17,8	,0	5,6	5,2	,9	440
55-64	,8	18,0	52,4	14,0	1,0	2,8	8,7	2,4	374
65-74	2,9	19,7	56,9	8,7	,5	6,7	4,0	,5	383
75 +	,7	29,0	51,7	8,3	,2	9,8	,0	,3	243
Total	2,0	18,7	54,7	15,5	,2	3,8	4,2	,9	3588
NIVEAU INSTRUCTION									
Pas de diplôme	,0	1,8	74,0	22,6	,0	,0	1,5	,0	120
Primaire	,6	19,3	61,5	13,1	,1	2,9	,7	1,8	492
Secondaire inférieur	,5	12,4	62,7	16,7	,2	3,5	4,0	,0	624
Secondaire supérieur	2,0	19,6	55,7	14,0	,3	4,2	2,3	1,9	1061
Supérieur	3,0	23,5	44,9	16,7	,3	4,1	7,3	,2	1158
Total	1,9	19,1	54,2	15,7	,2	3,7	4,2	,9	3455
REVENU EQUIVALENT (FB)									
< 20.000	,9	24,0	54,5	17,7	,5	1,9	,5	,0	299
20.000-30.000	1,4	14,4	57,9	18,6	,4	3,0	2,4	1,9	799
30.000-40.000	1,1	17,7	58,5	13,7	,4	5,0	2,3	1,3	893
40.000-60.000	2,8	19,4	50,7	15,4	,0	3,8	7,6	,3	1156
>60.000	2,5	26,5	51,8	12,3	,0	2,9	4,0	,0	327
Total	1,9	18,8	54,7	15,6	,2	3,7	4,2	,8	3474
SANTE SUBJECTIVE									
Bonne à très bonne	1,1	19,9	52,8	16,5	,2	3,7	5,0	,6	1950
Très mauvaise à moyenne	2,5	18,0	57,4	12,8	,4	5,4	3,1	,3	824
Total	1,5	19,4	54,1	15,5	,2	4,2	4,5	,5	2774
CONSOMMATION DE TABAC									
Jamais	,8	20,5	52,6	17,0	,2	3,6	3,9	1,4	1323
Dans le passé	1,7	16,8	51,6	16,0	,2	6,2	7,5	,1	654
Modéré (< 20)	2,4	19,4	56,1	15,6	,2	2,9	3,2	,4	547
Gros fumeur	1,9	19,0	58,3	10,2	,6	4,1	3,5	2,3	315
Total	1,5	19,3	53,8	15,6	,2	4,1	4,5	1,0	2839

légende: 1 = Aucune 4 = Huile 7 = Huile, marg.et/ou beurre
 2 = Beurre 5 = Autre 8 = Produit de régime
 3 = Margarine 6 = Beur.et marg.

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1003)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	GRAISSES DE FRITURE								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE									
Homme	7,4	8,2	31,4	47,1	4,1	,2	,7	,9	4847
Femme	8,1	7,5	30,3	47,9	4,2	,2	1,0	,8	5123
Total	7,8	7,9	30,8	47,5	4,1	,2	,9	,9	9970
GROUPES AGE									
0-14	9,8	6,8	26,7	50,9	4,3	,4	,8	,3	1554
15-24	4,8	7,8	34,7	46,4	4,2	,2	,8	1,2	1127
25-34	7,5	6,7	27,8	52,1	4,4	,1	,9	,5	1624
35-44	6,7	8,6	31,3	47,0	4,4	,1	,8	1,1	1603
45-54	4,6	7,8	34,3	45,8	4,7	,2	,7	1,9	1277
55-64	8,8	7,6	32,4	46,0	2,9	,1	1,6	,6	1082
65-74	11,7	11,0	29,2	43,4	3,5	,2	,6	,5	1054
75 +	17,6	8,7	32,1	36,6	3,1	,9	,7	,3	649
Total	7,8	7,9	30,8	47,5	4,1	,2	,9	,9	9970
NIVEAU INSTRUCTION									
Pas de diplôme	6,3	3,8	23,3	61,6	5,0	,0	,0	,0	349
Primaire	5,9	10,6	31,6	48,0	2,1	,2	,8	,9	1261
Secondaire inférieur	4,9	11,1	28,6	50,1	2,7	,3	1,0	1,3	1629
Secondaire supérieur	6,3	8,3	30,9	47,1	5,5	,2	,8	,8	2904
Supérieur	11,2	5,2	32,1	45,7	4,2	,2	,9	,5	3417
Total	7,8	7,8	30,8	47,7	4,2	,2	,8	,8	9560
REVENU EQUIVALENT (FB)									
< 20.000	5,8	10,3	25,2	53,4	4,6	,0	,6	,0	781
20.000-30.000	8,2	9,0	29,0	47,5	4,4	,4	,9	,5	1999
30.000-40.000	6,1	8,7	31,9	46,7	4,5	,2	,9	1,0	2325
40.000-60.000	7,2	6,8	33,5	46,8	3,4	,2	1,1	1,0	3172
>60.000	11,5	6,7	27,7	49,0	3,6	,1	,3	,9	1255
Total	7,6	7,9	30,9	47,6	4,0	,2	,9	,8	9532
SANTE SUBJECTIVE									
Bonne à très bonne	6,5	7,5	33,1	46,8	4,3	,1	1,0	,8	5861
Très mauvaise à moyenne	10,0	9,8	28,2	46,4	3,3	,3	,7	1,4	1988
Total	7,2	8,0	32,0	46,7	4,1	,2	,9	,9	7849
CONSUMMATION DE TABAC									
Jamais	7,3	7,9	29,4	48,3	5,1	,1	,9	1,0	3671
Dans le passé	8,1	7,2	34,0	45,4	3,2	,2	,7	1,2	1901
Modéré (< 20)	6,4	7,6	35,5	45,4	3,2	,1	,8	1,0	1551
Gros fumeur	7,4	11,9	31,7	42,6	4,3	,1	1,4	,5	828
Total	7,3	8,1	31,9	46,4	4,2	,1	,9	1,0	7951
REGION DE RESIDENCE									
Région Flamande	6,3	7,8	31,3	47,6	4,9	,1	,8	1,2	3440
Région Bruxelloise	18,0	4,4	18,5	56,2	1,6	,5	,6	,2	2949
Wallonie	7,0	9,1	34,0	44,5	3,7	,2	1,1	,4	3581
Belgique	7,8	7,9	30,8	47,5	4,1	,2	,9	,9	9970

légende: 1 = Pas d'aliments frits

4 = Huile

2 = Graisse animale
3 = Graisse végétale

5 = Huile de composition mixte
6 = Autre

REGIO: 1 Région Flamande

 UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1003)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

	GRAISSES DE FRITURE								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE									
Homme	5,8	8,2	31,9	47,4	4,6	,1	,8	1,1	1706
Femme	6,9	7,4	30,6	47,7	5,1	,2	,8	1,3	1734
Total	6,3	7,8	31,3	47,6	4,9	,1	,8	1,2	3440
GROUPES AGE									
0-14	8,6	6,5	27,8	50,6	5,2	,4	,5	,5	501
15-24	4,3	7,3	36,7	43,9	5,8	,0	1,1	1,1	425
25-34	5,0	6,9	26,4	54,8	5,1	,0	1,0	,8	585
35-44	4,5	7,8	34,7	45,6	4,9	,0	,7	1,8	527
45-54	3,2	8,3	35,8	43,9	5,0	,3	,7	2,9	461
55-64	8,0	8,3	32,5	47,5	2,9	,0	,4	,4	400
65-74	12,3	12,3	22,6	46,8	4,6	,0	1,0	,4	357
75 +	19,3	7,3	27,8	37,1	5,1	1,5	1,2	,7	184
Total	6,3	7,8	31,3	47,6	4,9	,1	,8	1,2	3440
NIVEAU INSTRUCTION									
Pas de diplôme	8,1	,9	27,8	52,7	10,5	,0	,0	,0	65
Primaire	5,9	11,2	30,4	48,6	2,3	,3	,7	,6	410
Secondaire									
inférieur	4,1	9,9	28,0	51,0	3,1	,1	1,4	2,3	594
supérieur	5,9	8,5	31,8	45,9	6,2	,2	,6	,9	1149
Supérieur	8,2	4,7	32,3	48,4	5,0	,1	,5	,8	1101
Total	6,4	7,6	31,1	48,1	4,9	,2	,7	1,1	3319
REVENU EQUIVALENT (FB)									
< 20.000	8,5	8,6	21,7	51,5	9,7	,0	,0	,0	116
20.000-30.000	7,4	10,4	29,2	46,0	5,0	,4	1,2	,4	594
30.000-40.000	5,4	8,6	30,8	47,7	5,1	,1	1,1	1,1	837
40.000-60.000	4,8	6,1	35,0	47,4	4,2	,1	,8	1,6	1257
>60.000	9,0	7,3	28,4	50,1	3,7	,0	,1	1,4	448
Total	6,2	7,8	31,5	47,8	4,7	,2	,8	1,2	3252
SANTE SUBJECTIVE									
Bonne à très bonne	4,8	7,5	33,3	47,2	5,0	,1	1,0	1,2	2258
Très mauvaise à moyenne	11,3	9,3	26,0	45,6	4,6	,3	,4	2,4	560
Total	6,0	7,8	32,0	46,9	4,9	,1	,9	1,4	2818
CONSOMMATION DE TABAC									
Jamais	6,3	7,9	29,7	47,6	6,5	,1	,7	1,2	1358
Dans le passé	7,4	7,8	32,2	46,9	3,1	,0	,7	1,9	696
Modéré (< 20)	4,6	5,7	38,5	45,3	3,4	,0	1,1	1,5	556
Gros fumeur	4,2	12,6	33,5	42,8	4,8	,0	1,0	1,0	238
Total	6,0	7,9	32,4	46,5	4,9	,0	,8	1,4	2848

légende: 1 = Pas d'aliments frits 3 = Graisse végét. 5 = Huile comp. mixte
 2 = Graisse animale 4 = Huile 6 = Autre

REGIO: 2 Région Bruxelloise

 UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1003)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

	GRAISSES DE FRITURE								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE									
Homme	17,5	4,9	18,3	56,5	1,3	,6	,4	,4	1415
Femme	18,5	4,0	18,6	55,9	1,8	,4	,7	,1	1534
Total	18,0	4,4	18,5	56,2	1,6	,5	,6	,2	2949
GROUPES AGE									
0-14	16,3	1,3	17,8	61,2	1,5	1,7	,2	,1	448
15-24	7,5	3,9	16,2	69,8	1,2	1,0	,3	,0	302
25-34	18,3	4,9	19,2	56,0	,6	,0	1,1	,0	487
35-44	21,6	4,9	14,8	55,8	2,3	,2	,3	,2	488
45-54	16,8	7,7	20,5	50,7	2,2	,0	1,1	1,0	378
55-64	19,3	5,6	15,0	56,5	2,3	,2	,8	,2	308
65-74	19,1	2,7	27,0	49,4	,9	,4	,0	,5	314
75 +	32,4	3,3	21,4	39,3	2,1	,8	,6	,0	224
Total	18,0	4,4	18,5	56,2	1,6	,5	,6	,2	2949
NIVEAU INSTRUCTION									
Pas de diplôme	8,1	2,3	12,1	76,1	1,3	,0	,0	,0	166
Primaire	6,6	5,3	19,6	64,7	2,5	,5	,3	,4	361
Secondaire inférieur	13,4	5,6	15,0	62,5	,7	,9	1,8	,1	412
Secondaire supérieur	11,9	4,8	19,5	60,5	1,8	1,0	,5	,0	697
Supérieur	28,9	4,1	19,5	45,4	1,4	,0	,5	,1	1157
Total	17,9	4,5	18,4	56,5	1,6	,5	,6	,1	2793
REVENU EQUIVALENT (FB)									
< 20.000	7,0	3,3	16,6	71,9	,8	,0	,4	,0	366
20.000-30.000	12,8	3,3	17,7	60,9	2,4	1,7	,9	,4	612
30.000-40.000	13,9	5,4	20,6	57,5	1,5	,3	,4	,5	593
40.000-60.000	24,2	6,4	17,0	50,1	1,4	,1	,6	,2	762
>60.000	29,5	3,3	19,5	45,3	1,6	,2	,5	,0	479
Total	17,8	4,5	18,2	56,5	1,6	,5	,6	,2	2812
SANTE SUBJECTIVE									
Bonne à très bonne	19,1	5,0	19,1	54,2	1,3	,4	,6	,2	1654
Très mauvaise à moyenne	17,4	5,7	17,9	55,6	2,1	,1	,7	,5	606
Total	18,7	5,2	18,8	54,6	1,5	,4	,7	,3	2260
CONSOMMATION DE TABAC									
Jamais	18,5	4,3	18,3	56,2	1,3	,4	,9	,1	992
Dans le passé	19,7	7,5	21,5	48,9	1,1	,2	,4	,7	551
Modéré (< 20)	18,2	5,1	15,6	57,0	2,5	,5	,6	,4	450
Gros fumeur	16,0	6,7	17,3	57,4	1,9	,0	,7	,0	275
Total	18,4	5,4	18,3	55,0	1,6	,3	,7	,3	2268

légende: 1 = Pas d'aliments frits 3 = Graisse végét. 5 = Huile comp. mixte
 2 = Graisse animale 4 = Huile 6 = Autre

REGIO: 3 Wallonie

 UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1003)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

	GRAISSES DE FRITURE								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE									
Homme	7,1	9,4	34,4	43,5	4,0	,3	,7	,6	1726
Femme	6,9	8,7	33,6	45,5	3,4	,2	1,5	,3	1855
Total	7,0	9,1	34,0	44,5	3,7	,2	1,1	,4	3581
GROUPES AGE									
0-14	10,1	8,8	27,3	48,5	3,7	,2	1,4	,2	605
15-24	4,8	10,0	37,1	43,3	2,5	,2	,4	1,7	400
25-34	8,3	7,1	33,4	45,4	4,6	,3	,8	,0	552
35-44	6,4	11,3	30,2	46,8	4,1	,2	1,0	,0	588
45-54	3,9	6,8	35,6	47,9	4,8	,2	,5	,4	438
55-64	6,9	6,9	38,2	39,2	3,3	,3	4,3	1,0	374
65-74	8,3	11,7	39,9	36,4	2,6	,4	,3	,5	383
75 +	7,3	13,4	43,8	34,4	,9	,1	,0	,0	241
Total	7,0	9,1	34,0	44,5	3,7	,2	1,1	,4	3581
NIVEAU INSTRUCTION									
Pas de diplôme	3,3	7,5	26,8	60,1	2,3	,0	,0	,0	118
Primaire	5,8	11,5	37,9	41,0	1,5	,0	1,0	1,4	490
Secondaire inférieur	4,3	14,2	32,8	45,7	2,4	,5	,1	,0	623
Secondaire supérieur	5,7	9,0	32,0	46,0	5,2	,1	1,2	,9	1058
Supérieur	10,1	6,5	35,9	41,6	3,9	,3	1,6	,1	1159
Total	7,0	9,2	34,0	44,3	3,7	,2	1,1	,5	3448
REVENU EQUIVALENT (FB)									
< 20.000	3,4	15,3	32,2	44,6	3,4	,0	1,2	,0	299
20.000-30.000	7,9	9,0	32,6	45,1	4,2	,0	,6	,7	793
30.000-40.000	5,1	9,6	36,4	42,5	4,5	,2	,6	1,0	895
40.000-60.000	7,9	8,1	34,3	44,9	2,3	,4	1,9	,2	1153
>60.000	8,3	7,3	30,4	48,1	4,6	,5	,9	,0	328
Total	6,9	9,2	33,9	44,6	3,6	,2	1,1	,5	3468
SANTE SUBJECTIVE									
Bonne à très bonne	5,8	8,2	37,3	43,6	3,7	,2	1,2	,1	1949
Très mauvaise à moyenne	6,4	11,5	33,9	44,6	2,0	,4	,9	,3	822
Total	6,0	9,1	36,3	43,9	3,2	,3	1,1	,1	2771
CONSOMMATION DE TABAC									
Jamais	5,7	8,9	32,3	47,2	3,4	,1	1,3	1,1	1321
Dans le passé	6,2	5,9	41,0	41,3	4,2	,7	,7	,0	654
Modéré (< 20)	5,8	11,8	37,0	41,6	3,2	,1	,2	,2	545
Gros fumeur	9,3	12,6	33,6	37,8	4,3	,3	2,1	,0	315
Total	6,3	9,3	35,4	43,6	3,6	,3	1,1	,5	2835

légende: 1 = Pas d'aliments frits 3 = Graisse végét. 5 = Huile comp. mixte
 2 = Graisse animale 4 = Huile 6 = Autre

UTILISATION DES CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES (INDICATEUR: NU1004_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES					Total
	Pas de crudités	Pas d'huile	Huile	Produit diététique	Autre	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	1,5	14,1	80,8	1,2	2,4	4863
Femme	1,9	11,7	83,3	1,7	1,5	5134
Total	1,7	12,9	82,0	1,4	2,0	9997
GROUPES AGE						
0-14	5,5	18,4	74,5	,4	1,3	1533
15-24	1,9	17,0	78,1	,4	2,6	1135
25-34	1,1	13,4	82,6	1,1	1,9	1627
35-44	,5	9,7	86,8	1,4	1,6	1603
45-54	,3	9,9	85,9	1,7	2,2	1282
55-64	,6	11,5	82,7	2,4	2,8	1085
65-74	1,7	8,6	84,7	3,4	1,6	1070
75 +	2,4	12,3	79,3	3,3	2,6	662
Total	1,7	12,9	82,0	1,4	2,0	9997
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	,7	9,9	87,0	1,5	,9	351
Primaire	,8	11,2	83,2	1,8	3,0	1276
Secondaire inférieur	1,2	12,0	83,1	1,4	2,3	1638
Secondaire supérieur	1,7	12,4	82,7	1,4	1,7	2889
Supérieur	2,2	14,6	80,2	1,4	1,6	3429
Total	1,7	12,9	82,1	1,4	1,9	9583
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	,9	9,8	86,4	1,9	1,0	780
20.000-30.000	,7	13,7	81,9	1,4	2,3	2009
30.000-40.000	1,9	10,5	84,6	1,2	1,8	2324
40.000-60.000	2,3	14,9	80,2	,7	1,8	3175
>60.000	1,4	12,3	81,7	2,9	1,8	1267
Total	1,7	13,0	82,2	1,3	1,8	9555
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,1	11,5	83,9	1,4	2,1	5876
Très mauvaise à moyenne	,9	11,3	83,2	2,3	2,2	2012
Total	1,0	11,5	83,8	1,6	2,1	7888
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	,6	5,5	38,7	,8	,6	3685
Dans le passé	,2	2,6	19,1	,4	,6	1910
Modéré (< 20)	,1	2,4	16,8	,3	,5	1562
Gros fumeur	,1	1,4	8,8	,1	,4	834
Total	1,0	11,9	83,5	1,5	2,1	7991
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	2,2	18,3	75,9	1,9	1,7	3437
Région Bruxelloise	1,1	7,0	89,7	,8	1,5	2982
Wallonie	,9	5,4	90,2	,8	2,6	3578

Belgique	1,7	12,9	82,0	1,4	2,0	9997
----------	-----	------	------	-----	-----	------

REGIO: 1 Région Flamande

UTILISATION DES CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES (INDICATEUR: NU1004_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES					Total
	Pas de crudités	Pas d'huile	Huile	Produit diététique	Autre	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	2,0	19,8	74,4	1,5	2,3	1704
Femme	2,5	16,7	77,5	2,3	1,0	1733
Total	2,2	18,3	75,9	1,9	1,7	3437
GROUPES AGE						
0-14	7,6	28,2	62,5	,6	1,1	487
15-24	3,0	23,4	70,2	,5	2,9	422
25-34	1,7	19,3	76,2	1,2	1,7	586
35-44	,7	14,0	82,6	1,5	1,3	527
45-54	,4	12,7	82,4	2,4	2,1	462
55-64	,7	16,0	78,4	3,2	1,6	402
65-74	1,2	11,8	81,3	5,0	,7	362
75 +	2,5	18,0	71,8	6,6	1,1	189
Total	2,2	18,3	75,9	1,9	1,7	3437
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	2,0	21,7	73,3	2,0	1,0	64
Primaire	,7	16,7	76,6	3,3	2,7	420
Secondaire inférieur	1,0	17,7	76,8	2,0	2,4	594
Secondaire supérieur	2,2	17,2	77,4	1,8	1,3	1139
Supérieur	3,2	20,4	73,7	1,6	1,1	1099
Total	2,2	18,4	75,9	1,9	1,5	3316
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	2,6	23,8	70,1	2,7	,8	118
20.000-30.000	,7	19,7	75,8	2,3	1,5	597
30.000-40.000	2,6	15,2	78,3	1,9	2,0	834
40.000-60.000	2,8	20,2	74,7	,8	1,5	1253
>60.000	2,0	16,9	77,1	3,3	,8	449
Total	2,2	18,6	76,0	1,8	1,5	3251
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,4	15,7	79,2	1,8	1,9	2260
Très mauvaise à moyenne	1,3	14,7	79,0	3,7	1,4	565
Total	1,4	15,5	79,1	2,1	1,8	2825
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	,8	7,4	37,1	1,1	,5	1362
Dans le passé	,2	3,7	18,7	,5	,6	699
Modéré (< 20)	,1	3,3	15,6	,4	,3	558
Gros fumeur	,2	1,9	7,0	,1	,4	238
Total	1,4	16,3	78,5	2,1	1,8	2857

REGIO: 2 Région Bruxelloise

UTILISATION DES CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES (INDICATEUR: NU1004_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES					Total
	Pas de crudités	Pas d'huile	Huile	Produit diététique	Autre	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	1,3	8,9	88,0	,5	1,3	1440
Femme	,9	5,2	91,2	1,0	1,6	1542
Total	1,1	7,0	89,7	,8	1,5	2982
GROUPES AGE						
0-14	2,8	7,6	87,2	,0	2,4	452
15-24	,5	10,8	86,5	,7	1,6	310
25-34	,2	6,4	90,9	,8	1,7	491
35-44	,2	3,8	94,3	1,0	,6	488
45-54	,6	4,3	92,2	1,1	1,9	381
55-64	1,2	10,8	84,7	1,3	2,0	310
65-74	1,9	5,3	91,8	,8	,2	322
75 +	2,8	9,5	86,2	,6	,8	228
Total	1,1	7,0	89,7	,8	1,5	2982
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	,0	2,8	97,2	,0	,0	167
Primaire	,6	7,9	90,8	,2	,5	362
Secondaire inférieur	1,4	8,0	89,6	,2	,8	419
Secondaire supérieur	1,3	6,1	89,1	,8	2,8	697
Supérieur	1,3	7,7	88,6	1,3	1,1	1178
Total	1,1	7,0	89,8	,8	1,3	2823
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	,5	5,7	93,1	,0	,7	366
20.000-30.000	1,2	7,9	88,9	,0	2,1	615
30.000-40.000	1,3	6,7	87,8	1,3	2,9	598
40.000-60.000	1,5	8,8	88,7	,7	,2	772
>60.000	,8	5,3	90,9	1,8	1,3	490
Total	1,1	7,1	89,6	,7	1,4	2841
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,4	7,2	90,4	,8	1,3	1668
Très mauvaise à moyenne	1,4	6,5	89,0	1,4	1,7	619
Total	,6	7,0	90,0	1,0	1,4	2287
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	,3	3,4	40,6	,3	,4	1001
Dans le passé	,1	1,1	19,1	,3	,3	555
Modéré (< 20)	,1	1,8	19,3	,1	,5	457
Gros fumeur	,2	,7	11,0	,1	,2	279
Total	,8	6,9	90,1	,9	1,3	2292

REGIO: 3 Wallonie

UTILISATION DES CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES (INDICATEUR: NU1004_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES					Total
	Pas de crudités	Pas d'huile	Huile	Produit diététique	Autre	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	,7	5,7	89,8	,8	3,0	1719
Femme	1,1	5,1	90,6	,8	2,3	1859
Total	,9	5,4	90,2	,8	2,6	3578
GROUPES AGE						
0-14	3,0	6,4	89,4	,1	1,1	594
15-24	,3	8,2	88,8	,3	2,4	403
25-34	,2	4,5	92,0	1,1	2,3	550
35-44	,2	4,0	92,0	1,4	2,4	588
45-54	,0	6,2	90,7	,6	2,4	439
55-64	,3	2,4	90,9	1,0	5,5	373
65-74	2,6	4,8	87,6	1,7	3,4	386
75 +	2,0	6,1	86,0	,2	5,7	245
Total	,9	5,4	90,2	,8	2,6	3578
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	,0	3,9	92,6	2,2	1,3	120
Primaire	1,1	3,3	91,2	,1	4,4	494
Secondaire inférieur	1,5	3,5	92,0	,5	2,6	625
Secondaire supérieur	,7	4,4	91,6	,8	2,4	1053
Supérieur	,9	7,7	87,8	1,1	2,5	1152
Total	,9	5,3	90,3	,8	2,6	3444
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	,0	2,9	93,6	2,3	1,2	296
20.000-30.000	,7	7,2	88,3	,4	3,4	797
30.000-40.000	,9	4,5	93,3	,2	1,2	892
40.000-60.000	1,6	6,1	88,9	,7	2,7	1150
>60.000	,0	3,3	89,2	2,4	5,1	328
Total	,9	5,4	90,3	,8	2,6	3463
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,5	4,2	91,6	,9	2,8	1948
Très mauvaise à moyenne	,4	8,6	86,8	,7	3,5	828
Total	,5	5,4	90,3	,8	3,0	2776
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	,4	2,7	41,1	,3	,9	1322
Dans le passé	,0	1,2	19,9	,2	,8	656
Modéré (< 20)	,0	,9	18,2	,3	,8	547
Gros fumeur	,0	,6	11,3	,0	,4	317
Total	,5	5,4	90,4	,8	2,9	2842

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	IMC				Total
	Maigreur	Poids normal	Excès de poids	Obésité	N
	col %	col %	col %	col %	
REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES					
1-2X/sem.	3,1	1,7	1,6	1,1	156
3-5X/sem.	15,2	12,9	11,6	8,4	901
6-7X/sem.	81,7	85,4	86,8	90,5	6921
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	7978
PETITS DEJEUNERS					
1-2X/sem.	9,8	6,1	5,6	5,2	413
3-5X/sem.	6,7	5,8	4,9	3,8	383
6-7X/sem.	83,5	88,1	89,4	91,0	6301
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	7097
COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES					
Moins que hebdomadaire	13,3	14,2	18,1	22,6	1444
Au moins hebdomadaire	22,1	30,0	29,8	28,3	2399
Quotidien ou presque	64,6	55,8	52,1	49,0	4163
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	8006
PRODUITS LAITIERS					
Quotidienne ou presque	77,2	76,0	73,7	70,9	6080
Peu fréquente	22,8	24,0	26,3	29,1	1844
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	7924
CONSOMMATION DE POISSON					
Au moins hebdomadaire	70,2	70,0	72,6	74,9	5786
Moins que hebdomadaire	29,8	30,0	27,4	25,1	2242
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	8028
FRUITS ET LEGUMES					
>=2 portions par jour	42,2	47,8	49,4	52,1	3783
<2 portions par jour	57,8	52,2	50,6	47,9	4228
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	8011
TYPE DE PAIN CONSOMME					
Pain gris prédominant	50,9	53,4	51,6	46,3	3897
Pain blanc prédominant	49,1	46,6	48,4	53,7	4002
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	7899

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	IMC				Total
	Maigreur	Poids normal	Excès de poids	Obésité	N
	col %	col %	col %	col %	
REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES					
1-2X/sem.	1,2	1,1	1,4	1,3	33
3-5X/sem.	17,1	14,3	14,0	8,0	352
6-7X/sem.	81,8	84,6	84,6	90,7	2390
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2775
PETITS DEJEUNERS					
1-2X/sem.	10,2	5,5	5,1	5,7	137
3-5X/sem.	6,9	5,1	5,2	2,4	125
6-7X/sem.	82,9	89,4	89,7	91,9	2285
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2547
COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES					
Moins que hebdomadaire	9,6	11,9	17,5	19,9	444
Au moins hebdomadaire	23,3	31,8	28,6	30,2	830
Quotidien ou presque	67,1	56,3	53,9	49,9	1511
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2785
PRODUITS LAITIERS					
Quotidienne ou presque	73,6	72,6	69,8	60,0	1977
Peu fréquente	26,4	27,4	30,2	40,0	782
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2759
CONSOMMATION DE POISSON					
Au moins hebdomadaire	69,7	71,6	71,8	76,5	2030
Moins que hebdomadaire	30,3	28,4	28,2	23,5	759
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2789
FRUITS ET LEGUMES					
>=2 portions par jour	48,4	50,8	52,2	52,9	1450
<2 portions par jour	51,6	49,2	47,8	47,1	1338
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2788
TYPE DE PAIN CONSOMME					
Pain gris prédominant	64,6	63,4	62,5	55,9	1736
Pain blanc prédominant	35,4	36,6	37,5	44,1	1017
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2753

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	IMC				Total
	Maigreur	Poids normal	Excès de poids	Obésité	N
	col %	col %	col %	col %	
REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES					
1-2X/sem.	5,5	2,8	2,5	4,6	73
3-5X/sem.	18,2	13,3	11,4	7,6	288
6-7X/sem.	76,3	83,9	86,1	87,8	2029
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2390
PETITS DEJEUNERS					
1-2X/sem.	6,6	8,2	8,8	6,7	150
3-5X/sem.	6,6	6,0	3,4	5,5	121
6-7X/sem.	86,8	85,7	87,8	87,8	1867
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2138
COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES					
Moins que hebdomadaire	12,7	17,0	19,9	23,0	466
Au moins hebdomadaire	22,6	28,3	34,0	28,6	753
Quotidien ou presque	64,7	54,8	46,2	48,3	1185
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2404
PRODUITS LAITIERS					
Quotidienne ou presque	79,2	79,3	74,0	77,9	1824
Peu fréquente	20,8	20,7	26,0	22,1	544
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2368
CONSOMMATION DE POISSON					
Au moins hebdomadaire	71,4	75,7	78,5	83,4	1863
Moins que hebdomadaire	28,6	24,3	21,5	16,6	550
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2413
FRUITS ET LEGUMES					
>=2 portions par jour	35,0	44,8	43,5	48,6	1086
<2 portions par jour	65,0	55,2	56,5	51,4	1317
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2403
TYPE DE PAIN CONSOMME					
Pain gris prédominant	42,9	45,4	47,6	42,8	1088
Pain blanc prédominant	57,1	54,6	52,4	57,2	1287
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2375

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	IMC				Total
	Maigreur	Poids normal	Excès de poids	Obésité	N
	col %	col %	col %	col %	
REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES					
1-2X/sem.	5,4	2,5	1,7	,2	50
3-5X/sem.	10,6	10,1	7,5	9,1	261
6-7X/sem.	84,0	87,4	90,8	90,7	2502
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2813
PETITS DEJEUNERS					
1-2X/sem.	10,5	6,6	5,8	4,1	126
3-5X/sem.	6,3	7,0	4,9	5,4	137
6-7X/sem.	83,3	86,4	89,4	90,5	2149
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2412
COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES					
Moins que hebdomadaire	19,9	17,5	18,7	26,0	534
Au moins hebdomadaire	19,7	27,1	30,8	25,9	816
Quotidien ou presque	60,4	55,4	50,5	48,1	1467
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2817
PRODUITS LAITIERS					
Quotidienne ou presque	82,5	81,3	80,7	82,9	2279
Peu fréquente	17,5	18,7	19,3	17,1	518
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2797
CONSOMMATION DE POISSON					
Au moins hebdomadaire	70,4	64,8	72,3	70,9	1893
Moins que hebdomadaire	29,6	35,2	27,7	29,1	933
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2826
FRUITS ET LEGUMES					
>=2 portions par jour	34,5	43,1	45,9	51,8	1247
<2 portions par jour	65,5	56,9	54,1	48,2	1573
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2820
TYPE DE PAIN CONSOMME					
Pain gris prédominant	30,4	36,8	33,4	34,5	1073
Pain blanc prédominant	69,6	63,2	66,6	65,5	1698
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2771

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	IMC				Total
	Maigreur	Poids normal	Excès de poids	Obésité	N
	col %	col %	col %	col %	
Corps gras sur le pain					
Pas de corps gras	21,4	20,4	17,6	16,8	1322
Beurre	38,8	31,9	33,0	29,7	3032
Margarine	20,2	22,3	20,4	18,9	1611
Margarine de régime	17,2	23,1	26,3	31,3	1816
Autre	,5	,5	,4	1,2	55
Beurre ou margarine	1,4	1,4	1,5	,8	120
Margarine ou huile	,5	,4	,8	1,3	55
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	8011
GRAISSES DE CUISSON					
Pas de corps gras	2,7	,8	2,2	2,2	105
Beurre	15,0	16,3	16,1	14,4	1204
Margarine	50,8	52,1	55,5	54,4	4008
Huile	22,0	18,2	16,0	16,5	1771
Autre	,0	,1	,1	,1	9
Beurre/margarine	4,7	4,7	4,0	4,9	402
Margarine/huile	3,8	6,1	4,1	5,5	389
Produit de régime	,9	1,7	2,0	2,0	101
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	7989
GRAISSES DE FRITURE					
Pas d'aliments frits	11,6	7,6	6,7	6,0	895
Graisse animale	4,4	8,2	8,1	9,0	608
Graisse végétale	30,8	32,2	31,0	29,5	2352
Huile	47,6	46,5	47,1	48,5	3702
Huile de composition mixte	3,2	3,9	4,5	4,7	264
Autre	,2	,2	,1	,3	20
Matières grasses diverses	1,0	,8	1,0	,9	66
Huile de régime	1,2	,7	1,5	1,0	48
Belgique	100,0	100,0	100,0	100,0	7955
CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES					
Pas de crudités	1,5	1,1	1,0	,4	80
Pas d'huile	15,0	11,8	12,0	5,9	692
Huile	80,5	83,5	82,7	90,0	6935
Produit diététique	1,0	1,5	2,2	1,5	127
Autre	2,0	2,0	2,1	2,2	160
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	7994

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	IMC				Total
	Maigreur	Poids normal	Excès de poids	Obésité	N
	col %	col %	col %	col %	
Corps gras sur le pain					
Pas de corps gras	23,2	22,5	18,6	20,1	530
Beurre	29,9	22,0	24,2	17,7	665
Margarine	21,3	26,0	22,6	18,9	635
Margarine de régime	22,8	27,3	33,2	39,5	901
Autre	,3	,4	,2	1,1	11
Beurre ou margarine	1,9	1,7	,9	,9	41
Margarine ou huile	,5	,1	,3	1,9	6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2789
GRAISSES DE CUISSON					
Pas de corps gras	2,7	,8	2,1	3,0	45
Beurre	15,3	15,2	15,0	12,7	395
Margarine	52,0	54,4	59,0	60,0	1534
Huile	20,1	16,0	13,1	12,1	466
Beurre/margarine	4,2	4,7	3,6	4,9	120
Margarine/huile	4,2	7,0	4,4	3,6	153
Produit de régime	1,6	1,9	2,8	3,6	67
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2780
GRAISSES DE FRITURE					
Pas d'aliments frits	9,3	5,5	5,7	6,3	202
Graisse animale	4,2	8,2	8,3	9,0	213
Graisse végétale	30,5	32,9	30,6	29,0	882
Huile	49,6	46,8	46,5	50,0	1286
Huile de composition mixte	3,6	4,6	5,9	4,2	119
Autre	,1	,1	,1	,0	5
Matières grasses diverses	,6	1,0	,7	,2	27
Huile de régime	2,2	,9	2,2	1,3	35
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2769
CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES					
Pas de crudités	1,9	1,7	,9	,7	40
Pas d'huile	20,8	16,2	16,9	8,1	419
Huile	74,2	78,0	78,0	88,3	2200
Produit diététique	1,5	2,0	2,6	2,4	79
Autre	1,6	2,1	1,5	,6	41
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2779

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	IMC				Total
	Maigreur	Poids normal	Excès de poids	Obésité	N
	col %	col %	col %	col %	

Corps gras sur le pain					
Pas de corps gras	13,9	15,8	20,5	14,5	381
Beurre	51,5	40,3	34,8	38,0	974
Margarine	21,3	24,2	22,0	25,1	535
Margarine de régime	10,7	15,0	17,9	19,2	411
Autre	,6	2,2	,7	,8	27
Beurre ou margarine	1,2	2,1	2,7	1,9	51
Margarine ou huile	,9	,5	1,4	,6	20
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2399
GRAISSES DE CUISSON					
Pas de corps gras	1,1	,5	3,0	,9	25
Beurre	15,8	11,5	13,3	9,6	275
Margarine	32,7	34,9	35,1	34,4	895
Huile	35,8	39,9	36,7	43,7	876
Autre	,0	,0	,0	,0	2
Beurre/margarine	9,7	6,5	5,4	7,8	162
Margarine/huile	4,4	5,9	5,6	3,4	137
Produit de régime	,5	,7	,8	,2	21
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2393
GRAISSES DE FRITURE					
Pas d'aliments frits	20,8	20,2	16,7	10,6	469
Graisse animale	3,9	4,4	5,2	8,6	119
Graisse végétale	18,2	18,9	14,9	22,2	466
Huile	53,5	54,2	60,0	57,0	1242
Huile de composition mixte	2,1	1,4	1,6	,3	44
Autre	,0	,3	,0	,7	7
Matières grasses diverses	1,5	,5	1,0	,0	17
Huile de régime	,0	,1	,6	,6	8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2372
CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES					
Pas de crudités	2,6	,7	,3	,6	28
Pas d'huile	9,1	6,5	7,4	4,6	154
Huile	85,8	90,8	90,6	89,6	2159
Produit diététique	,3	1,0	1,1	1,0	25
Autre	2,2	,9	,6	4,3	30
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2396

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	IMC				Total
	Maigreur	Poids normal	Excès de poids	Obésité	N
	col %	col %	col %	col %	

Corps gras sur le pain					
Pas de corps gras	21,4	18,1	15,0	13,2	411
Beurre	49,0	48,1	48,2	43,2	1393
Margarine	17,9	14,1	15,9	17,4	441
Margarine de régime	10,0	17,9	16,5	23,7	504
Autre	,8	,2	,7	1,5	17
Beurre ou margarine	,6	,7	2,0	,4	28
Margarine ou huile	,2	,8	1,6	,6	29
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2823
GRAISSES DE CUISSON					
Pas de corps gras	3,3	,9	2,1	1,6	35
Beurre	14,1	20,3	19,0	17,6	534
Margarine	56,4	54,1	55,1	51,9	1579
Huile	19,5	14,3	15,2	15,9	429
Autre	,0	,3	,2	,2	7
Beurre/margarine	3,6	4,0	4,4	4,2	120
Margarine/huile	3,0	4,5	3,2	8,3	99
Produit de régime	,1	1,6	,8	,4	13
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2816
GRAISSES DE FRITURE					
Pas d'aliments frits	11,7	6,9	5,7	4,7	224
Graisse animale	5,0	9,6	8,7	9,1	276
Graisse végétale	36,7	36,1	36,3	31,8	1004
Huile	41,7	42,9	44,4	44,7	1174
Huile de composition mixte	2,9	3,4	2,8	6,4	101
Autre	,4	,2	,2	,5	8
Matières grasses diverses	1,5	,4	1,5	2,0	22
Huile de régime	,0	,5	,5	,8	5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2814
CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES					
Pas de crudités	,1	,2	1,4	,1	12
Pas d'huile	7,5	5,2	4,6	3,4	119
Huile	89,2	91,5	88,9	92,2	2576
Produit diététique	,4	,7	1,6	,5	23
Autre	2,8	2,4	3,5	3,7	89
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	2819
