

HABITUDES ALIMENTAIRES(NU06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES | | | Total |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| | 1-2X/sem. | 3-5X/sem. | 6-7X/sem. | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 1,6 | 12,2 | 86,2 | 4880 |
| Femme | 1,5 | 11,1 | 87,4 | 5139 |
| Total | 1,6 | 11,6 | 86,8 | 10019 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 0-14 | ,7 | 7,8 | 91,5 | 1564 |
| 15-24 | 2,8 | 13,3 | 83,9 | 1126 |
| 25-34 | 2,1 | 18,0 | 79,9 | 1631 |
| 35-44 | 2,5 | 14,5 | 83,0 | 1598 |
| 45-54 | ,9 | 9,7 | 89,4 | 1279 |
| 55-64 | ,7 | 5,7 | 93,6 | 1084 |
| 65-74 | ,6 | 8,9 | 90,5 | 1068 |
| 75 + | ,5 | 6,6 | 92,9 | 669 |
| Total | 1,6 | 11,6 | 86,8 | 10019 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 1,2 | 8,5 | 90,4 | 346 |
| Primaire | 1,7 | 8,7 | 89,6 | 1277 |
| Secondaire inférieur | 2,5 | 14,0 | 83,5 | 1637 |
| Secondaire supérieur | 1,4 | 11,4 | 87,2 | 2894 |
| Supérieur | 1,2 | 11,0 | 87,8 | 3446 |
| Total | 1,5 | 11,3 | 87,1 | 9600 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 2,7 | 8,8 | 88,5 | 781 |
| 20.000-30.000 | 3,1 | 11,3 | 85,6 | 2000 |
| 30.000-40.000 | ,9 | 10,7 | 88,4 | 2326 |
| 40.000-60.000 | 1,0 | 11,8 | 87,2 | 3197 |
| >60.000 | 1,4 | 14,3 | 84,2 | 1263 |
| Total | 1,6 | 11,6 | 86,8 | 9567 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,4 | 12,8 | 85,9 | 5865 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,5 | 10,1 | 87,4 | 2000 |
| Total | 1,6 | 12,2 | 86,2 | 7865 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 1,3 | 11,2 | 87,5 | 3693 |
| Dans le passé | 1,3 | 10,1 | 88,6 | 1911 |
| Modéré (< 20) | 2,6 | 15,3 | 82,1 | 1551 |
| Gros fumeur | 3,1 | 15,7 | 81,2 | 821 |
| Total | 1,7 | 12,2 | 86,0 | 7976 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | |
| Région Flamande | 1,1 | 13,3 | 85,7 | 3447 |
| Région Bruxelloise | 2,8 | 11,6 | 85,7 | 2991 |
| Wallonie | 2,1 | 8,8 | 89,2 | 3581 |
| Belgique | 1,6 | 11,6 | 86,8 | 10019 |

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU06_1)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES | | | Total |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| | 1-2X/sem. | 3-5X/sem. | 6-7X/sem. | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 1,3 | 13,9 | 84,8 | 1706 |
| Femme | ,8 | 12,6 | 86,5 | 1741 |
| Total | 1,1 | 13,3 | 85,7 | 3447 |
| GROUPES AGE | | | | |
| 0-14 | ,4 | 8,1 | 91,5 | 498 |
| 15-24 | 2,0 | 15,0 | 82,9 | 422 |
| 25-34 | 1,5 | 19,3 | 79,2 | 583 |
| 35-44 | 1,7 | 17,5 | 80,8 | 527 |
| 45-54 | ,2 | 11,0 | 88,7 | 462 |
| 55-64 | ,9 | 6,4 | 92,6 | 404 |
| 65-74 | ,1 | 12,0 | 87,8 | 359 |
| 75 + | ,0 | 8,2 | 91,8 | 192 |
| Total | 1,1 | 13,3 | 85,7 | 3447 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | ,0 | 4,4 | 95,6 | 63 |
| Primaire | ,9 | 10,2 | 88,8 | 422 |
| Secondaire inférieur | 1,5 | 17,6 | 80,9 | 596 |
| Secondaire supérieur | 1,0 | 12,5 | 86,5 | 1146 |
| Supérieur | ,9 | 12,1 | 87,0 | 1100 |
| Total | 1,0 | 12,9 | 86,1 | 3327 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | ,6 | 6,2 | 93,3 | 118 |
| 20.000-30.000 | 2,1 | 11,0 | 86,9 | 599 |
| 30.000-40.000 | ,6 | 13,0 | 86,4 | 836 |
| 40.000-60.000 | ,8 | 13,6 | 85,6 | 1258 |
| >60.000 | ,8 | 17,2 | 81,9 | 445 |
| Total | 1,0 | 13,2 | 85,7 | 3256 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,0 | 14,3 | 84,7 | 2256 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,2 | 11,3 | 86,5 | 564 |
| Total | 1,2 | 13,7 | 85,1 | 2820 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | ,5 | 12,6 | 86,9 | 1365 |
| Dans le passé | 1,0 | 11,0 | 88,0 | 700 |
| Modéré (< 20) | 2,6 | 17,3 | 80,1 | 554 |
| Gros fumeur | 2,7 | 20,7 | 76,6 | 233 |
| Total | 1,2 | 13,9 | 84,9 | 2852 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES | | | Total |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| | 1-2X/sem. | 3-5X/sem. | 6-7X/sem. | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 2,9 | 11,3 | 85,8 | 1447 |
| Femme | 2,7 | 11,8 | 85,5 | 1544 |
| Total | 2,8 | 11,6 | 85,7 | 2991 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 0-14 | ,5 | 5,2 | 94,2 | 464 |
| 15-24 | 4,7 | 19,8 | 75,5 | 306 |
| 25-34 | 3,8 | 18,7 | 77,6 | 493 |
| 35-44 | 3,9 | 13,0 | 83,2 | 485 |
| 45-54 | 3,3 | 8,7 | 88,0 | 379 |
| 55-64 | 1,1 | 6,1 | 92,9 | 309 |
| 65-74 | 1,8 | 6,3 | 91,9 | 322 |
| 75 + | ,8 | 5,7 | 93,5 | 233 |
| Total | 2,8 | 11,6 | 85,7 | 2991 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 1,6 | 4,5 | 93,9 | 163 |
| Primaire | 4,4 | 8,1 | 87,5 | 360 |
| Secondaire inférieur | 4,1 | 13,0 | 82,9 | 420 |
| Secondaire supérieur | 2,4 | 12,3 | 85,3 | 698 |
| Supérieur | 2,1 | 12,2 | 85,7 | 1187 |
| Total | 2,7 | 11,3 | 86,0 | 2828 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 4,6 | 15,3 | 80,1 | 366 |
| 20.000-30.000 | 4,6 | 9,8 | 85,6 | 608 |
| 30.000-40.000 | 1,3 | 12,5 | 86,2 | 598 |
| 40.000-60.000 | 1,3 | 11,3 | 87,3 | 784 |
| >60.000 | 2,5 | 10,4 | 87,1 | 491 |
| Total | 2,8 | 11,6 | 85,6 | 2847 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 2,7 | 13,6 | 83,8 | 1665 |
| Très mauvaise à moyenne | 4,8 | 10,4 | 84,8 | 610 |
| Total | 3,2 | 12,8 | 84,0 | 2275 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 1,5 | 11,1 | 87,4 | 1006 |
| Dans le passé | 4,2 | 12,9 | 83,0 | 555 |
| Modéré (< 20) | 5,2 | 15,0 | 79,8 | 451 |
| Gros fumeur | 4,4 | 15,0 | 80,7 | 276 |
| Total | 3,2 | 12,8 | 84,0 | 2288 |

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES | | | Total |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| | 1-2X/sem. | 3-5X/sem. | 6-7X/sem. | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 1,8 | 9,4 | 88,8 | 1727 |
| Femme | 2,3 | 8,2 | 89,5 | 1854 |
| Total | 2,1 | 8,8 | 89,2 | 3581 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 0-14 | 1,3 | 8,1 | 90,7 | 602 |
| 15-24 | 3,5 | 8,3 | 88,2 | 398 |
| 25-34 | 2,5 | 15,4 | 82,1 | 555 |
| 35-44 | 3,5 | 9,7 | 86,8 | 586 |
| 45-54 | 1,5 | 7,4 | 91,1 | 438 |
| 55-64 | ,1 | 4,0 | 95,9 | 371 |
| 65-74 | ,9 | 5,1 | 94,0 | 387 |
| 75 + | 1,2 | 4,7 | 94,1 | 244 |
| Total | 2,1 | 8,8 | 89,2 | 3581 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 1,9 | 14,8 | 83,3 | 120 |
| Primaire | 2,1 | 6,4 | 91,5 | 495 |
| Secondaire inférieur | 3,7 | 8,1 | 88,2 | 621 |
| Secondaire supérieur | 2,1 | 8,9 | 89,0 | 1050 |
| Supérieur | 1,2 | 8,8 | 89,9 | 1159 |
| Total | 2,1 | 8,7 | 89,3 | 3445 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 3,2 | 6,9 | 89,8 | 297 |
| 20.000-30.000 | 4,0 | 12,3 | 83,7 | 793 |
| 30.000-40.000 | 1,1 | 7,0 | 91,9 | 892 |
| 40.000-60.000 | 1,2 | 8,6 | 90,2 | 1155 |
| >60.000 | 2,5 | 8,5 | 89,0 | 327 |
| Total | 2,1 | 8,9 | 89,0 | 3464 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,7 | 9,3 | 88,9 | 1944 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,2 | 8,6 | 89,2 | 826 |
| Total | 1,9 | 9,1 | 89,0 | 2770 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 2,9 | 8,6 | 88,5 | 1322 |
| Dans le passé | 1,0 | 7,6 | 91,4 | 656 |
| Modéré (< 20) | 1,7 | 11,8 | 86,5 | 546 |
| Gros fumeur | 3,3 | 8,7 | 88,0 | 312 |
| Total | 2,3 | 9,0 | 88,7 | 2836 |

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU07_1)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PETITS DEJEUNERS | | | Total |
|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------|
| | 1-2X/sem. | 3-5X/sem. | 6-7X/sem. | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 6,7 | 5,9 | 87,3 | 4359 |
| Femme | 4,9 | 5,4 | 89,8 | 4699 |
| Total | 5,8 | 5,6 | 88,6 | 9058 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 0-14 | 3,3 | 4,4 | 92,4 | 1522 |
| 15-24 | 11,0 | 13,1 | 76,0 | 980 |
| 25-34 | 10,4 | 8,9 | 80,6 | 1409 |
| 35-44 | 7,6 | 5,6 | 86,7 | 1380 |
| 45-54 | 3,8 | 3,7 | 92,6 | 1122 |
| 55-64 | 2,0 | 1,4 | 96,6 | 992 |
| 65-74 | ,6 | 1,1 | 98,3 | 1004 |
| 75 + | ,2 | ,4 | 99,4 | 649 |
| Total | 5,8 | 5,6 | 88,6 | 9058 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 4,3 | 7,9 | 87,8 | 313 |
| Primaire | 4,7 | 2,8 | 92,6 | 1131 |
| Secondaire inférieur | 5,4 | 6,1 | 88,5 | 1451 |
| Secondaire supérieur | 7,1 | 5,9 | 87,0 | 2565 |
| Supérieur | 5,1 | 5,9 | 89,0 | 3223 |
| Total | 5,8 | 5,6 | 88,6 | 8683 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 7,0 | 4,2 | 88,8 | 680 |
| 20.000-30.000 | 4,8 | 5,6 | 89,6 | 1751 |
| 30.000-40.000 | 5,3 | 5,8 | 88,9 | 2096 |
| 40.000-60.000 | 6,2 | 5,9 | 88,0 | 2927 |
| >60.000 | 7,6 | 6,4 | 86,0 | 1177 |
| Total | 5,9 | 5,8 | 88,3 | 8631 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 6,6 | 6,0 | 87,4 | 5255 |
| Très mauvaise à moyenne | 6,0 | 4,2 | 89,8 | 1760 |
| Total | 6,5 | 5,6 | 87,9 | 7015 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 4,3 | 4,9 | 90,8 | 3450 |
| Dans le passé | 5,4 | 4,0 | 90,6 | 1779 |
| Modéré (< 20) | 11,3 | 8,9 | 79,8 | 1317 |
| Gros fumeur | 11,4 | 9,3 | 79,2 | 554 |
| Total | 6,4 | 5,8 | 87,8 | 7100 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | |
| Région Flamande | 5,5 | 5,5 | 88,9 | 3196 |
| Région Bruxelloise | 7,1 | 5,4 | 87,5 | 2709 |
| Wallonie | 5,8 | 6,0 | 88,2 | 3153 |
| Belgique | 5,8 | 5,6 | 88,6 | 9058 |

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PETITS DEJEUNERS | | | Total |
|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------|
| | 1-2X/sem. | 3-5X/sem. | 6-7X/sem. | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 6,3 | 5,4 | 88,3 | 1557 |
| Femme | 4,8 | 5,6 | 89,6 | 1639 |
| Total | 5,5 | 5,5 | 88,9 | 3196 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 0-14 | 3,6 | 4,7 | 91,7 | 493 |
| 15-24 | 11,1 | 13,3 | 75,6 | 373 |
| 25-34 | 10,1 | 8,8 | 81,0 | 516 |
| 35-44 | 7,6 | 4,4 | 87,9 | 471 |
| 45-54 | 2,1 | 4,1 | 93,7 | 434 |
| 55-64 | 1,5 | 1,3 | 97,3 | 379 |
| 65-74 | ,5 | ,0 | 99,5 | 341 |
| 75 + | ,0 | ,3 | 99,7 | 189 |
| Total | 5,5 | 5,5 | 88,9 | 3196 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 2,1 | 15,5 | 82,3 | 58 |
| Primaire | 5,1 | 2,1 | 92,8 | 394 |
| Secondaire inférieur | 4,7 | 4,5 | 90,8 | 552 |
| Secondaire supérieur | 8,0 | 6,0 | 86,0 | 1036 |
| Supérieur | 3,7 | 5,9 | 90,5 | 1049 |
| Total | 5,5 | 5,5 | 89,0 | 3089 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 2,5 | 2,7 | 94,7 | 111 |
| 20.000-30.000 | 4,3 | 5,5 | 90,2 | 537 |
| 30.000-40.000 | 5,1 | 6,3 | 88,6 | 779 |
| 40.000-60.000 | 6,2 | 5,2 | 88,6 | 1167 |
| >60.000 | 7,3 | 6,7 | 86,0 | 421 |
| Total | 5,7 | 5,7 | 88,7 | 3015 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 6,3 | 5,6 | 88,1 | 2077 |
| Très mauvaise à moyenne | 4,9 | 3,4 | 91,7 | 516 |
| Total | 6,0 | 5,2 | 88,7 | 2593 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 3,7 | 5,0 | 91,3 | 1299 |
| Dans le passé | 5,7 | 3,7 | 90,6 | 666 |
| Modéré (< 20) | 11,6 | 8,0 | 80,4 | 482 |
| Gros fumeur | 8,4 | 8,6 | 83,0 | 168 |
| Total | 6,0 | 5,5 | 88,5 | 2615 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PETITS DEJEUNERS | | | Total |
|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------|
| | 1-2X/sem. | 3-5X/sem. | 6-7X/sem. | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 8,2 | 6,2 | 85,6 | 1296 |
| Femme | 6,0 | 4,7 | 89,3 | 1413 |
| Total | 7,1 | 5,4 | 87,5 | 2709 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 0-14 | 2,1 | 5,0 | 92,9 | 448 |
| 15-24 | 8,4 | 9,7 | 81,9 | 270 |
| 25-34 | 13,8 | 7,6 | 78,6 | 445 |
| 35-44 | 10,5 | 7,6 | 81,9 | 421 |
| 45-54 | 8,6 | 4,4 | 87,0 | 321 |
| 55-64 | 2,1 | 2,3 | 95,6 | 277 |
| 65-74 | 1,5 | 1,0 | 97,6 | 300 |
| 75 + | 1,2 | ,0 | 98,8 | 227 |
| Total | 7,1 | 5,4 | 87,5 | 2709 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | ,5 | ,0 | 99,5 | 150 |
| Primaire | 5,2 | 3,3 | 91,5 | 311 |
| Secondaire inférieur | 7,0 | 7,2 | 85,7 | 370 |
| Secondaire supérieur | 9,4 | 4,3 | 86,3 | 618 |
| Supérieur | 7,7 | 7,2 | 85,1 | 1111 |
| Total | 7,2 | 5,4 | 87,4 | 2560 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 5,4 | 6,3 | 88,2 | 329 |
| 20.000-30.000 | 6,0 | 4,8 | 89,3 | 537 |
| 30.000-40.000 | 10,3 | 3,2 | 86,5 | 537 |
| 40.000-60.000 | 7,4 | 7,1 | 85,5 | 712 |
| >60.000 | 6,7 | 6,1 | 87,2 | 459 |
| Total | 7,3 | 5,5 | 87,3 | 2574 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 8,3 | 5,9 | 85,8 | 1500 |
| Très mauvaise à moyenne | 7,7 | 2,8 | 89,4 | 533 |
| Total | 8,1 | 5,2 | 86,7 | 2033 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 7,5 | 3,5 | 89,1 | 941 |
| Dans le passé | 6,3 | 4,8 | 88,9 | 520 |
| Modéré (< 20) | 10,7 | 7,9 | 81,4 | 383 |
| Gros fumeur | 13,1 | 10,1 | 76,8 | 200 |
| Total | 8,4 | 5,3 | 86,3 | 2044 |

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PETITS DEJEUNERS | | | Total |
|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------|
| | 1-2X/sem. | 3-5X/sem. | 6-7X/sem. | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 7,0 | 6,8 | 86,2 | 1506 |
| Femme | 4,7 | 5,2 | 90,2 | 1647 |
| Total | 5,8 | 6,0 | 88,2 | 3153 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 0-14 | 3,0 | 3,7 | 93,3 | 581 |
| 15-24 | 11,5 | 13,8 | 74,7 | 337 |
| 25-34 | 9,7 | 9,6 | 80,7 | 448 |
| 35-44 | 6,7 | 7,3 | 86,0 | 488 |
| 45-54 | 6,0 | 2,4 | 91,7 | 367 |
| 55-64 | 3,1 | 1,5 | 95,4 | 336 |
| 65-74 | ,4 | 2,8 | 96,7 | 363 |
| 75 + | ,0 | ,8 | 99,2 | 233 |
| Total | 5,8 | 6,0 | 88,2 | 3153 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 9,5 | 6,0 | 84,6 | 105 |
| Primaire | 3,6 | 3,8 | 92,6 | 426 |
| Secondaire inférieur | 6,5 | 8,6 | 84,9 | 529 |
| Secondaire supérieur | 4,5 | 6,0 | 89,5 | 911 |
| Supérieur | 6,6 | 5,5 | 87,9 | 1063 |
| Total | 5,7 | 6,0 | 88,3 | 3034 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 11,6 | 4,0 | 84,4 | 240 |
| 20.000-30.000 | 5,2 | 5,9 | 88,9 | 677 |
| 30.000-40.000 | 4,2 | 5,7 | 90,1 | 780 |
| 40.000-60.000 | 5,7 | 7,0 | 87,3 | 1048 |
| >60.000 | 9,1 | 5,6 | 85,3 | 297 |
| Total | 6,0 | 6,1 | 88,0 | 3042 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 6,8 | 6,9 | 86,4 | 1678 |
| Très mauvaise à moyenne | 6,8 | 5,7 | 87,4 | 711 |
| Total | 6,8 | 6,6 | 86,7 | 2389 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 4,4 | 5,2 | 90,5 | 1210 |
| Dans le passé | 4,6 | 4,3 | 91,1 | 593 |
| Modéré (< 20) | 10,9 | 11,0 | 78,1 | 452 |
| Gros fumeur | 15,7 | 10,3 | 74,1 | 186 |
| Total | 6,6 | 6,5 | 86,9 | 2441 |

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU08_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES | | | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | Moins que hebdomadaire | Au moins hebdomadaire | Quotidien ou presque | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 14,3 | 23,2 | 62,5 | 4912 |
| Femme | 15,3 | 27,9 | 56,7 | 5165 |
| Total | 14,8 | 25,6 | 59,6 | 10077 |
| GROUPES AGE | | | | |
| 0-14 | 9,4 | 10,2 | 80,4 | 1595 |
| 15-24 | 3,8 | 19,3 | 76,9 | 1141 |
| 25-34 | 7,0 | 27,2 | 65,8 | 1630 |
| 35-44 | 13,1 | 30,0 | 56,9 | 1603 |
| 45-54 | 23,0 | 30,7 | 46,3 | 1285 |
| 55-64 | 28,6 | 31,8 | 39,6 | 1088 |
| 65-74 | 27,2 | 33,2 | 39,5 | 1067 |
| 75 + | 28,9 | 31,4 | 39,8 | 668 |
| Total | 14,8 | 25,6 | 59,6 | 10077 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 24,5 | 19,1 | 56,5 | 347 |
| Primaire | 18,9 | 24,9 | 56,2 | 1280 |
| Secondaire inférieur | 15,3 | 22,2 | 62,5 | 1649 |
| Secondaire supérieur | 13,2 | 24,1 | 62,7 | 2919 |
| Supérieur | 13,8 | 29,5 | 56,7 | 3460 |
| Total | 14,7 | 25,6 | 59,6 | 9655 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 13,5 | 25,5 | 61,0 | 784 |
| 20.000-30.000 | 15,9 | 22,3 | 61,8 | 2023 |
| 30.000-40.000 | 14,8 | 24,2 | 60,9 | 2343 |
| 40.000-60.000 | 13,9 | 26,2 | 59,9 | 3206 |
| >60.000 | 15,3 | 31,0 | 53,6 | 1272 |
| Total | 14,7 | 25,5 | 59,8 | 9628 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 13,8 | 28,9 | 57,3 | 5887 |
| Très mauvaise à moyenne | 21,9 | 27,2 | 50,9 | 2015 |
| Total | 15,6 | 28,5 | 55,9 | 7902 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 14,6 | 30,5 | 54,9 | 3692 |
| Dans le passé | 17,2 | 29,0 | 53,8 | 1918 |
| Modéré (< 20) | 15,0 | 27,1 | 58,0 | 1562 |
| Gros fumeur | 16,6 | 21,7 | 61,7 | 834 |
| Total | 15,5 | 28,5 | 56,0 | 8006 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | |
| Région Flamande | 13,4 | 26,2 | 60,4 | 3467 |
| Région Bruxelloise | 16,0 | 27,4 | 56,6 | 3009 |
| Wallonie | 16,9 | 23,9 | 59,2 | 3601 |
| Belgique | 14,8 | 25,6 | 59,6 | 10077 |

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU08_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES | | | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | Moins que hebdomadaire | Au moins hebdomadaire | Quotidien ou presque | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 13,4 | 23,5 | 63,2 | 1719 |
| Femme | 13,5 | 28,9 | 57,6 | 1748 |
| Total | 13,4 | 26,2 | 60,4 | 3467 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 0-14 | 10,3 | 10,1 | 79,5 | 510 |
| 15-24 | 2,2 | 21,6 | 76,2 | 426 |
| 25-34 | 5,9 | 26,7 | 67,3 | 585 |
| 35-44 | 11,0 | 31,2 | 57,7 | 528 |
| 45-54 | 22,7 | 30,5 | 46,8 | 464 |
| 55-64 | 24,6 | 30,5 | 45,0 | 404 |
| 65-74 | 25,6 | 34,0 | 40,3 | 360 |
| 75 + | 22,2 | 37,2 | 40,6 | 190 |
| Total | 13,4 | 26,2 | 60,4 | 3467 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 25,2 | 19,5 | 55,3 | 63 |
| Primaire | 17,9 | 26,3 | 55,8 | 419 |
| Secondaire inférieur | 13,7 | 20,7 | 65,7 | 599 |
| Secondaire supérieur | 11,5 | 26,4 | 62,1 | 1154 |
| Supérieur | 12,8 | 29,6 | 57,6 | 1110 |
| Total | 13,3 | 26,3 | 60,4 | 3345 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 18,9 | 26,6 | 54,5 | 117 |
| 20.000-30.000 | 13,8 | 21,6 | 64,6 | 601 |
| 30.000-40.000 | 13,1 | 23,6 | 63,4 | 842 |
| 40.000-60.000 | 11,9 | 27,5 | 60,5 | 1264 |
| >60.000 | 15,3 | 32,0 | 52,8 | 454 |
| Total | 13,3 | 26,1 | 60,6 | 3278 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 13,1 | 29,2 | 57,6 | 2268 |
| Très mauvaise à moyenne | 18,1 | 25,6 | 56,3 | 565 |
| Total | 14,0 | 28,6 | 57,4 | 2833 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 12,5 | 31,3 | 56,2 | 1365 |
| Dans le passé | 16,0 | 28,7 | 55,3 | 702 |
| Modéré (< 20) | 12,1 | 27,1 | 60,8 | 556 |
| Gros fumeur | 15,2 | 22,4 | 62,4 | 240 |
| Total | 13,5 | 29,0 | 57,5 | 2863 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU08_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES | | | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | Moins que hebdomadaire | Au moins hebdomadaire | Quotidien ou presque | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 14,7 | 27,0 | 58,4 | 1455 |
| Femme | 17,2 | 27,8 | 55,0 | 1554 |
| Total | 16,0 | 27,4 | 56,6 | 3009 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 0-14 | 6,7 | 18,8 | 74,6 | 468 |
| 15-24 | 2,3 | 16,1 | 81,5 | 311 |
| 25-34 | 7,1 | 28,8 | 64,1 | 494 |
| 35-44 | 15,5 | 31,8 | 52,8 | 488 |
| 45-54 | 25,3 | 36,0 | 38,7 | 380 |
| 55-64 | 31,2 | 34,8 | 34,1 | 312 |
| 65-74 | 28,1 | 26,0 | 45,8 | 321 |
| 75 + | 34,7 | 29,3 | 36,1 | 235 |
| Total | 16,0 | 27,4 | 56,6 | 3009 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 22,5 | 15,5 | 62,0 | 164 |
| Primaire | 15,8 | 26,3 | 57,9 | 366 |
| Secondaire inférieur | 12,7 | 23,4 | 63,9 | 424 |
| Secondaire supérieur | 17,2 | 23,1 | 59,6 | 702 |
| Supérieur | 15,0 | 34,2 | 50,8 | 1189 |
| Total | 15,9 | 27,4 | 56,7 | 2845 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 8,7 | 25,7 | 65,5 | 369 |
| 20.000-30.000 | 16,9 | 25,3 | 57,8 | 624 |
| 30.000-40.000 | 17,2 | 25,9 | 56,8 | 600 |
| 40.000-60.000 | 13,9 | 26,7 | 59,4 | 781 |
| >60.000 | 19,1 | 33,9 | 46,9 | 492 |
| Total | 15,5 | 27,3 | 57,2 | 2866 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 15,3 | 29,8 | 54,9 | 1671 |
| Très mauvaise à moyenne | 23,9 | 28,1 | 47,9 | 620 |
| Total | 17,5 | 29,4 | 53,1 | 2291 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 17,0 | 30,5 | 52,5 | 1007 |
| Dans le passé | 20,5 | 31,4 | 48,1 | 561 |
| Modéré (< 20) | 17,4 | 26,9 | 55,7 | 455 |
| Gros fumeur | 17,2 | 23,1 | 59,8 | 277 |
| Total | 17,8 | 29,0 | 53,2 | 2300 |

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU08_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES | | | Total |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | Moins que hebdomadaire | Au moins hebdomadaire | Quotidien ou presque | N |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 15,8 | 21,6 | 62,6 | 1738 |
| Femme | 17,9 | 26,2 | 55,8 | 1863 |
| Total | 16,9 | 23,9 | 59,2 | 3601 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 0-14 | 8,7 | 8,2 | 83,1 | 617 |
| 15-24 | 7,0 | 16,3 | 76,7 | 404 |
| 25-34 | 9,0 | 27,6 | 63,4 | 551 |
| 35-44 | 15,9 | 27,4 | 56,7 | 587 |
| 45-54 | 22,8 | 29,7 | 47,5 | 441 |
| 55-64 | 36,2 | 33,7 | 30,1 | 372 |
| 65-74 | 29,3 | 34,5 | 36,2 | 386 |
| 75 + | 35,0 | 24,4 | 40,6 | 243 |
| Total | 16,9 | 23,9 | 59,2 | 3601 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 25,2 | 21,0 | 53,8 | 120 |
| Primaire | 21,7 | 22,1 | 56,2 | 495 |
| Secondaire inférieur | 18,7 | 24,5 | 56,8 | 626 |
| Secondaire supérieur | 15,5 | 19,6 | 64,9 | 1063 |
| Supérieur | 15,0 | 27,8 | 57,2 | 1161 |
| Total | 16,9 | 23,8 | 59,3 | 3465 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 12,7 | 24,6 | 62,8 | 298 |
| 20.000-30.000 | 18,5 | 22,2 | 59,3 | 798 |
| 30.000-40.000 | 16,9 | 24,8 | 58,3 | 901 |
| 40.000-60.000 | 17,7 | 23,6 | 58,8 | 1161 |
| >60.000 | 13,2 | 26,5 | 60,3 | 326 |
| Total | 16,9 | 23,9 | 59,2 | 3484 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 14,7 | 27,9 | 57,4 | 1948 |
| Très mauvaise à moyenne | 26,0 | 28,9 | 45,1 | 830 |
| Total | 17,8 | 28,1 | 54,1 | 2778 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 17,8 | 28,9 | 53,3 | 1320 |
| Dans le passé | 18,5 | 28,8 | 52,6 | 655 |
| Modéré (< 20) | 19,2 | 27,1 | 53,7 | 551 |
| Gros fumeur | 18,5 | 20,3 | 61,3 | 317 |
| Total | 18,3 | 27,5 | 54,2 | 2843 |

HABITUDES ALIMENTAIRES(NU0901_2)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PRODUITS LAITIERS | | Total |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------|
| | Quotidienne ou presque | Peu fréquente | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 74,5 | 25,5 | 4861 |
| Femme | 78,8 | 21,2 | 5123 |
| Total | 76,7 | 23,3 | 9984 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 85,5 | 14,5 | 1591 |
| 15-24 | 78,0 | 22,0 | 1123 |
| 25-34 | 75,3 | 24,7 | 1602 |
| 35-44 | 73,4 | 26,6 | 1583 |
| 45-54 | 72,9 | 27,1 | 1267 |
| 55-64 | 74,7 | 25,3 | 1082 |
| 65-74 | 76,7 | 23,3 | 1065 |
| 75 + | 76,2 | 23,8 | 671 |
| Total | 76,7 | 23,3 | 9984 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 78,4 | 21,6 | 347 |
| Primaire | 74,0 | 26,0 | 1278 |
| Secondaire inférieur | 73,0 | 27,0 | 1635 |
| Secondaire supérieur | 74,5 | 25,5 | 2883 |
| Supérieur | 81,0 | 19,0 | 3422 |
| Total | 76,6 | 23,4 | 9565 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 78,8 | 21,2 | 775 |
| 20.000-30.000 | 77,3 | 22,7 | 2001 |
| 30.000-40.000 | 75,2 | 24,8 | 2339 |
| 40.000-60.000 | 75,9 | 24,1 | 3166 |
| >60.000 | 78,0 | 22,0 | 1259 |
| Total | 76,5 | 23,5 | 9540 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 75,2 | 24,8 | 5817 |
| Très mauvaise à moyenne | 74,9 | 25,1 | 2002 |
| Total | 75,1 | 24,9 | 7819 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 77,4 | 22,6 | 3659 |
| Dans le passé | 75,4 | 24,6 | 1900 |
| Modéré (< 20) | 73,2 | 26,8 | 1542 |
| Gros fumeur | 67,7 | 32,3 | 822 |
| Total | 75,0 | 25,0 | 7923 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 72,7 | 27,3 | 3436 |
| Région Bruxelloise | 78,9 | 21,1 | 2970 |
| Wallonie | 83,0 | 17,0 | 3578 |
| Belgique | 76,7 | 23,3 | 9984 |

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_2)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PRODUITS LAITIERS | | Total |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------|
| | Quotidienne ou presque | Peu fréquente | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 69,4 | 30,6 | 1703 |
| Femme | 76,0 | 24,0 | 1733 |
| Total | 72,7 | 27,3 | 3436 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 83,2 | 16,8 | 507 |
| 15-24 | 73,4 | 26,6 | 421 |
| 25-34 | 69,3 | 30,7 | 576 |
| 35-44 | 69,5 | 30,5 | 522 |
| 45-54 | 67,2 | 32,8 | 458 |
| 55-64 | 72,2 | 27,8 | 401 |
| 65-74 | 74,9 | 25,1 | 359 |
| 75 + | 79,1 | 20,9 | 192 |
| Total | 72,7 | 27,3 | 3436 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 79,7 | 20,3 | 64 |
| Primaire | 71,5 | 28,5 | 419 |
| Secondaire inférieur | 70,6 | 29,4 | 595 |
| Secondaire supérieur | 69,3 | 30,7 | 1136 |
| Supérieur | 77,0 | 23,0 | 1101 |
| Total | 72,6 | 27,4 | 3315 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 80,1 | 19,9 | 117 |
| 20.000-30.000 | 72,3 | 27,7 | 595 |
| 30.000-40.000 | 71,8 | 28,2 | 839 |
| 40.000-60.000 | 70,8 | 29,2 | 1248 |
| >60.000 | 74,3 | 25,7 | 448 |
| Total | 72,2 | 27,8 | 3247 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 70,4 | 29,6 | 2240 |
| Très mauvaise à moyenne | 73,3 | 26,7 | 565 |
| Total | 70,9 | 29,1 | 2805 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 73,1 | 26,9 | 1354 |
| Dans le passé | 72,4 | 27,6 | 693 |
| Modéré (< 20) | 67,8 | 32,2 | 554 |
| Gros fumeur | 61,6 | 38,4 | 236 |
| Total | 70,8 | 29,2 | 2837 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PRODUITS LAITIERS | | Total |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------|
| | Quotidienne ou presque | Peu fréquente | N |
| | % | % | |
| | ----- | | |
| SEXE | | | |
| Homme | 78,1 | 21,9 | 1432 |
| Femme | 79,7 | 20,3 | 1538 |
| Total | 78,9 | 21,1 | 2970 |
| GROUPE AGE | | | |
| 0-14 | 85,1 | 14,9 | 469 |
| 15-24 | 76,0 | 24,0 | 305 |
| 25-34 | 79,5 | 20,5 | 480 |
| 35-44 | 77,4 | 22,6 | 479 |
| 45-54 | 77,6 | 22,4 | 372 |
| 55-64 | 74,7 | 25,3 | 309 |
| 65-74 | 84,4 | 15,6 | 321 |
| 75 + | 75,3 | 24,7 | 235 |
| Total | 78,9 | 21,1 | 2970 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 83,7 | 16,3 | 166 |
| Primaire | 73,6 | 26,4 | 365 |
| Secondaire inférieur | 72,2 | 27,8 | 416 |
| Secondaire supérieur | 78,1 | 21,9 | 695 |
| Supérieur | 82,9 | 17,1 | 1165 |
| Total | 79,0 | 21,0 | 2807 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 78,1 | 21,9 | 363 |
| 20.000-30.000 | 77,7 | 22,3 | 614 |
| 30.000-40.000 | 78,4 | 21,6 | 600 |
| 40.000-60.000 | 78,3 | 21,7 | 767 |
| >60.000 | 84,0 | 16,0 | 485 |
| Total | 79,1 | 20,9 | 2829 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 79,0 | 21,0 | 1640 |
| Très mauvaise à moyenne | 77,2 | 22,8 | 614 |
| Total | 78,5 | 21,5 | 2254 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 79,3 | 20,7 | 993 |
| Dans le passé | 79,0 | 21,0 | 552 |
| Modéré (< 20) | 79,8 | 20,2 | 446 |
| Gros fumeur | 67,5 | 32,5 | 273 |
| Total | 77,9 | 22,1 | 2264 |

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PRODUITS LAITIERS | | Total |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------|
| | Quotidienne ou presque | Peu fréquente | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 82,4 | 17,6 | 1726 |
| Femme | 83,5 | 16,5 | 1852 |
| Total | 83,0 | 17,0 | 3578 |
| GROUPE AGE | | | |
| 0-14 | 89,3 | 10,7 | 615 |
| 15-24 | 86,5 | 13,5 | 397 |
| 25-34 | 85,3 | 14,7 | 546 |
| 35-44 | 79,2 | 20,8 | 582 |
| 45-54 | 82,0 | 18,0 | 437 |
| 55-64 | 80,1 | 19,9 | 372 |
| 65-74 | 77,0 | 23,0 | 385 |
| 75 + | 72,5 | 27,5 | 244 |
| Total | 83,0 | 17,0 | 3578 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 73,5 | 26,5 | 117 |
| Primaire | 78,3 | 21,7 | 494 |
| Secondaire inférieur | 77,3 | 22,7 | 624 |
| Secondaire supérieur | 84,1 | 15,9 | 1052 |
| Supérieur | 86,7 | 13,3 | 1156 |
| Total | 82,9 | 17,1 | 3443 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 78,4 | 21,6 | 295 |
| 20.000-30.000 | 84,4 | 15,6 | 792 |
| 30.000-40.000 | 79,5 | 20,5 | 900 |
| 40.000-60.000 | 85,0 | 15,0 | 1151 |
| >60.000 | 85,1 | 14,9 | 326 |
| Total | 82,9 | 17,1 | 3464 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 83,8 | 16,2 | 1937 |
| Très mauvaise à moyenne | 76,2 | 23,8 | 823 |
| Total | 81,8 | 18,2 | 2760 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 84,7 | 15,3 | 1312 |
| Dans le passé | 80,1 | 19,9 | 655 |
| Modéré (< 20) | 80,6 | 19,4 | 542 |
| Gros fumeur | 76,3 | 23,7 | 313 |
| Total | 81,8 | 18,2 | 2822 |

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PRODUITS LAITIERS ECREMES DE PREFERENCE | | Total |
|-------------------------------|--|---------|-------|
| | Entiers | Ecrémés | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 29,5 | 70,5 | 4849 |
| Femme | 25,0 | 75,0 | 5101 |
| Total | 27,3 | 72,7 | 9950 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 36,6 | 63,4 | 1564 |
| 15-24 | 27,0 | 73,0 | 1130 |
| 25-34 | 27,0 | 73,0 | 1605 |
| 35-44 | 26,4 | 73,6 | 1593 |
| 45-54 | 21,9 | 78,1 | 1266 |
| 55-64 | 25,1 | 74,9 | 1073 |
| 65-74 | 23,4 | 76,6 | 1056 |
| 75 + | 29,5 | 70,5 | 663 |
| Total | 27,3 | 72,7 | 9950 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 46,7 | 53,3 | 347 |
| Primaire | 31,8 | 68,2 | 1257 |
| Secondaire inférieur | 33,0 | 67,0 | 1631 |
| Secondaire supérieur | 24,9 | 75,1 | 2888 |
| Supérieur | 23,2 | 76,8 | 3422 |
| Total | 27,1 | 72,9 | 9545 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 42,1 | 57,9 | 759 |
| 20.000-30.000 | 31,5 | 68,5 | 2008 |
| 30.000-40.000 | 28,2 | 71,8 | 2322 |
| 40.000-60.000 | 23,9 | 76,1 | 3168 |
| >60.000 | 20,1 | 79,9 | 1255 |
| Total | 27,0 | 73,0 | 9512 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 25,1 | 74,9 | 5818 |
| Très mauvaise à moyenne | 27,1 | 72,9 | 1994 |
| Total | 25,5 | 74,5 | 7812 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 24,4 | 75,6 | 3654 |
| Dans le passé | 24,2 | 75,8 | 1890 |
| Modéré (< 20) | 27,0 | 73,0 | 1549 |
| Gros fumeur | 33,0 | 67,0 | 825 |
| Total | 25,8 | 74,2 | 7918 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 21,3 | 78,7 | 3432 |
| Région Bruxelloise | 38,0 | 62,0 | 2960 |
| Wallonie | 34,3 | 65,7 | 3558 |
| Belgique | 27,3 | 72,7 | 9950 |

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PRODUITS LAITIERS ECREMES DE PREFERENCE | | Total |
|-------------------------------|--|---------|-------|
| | Entiers | Ecrémés | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 23,1 | 76,9 | 1701 |
| Femme | 19,5 | 80,5 | 1731 |
| Total | 21,3 | 78,7 | 3432 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 30,8 | 69,2 | 500 |
| 15-24 | 18,7 | 81,3 | 421 |
| 25-34 | 20,2 | 79,8 | 585 |
| 35-44 | 22,0 | 78,0 | 526 |
| 45-54 | 15,6 | 84,4 | 458 |
| 55-64 | 22,5 | 77,5 | 397 |
| 65-74 | 16,6 | 83,4 | 354 |
| 75 + | 24,8 | 75,2 | 191 |
| Total | 21,3 | 78,7 | 3432 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 45,0 | 55,0 | 64 |
| Primaire | 27,4 | 72,6 | 419 |
| Secondaire inférieur | 28,5 | 71,5 | 592 |
| Secondaire supérieur | 18,7 | 81,3 | 1138 |
| Supérieur | 16,6 | 83,4 | 1100 |
| Total | 21,1 | 78,9 | 3313 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 34,6 | 65,4 | 114 |
| 20.000-30.000 | 26,7 | 73,3 | 599 |
| 30.000-40.000 | 18,8 | 81,2 | 836 |
| 40.000-60.000 | 20,0 | 80,0 | 1254 |
| >60.000 | 15,1 | 84,9 | 445 |
| Total | 20,7 | 79,3 | 3248 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 19,4 | 80,6 | 2247 |
| Très mauvaise à moyenne | 21,8 | 78,2 | 562 |
| Total | 19,8 | 80,2 | 2809 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 17,9 | 82,1 | 1356 |
| Dans le passé | 21,2 | 78,8 | 692 |
| Modéré (< 20) | 20,8 | 79,2 | 553 |
| Gros fumeur | 26,1 | 73,9 | 239 |
| Total | 20,0 | 80,0 | 2840 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PRODUITS LAITIERS ECREMES DE PREFERENCE | | Total |
|-------------------------------|--|---------|-------|
| | Entiers | Ecrémés | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 40,5 | 59,5 | 1428 |
| Femme | 35,7 | 64,3 | 1532 |
| Total | 38,0 | 62,0 | 2960 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 46,4 | 53,6 | 456 |
| 15-24 | 44,8 | 55,2 | 308 |
| 25-34 | 36,5 | 63,5 | 482 |
| 35-44 | 33,6 | 66,4 | 481 |
| 45-54 | 35,0 | 65,0 | 375 |
| 55-64 | 38,4 | 61,6 | 307 |
| 65-74 | 31,5 | 68,5 | 319 |
| 75 + | 34,0 | 66,0 | 232 |
| Total | 38,0 | 62,0 | 2960 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 57,8 | 42,2 | 164 |
| Primaire | 38,0 | 62,0 | 354 |
| Secondaire inférieur | 46,8 | 53,2 | 419 |
| Secondaire supérieur | 38,9 | 61,1 | 699 |
| Supérieur | 30,0 | 70,0 | 1169 |
| Total | 37,7 | 62,3 | 2805 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 55,6 | 44,4 | 356 |
| 20.000-30.000 | 40,2 | 59,8 | 616 |
| 30.000-40.000 | 41,0 | 59,0 | 596 |
| 40.000-60.000 | 35,4 | 64,6 | 765 |
| >60.000 | 23,4 | 76,6 | 488 |
| Total | 38,5 | 61,5 | 2821 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 35,0 | 65,0 | 1644 |
| Très mauvaise à moyenne | 35,6 | 64,4 | 613 |
| Total | 35,1 | 64,9 | 2257 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 40,1 | 59,9 | 992 |
| Dans le passé | 26,0 | 74,0 | 549 |
| Modéré (< 20) | 34,4 | 65,6 | 451 |
| Gros fumeur | 40,7 | 59,3 | 275 |
| Total | 36,0 | 64,0 | 2267 |

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0901_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PRODUITS LAITIERS ECREMES DE PREFERENCE | | Total |
|-------------------------------|--|---------|-------|
| | Entiers | Ecrémés | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 37,3 | 62,7 | 1720 |
| Femme | 31,2 | 68,8 | 1838 |
| Total | 34,3 | 65,7 | 3558 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 42,8 | 57,2 | 608 |
| 15-24 | 35,4 | 64,6 | 401 |
| 25-34 | 37,0 | 63,0 | 538 |
| 35-44 | 31,8 | 68,2 | 586 |
| 45-54 | 30,0 | 70,0 | 433 |
| 55-64 | 25,8 | 74,2 | 369 |
| 65-74 | 30,9 | 69,1 | 383 |
| 75 + | 33,6 | 66,4 | 240 |
| Total | 34,3 | 65,7 | 3558 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 41,0 | 59,0 | 119 |
| Primaire | 36,9 | 63,1 | 484 |
| Secondaire inférieur | 37,4 | 62,6 | 620 |
| Secondaire supérieur | 33,7 | 66,3 | 1051 |
| Supérieur | 31,4 | 68,6 | 1153 |
| Total | 34,1 | 65,9 | 3427 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 39,7 | 60,3 | 289 |
| 20.000-30.000 | 35,3 | 64,7 | 793 |
| 30.000-40.000 | 39,1 | 60,9 | 890 |
| 40.000-60.000 | 28,7 | 71,3 | 1149 |
| >60.000 | 32,8 | 67,2 | 322 |
| Total | 34,1 | 65,9 | 3443 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 33,8 | 66,2 | 1927 |
| Très mauvaise à moyenne | 31,2 | 68,8 | 819 |
| Total | 33,1 | 66,9 | 2746 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 31,6 | 68,4 | 1306 |
| Dans le passé | 29,7 | 70,3 | 649 |
| Modéré (< 20) | 35,3 | 64,7 | 545 |
| Gros fumeur | 40,6 | 59,4 | 311 |
| Total | 33,0 | 67,0 | 2811 |

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0904_2)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATION DE POISSON | | Total |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| | Au moins hebdomadaire | Moins que hebdomadaire | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 70,3 | 29,7 | 4927 |
| Femme | 71,6 | 28,4 | 5175 |
| Total | 71,0 | 29,0 | 10102 |
| GROUPE AGE | | | |
| 0-14 | 71,0 | 29,0 | 1597 |
| 15-24 | 61,6 | 38,4 | 1143 |
| 25-34 | 63,8 | 36,2 | 1635 |
| 35-44 | 69,5 | 30,5 | 1604 |
| 45-54 | 77,2 | 22,8 | 1284 |
| 55-64 | 83,0 | 17,0 | 1093 |
| 65-74 | 76,2 | 23,8 | 1072 |
| 75 + | 78,6 | 21,4 | 674 |
| Total | 71,0 | 29,0 | 10102 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 69,7 | 30,3 | 351 |
| Primaire | 66,9 | 33,1 | 1286 |
| Secondaire inférieur | 65,9 | 34,1 | 1650 |
| Secondaire supérieur | 70,3 | 29,7 | 2925 |
| Supérieur | 74,8 | 25,2 | 3468 |
| Total | 70,8 | 29,2 | 9680 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 67,4 | 32,6 | 787 |
| 20.000-30.000 | 68,1 | 31,9 | 2030 |
| 30.000-40.000 | 72,8 | 27,2 | 2350 |
| 40.000-60.000 | 70,0 | 30,0 | 3210 |
| >60.000 | 76,2 | 23,8 | 1276 |
| Total | 70,9 | 29,1 | 9653 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 70,5 | 29,5 | 5900 |
| Très mauvaise à moyenne | 73,1 | 26,9 | 2020 |
| Total | 71,1 | 28,9 | 7920 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 74,5 | 25,5 | 3704 |
| Dans le passé | 74,5 | 25,5 | 1923 |
| Modéré (< 20) | 65,1 | 34,9 | 1566 |
| Gros fumeur | 58,2 | 41,8 | 834 |
| Total | 70,9 | 29,1 | 8027 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 71,0 | 29,0 | 3471 |
| Région Bruxelloise | 77,6 | 22,4 | 3021 |
| Wallonie | 68,8 | 31,2 | 3610 |
| Belgique | 71,0 | 29,0 | 10102 |

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0904 2)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATION DE POISSON | | Total |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| | Au moins hebdomadaire | Moins que hebdomadaire | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 70,6 | 29,4 | 1725 |
| Femme | 71,4 | 28,6 | 1746 |
| Total | 71,0 | 29,0 | 3471 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 70,1 | 29,9 | 510 |
| 15-24 | 58,5 | 41,5 | 426 |
| 25-34 | 64,4 | 35,6 | 587 |
| 35-44 | 69,3 | 30,7 | 527 |
| 45-54 | 78,6 | 21,4 | 462 |
| 55-64 | 85,8 | 14,2 | 406 |
| 65-74 | 77,5 | 22,5 | 361 |
| 75 + | 75,8 | 24,2 | 192 |
| Total | 71,0 | 29,0 | 3471 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 60,8 | 39,2 | 65 |
| Primaire | 66,9 | 33,1 | 421 |
| Secondaire inférieur | 67,4 | 32,6 | 599 |
| Secondaire supérieur | 70,2 | 29,8 | 1153 |
| Supérieur | 74,6 | 25,4 | 1111 |
| Total | 70,7 | 29,3 | 3349 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 66,4 | 33,6 | 118 |
| 20.000-30.000 | 66,8 | 33,2 | 602 |
| 30.000-40.000 | 74,1 | 25,9 | 843 |
| 40.000-60.000 | 69,7 | 30,3 | 1265 |
| >60.000 | 75,6 | 24,4 | 452 |
| Total | 71,0 | 29,0 | 3280 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 70,8 | 29,2 | 2270 |
| Très mauvaise à moyenne | 72,7 | 27,3 | 566 |
| Total | 71,1 | 28,9 | 2836 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 74,3 | 25,7 | 1368 |
| Dans le passé | 74,6 | 25,4 | 702 |
| Modéré (< 20) | 65,4 | 34,6 | 558 |
| Gros fumeur | 57,2 | 42,8 | 240 |
| Total | 71,0 | 29,0 | 2868 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0904_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATION DE POISSON | | Total |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| | Au moins hebdomadaire | Moins que hebdomadaire | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 77,5 | 22,5 | 1459 |
| Femme | 77,7 | 22,3 | 1562 |
| Total | 77,6 | 22,4 | 3021 |
| GROUPE AGE | | | |
| 0-14 | 81,2 | 18,8 | 470 |
| 15-24 | 68,0 | 32,0 | 312 |
| 25-34 | 69,9 | 30,1 | 495 |
| 35-44 | 77,9 | 22,1 | 489 |
| 45-54 | 81,6 | 18,4 | 381 |
| 55-64 | 84,1 | 15,9 | 313 |
| 65-74 | 87,6 | 12,4 | 324 |
| 75 + | 80,8 | 19,2 | 237 |
| Total | 77,6 | 22,4 | 3021 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 82,8 | 17,2 | 167 |
| Primaire | 77,2 | 22,8 | 368 |
| Secondaire inférieur | 66,1 | 33,9 | 424 |
| Secondaire supérieur | 75,7 | 24,3 | 707 |
| Supérieur | 80,9 | 19,1 | 1191 |
| Total | 77,2 | 22,8 | 2857 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 78,0 | 22,0 | 369 |
| 20.000-30.000 | 74,4 | 25,6 | 625 |
| 30.000-40.000 | 80,1 | 19,9 | 606 |
| 40.000-60.000 | 74,7 | 25,3 | 783 |
| >60.000 | 83,1 | 16,9 | 495 |
| Total | 77,6 | 22,4 | 2878 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 77,0 | 23,0 | 1676 |
| Très mauvaise à moyenne | 78,2 | 21,8 | 623 |
| Total | 77,3 | 22,7 | 2299 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 82,2 | 17,8 | 1011 |
| Dans le passé | 77,6 | 22,4 | 561 |
| Modéré (< 20) | 73,2 | 26,8 | 459 |
| Gros fumeur | 66,5 | 33,5 | 277 |
| Total | 77,4 | 22,6 | 2308 |

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0904_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CONSOMMATION DE POISSON | | Total |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| | Au moins hebdomadaire | Moins que hebdomadaire | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 67,7 | 32,3 | 1743 |
| Femme | 69,9 | 30,1 | 1867 |
| Total | 68,8 | 31,2 | 3610 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 69,6 | 30,4 | 617 |
| 15-24 | 64,9 | 35,1 | 405 |
| 25-34 | 60,6 | 39,4 | 553 |
| 35-44 | 67,6 | 32,4 | 588 |
| 45-54 | 73,2 | 26,8 | 441 |
| 55-64 | 76,8 | 23,2 | 374 |
| 65-74 | 70,2 | 29,8 | 387 |
| 75 + | 81,2 | 18,8 | 245 |
| Total | 68,8 | 31,2 | 3610 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 69,2 | 30,8 | 119 |
| Primaire | 63,3 | 36,7 | 497 |
| Secondaire inférieur | 63,4 | 36,6 | 627 |
| Secondaire supérieur | 69,2 | 30,8 | 1065 |
| Supérieur | 73,0 | 27,0 | 1166 |
| Total | 68,9 | 31,1 | 3474 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 62,2 | 37,8 | 300 |
| 20.000-30.000 | 67,8 | 32,2 | 803 |
| 30.000-40.000 | 68,9 | 31,1 | 901 |
| 40.000-60.000 | 69,4 | 30,6 | 1162 |
| >60.000 | 73,7 | 26,3 | 329 |
| Total | 68,7 | 31,3 | 3495 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 67,8 | 32,2 | 1954 |
| Très mauvaise à moyenne | 72,1 | 27,9 | 831 |
| Total | 68,9 | 31,1 | 2785 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 72,7 | 27,3 | 1325 |
| Dans le passé | 73,3 | 26,7 | 660 |
| Modéré (< 20) | 61,9 | 38,1 | 549 |
| Gros fumeur | 57,1 | 42,9 | 317 |
| Total | 68,7 | 31,3 | 2851 |

HABITUDES ALIMENTAIRES(NU0908_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | FRUITS ET LEGUMES | | Total |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | >=2 portions par jour | <2 portions par jour | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 44,3 | 55,7 | 4918 |
| Femme | 53,9 | 46,1 | 5162 |
| Total | 49,1 | 50,9 | 10080 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 53,9 | 46,1 | 1593 |
| 15-24 | 42,0 | 58,0 | 1135 |
| 25-34 | 41,1 | 58,9 | 1632 |
| 35-44 | 41,6 | 58,4 | 1601 |
| 45-54 | 49,9 | 50,1 | 1282 |
| 55-64 | 62,0 | 38,0 | 1091 |
| 65-74 | 59,4 | 40,6 | 1072 |
| 75 + | 68,3 | 31,7 | 674 |
| Total | 49,1 | 50,9 | 10080 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 50,5 | 49,5 | 350 |
| Primaire | 51,0 | 49,0 | 1280 |
| Secondaire inférieur | 47,0 | 53,0 | 1647 |
| Secondaire supérieur | 48,8 | 51,2 | 2918 |
| Supérieur | 49,9 | 50,1 | 3466 |
| Total | 49,2 | 50,8 | 9661 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 47,2 | 52,8 | 784 |
| 20.000-30.000 | 48,1 | 51,9 | 2024 |
| 30.000-40.000 | 48,6 | 51,4 | 2343 |
| 40.000-60.000 | 48,7 | 51,3 | 3203 |
| >60.000 | 51,3 | 48,7 | 1277 |
| Total | 48,8 | 51,2 | 9631 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 47,7 | 52,3 | 5891 |
| Très mauvaise à moyenne | 49,7 | 50,3 | 2017 |
| Total | 48,2 | 51,8 | 7908 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 54,4 | 45,6 | 3696 |
| Dans le passé | 51,4 | 48,6 | 1921 |
| Modéré (< 20) | 40,5 | 59,5 | 1563 |
| Gros fumeur | 25,1 | 74,9 | 835 |
| Total | 47,8 | 52,2 | 8015 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 51,9 | 48,1 | 3470 |
| Région Bruxelloise | 45,4 | 54,6 | 3006 |
| Wallonie | 45,4 | 54,6 | 3604 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| Belgique | 49,1 | 50,9 | 10080 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0908_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | FRUITS ET LEGUMES | | Total |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | >=2 portions par jour | <2 portions par jour | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 47,5 | 52,5 | 1722 |
| Femme | 56,4 | 43,6 | 1748 |
| Total | 51,9 | 48,1 | 3470 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 55,9 | 44,1 | 511 |
| 15-24 | 44,2 | 55,8 | 422 |
| 25-34 | 45,9 | 54,1 | 586 |
| 35-44 | 43,9 | 56,1 | 528 |
| 45-54 | 52,1 | 47,9 | 463 |
| 55-64 | 65,4 | 34,6 | 406 |
| 65-74 | 62,8 | 37,2 | 362 |
| 75 + | 72,4 | 27,6 | 192 |
| Total | 51,9 | 48,1 | 3470 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 50,3 | 49,7 | 65 |
| Primaire | 54,4 | 45,6 | 422 |
| Secondaire inférieur | 52,6 | 47,4 | 597 |
| Secondaire supérieur | 50,2 | 49,8 | 1152 |
| Supérieur | 53,2 | 46,8 | 1112 |
| Total | 52,1 | 47,9 | 3348 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 58,6 | 41,4 | 118 |
| 20.000-30.000 | 51,4 | 48,6 | 599 |
| 30.000-40.000 | 51,9 | 48,1 | 844 |
| 40.000-60.000 | 50,9 | 49,1 | 1264 |
| >60.000 | 52,4 | 47,6 | 454 |
| Total | 51,7 | 48,3 | 3279 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 50,0 | 50,0 | 2269 |
| Très mauvaise à moyenne | 56,2 | 43,8 | 566 |
| Total | 51,1 | 48,9 | 2835 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 56,4 | 43,6 | 1367 |
| Dans le passé | 56,0 | 44,0 | 703 |
| Modéré (< 20) | 43,8 | 56,2 | 556 |
| Gros fumeur | 26,3 | 73,7 | 240 |
| Total | 50,9 | 49,1 | 2866 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0908_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | FRUITS ET LEGUMES | | Total |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| | >=2 portions par jour | <2 portions par jour | N |
| | % | % | |
| | ----- | | |
| SEXE | | | |
| Homme | 39,4 | 60,6 | 1455 |
| Femme | 51,0 | 49,0 | 1551 |
| Total | 45,4 | 54,6 | 3006 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 53,4 | 46,6 | 466 |
| 15-24 | 33,2 | 66,8 | 308 |
| 25-34 | 36,7 | 63,3 | 493 |
| 35-44 | 42,4 | 57,6 | 486 |
| 45-54 | 45,1 | 54,9 | 380 |
| 55-64 | 47,9 | 52,1 | 313 |
| 65-74 | 62,7 | 37,3 | 324 |
| 75 + | 58,4 | 41,6 | 236 |
| Total | 45,4 | 54,6 | 3006 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 63,4 | 36,6 | 165 |
| Primaire | 46,8 | 53,2 | 365 |
| Secondaire inférieur | 32,0 | 68,0 | 421 |
| Secondaire supérieur | 43,9 | 56,1 | 704 |
| Supérieur | 47,3 | 52,7 | 1189 |
| Total | 45,4 | 54,6 | 2844 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 40,1 | 59,9 | 366 |
| 20.000-30.000 | 43,1 | 56,9 | 621 |
| 30.000-40.000 | 46,2 | 53,8 | 601 |
| 40.000-60.000 | 44,0 | 56,0 | 782 |
| >60.000 | 53,6 | 46,4 | 494 |
| Total | 45,3 | 54,7 | 2864 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 42,7 | 57,3 | 1670 |
| Très mauvaise à moyenne | 44,0 | 56,0 | 622 |
| Total | 43,1 | 56,9 | 2292 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 52,6 | 47,4 | 1007 |
| Dans le passé | 41,5 | 58,5 | 560 |
| Modéré (< 20) | 34,6 | 65,4 | 458 |
| Gros fumeur | 24,4 | 75,6 | 278 |
| Total | 42,9 | 57,1 | 2303 |

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0908_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | FRUITS ET LEGUMES | | Total |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | >=2 portions par jour | <2 portions par jour | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 40,3 | 59,7 | 1741 |
| Femme | 50,6 | 49,4 | 1863 |
| Total | 45,4 | 54,6 | 3604 |
| GROUPE AGE | | | |
| 0-14 | 50,9 | 49,1 | 616 |
| 15-24 | 41,1 | 58,9 | 405 |
| 25-34 | 33,5 | 66,5 | 553 |
| 35-44 | 37,2 | 62,8 | 587 |
| 45-54 | 47,4 | 52,6 | 439 |
| 55-64 | 59,6 | 40,4 | 372 |
| 65-74 | 53,0 | 47,0 | 386 |
| 75 + | 68,0 | 32,0 | 246 |
| Total | 45,4 | 54,6 | 3604 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 42,1 | 57,9 | 120 |
| Primaire | 46,9 | 53,1 | 493 |
| Secondaire inférieur | 41,1 | 58,9 | 629 |
| Secondaire supérieur | 47,5 | 52,5 | 1062 |
| Supérieur | 45,5 | 54,5 | 1165 |
| Total | 45,4 | 54,6 | 3469 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 43,5 | 56,5 | 300 |
| 20.000-30.000 | 45,0 | 55,0 | 804 |
| 30.000-40.000 | 44,1 | 55,9 | 898 |
| 40.000-60.000 | 45,7 | 54,3 | 1157 |
| >60.000 | 47,0 | 53,0 | 329 |
| Total | 45,1 | 54,9 | 3488 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 44,7 | 55,3 | 1952 |
| Très mauvaise à moyenne | 43,4 | 56,6 | 829 |
| Total | 44,3 | 55,7 | 2781 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 51,3 | 48,7 | 1322 |
| Dans le passé | 45,3 | 54,7 | 658 |
| Modéré (< 20) | 36,9 | 63,1 | 549 |
| Gros fumeur | 23,6 | 76,4 | 317 |
| Total | 43,6 | 56,4 | 2846 |

HABITUDES ALIMENTAIRES(NU0910_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | TYPE DE PAIN CONSOMME | | Total |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| | Pain gris prédominant | Pain blanc prédominant | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 47,2 | 52,8 | 4842 |
| Femme | 51,0 | 49,0 | 5098 |
| Total | 49,1 | 50,9 | 9940 |
| GROUPE AGE | | | |
| 0-14 | 39,3 | 60,7 | 1574 |
| 15-24 | 38,6 | 61,4 | 1117 |
| 25-34 | 50,7 | 49,3 | 1618 |
| 35-44 | 52,1 | 47,9 | 1574 |
| 45-54 | 56,7 | 43,3 | 1265 |
| 55-64 | 59,3 | 40,7 | 1074 |
| 65-74 | 52,2 | 47,8 | 1056 |
| 75 + | 44,2 | 55,8 | 662 |
| Total | 49,1 | 50,9 | 9940 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 31,5 | 68,5 | 350 |
| Primaire | 41,5 | 58,5 | 1266 |
| Secondaire inférieur | 44,4 | 55,6 | 1622 |
| Secondaire supérieur | 48,3 | 51,7 | 2875 |
| Supérieur | 57,0 | 43,0 | 3415 |
| Total | 49,5 | 50,5 | 9528 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 31,1 | 68,9 | 765 |
| 20.000-30.000 | 44,0 | 56,0 | 1994 |
| 30.000-40.000 | 46,1 | 53,9 | 2311 |
| 40.000-60.000 | 52,2 | 47,8 | 3165 |
| >60.000 | 62,9 | 37,1 | 1262 |
| Total | 49,3 | 50,7 | 9497 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 53,1 | 46,9 | 5809 |
| Très mauvaise à moyenne | 44,9 | 55,1 | 1984 |
| Total | 51,3 | 48,7 | 7793 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 53,3 | 46,7 | 3650 |
| Dans le passé | 54,8 | 45,2 | 1885 |
| Modéré (< 20) | 48,7 | 51,3 | 1545 |
| Gros fumeur | 38,9 | 61,1 | 820 |
| Total | 51,2 | 48,8 | 7900 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 59,7 | 40,3 | 3425 |
| Région Bruxelloise | 42,5 | 57,5 | 2965 |
| Wallonie | 32,8 | 67,2 | 3550 |
| Belgique | 49,1 | 50,9 | 9940 |

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0910_3)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | TYPE DE PAIN CONSOMME | | Total |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| | Pain gris prédominant | Pain blanc prédominant | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 58,9 | 41,1 | 1699 |
| Femme | 60,5 | 39,5 | 1726 |
| Total | 59,7 | 40,3 | 3425 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 50,1 | 49,9 | 504 |
| 15-24 | 48,4 | 51,6 | 418 |
| 25-34 | 61,1 | 38,9 | 584 |
| 35-44 | 61,6 | 38,4 | 519 |
| 45-54 | 68,1 | 31,9 | 455 |
| 55-64 | 65,3 | 34,7 | 396 |
| 65-74 | 67,1 | 32,9 | 359 |
| 75 + | 57,0 | 43,0 | 190 |
| Total | 59,7 | 40,3 | 3425 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 42,9 | 57,1 | 65 |
| Primaire | 53,5 | 46,5 | 418 |
| Secondaire inférieur | 57,7 | 42,3 | 587 |
| Secondaire supérieur | 57,3 | 42,7 | 1138 |
| Supérieur | 67,5 | 32,5 | 1096 |
| Total | 60,1 | 39,9 | 3304 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 54,6 | 45,4 | 109 |
| 20.000-30.000 | 56,7 | 43,3 | 593 |
| 30.000-40.000 | 59,1 | 40,9 | 833 |
| 40.000-60.000 | 60,3 | 39,7 | 1258 |
| >60.000 | 68,2 | 31,8 | 445 |
| Total | 60,4 | 39,6 | 3238 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 62,7 | 37,3 | 2244 |
| Très mauvaise à moyenne | 56,1 | 43,9 | 556 |
| Total | 61,5 | 38,5 | 2800 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 63,7 | 36,3 | 1355 |
| Dans le passé | 62,8 | 37,2 | 689 |
| Modéré (< 20) | 59,5 | 40,5 | 551 |
| Gros fumeur | 47,4 | 52,6 | 235 |
| Total | 61,1 | 38,9 | 2830 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0910_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | TYPE DE PAIN CONSOMME | | Total |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| | Pain gris prédominant | Pain blanc prédominant | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 38,5 | 61,5 | 1432 |
| Femme | 46,2 | 53,8 | 1533 |
| Total | 42,5 | 57,5 | 2965 |
| GROUPE AGE | | | |
| 0-14 | 32,3 | 67,7 | 457 |
| 15-24 | 25,2 | 74,8 | 305 |
| 25-34 | 42,1 | 57,9 | 489 |
| 35-44 | 47,9 | 52,1 | 476 |
| 45-54 | 49,3 | 50,7 | 377 |
| 55-64 | 50,6 | 49,4 | 310 |
| 65-74 | 56,5 | 43,5 | 319 |
| 75 + | 44,3 | 55,7 | 232 |
| Total | 42,5 | 57,5 | 2965 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 31,4 | 68,6 | 166 |
| Primaire | 38,7 | 61,3 | 363 |
| Secondaire inférieur | 32,9 | 67,1 | 419 |
| Secondaire supérieur | 41,9 | 58,1 | 691 |
| Supérieur | 51,1 | 48,9 | 1167 |
| Total | 43,1 | 56,9 | 2806 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 28,4 | 71,6 | 362 |
| 20.000-30.000 | 37,1 | 62,9 | 613 |
| 30.000-40.000 | 40,5 | 59,5 | 588 |
| 40.000-60.000 | 48,7 | 51,3 | 770 |
| >60.000 | 53,9 | 46,1 | 491 |
| Total | 42,3 | 57,7 | 2824 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 44,9 | 55,1 | 1647 |
| Très mauvaise à moyenne | 43,2 | 56,8 | 615 |
| Total | 44,5 | 55,5 | 2262 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 44,7 | 55,3 | 996 |
| Dans le passé | 51,0 | 49,0 | 549 |
| Modéré (< 20) | 43,1 | 56,9 | 452 |
| Gros fumeur | 36,1 | 63,9 | 276 |
| Total | 44,6 | 55,4 | 2273 |

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES (NU0910_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | TYPE DE PAIN CONSOMME | | Total |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| | Pain gris prédominant | Pain blanc prédominant | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 29,3 | 70,7 | 1711 |
| Femme | 36,3 | 63,7 | 1839 |
| Total | 32,8 | 67,2 | 3550 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 25,1 | 74,9 | 613 |
| 15-24 | 26,1 | 73,9 | 394 |
| 25-34 | 33,7 | 66,3 | 545 |
| 35-44 | 36,7 | 63,3 | 579 |
| 45-54 | 37,4 | 62,6 | 433 |
| 55-64 | 49,9 | 50,1 | 368 |
| 65-74 | 27,7 | 72,3 | 378 |
| 75 + | 26,2 | 73,8 | 240 |
| Total | 32,8 | 67,2 | 3550 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 21,1 | 78,9 | 119 |
| Primaire | 22,5 | 77,5 | 485 |
| Secondaire inférieur | 24,7 | 75,3 | 616 |
| Secondaire supérieur | 31,8 | 68,2 | 1046 |
| Supérieur | 42,3 | 57,7 | 1152 |
| Total | 33,0 | 67,0 | 3418 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 17,9 | 82,1 | 294 |
| 20.000-30.000 | 28,3 | 71,7 | 788 |
| 30.000-40.000 | 28,0 | 72,0 | 890 |
| 40.000-60.000 | 37,3 | 62,7 | 1137 |
| >60.000 | 53,1 | 46,9 | 326 |
| Total | 32,7 | 67,3 | 3435 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 35,6 | 64,4 | 1918 |
| Très mauvaise à moyenne | 31,6 | 68,4 | 813 |
| Total | 34,5 | 65,5 | 2731 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 36,3 | 63,7 | 1299 |
| Dans le passé | 40,2 | 59,8 | 647 |
| Modéré (< 20) | 31,6 | 68,4 | 542 |
| Gros fumeur | 27,8 | 72,2 | 309 |
| Total | 35,2 | 64,8 | 2797 |

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1001_4)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | Corps gras sur le pain | | | | | | | Total |
|-------------------------------|------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | |
| Homme | 20,6 | 32,8 | 23,1 | 20,6 | ,6 | 1,6 | ,7 | 4895 |
| Femme | 21,3 | 32,1 | 19,7 | 24,7 | ,4 | 1,1 | ,6 | 5159 |
| Total | 20,9 | 32,5 | 21,4 | 22,7 | ,5 | 1,3 | ,6 | 10054 |
| GROUPE AGE | | | | | | | | |
| 0-14 | 28,7 | 31,9 | 23,4 | 13,8 | ,3 | 1,2 | ,8 | 1567 |
| 15-24 | 29,4 | 29,7 | 23,5 | 15,5 | ,4 | 1,3 | ,3 | 1134 |
| 25-34 | 21,9 | 30,3 | 27,8 | 17,9 | ,6 | 1,2 | ,4 | 1630 |
| 35-44 | 22,7 | 28,5 | 22,0 | 24,2 | ,4 | 1,6 | ,6 | 1602 |
| 45-54 | 13,6 | 32,7 | 17,7 | 33,3 | ,6 | 1,1 | ,9 | 1282 |
| 55-64 | 16,6 | 34,7 | 15,3 | 30,1 | ,3 | 2,1 | ,8 | 1094 |
| 65-74 | 11,8 | 40,3 | 14,8 | 29,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1071 |
| 75 + | 5,8 | 50,4 | 17,5 | 25,6 | ,4 | ,4 | ,0 | 674 |
| Total | 20,9 | 32,5 | 21,4 | 22,7 | ,5 | 1,3 | ,6 | 10054 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 12,3 | 34,2 | 26,4 | 23,0 | 2,1 | 2,1 | ,0 | 350 |
| Primaire | 14,7 | 37,9 | 21,2 | 23,8 | ,8 | ,6 | 1,0 | 1283 |
| Secondaire inférieur | 17,7 | 34,3 | 22,3 | 24,0 | ,3 | ,8 | ,6 | 1647 |
| Secondaire supérieur | 21,4 | 32,8 | 21,8 | 21,9 | ,4 | 1,4 | ,3 | 2915 |
| Supérieur | 24,4 | 30,0 | 20,4 | 22,0 | ,5 | 1,6 | 1,0 | 3440 |
| Total | 20,8 | 32,7 | 21,5 | 22,5 | ,5 | 1,3 | ,7 | 9635 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | |
| < 20.000 | 13,7 | 46,7 | 22,7 | 14,3 | ,5 | 1,6 | ,6 | 786 |
| 20.000-30.000 | 19,6 | 32,1 | 23,2 | 23,7 | ,7 | ,7 | ,1 | 2015 |
| 30.000-40.000 | 21,1 | 34,0 | 20,0 | 22,8 | ,4 | 1,2 | ,5 | 2340 |
| 40.000-60.000 | 23,0 | 30,4 | 21,6 | 22,2 | ,3 | 1,4 | 1,0 | 3198 |
| >60.000 | 23,0 | 28,6 | 19,8 | 24,9 | 1,2 | 1,9 | ,6 | 1266 |
| Total | 21,3 | 32,3 | 21,4 | 22,6 | ,5 | 1,3 | ,6 | 9605 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 20,6 | 30,8 | 22,5 | 23,5 | ,5 | 1,5 | ,6 | 5886 |
| Très mauvaise à moyenne | 15,4 | 37,9 | 16,1 | 28,6 | ,8 | ,5 | ,7 | 2020 |
| Total | 19,5 | 32,3 | 21,1 | 24,6 | ,6 | 1,3 | ,6 | 7906 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | |
| Jamais | 20,9 | 31,3 | 19,9 | 25,6 | ,4 | 1,4 | ,5 | 3697 |
| Dans le passé | 18,7 | 30,9 | 20,5 | 26,7 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1921 |
| Modéré (< 20) | 19,3 | 34,3 | 23,1 | 21,1 | ,5 | 1,3 | ,4 | 1560 |
| Gros fumeur | 18,7 | 36,7 | 23,3 | 18,6 | ,3 | 1,5 | ,8 | 834 |
| Total | 19,8 | 32,4 | 21,0 | 24,2 | ,6 | 1,4 | ,6 | 8012 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | | | |
| Région Flamande | 23,7 | 22,5 | 23,9 | 28,0 | ,3 | 1,4 | ,3 | 3462 |
| Région Bruxelloise | 17,5 | 40,3 | 23,6 | 14,1 | 1,4 | 2,4 | ,7 | 2994 |
| Wallonie | 17,3 | 47,5 | 16,5 | 16,1 | ,6 | ,9 | 1,2 | 3598 |
| Belgique | 20,9 | 32,5 | 21,4 | 22,7 | ,5 | 1,3 | ,6 | 10054 |

légende:

1= Pas de corps gras
2= Beurre3= Margarine
4= Margarine de régime
5= Autre6= Beurre ou margarine
7= Beurre allégé

REGIO: 1 Région Flamande

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1001_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | Corps gras sur le pain | | | | | | | Total |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------|-----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | |
| Homme | 22,7 | 23,2 | 26,4 | 25,4 | ,4 | 1,7 | ,3 | 1716 |
| Femme | 24,7 | 21,7 | 21,4 | 30,6 | ,3 | 1,0 | ,3 | 1746 |
| Total | 23,7 | 22,5 | 23,9 | 28,0 | ,3 | 1,4 | ,3 | 3462 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | |
| 0-14 | 36,1 | 19,5 | 25,2 | 17,9 | ,1 | 1,2 | ,0 | 503 |
| 15-24 | 33,5 | 22,0 | 25,6 | 16,8 | ,2 | 1,6 | ,2 | 422 |
| 25-34 | 24,4 | 22,0 | 31,6 | 20,8 | ,6 | ,7 | ,0 | 586 |
| 35-44 | 25,4 | 18,0 | 24,2 | 29,7 | ,2 | 2,1 | ,4 | 528 |
| 45-54 | 13,4 | 25,0 | 18,8 | 40,3 | ,7 | 1,2 | ,5 | 463 |
| 55-64 | 17,0 | 24,7 | 18,6 | 37,5 | ,0 | 2,0 | ,3 | 406 |
| 65-74 | 14,4 | 26,1 | 19,1 | 37,5 | ,0 | 1,3 | 1,7 | 362 |
| 75 + | 4,6 | 36,4 | 16,9 | 41,5 | ,6 | ,0 | ,0 | 192 |
| Total | 23,7 | 22,5 | 23,9 | 28,0 | ,3 | 1,4 | ,3 | 3462 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 9,4 | 26,7 | 29,4 | 33,3 | ,0 | 1,2 | ,0 | 65 |
| Primaire | 15,4 | 26,9 | 22,8 | 33,0 | ,0 | ,8 | 1,2 | 422 |
| Secondaire inférieur | 21,2 | 22,9 | 23,9 | 30,4 | ,2 | ,6 | ,8 | 599 |
| Secondaire supérieur | 24,1 | 25,0 | 23,9 | 25,3 | ,2 | 1,5 | ,1 | 1152 |
| Supérieur | 27,2 | 18,0 | 24,7 | 27,7 | ,5 | 1,7 | ,1 | 1102 |
| Total | 23,4 | 22,5 | 24,1 | 28,0 | ,3 | 1,3 | ,3 | 3340 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | |
| < 20.000 | 13,3 | 41,6 | 22,4 | 22,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 118 |
| 20.000-30.000 | 20,3 | 22,6 | 23,7 | 32,8 | ,0 | ,7 | ,0 | 600 |
| 30.000-40.000 | 24,2 | 23,6 | 23,4 | 26,2 | ,4 | 1,6 | ,6 | 844 |
| 40.000-60.000 | 27,1 | 20,1 | 24,3 | 26,5 | ,3 | 1,2 | ,5 | 1260 |
| >60.000 | 24,6 | 18,4 | 24,2 | 29,8 | ,8 | 2,2 | ,0 | 450 |
| Total | 24,3 | 21,8 | 23,9 | 28,0 | ,3 | 1,3 | ,3 | 3272 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 22,6 | 21,5 | 25,8 | 27,8 | ,4 | 1,6 | ,3 | 2268 |
| Très mauvaise à moyenne | 15,2 | 26,5 | 17,4 | 39,8 | ,0 | ,2 | ,8 | 566 |
| Total | 21,3 | 22,4 | 24,3 | 30,0 | ,4 | 1,4 | ,4 | 2834 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | |
| Jamais | 23,2 | 21,8 | 22,4 | 30,9 | ,2 | 1,2 | ,2 | 1366 |
| Dans le passé | 19,4 | 22,1 | 22,9 | 32,4 | ,7 | 1,3 | 1,2 | 703 |
| Modéré (< 20) | 20,4 | 23,0 | 27,4 | 27,1 | ,6 | 1,5 | ,0 | 557 |
| Gros fumeur | 22,5 | 27,2 | 27,6 | 20,2 | ,0 | 2,6 | ,0 | 240 |
| Total | 21,7 | 22,6 | 24,0 | 29,5 | ,4 | 1,4 | ,4 | 2866 |
| légende: | | | | | | | | |
| 1= Pas de corps gras | 3= Margarine | 4= Margarine de régime | 5= Autre | 6= Beurre ou margarine | 7= Beurre allégé | | | |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1001_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | Corps gras sur le pain | | | | | | | Total |
|-------------------------------|------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | |
| Homme | 17,4 | 40,0 | 24,0 | 13,0 | 1,8 | 3,0 | ,8 | 1442 |
| Femme | 17,5 | 40,5 | 23,2 | 15,1 | 1,1 | 1,9 | ,6 | 1552 |
| Total | 17,5 | 40,3 | 23,6 | 14,1 | 1,4 | 2,4 | ,7 | 2994 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | |
| 0-14 | 25,4 | 39,5 | 24,1 | 5,5 | 1,2 | 4,0 | ,3 | 457 |
| 15-24 | 14,6 | 42,7 | 25,8 | 13,1 | 1,6 | 1,6 | ,6 | 309 |
| 25-34 | 16,9 | 37,3 | 28,1 | 14,4 | ,5 | 2,2 | ,7 | 492 |
| 35-44 | 19,3 | 40,2 | 24,5 | 11,9 | 1,0 | 2,9 | ,3 | 487 |
| 45-54 | 14,8 | 37,9 | 23,2 | 19,7 | 1,4 | 2,2 | ,8 | 378 |
| 55-64 | 25,1 | 36,3 | 15,3 | 17,3 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 314 |
| 65-74 | 10,7 | 44,8 | 14,8 | 20,8 | 5,0 | 2,7 | 1,2 | 322 |
| 75 + | 6,9 | 49,9 | 27,1 | 14,8 | ,2 | 1,1 | ,0 | 235 |
| Total | 17,5 | 40,3 | 23,6 | 14,1 | 1,4 | 2,4 | ,7 | 2994 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 15,2 | 40,9 | 28,5 | 7,8 | 1,3 | 6,3 | ,0 | 165 |
| Primaire | 12,9 | 38,6 | 30,9 | 11,4 | 4,5 | 1,6 | ,1 | 365 |
| Secondaire inférieur | 12,4 | 43,7 | 26,4 | 14,6 | ,0 | 2,7 | ,3 | 422 |
| Secondaire supérieur | 16,9 | 38,8 | 26,8 | 13,4 | 1,6 | 2,2 | ,3 | 705 |
| Supérieur | 20,8 | 40,4 | 18,0 | 16,2 | 1,1 | 2,1 | 1,4 | 1176 |
| Total | 17,2 | 40,2 | 23,9 | 14,0 | 1,5 | 2,4 | ,7 | 2833 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | |
| < 20.000 | 13,4 | 37,0 | 34,5 | 7,0 | 1,7 | 6,1 | ,3 | 369 |
| 20.000-30.000 | 17,6 | 35,9 | 29,1 | 13,8 | 2,4 | 1,1 | ,2 | 616 |
| 30.000-40.000 | 20,0 | 42,2 | 19,7 | 14,8 | ,3 | 2,2 | ,7 | 600 |
| 40.000-60.000 | 17,3 | 40,4 | 21,0 | 18,0 | ,5 | 1,3 | 1,4 | 778 |
| >60.000 | 19,5 | 44,2 | 15,8 | 15,0 | 2,9 | 1,9 | ,6 | 488 |
| Total | 17,7 | 39,8 | 23,8 | 14,3 | 1,5 | 2,2 | ,7 | 2851 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 17,1 | 41,3 | 22,2 | 15,6 | ,8 | 2,0 | ,9 | 1668 |
| Très mauvaise à moyenne | 15,6 | 38,2 | 23,5 | 17,7 | 2,8 | 1,7 | ,4 | 622 |
| Total | 16,7 | 40,5 | 22,5 | 16,2 | 1,3 | 1,9 | ,8 | 2290 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | |
| Jamais | 18,2 | 38,2 | 23,4 | 16,0 | ,9 | 2,2 | 1,1 | 1005 |
| Dans le passé | 17,9 | 34,8 | 22,5 | 18,2 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 560 |
| Modéré (< 20) | 13,2 | 51,3 | 19,8 | 13,2 | ,5 | 1,6 | ,3 | 455 |
| Gros fumeur | 17,4 | 42,5 | 23,0 | 13,9 | 1,5 | 1,6 | ,1 | 278 |
| Total | 16,9 | 40,9 | 22,4 | 15,6 | 1,4 | 1,9 | ,8 | 2298 |

légende:

1= Pas de corps gras
2= Beurre3= Margarine
4= Margarine de régime
5= Autre6= Beurre ou margarine
7= Beurre allégé

REGIO: 3 Wallonie

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1001_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | Corps gras sur le pain | | | | | | | Total |
|-------------------------------|------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | |
| Homme | 18,0 | 47,6 | 17,1 | 14,4 | ,6 | ,9 | 1,3 | 1737 |
| Femme | 16,6 | 47,4 | 15,8 | 17,8 | ,5 | 1,0 | 1,0 | 1861 |
| Total | 17,3 | 47,5 | 16,5 | 16,1 | ,6 | ,9 | 1,2 | 3598 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | |
| 0-14 | 18,3 | 48,5 | 20,4 | 9,7 | ,3 | ,6 | 2,2 | 607 |
| 15-24 | 27,0 | 38,4 | 19,3 | 14,0 | ,5 | ,6 | ,2 | 403 |
| 25-34 | 18,9 | 43,8 | 20,2 | 13,6 | ,7 | 1,8 | 1,0 | 552 |
| 35-44 | 18,9 | 43,4 | 17,5 | 18,2 | ,4 | ,3 | 1,2 | 587 |
| 45-54 | 13,7 | 45,8 | 14,0 | 24,2 | ,2 | ,7 | 1,5 | 441 |
| 55-64 | 12,9 | 55,4 | 8,4 | 19,2 | ,3 | 2,2 | 1,5 | 374 |
| 65-74 | 8,3 | 60,7 | 8,2 | 19,3 | 2,1 | ,9 | ,5 | 387 |
| 75 + | 6,9 | 70,2 | 13,2 | 8,9 | ,3 | ,4 | ,0 | 247 |
| Total | 17,3 | 47,5 | 16,5 | 16,1 | ,6 | ,9 | 1,2 | 3598 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 12,9 | 36,6 | 22,3 | 23,7 | 4,6 | ,0 | ,0 | 120 |
| Primaire | 14,2 | 56,0 | 15,1 | 12,9 | ,8 | ,0 | ,9 | 496 |
| Secondaire inférieur | 13,2 | 51,4 | 18,7 | 15,3 | ,4 | ,8 | ,2 | 626 |
| Secondaire supérieur | 17,3 | 46,9 | 16,4 | 17,1 | ,5 | 1,0 | ,8 | 1058 |
| Supérieur | 21,1 | 45,8 | 14,5 | 14,9 | ,3 | 1,4 | 2,2 | 1162 |
| Total | 17,4 | 47,9 | 16,2 | 15,7 | ,6 | ,9 | 1,2 | 3462 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | |
| < 20.000 | 14,0 | 55,3 | 16,5 | 12,7 | ,2 | ,1 | 1,2 | 299 |
| 20.000-30.000 | 19,3 | 44,4 | 20,6 | 14,1 | 1,0 | ,4 | ,2 | 799 |
| 30.000-40.000 | 16,7 | 47,6 | 15,0 | 19,7 | ,4 | ,4 | ,2 | 896 |
| 40.000-60.000 | 16,5 | 47,9 | 16,6 | 15,1 | ,4 | 1,7 | 1,7 | 1160 |
| >60.000 | 20,2 | 48,9 | 9,5 | 16,8 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 328 |
| Total | 17,3 | 47,7 | 16,5 | 16,0 | ,6 | ,9 | 1,0 | 3482 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 17,6 | 46,6 | 15,8 | 17,1 | ,5 | 1,2 | 1,2 | 1950 |
| Très mauvaise à moyenne | 15,6 | 52,0 | 12,4 | 17,8 | 1,0 | ,6 | ,5 | 832 |
| Total | 17,0 | 48,1 | 14,9 | 17,3 | ,7 | 1,1 | 1,0 | 2782 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | |
| Jamais | 17,4 | 47,1 | 14,0 | 18,6 | ,8 | 1,5 | ,7 | 1326 |
| Dans le passé | 17,4 | 47,0 | 15,1 | 18,0 | ,8 | ,8 | 1,0 | 658 |
| Modéré (< 20) | 19,5 | 48,3 | 16,9 | 13,2 | ,2 | ,9 | 1,0 | 548 |
| Gros fumeur | 13,8 | 48,4 | 17,3 | 17,9 | ,3 | ,0 | 2,3 | 316 |
| Total | 17,4 | 47,5 | 15,2 | 17,3 | ,6 | 1,0 | 1,0 | 2848 |

légende: 3= Margarine 6= Beurre ou margarine
1= Pas de corps gras 4= Margarine de régime 7= Beurre allégé
2= Beurre 5= Autre

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1002_4)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | GRAISSES DE CUISSON | | | | | | | | Total |
|-------------------------------|---------------------|------|------|------|----|-----|-----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | | |
| Homme | 2,0 | 16,3 | 53,6 | 17,6 | ,1 | 4,2 | 4,7 | 1,5 | 4871 |
| Femme | 1,9 | 15,5 | 52,9 | 17,9 | ,0 | 4,5 | 5,7 | 1,7 | 5137 |
| Total | 1,9 | 15,9 | 53,2 | 17,7 | ,1 | 4,4 | 5,2 | 1,6 | 10008 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | | |
| 0-14 | 4,2 | 14,1 | 53,9 | 17,6 | ,1 | 4,1 | 4,7 | 1,4 | 1553 |
| 15-24 | 1,3 | 19,2 | 52,9 | 17,0 | ,1 | 4,1 | 4,6 | ,9 | 1132 |
| 25-34 | 1,5 | 17,9 | 54,0 | 19,2 | ,0 | 3,6 | 3,6 | ,2 | 1632 |
| 35-44 | 1,6 | 14,1 | 51,6 | 18,7 | ,1 | 5,0 | 7,4 | 1,6 | 1602 |
| 45-54 | 1,9 | 15,0 | 51,7 | 18,8 | ,0 | 4,7 | 5,5 | 2,5 | 1283 |
| 55-64 | 1,3 | 14,3 | 54,8 | 16,9 | ,3 | 2,5 | 5,9 | 4,0 | 1090 |
| 65-74 | 1,6 | 14,4 | 54,2 | 15,7 | ,2 | 6,8 | 4,9 | 2,3 | 1062 |
| 75 + | 1,4 | 20,0 | 55,6 | 11,3 | ,1 | 6,3 | 4,8 | ,5 | 654 |
| Total | 1,9 | 15,9 | 53,2 | 17,7 | ,1 | 4,4 | 5,2 | 1,6 | 10008 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 1,6 | 13,7 | 49,7 | 25,3 | ,0 | 4,7 | 5,0 | ,0 | 348 |
| Primaire | 1,1 | 15,4 | 60,3 | 15,3 | ,0 | 4,0 | 2,2 | 1,7 | 1271 |
| Secondaire inférieur | ,7 | 14,8 | 62,2 | 14,2 | ,1 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 1634 |
| Secondaire supérieur | 1,9 | 16,3 | 56,0 | 14,6 | ,1 | 4,7 | 4,8 | 1,6 | 2909 |
| Supérieur | 2,8 | 16,8 | 44,7 | 22,4 | ,1 | 4,7 | 7,1 | 1,4 | 3432 |
| Total | 2,0 | 16,0 | 53,3 | 17,7 | ,1 | 4,3 | 5,0 | 1,6 | 9594 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | | |
| < 20.000 | ,6 | 19,6 | 44,5 | 24,0 | ,2 | 4,3 | 5,9 | ,7 | 777 |
| 20.000-30.000 | 1,6 | 15,6 | 55,5 | 20,3 | ,1 | 2,5 | 2,7 | 1,7 | 2005 |
| 30.000-40.000 | 1,0 | 18,4 | 55,1 | 15,8 | ,1 | 4,5 | 3,0 | 2,1 | 2331 |
| 40.000-60.000 | 2,5 | 15,0 | 54,5 | 15,0 | ,0 | 4,9 | 6,9 | 1,3 | 3187 |
| >60.000 | 3,2 | 14,9 | 45,9 | 23,2 | ,1 | 5,9 | 5,9 | ,9 | 1263 |
| Total | 1,9 | 16,2 | 53,1 | 17,9 | ,1 | 4,4 | 4,9 | 1,5 | 9563 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,3 | 15,9 | 53,5 | 17,9 | ,1 | 4,3 | 5,7 | 1,3 | 5885 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,0 | 16,8 | 54,2 | 16,8 | ,1 | 3,8 | 4,0 | 2,2 | 1993 |
| Total | 1,5 | 16,1 | 53,6 | 17,7 | ,1 | 4,2 | 5,4 | 1,5 | 7878 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | | |
| Jamais | 1,3 | 17,2 | 52,7 | 18,3 | ,1 | 3,4 | 5,5 | 1,6 | 3690 |
| Dans le passé | 1,9 | 12,2 | 52,3 | 19,2 | ,1 | 6,4 | 6,5 | 1,5 | 1905 |
| Modéré (< 20) | 1,7 | 18,2 | 53,1 | 16,9 | ,1 | 4,4 | 4,9 | ,7 | 1558 |
| Gros fumeur | 1,3 | 14,7 | 59,3 | 13,3 | ,2 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 831 |
| Total | 1,5 | 16,0 | 53,4 | 17,7 | ,1 | 4,3 | 5,4 | 1,6 | 7984 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | | | | |
| Région Flamande | 2,0 | 14,9 | 55,8 | 15,1 | ,0 | 4,3 | 5,7 | 2,2 | 3454 |
| Région Bruxelloise | 1,5 | 12,3 | 34,8 | 38,8 | ,0 | 6,6 | 5,5 | ,6 | 2966 |
| Wallonie | 2,0 | 18,7 | 54,7 | 15,5 | ,2 | 3,8 | 4,2 | ,9 | 3588 |
| Belgique | 1,9 | 15,9 | 53,2 | 17,7 | ,1 | 4,4 | 5,2 | 1,6 | 10008 |

legende: 1 = Aucune 4 = Huile 7 = Huile, marg.et/ou beurre
2 = Beurre 5 = Autre 8 = Produit de régime
3 = Margarine 6 = Beur.et marg.

REGIO: 1 Région Flamande

 UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1002_4)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | GRAISSES DE CUISSON | | | | | | | | Total |
|-------------------------------|---------------------|------|------|------|----|-----|------|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | | |
| Homme | 1,9 | 15,6 | 56,8 | 14,5 | ,0 | 4,2 | 4,9 | 2,1 | 1714 |
| Femme | 2,1 | 14,2 | 54,7 | 15,8 | ,0 | 4,3 | 6,5 | 2,3 | 1740 |
| Total | 2,0 | 14,9 | 55,8 | 15,1 | ,0 | 4,3 | 5,7 | 2,2 | 3454 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | | |
| 0-14 | 4,5 | 13,3 | 54,3 | 15,8 | ,0 | 4,5 | 5,3 | 2,3 | 502 |
| 15-24 | 1,3 | 19,5 | 56,9 | 12,3 | ,1 | 4,0 | 5,4 | ,6 | 426 |
| 25-34 | 1,8 | 18,4 | 55,2 | 17,4 | ,0 | 4,0 | 3,1 | ,2 | 587 |
| 35-44 | 1,6 | 12,6 | 54,1 | 14,3 | ,0 | 5,4 | 9,8 | 2,2 | 528 |
| 45-54 | 2,2 | 13,2 | 55,7 | 16,2 | ,0 | 3,9 | 5,2 | 3,6 | 462 |
| 55-64 | ,8 | 13,6 | 59,5 | 14,4 | ,0 | 2,0 | 4,5 | 5,3 | 404 |
| 65-74 | ,8 | 10,9 | 56,6 | 15,4 | ,0 | 6,7 | 5,9 | 3,6 | 360 |
| 75 + | 2,0 | 16,7 | 57,3 | 11,9 | ,0 | 4,2 | 7,6 | ,4 | 185 |
| Total | 2,0 | 14,9 | 55,8 | 15,1 | ,0 | 4,3 | 5,7 | 2,2 | 3454 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 4,0 | 32,9 | 50,4 | 1,3 | ,0 | 1,2 | 10,1 | ,0 | 63 |
| Primaire | 1,4 | 13,2 | 66,0 | 9,6 | ,0 | 4,8 | 3,2 | 1,8 | 418 |
| Secondaire inférieur | ,8 | 16,3 | 64,1 | 10,7 | ,0 | 1,9 | 2,2 | 4,1 | 597 |
| Secondaire supérieur | 2,0 | 15,3 | 57,2 | 13,3 | ,0 | 4,9 | 5,8 | 1,6 | 1150 |
| Supérieur | 2,8 | 13,4 | 47,8 | 22,0 | ,0 | 4,7 | 7,1 | 2,3 | 1105 |
| Total | 2,1 | 14,9 | 56,0 | 15,2 | ,0 | 4,2 | 5,4 | 2,2 | 3333 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | | |
| < 20.000 | ,0 | 21,6 | 48,9 | 11,8 | ,0 | 2,1 | 13,0 | 2,6 | 113 |
| 20.000-30.000 | 1,8 | 16,6 | 59,6 | 15,6 | ,0 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 598 |
| 30.000-40.000 | 1,0 | 19,9 | 54,7 | 14,4 | ,0 | 4,1 | 3,1 | 2,8 | 840 |
| 40.000-60.000 | 2,3 | 13,3 | 57,7 | 13,0 | ,0 | 5,1 | 6,8 | 1,8 | 1263 |
| >60.000 | 3,8 | 10,7 | 47,4 | 23,6 | ,1 | 6,7 | 6,5 | 1,3 | 451 |
| Total | 2,1 | 15,3 | 55,5 | 15,4 | ,0 | 4,4 | 5,2 | 2,0 | 3265 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,4 | 14,4 | 56,7 | 15,3 | ,0 | 4,3 | 6,2 | 1,7 | 2270 |
| Très mauvaise à moyenne | 1,8 | 17,0 | 55,7 | 14,7 | ,0 | 2,5 | 4,4 | 4,1 | 558 |
| Total | 1,5 | 14,8 | 56,5 | 15,2 | ,0 | 4,0 | 5,8 | 2,1 | 2828 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | | |
| Jamais | 1,5 | 16,3 | 56,0 | 15,2 | ,0 | 2,7 | 6,5 | 1,8 | 1366 |
| Dans le passé | 2,2 | 9,9 | 54,9 | 18,3 | ,0 | 6,4 | 5,9 | 2,3 | 699 |
| Modéré (< 20) | 1,6 | 17,9 | 55,8 | 13,3 | ,0 | 5,2 | 5,5 | ,9 | 557 |
| Gros fumeur | ,8 | 12,4 | 63,5 | 11,1 | ,0 | 2,7 | 3,7 | 5,8 | 239 |
| Total | 1,6 | 14,7 | 56,4 | 15,1 | ,0 | 4,1 | 5,9 | 2,1 | 2861 |

legende: 1 = Aucune 4 = Huile 7 = Huile, marg.et/ou beurre
 2 = Beurre 5 = Autre 8 = Produit de régime
 3 = Margarine 6 = Beur.et marg.

REGIO: 2 Région Bruxelloise

 UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1002_4)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | GRAISSES DE CUISSON | | | | | | | | Total |
|-------------------------------|---------------------|------|------|------|----|------|-----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | | |
| Homme | 1,7 | 12,8 | 32,6 | 40,5 | ,0 | 7,0 | 5,0 | ,5 | 1428 |
| Femme | 1,4 | 11,8 | 36,8 | 37,2 | ,0 | 6,2 | 6,0 | ,7 | 1538 |
| Total | 1,5 | 12,3 | 34,8 | 38,8 | ,0 | 6,6 | 5,5 | ,6 | 2966 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | | |
| 0-14 | 3,1 | 12,0 | 36,1 | 35,5 | ,0 | 6,5 | 6,8 | ,0 | 445 |
| 15-24 | ,0 | 18,7 | 29,7 | 41,2 | ,0 | 6,2 | 3,4 | ,7 | 303 |
| 25-34 | ,9 | 11,4 | 33,0 | 43,2 | ,0 | 6,0 | 5,1 | ,3 | 492 |
| 35-44 | ,7 | 11,6 | 29,3 | 44,3 | ,0 | 8,9 | 5,1 | ,1 | 488 |
| 45-54 | ,2 | 10,1 | 35,7 | 39,0 | ,0 | 6,2 | 7,9 | ,9 | 381 |
| 55-64 | 6,1 | 8,4 | 33,9 | 39,4 | ,0 | 4,9 | 6,5 | ,8 | 312 |
| 65-74 | 1,1 | 14,4 | 35,1 | 37,5 | ,2 | 7,7 | 2,5 | 1,5 | 319 |
| 75 + | 1,2 | 11,7 | 58,8 | 15,4 | ,1 | 5,1 | 6,7 | 1,0 | 226 |
| Total | 1,5 | 12,3 | 34,8 | 38,8 | ,0 | 6,6 | 5,5 | ,6 | 2966 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | ,8 | 5,9 | 12,5 | 61,0 | ,0 | 16,2 | 3,6 | ,0 | 165 |
| Primaire | 1,3 | 15,1 | 30,5 | 47,9 | ,0 | 3,0 | 1,8 | ,4 | 361 |
| Secondaire inférieur | 1,2 | 13,8 | 46,1 | 28,9 | ,0 | 5,4 | 4,5 | ,2 | 413 |
| Secondaire supérieur | 1,1 | 12,0 | 47,7 | 26,8 | ,0 | 5,3 | 6,6 | ,4 | 698 |
| Supérieur | 2,2 | 12,8 | 29,7 | 40,9 | ,1 | 6,7 | 6,6 | 1,0 | 1169 |
| Total | 1,6 | 12,5 | 35,4 | 38,0 | ,0 | 6,4 | 5,5 | ,6 | 2806 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | | |
| < 20.000 | ,8 | 9,2 | 20,9 | 50,0 | ,0 | 11,4 | 7,7 | ,0 | 365 |
| 20.000-30.000 | 1,2 | 15,1 | 30,7 | 45,3 | ,0 | 2,6 | 5,1 | ,0 | 608 |
| 30.000-40.000 | ,9 | 12,1 | 44,3 | 32,5 | ,0 | 4,5 | 5,1 | ,5 | 598 |
| 40.000-60.000 | 2,9 | 9,2 | 43,2 | 30,7 | ,0 | 8,5 | 4,2 | 1,4 | 768 |
| >60.000 | 1,4 | 16,0 | 29,0 | 39,1 | ,2 | 7,5 | 6,1 | ,8 | 485 |
| Total | 1,6 | 12,4 | 34,8 | 38,8 | ,0 | 6,5 | 5,4 | ,6 | 2824 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,3 | 12,8 | 35,1 | 38,3 | ,0 | 6,6 | 5,3 | ,5 | 1665 |
| Très mauvaise à moyenne | 1,5 | 12,0 | 37,0 | 39,0 | ,0 | 4,0 | 5,3 | 1,2 | 611 |
| Total | 1,3 | 12,6 | 35,6 | 38,5 | ,0 | 6,0 | 5,3 | ,7 | 2276 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | | |
| Jamais | 2,0 | 12,2 | 33,1 | 41,3 | ,0 | 6,3 | 4,3 | ,7 | 1001 |
| Dans le passé | ,6 | 11,6 | 37,0 | 36,3 | ,2 | 6,8 | 6,6 | ,9 | 552 |
| Modéré (< 20) | ,6 | 16,4 | 30,6 | 40,1 | ,0 | 5,0 | 6,7 | ,6 | 454 |
| Gros fumeur | 1,6 | 11,6 | 43,6 | 33,5 | ,0 | 5,8 | 3,6 | ,4 | 277 |
| Total | 1,4 | 12,9 | 34,7 | 39,1 | ,0 | 6,0 | 5,2 | ,7 | 2284 |

legende: 1 = Aucune 4 = Huile 7 = Huile, marg.et/ou beurre
 2 = Beurre 5 = Autre 8 = Produit de régime
 3 = Margarine 6 = Beur.et marg.

REGIO: 3 Wallonie

 UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1002_4)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | GRAISSES DE CUISSON | | | | | | | | Total |
|-------------------------------|---------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | | |
| Homme | 2,3 | 18,7 | 54,5 | 15,8 | ,3 | 3,3 | 4,4 | ,8 | 1729 |
| Femme | 1,6 | 18,8 | 55,0 | 15,1 | ,1 | 4,4 | 4,1 | 1,0 | 1859 |
| Total | 2,0 | 18,7 | 54,7 | 15,5 | ,2 | 3,8 | 4,2 | ,9 | 3588 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | | |
| 0-14 | 4,0 | 15,9 | 57,9 | 15,5 | ,2 | 2,8 | 3,4 | ,3 | 606 |
| 15-24 | 1,7 | 18,9 | 53,4 | 17,5 | ,1 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 403 |
| 25-34 | 1,0 | 19,5 | 59,4 | 14,2 | ,0 | 1,9 | 3,9 | ,2 | 553 |
| 35-44 | 1,7 | 17,5 | 53,9 | 18,7 | ,3 | 3,1 | 3,8 | 1,0 | 586 |
| 45-54 | 1,7 | 19,7 | 49,0 | 17,8 | ,0 | 5,6 | 5,2 | ,9 | 440 |
| 55-64 | ,8 | 18,0 | 52,4 | 14,0 | 1,0 | 2,8 | 8,7 | 2,4 | 374 |
| 65-74 | 2,9 | 19,7 | 56,9 | 8,7 | ,5 | 6,7 | 4,0 | ,5 | 383 |
| 75 + | ,7 | 29,0 | 51,7 | 8,3 | ,2 | 9,8 | ,0 | ,3 | 243 |
| Total | 2,0 | 18,7 | 54,7 | 15,5 | ,2 | 3,8 | 4,2 | ,9 | 3588 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | ,0 | 1,8 | 74,0 | 22,6 | ,0 | ,0 | 1,5 | ,0 | 120 |
| Primaire | ,6 | 19,3 | 61,5 | 13,1 | ,1 | 2,9 | ,7 | 1,8 | 492 |
| Secondaire inférieur | ,5 | 12,4 | 62,7 | 16,7 | ,2 | 3,5 | 4,0 | ,0 | 624 |
| Secondaire supérieur | 2,0 | 19,6 | 55,7 | 14,0 | ,3 | 4,2 | 2,3 | 1,9 | 1061 |
| Supérieur | 3,0 | 23,5 | 44,9 | 16,7 | ,3 | 4,1 | 7,3 | ,2 | 1158 |
| Total | 1,9 | 19,1 | 54,2 | 15,7 | ,2 | 3,7 | 4,2 | ,9 | 3455 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | | |
| < 20.000 | ,9 | 24,0 | 54,5 | 17,7 | ,5 | 1,9 | ,5 | ,0 | 299 |
| 20.000-30.000 | 1,4 | 14,4 | 57,9 | 18,6 | ,4 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 799 |
| 30.000-40.000 | 1,1 | 17,7 | 58,5 | 13,7 | ,4 | 5,0 | 2,3 | 1,3 | 893 |
| 40.000-60.000 | 2,8 | 19,4 | 50,7 | 15,4 | ,0 | 3,8 | 7,6 | ,3 | 1156 |
| >60.000 | 2,5 | 26,5 | 51,8 | 12,3 | ,0 | 2,9 | 4,0 | ,0 | 327 |
| Total | 1,9 | 18,8 | 54,7 | 15,6 | ,2 | 3,7 | 4,2 | ,8 | 3474 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,1 | 19,9 | 52,8 | 16,5 | ,2 | 3,7 | 5,0 | ,6 | 1950 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,5 | 18,0 | 57,4 | 12,8 | ,4 | 5,4 | 3,1 | ,3 | 824 |
| Total | 1,5 | 19,4 | 54,1 | 15,5 | ,2 | 4,2 | 4,5 | ,5 | 2774 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | | |
| Jamais | ,8 | 20,5 | 52,6 | 17,0 | ,2 | 3,6 | 3,9 | 1,4 | 1323 |
| Dans le passé | 1,7 | 16,8 | 51,6 | 16,0 | ,2 | 6,2 | 7,5 | ,1 | 654 |
| Modéré (< 20) | 2,4 | 19,4 | 56,1 | 15,6 | ,2 | 2,9 | 3,2 | ,4 | 547 |
| Gros fumeur | 1,9 | 19,0 | 58,3 | 10,2 | ,6 | 4,1 | 3,5 | 2,3 | 315 |
| Total | 1,5 | 19,3 | 53,8 | 15,6 | ,2 | 4,1 | 4,5 | 1,0 | 2839 |

legende: 1 = Aucune 4 = Huile 7 = Huile, marg.et/ou beurre
 2 = Beurre 5 = Autre 8 = Produit de régime
 3 = Margarine 6 = Beur.et marg.

UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1003)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | GRAISSES DE FRITURE | | | | | | | | Total N |
|-----------------------------------|---------------------|------|------|------|-----|----|-----|-----|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | | |
| Homme | 7,4 | 8,2 | 31,4 | 47,1 | 4,1 | ,2 | ,7 | ,9 | 4847 |
| Femme | 8,1 | 7,5 | 30,3 | 47,9 | 4,2 | ,2 | 1,0 | ,8 | 5123 |
| Total | 7,8 | 7,9 | 30,8 | 47,5 | 4,1 | ,2 | ,9 | ,9 | 9970 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | | |
| 0-14 | 9,8 | 6,8 | 26,7 | 50,9 | 4,3 | ,4 | ,8 | ,3 | 1554 |
| 15-24 | 4,8 | 7,8 | 34,7 | 46,4 | 4,2 | ,2 | ,8 | 1,2 | 1127 |
| 25-34 | 7,5 | 6,7 | 27,8 | 52,1 | 4,4 | ,1 | ,9 | ,5 | 1624 |
| 35-44 | 6,7 | 8,6 | 31,3 | 47,0 | 4,4 | ,1 | ,8 | 1,1 | 1603 |
| 45-54 | 4,6 | 7,8 | 34,3 | 45,8 | 4,7 | ,2 | ,7 | 1,9 | 1277 |
| 55-64 | 8,8 | 7,6 | 32,4 | 46,0 | 2,9 | ,1 | 1,6 | ,6 | 1082 |
| 65-74 | 11,7 | 11,0 | 29,2 | 43,4 | 3,5 | ,2 | ,6 | ,5 | 1054 |
| 75 + | 17,6 | 8,7 | 32,1 | 36,6 | 3,1 | ,9 | ,7 | ,3 | 649 |
| Total | 7,8 | 7,9 | 30,8 | 47,5 | 4,1 | ,2 | ,9 | ,9 | 9970 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 6,3 | 3,8 | 23,3 | 61,6 | 5,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 349 |
| Primaire | 5,9 | 10,6 | 31,6 | 48,0 | 2,1 | ,2 | ,8 | ,9 | 1261 |
| Secondaire inférieur | 4,9 | 11,1 | 28,6 | 50,1 | 2,7 | ,3 | 1,0 | 1,3 | 1629 |
| Secondaire supérieur | 6,3 | 8,3 | 30,9 | 47,1 | 5,5 | ,2 | ,8 | ,8 | 2904 |
| Supérieur | 11,2 | 5,2 | 32,1 | 45,7 | 4,2 | ,2 | ,9 | ,5 | 3417 |
| Total | 7,8 | 7,8 | 30,8 | 47,7 | 4,2 | ,2 | ,8 | ,8 | 9560 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | | |
| < 20.000 | 5,8 | 10,3 | 25,2 | 53,4 | 4,6 | ,0 | ,6 | ,0 | 781 |
| 20.000-30.000 | 8,2 | 9,0 | 29,0 | 47,5 | 4,4 | ,4 | ,9 | ,5 | 1999 |
| 30.000-40.000 | 6,1 | 8,7 | 31,9 | 46,7 | 4,5 | ,2 | ,9 | 1,0 | 2325 |
| 40.000-60.000 | 7,2 | 6,8 | 33,5 | 46,8 | 3,4 | ,2 | 1,1 | 1,0 | 3172 |
| >60.000 | 11,5 | 6,7 | 27,7 | 49,0 | 3,6 | ,1 | ,3 | ,9 | 1255 |
| Total | 7,6 | 7,9 | 30,9 | 47,6 | 4,0 | ,2 | ,9 | ,8 | 9532 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 6,5 | 7,5 | 33,1 | 46,8 | 4,3 | ,1 | 1,0 | ,8 | 5861 |
| Très mauvaise à moyenne | 10,0 | 9,8 | 28,2 | 46,4 | 3,3 | ,3 | ,7 | 1,4 | 1988 |
| Total | 7,2 | 8,0 | 32,0 | 46,7 | 4,1 | ,2 | ,9 | ,9 | 7849 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | | |
| Jamais | 7,3 | 7,9 | 29,4 | 48,3 | 5,1 | ,1 | ,9 | 1,0 | 3671 |
| Dans le passé | 8,1 | 7,2 | 34,0 | 45,4 | 3,2 | ,2 | ,7 | 1,2 | 1901 |
| Modéré (< 20) | 6,4 | 7,6 | 35,5 | 45,4 | 3,2 | ,1 | ,8 | 1,0 | 1551 |
| Gros fumeur | 7,4 | 11,9 | 31,7 | 42,6 | 4,3 | ,1 | 1,4 | ,5 | 828 |
| Total | 7,3 | 8,1 | 31,9 | 46,4 | 4,2 | ,1 | ,9 | 1,0 | 7951 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | | | | |
| Région Flamande | 6,3 | 7,8 | 31,3 | 47,6 | 4,9 | ,1 | ,8 | 1,2 | 3440 |
| Région Bruxelloise | 18,0 | 4,4 | 18,5 | 56,2 | 1,6 | ,5 | ,6 | ,2 | 2949 |
| Wallonie | 7,0 | 9,1 | 34,0 | 44,5 | 3,7 | ,2 | 1,1 | ,4 | 3581 |
| Belgique | 7,8 | 7,9 | 30,8 | 47,5 | 4,1 | ,2 | ,9 | ,9 | 9970 |

legende: 1 = Pas d'aliments frits 4 = Huile
 2 = Graisse animale 5 = Huile de composition mixte
 3 = Graisse végétale 6 = Autre

REGIO: 1 Région Flamande

 UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1003)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | GRAISSES DE FRITURE | | | | | | | | Total |
|-------------------------------|---------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | | |
| Homme | 5,8 | 8,2 | 31,9 | 47,4 | 4,6 | ,1 | ,8 | 1,1 | 1706 |
| Femme | 6,9 | 7,4 | 30,6 | 47,7 | 5,1 | ,2 | ,8 | 1,3 | 1734 |
| Total | 6,3 | 7,8 | 31,3 | 47,6 | 4,9 | ,1 | ,8 | 1,2 | 3440 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | | |
| 0-14 | 8,6 | 6,5 | 27,8 | 50,6 | 5,2 | ,4 | ,5 | ,5 | 501 |
| 15-24 | 4,3 | 7,3 | 36,7 | 43,9 | 5,8 | ,0 | 1,1 | 1,1 | 425 |
| 25-34 | 5,0 | 6,9 | 26,4 | 54,8 | 5,1 | ,0 | 1,0 | ,8 | 585 |
| 35-44 | 4,5 | 7,8 | 34,7 | 45,6 | 4,9 | ,0 | ,7 | 1,8 | 527 |
| 45-54 | 3,2 | 8,3 | 35,8 | 43,9 | 5,0 | ,3 | ,7 | 2,9 | 461 |
| 55-64 | 8,0 | 8,3 | 32,5 | 47,5 | 2,9 | ,0 | ,4 | ,4 | 400 |
| 65-74 | 12,3 | 12,3 | 22,6 | 46,8 | 4,6 | ,0 | 1,0 | ,4 | 357 |
| 75 + | 19,3 | 7,3 | 27,8 | 37,1 | 5,1 | 1,5 | 1,2 | ,7 | 184 |
| Total | 6,3 | 7,8 | 31,3 | 47,6 | 4,9 | ,1 | ,8 | 1,2 | 3440 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 8,1 | ,9 | 27,8 | 52,7 | 10,5 | ,0 | ,0 | ,0 | 65 |
| Primaire | 5,9 | 11,2 | 30,4 | 48,6 | 2,3 | ,3 | ,7 | ,6 | 410 |
| Secondaire inférieur | 4,1 | 9,9 | 28,0 | 51,0 | 3,1 | ,1 | 1,4 | 2,3 | 594 |
| Secondaire supérieur | 5,9 | 8,5 | 31,8 | 45,9 | 6,2 | ,2 | ,6 | ,9 | 1149 |
| Supérieur | 8,2 | 4,7 | 32,3 | 48,4 | 5,0 | ,1 | ,5 | ,8 | 1101 |
| Total | 6,4 | 7,6 | 31,1 | 48,1 | 4,9 | ,2 | ,7 | 1,1 | 3319 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | | |
| < 20.000 | 8,5 | 8,6 | 21,7 | 51,5 | 9,7 | ,0 | ,0 | ,0 | 116 |
| 20.000-30.000 | 7,4 | 10,4 | 29,2 | 46,0 | 5,0 | ,4 | 1,2 | ,4 | 594 |
| 30.000-40.000 | 5,4 | 8,6 | 30,8 | 47,7 | 5,1 | ,1 | 1,1 | 1,1 | 837 |
| 40.000-60.000 | 4,8 | 6,1 | 35,0 | 47,4 | 4,2 | ,1 | ,8 | 1,6 | 1257 |
| >60.000 | 9,0 | 7,3 | 28,4 | 50,1 | 3,7 | ,0 | ,1 | 1,4 | 448 |
| Total | 6,2 | 7,8 | 31,5 | 47,8 | 4,7 | ,2 | ,8 | 1,2 | 3252 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 4,8 | 7,5 | 33,3 | 47,2 | 5,0 | ,1 | 1,0 | 1,2 | 2258 |
| Très mauvaise à moyenne | 11,3 | 9,3 | 26,0 | 45,6 | 4,6 | ,3 | ,4 | 2,4 | 560 |
| Total | 6,0 | 7,8 | 32,0 | 46,9 | 4,9 | ,1 | ,9 | 1,4 | 2818 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | | |
| Jamais | 6,3 | 7,9 | 29,7 | 47,6 | 6,5 | ,1 | ,7 | 1,2 | 1358 |
| Dans le passé | 7,4 | 7,8 | 32,2 | 46,9 | 3,1 | ,0 | ,7 | 1,9 | 696 |
| Modéré (< 20) | 4,6 | 5,7 | 38,5 | 45,3 | 3,4 | ,0 | 1,1 | 1,5 | 556 |
| Gros fumeur | 4,2 | 12,6 | 33,5 | 42,8 | 4,8 | ,0 | 1,0 | 1,0 | 238 |
| Total | 6,0 | 7,9 | 32,4 | 46,5 | 4,9 | ,0 | ,8 | 1,4 | 2848 |

legende: 1 = Pas d'aliments frits 3 = Graisse végét. 5 = Huile comp. mixte
 2 = Graisse animale 4 = Huile 6 = Autre

REGIO: 2 Région Bruxelloise

 UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1003)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | GRAISSES DE FRITURE | | | | | | | | Total |
|-------------------------------|---------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | | |
| Homme | 17,5 | 4,9 | 18,3 | 56,5 | 1,3 | ,6 | ,4 | ,4 | 1415 |
| Femme | 18,5 | 4,0 | 18,6 | 55,9 | 1,8 | ,4 | ,7 | ,1 | 1534 |
| Total | 18,0 | 4,4 | 18,5 | 56,2 | 1,6 | ,5 | ,6 | ,2 | 2949 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | | |
| 0-14 | 16,3 | 1,3 | 17,8 | 61,2 | 1,5 | 1,7 | ,2 | ,1 | 448 |
| 15-24 | 7,5 | 3,9 | 16,2 | 69,8 | 1,2 | 1,0 | ,3 | ,0 | 302 |
| 25-34 | 18,3 | 4,9 | 19,2 | 56,0 | ,6 | ,0 | 1,1 | ,0 | 487 |
| 35-44 | 21,6 | 4,9 | 14,8 | 55,8 | 2,3 | ,2 | ,3 | ,2 | 488 |
| 45-54 | 16,8 | 7,7 | 20,5 | 50,7 | 2,2 | ,0 | 1,1 | 1,0 | 378 |
| 55-64 | 19,3 | 5,6 | 15,0 | 56,5 | 2,3 | ,2 | ,8 | ,2 | 308 |
| 65-74 | 19,1 | 2,7 | 27,0 | 49,4 | ,9 | ,4 | ,0 | ,5 | 314 |
| 75 + | 32,4 | 3,3 | 21,4 | 39,3 | 2,1 | ,8 | ,6 | ,0 | 224 |
| Total | 18,0 | 4,4 | 18,5 | 56,2 | 1,6 | ,5 | ,6 | ,2 | 2949 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 8,1 | 2,3 | 12,1 | 76,1 | 1,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 166 |
| Primaire | 6,6 | 5,3 | 19,6 | 64,7 | 2,5 | ,5 | ,3 | ,4 | 361 |
| Secondaire inférieur | 13,4 | 5,6 | 15,0 | 62,5 | ,7 | ,9 | 1,8 | ,1 | 412 |
| Secondaire supérieur | 11,9 | 4,8 | 19,5 | 60,5 | 1,8 | 1,0 | ,5 | ,0 | 697 |
| Supérieur | 28,9 | 4,1 | 19,5 | 45,4 | 1,4 | ,0 | ,5 | ,1 | 1157 |
| Total | 17,9 | 4,5 | 18,4 | 56,5 | 1,6 | ,5 | ,6 | ,1 | 2793 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | | |
| < 20.000 | 7,0 | 3,3 | 16,6 | 71,9 | ,8 | ,0 | ,4 | ,0 | 366 |
| 20.000-30.000 | 12,8 | 3,3 | 17,7 | 60,9 | 2,4 | 1,7 | ,9 | ,4 | 612 |
| 30.000-40.000 | 13,9 | 5,4 | 20,6 | 57,5 | 1,5 | ,3 | ,4 | ,5 | 593 |
| 40.000-60.000 | 24,2 | 6,4 | 17,0 | 50,1 | 1,4 | ,1 | ,6 | ,2 | 762 |
| >60.000 | 29,5 | 3,3 | 19,5 | 45,3 | 1,6 | ,2 | ,5 | ,0 | 479 |
| Total | 17,8 | 4,5 | 18,2 | 56,5 | 1,6 | ,5 | ,6 | ,2 | 2812 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 19,1 | 5,0 | 19,1 | 54,2 | 1,3 | ,4 | ,6 | ,2 | 1654 |
| Très mauvaise à moyenne | 17,4 | 5,7 | 17,9 | 55,6 | 2,1 | ,1 | ,7 | ,5 | 606 |
| Total | 18,7 | 5,2 | 18,8 | 54,6 | 1,5 | ,4 | ,7 | ,3 | 2260 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | | |
| Jamais | 18,5 | 4,3 | 18,3 | 56,2 | 1,3 | ,4 | ,9 | ,1 | 992 |
| Dans le passé | 19,7 | 7,5 | 21,5 | 48,9 | 1,1 | ,2 | ,4 | ,7 | 551 |
| Modéré (< 20) | 18,2 | 5,1 | 15,6 | 57,0 | 2,5 | ,5 | ,6 | ,4 | 450 |
| Gros fumeur | 16,0 | 6,7 | 17,3 | 57,4 | 1,9 | ,0 | ,7 | ,0 | 275 |
| Total | 18,4 | 5,4 | 18,3 | 55,0 | 1,6 | ,3 | ,7 | ,3 | 2268 |

legende: 1 = Pas d'aliments frits 3 = Graisse végét. 5 = Huile comp. mixte
 2 = Graisse animale 4 = Huile 6 = Autre

REGIO: 3 Wallonie

 UTILISATION DES CORPS GRAS (NU1003)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | GRAISSES DE FRITURE | | | | | | | | Total |
|-------------------------------|---------------------|------|------|------|-----|----|-----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | | | | |
| Homme | 7,1 | 9,4 | 34,4 | 43,5 | 4,0 | ,3 | ,7 | ,6 | 1726 |
| Femme | 6,9 | 8,7 | 33,6 | 45,5 | 3,4 | ,2 | 1,5 | ,3 | 1855 |
| Total | 7,0 | 9,1 | 34,0 | 44,5 | 3,7 | ,2 | 1,1 | ,4 | 3581 |
| GROUPES AGE | | | | | | | | | |
| 0-14 | 10,1 | 8,8 | 27,3 | 48,5 | 3,7 | ,2 | 1,4 | ,2 | 605 |
| 15-24 | 4,8 | 10,0 | 37,1 | 43,3 | 2,5 | ,2 | ,4 | 1,7 | 400 |
| 25-34 | 8,3 | 7,1 | 33,4 | 45,4 | 4,6 | ,3 | ,8 | ,0 | 552 |
| 35-44 | 6,4 | 11,3 | 30,2 | 46,8 | 4,1 | ,2 | 1,0 | ,0 | 588 |
| 45-54 | 3,9 | 6,8 | 35,6 | 47,9 | 4,8 | ,2 | ,5 | ,4 | 438 |
| 55-64 | 6,9 | 6,9 | 38,2 | 39,2 | 3,3 | ,3 | 4,3 | 1,0 | 374 |
| 65-74 | 8,3 | 11,7 | 39,9 | 36,4 | 2,6 | ,4 | ,3 | ,5 | 383 |
| 75 + | 7,3 | 13,4 | 43,8 | 34,4 | ,9 | ,1 | ,0 | ,0 | 241 |
| Total | 7,0 | 9,1 | 34,0 | 44,5 | 3,7 | ,2 | 1,1 | ,4 | 3581 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | | | | |
| Pas de diplôme | 3,3 | 7,5 | 26,8 | 60,1 | 2,3 | ,0 | ,0 | ,0 | 118 |
| Primaire | 5,8 | 11,5 | 37,9 | 41,0 | 1,5 | ,0 | 1,0 | 1,4 | 490 |
| Secondaire inférieur | 4,3 | 14,2 | 32,8 | 45,7 | 2,4 | ,5 | ,1 | ,0 | 623 |
| Secondaire supérieur | 5,7 | 9,0 | 32,0 | 46,0 | 5,2 | ,1 | 1,2 | ,9 | 1058 |
| Supérieur | 10,1 | 6,5 | 35,9 | 41,6 | 3,9 | ,3 | 1,6 | ,1 | 1159 |
| Total | 7,0 | 9,2 | 34,0 | 44,3 | 3,7 | ,2 | 1,1 | ,5 | 3448 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | | | | |
| < 20.000 | 3,4 | 15,3 | 32,2 | 44,6 | 3,4 | ,0 | 1,2 | ,0 | 299 |
| 20.000-30.000 | 7,9 | 9,0 | 32,6 | 45,1 | 4,2 | ,0 | ,6 | ,7 | 793 |
| 30.000-40.000 | 5,1 | 9,6 | 36,4 | 42,5 | 4,5 | ,2 | ,6 | 1,0 | 895 |
| 40.000-60.000 | 7,9 | 8,1 | 34,3 | 44,9 | 2,3 | ,4 | 1,9 | ,2 | 1153 |
| >60.000 | 8,3 | 7,3 | 30,4 | 48,1 | 4,6 | ,5 | ,9 | ,0 | 328 |
| Total | 6,9 | 9,2 | 33,9 | 44,6 | 3,6 | ,2 | 1,1 | ,5 | 3468 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 5,8 | 8,2 | 37,3 | 43,6 | 3,7 | ,2 | 1,2 | ,1 | 1949 |
| Très mauvaise à moyenne | 6,4 | 11,5 | 33,9 | 44,6 | 2,0 | ,4 | ,9 | ,3 | 822 |
| Total | 6,0 | 9,1 | 36,3 | 43,9 | 3,2 | ,3 | 1,1 | ,1 | 2771 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | | | | |
| Jamais | 5,7 | 8,9 | 32,3 | 47,2 | 3,4 | ,1 | 1,3 | 1,1 | 1321 |
| Dans le passé | 6,2 | 5,9 | 41,0 | 41,3 | 4,2 | ,7 | ,7 | ,0 | 654 |
| Modéré (< 20) | 5,8 | 11,8 | 37,0 | 41,6 | 3,2 | ,1 | ,2 | ,2 | 545 |
| Gros fumeur | 9,3 | 12,6 | 33,6 | 37,8 | 4,3 | ,3 | 2,1 | ,0 | 315 |
| Total | 6,3 | 9,3 | 35,4 | 43,6 | 3,6 | ,3 | 1,1 | ,5 | 2835 |

legende: 1 = Pas d'aliments frits 3 = Graisse végét. 5 = Huile comp. mixte
 2 = Graisse animale 4 = Huile 6 = Autre

UTILISATION DES CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES (INDICATEUR: NU1004_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES | | | | | Total |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------|--------------------|-------|-------|
| | Pas de crudités | Pas d'huile | Huile | Produit diététique | Autre | N |
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 1,5 | 14,1 | 80,8 | 1,2 | 2,4 | 4863 |
| Femme | 1,9 | 11,7 | 83,3 | 1,7 | 1,5 | 5134 |
| Total | 1,7 | 12,9 | 82,0 | 1,4 | 2,0 | 9997 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 0-14 | 5,5 | 18,4 | 74,5 | ,4 | 1,3 | 1533 |
| 15-24 | 1,9 | 17,0 | 78,1 | ,4 | 2,6 | 1135 |
| 25-34 | 1,1 | 13,4 | 82,6 | 1,1 | 1,9 | 1627 |
| 35-44 | ,5 | 9,7 | 86,8 | 1,4 | 1,6 | 1603 |
| 45-54 | ,3 | 9,9 | 85,9 | 1,7 | 2,2 | 1282 |
| 55-64 | ,6 | 11,5 | 82,7 | 2,4 | 2,8 | 1085 |
| 65-74 | 1,7 | 8,6 | 84,7 | 3,4 | 1,6 | 1070 |
| 75 + | 2,4 | 12,3 | 79,3 | 3,3 | 2,6 | 662 |
| Total | 1,7 | 12,9 | 82,0 | 1,4 | 2,0 | 9997 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | ,7 | 9,9 | 87,0 | 1,5 | ,9 | 351 |
| Primaire | ,8 | 11,2 | 83,2 | 1,8 | 3,0 | 1276 |
| Secondaire inférieur | 1,2 | 12,0 | 83,1 | 1,4 | 2,3 | 1638 |
| Secondaire supérieur | 1,7 | 12,4 | 82,7 | 1,4 | 1,7 | 2889 |
| Supérieur | 2,2 | 14,6 | 80,2 | 1,4 | 1,6 | 3429 |
| Total | 1,7 | 12,9 | 82,1 | 1,4 | 1,9 | 9583 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | ,9 | 9,8 | 86,4 | 1,9 | 1,0 | 780 |
| 20.000-30.000 | ,7 | 13,7 | 81,9 | 1,4 | 2,3 | 2009 |
| 30.000-40.000 | 1,9 | 10,5 | 84,6 | 1,2 | 1,8 | 2324 |
| 40.000-60.000 | 2,3 | 14,9 | 80,2 | ,7 | 1,8 | 3175 |
| >60.000 | 1,4 | 12,3 | 81,7 | 2,9 | 1,8 | 1267 |
| Total | 1,7 | 13,0 | 82,2 | 1,3 | 1,8 | 9555 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,1 | 11,5 | 83,9 | 1,4 | 2,1 | 5876 |
| Très mauvaise à moyenne | ,9 | 11,3 | 83,2 | 2,3 | 2,2 | 2012 |
| Total | 1,0 | 11,5 | 83,8 | 1,6 | 2,1 | 7888 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | ,6 | 5,5 | 38,7 | ,8 | ,6 | 3685 |
| Dans le passé | ,2 | 2,6 | 19,1 | ,4 | ,6 | 1910 |
| Modéré (< 20) | ,1 | 2,4 | 16,8 | ,3 | ,5 | 1562 |
| Gros fumeur | ,1 | 1,4 | 8,8 | ,1 | ,4 | 834 |
| Total | 1,0 | 11,9 | 83,5 | 1,5 | 2,1 | 7991 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | |
| Région Flamande | 2,2 | 18,3 | 75,9 | 1,9 | 1,7 | 3437 |
| Région Bruxelloise | 1,1 | 7,0 | 89,7 | ,8 | 1,5 | 2982 |
| Wallonie | ,9 | 5,4 | 90,2 | ,8 | 2,6 | 3578 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Belgique | 1,7 | 12,9 | 82,0 | 1,4 | 2,0 | 9997 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|

REGIO: 1 Région Flamande

UTILISATION DES CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES (INDICATEUR: NU1004_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES | | | | | Total |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------|-----------------------|-------|-------|
| | Pas de crudités | Pas d'huile | Huile | Produit diététique | Autre | N |
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 2,0 | 19,8 | 74,4 | 1,5 | 2,3 | 1704 |
| Femme | 2,5 | 16,7 | 77,5 | 2,3 | 1,0 | 1733 |
| Total | 2,2 | 18,3 | 75,9 | 1,9 | 1,7 | 3437 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 0-14 | 7,6 | 28,2 | 62,5 | ,6 | 1,1 | 487 |
| 15-24 | 3,0 | 23,4 | 70,2 | ,5 | 2,9 | 422 |
| 25-34 | 1,7 | 19,3 | 76,2 | 1,2 | 1,7 | 586 |
| 35-44 | ,7 | 14,0 | 82,6 | 1,5 | 1,3 | 527 |
| 45-54 | ,4 | 12,7 | 82,4 | 2,4 | 2,1 | 462 |
| 55-64 | ,7 | 16,0 | 78,4 | 3,2 | 1,6 | 402 |
| 65-74 | 1,2 | 11,8 | 81,3 | 5,0 | ,7 | 362 |
| 75 + | 2,5 | 18,0 | 71,8 | 6,6 | 1,1 | 189 |
| Total | 2,2 | 18,3 | 75,9 | 1,9 | 1,7 | 3437 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 2,0 | 21,7 | 73,3 | 2,0 | 1,0 | 64 |
| Primaire | ,7 | 16,7 | 76,6 | 3,3 | 2,7 | 420 |
| Secondaire inférieur | 1,0 | 17,7 | 76,8 | 2,0 | 2,4 | 594 |
| Secondaire supérieur | 2,2 | 17,2 | 77,4 | 1,8 | 1,3 | 1139 |
| Supérieur | 3,2 | 20,4 | 73,7 | 1,6 | 1,1 | 1099 |
| Total | 2,2 | 18,4 | 75,9 | 1,9 | 1,5 | 3316 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 2,6 | 23,8 | 70,1 | 2,7 | ,8 | 118 |
| 20.000-30.000 | ,7 | 19,7 | 75,8 | 2,3 | 1,5 | 597 |
| 30.000-40.000 | 2,6 | 15,2 | 78,3 | 1,9 | 2,0 | 834 |
| 40.000-60.000 | 2,8 | 20,2 | 74,7 | ,8 | 1,5 | 1253 |
| >60.000 | 2,0 | 16,9 | 77,1 | 3,3 | ,8 | 449 |
| Total | 2,2 | 18,6 | 76,0 | 1,8 | 1,5 | 3251 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,4 | 15,7 | 79,2 | 1,8 | 1,9 | 2260 |
| Très mauvaise à moyenne | 1,3 | 14,7 | 79,0 | 3,7 | 1,4 | 565 |
| Total | 1,4 | 15,5 | 79,1 | 2,1 | 1,8 | 2825 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | ,8 | 7,4 | 37,1 | 1,1 | ,5 | 1362 |
| Dans le passé | ,2 | 3,7 | 18,7 | ,5 | ,6 | 699 |
| Modéré (< 20) | ,1 | 3,3 | 15,6 | ,4 | ,3 | 558 |
| Gros fumeur | ,2 | 1,9 | 7,0 | ,1 | ,4 | 238 |
| Total | 1,4 | 16,3 | 78,5 | 2,1 | 1,8 | 2857 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

UTILISATION DES CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES (INDICATEUR: NU1004_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES | | | | | Total |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------|-----------------------|-------|-------|
| | Pas de crudités | Pas d'huile | Huile | Produit diététique | Autre | N |
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 1,3 | 8,9 | 88,0 | ,5 | 1,3 | 1440 |
| Femme | ,9 | 5,2 | 91,2 | 1,0 | 1,6 | 1542 |
| Total | 1,1 | 7,0 | 89,7 | ,8 | 1,5 | 2982 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 0-14 | 2,8 | 7,6 | 87,2 | ,0 | 2,4 | 452 |
| 15-24 | ,5 | 10,8 | 86,5 | ,7 | 1,6 | 310 |
| 25-34 | ,2 | 6,4 | 90,9 | ,8 | 1,7 | 491 |
| 35-44 | ,2 | 3,8 | 94,3 | 1,0 | ,6 | 488 |
| 45-54 | ,6 | 4,3 | 92,2 | 1,1 | 1,9 | 381 |
| 55-64 | 1,2 | 10,8 | 84,7 | 1,3 | 2,0 | 310 |
| 65-74 | 1,9 | 5,3 | 91,8 | ,8 | ,2 | 322 |
| 75 + | 2,8 | 9,5 | 86,2 | ,6 | ,8 | 228 |
| Total | 1,1 | 7,0 | 89,7 | ,8 | 1,5 | 2982 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | ,0 | 2,8 | 97,2 | ,0 | ,0 | 167 |
| Primaire | ,6 | 7,9 | 90,8 | ,2 | ,5 | 362 |
| Secondaire inférieur | 1,4 | 8,0 | 89,6 | ,2 | ,8 | 419 |
| Secondaire supérieur | 1,3 | 6,1 | 89,1 | ,8 | 2,8 | 697 |
| Supérieur | 1,3 | 7,7 | 88,6 | 1,3 | 1,1 | 1178 |
| Total | 1,1 | 7,0 | 89,8 | ,8 | 1,3 | 2823 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | ,5 | 5,7 | 93,1 | ,0 | ,7 | 366 |
| 20.000-30.000 | 1,2 | 7,9 | 88,9 | ,0 | 2,1 | 615 |
| 30.000-40.000 | 1,3 | 6,7 | 87,8 | 1,3 | 2,9 | 598 |
| 40.000-60.000 | 1,5 | 8,8 | 88,7 | ,7 | ,2 | 772 |
| >60.000 | ,8 | 5,3 | 90,9 | 1,8 | 1,3 | 490 |
| Total | 1,1 | 7,1 | 89,6 | ,7 | 1,4 | 2841 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | ,4 | 7,2 | 90,4 | ,8 | 1,3 | 1668 |
| Très mauvaise à moyenne | 1,4 | 6,5 | 89,0 | 1,4 | 1,7 | 619 |
| Total | ,6 | 7,0 | 90,0 | 1,0 | 1,4 | 2287 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | ,3 | 3,4 | 40,6 | ,3 | ,4 | 1001 |
| Dans le passé | ,1 | 1,1 | 19,1 | ,3 | ,3 | 555 |
| Modéré (< 20) | ,1 | 1,8 | 19,3 | ,1 | ,5 | 457 |
| Gros fumeur | ,2 | ,7 | 11,0 | ,1 | ,2 | 279 |
| Total | ,8 | 6,9 | 90,1 | ,9 | 1,3 | 2292 |

REGIO: 3 Wallonie

UTILISATION DES CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES (INDICATEUR: NU1004_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES | | | | | Total |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------|--------------------|-------|-------|
| | Pas de crudités | Pas d'huile | Huile | Produit diététique | Autre | N |
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | ,7 | 5,7 | 89,8 | ,8 | 3,0 | 1719 |
| Femme | 1,1 | 5,1 | 90,6 | ,8 | 2,3 | 1859 |
| Total | ,9 | 5,4 | 90,2 | ,8 | 2,6 | 3578 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 0-14 | 3,0 | 6,4 | 89,4 | ,1 | 1,1 | 594 |
| 15-24 | ,3 | 8,2 | 88,8 | ,3 | 2,4 | 403 |
| 25-34 | ,2 | 4,5 | 92,0 | 1,1 | 2,3 | 550 |
| 35-44 | ,2 | 4,0 | 92,0 | 1,4 | 2,4 | 588 |
| 45-54 | ,0 | 6,2 | 90,7 | ,6 | 2,4 | 439 |
| 55-64 | ,3 | 2,4 | 90,9 | 1,0 | 5,5 | 373 |
| 65-74 | 2,6 | 4,8 | 87,6 | 1,7 | 3,4 | 386 |
| 75 + | 2,0 | 6,1 | 86,0 | ,2 | 5,7 | 245 |
| Total | ,9 | 5,4 | 90,2 | ,8 | 2,6 | 3578 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | ,0 | 3,9 | 92,6 | 2,2 | 1,3 | 120 |
| Primaire | 1,1 | 3,3 | 91,2 | ,1 | 4,4 | 494 |
| Secondaire inférieur | 1,5 | 3,5 | 92,0 | ,5 | 2,6 | 625 |
| Secondaire supérieur | ,7 | 4,4 | 91,6 | ,8 | 2,4 | 1053 |
| Supérieur | ,9 | 7,7 | 87,8 | 1,1 | 2,5 | 1152 |
| Total | ,9 | 5,3 | 90,3 | ,8 | 2,6 | 3444 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | ,0 | 2,9 | 93,6 | 2,3 | 1,2 | 296 |
| 20.000-30.000 | ,7 | 7,2 | 88,3 | ,4 | 3,4 | 797 |
| 30.000-40.000 | ,9 | 4,5 | 93,3 | ,2 | 1,2 | 892 |
| 40.000-60.000 | 1,6 | 6,1 | 88,9 | ,7 | 2,7 | 1150 |
| >60.000 | ,0 | 3,3 | 89,2 | 2,4 | 5,1 | 328 |
| Total | ,9 | 5,4 | 90,3 | ,8 | 2,6 | 3463 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | ,5 | 4,2 | 91,6 | ,9 | 2,8 | 1948 |
| Très mauvaise à moyenne | ,4 | 8,6 | 86,8 | ,7 | 3,5 | 828 |
| Total | ,5 | 5,4 | 90,3 | ,8 | 3,0 | 2776 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | ,4 | 2,7 | 41,1 | ,3 | ,9 | 1322 |
| Dans le passé | ,0 | 1,2 | 19,9 | ,2 | ,8 | 656 |
| Modéré (< 20) | ,0 | ,9 | 18,2 | ,3 | ,8 | 547 |
| Gros fumeur | ,0 | ,6 | 11,3 | ,0 | ,4 | 317 |
| Total | ,5 | 5,4 | 90,4 | ,8 | 2,9 | 2842 |

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | IMC | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|--------------|----------------|---------|-------|
| | Maigreur | Poids normal | Excès de poids | Obésité | N |
| | col % | col % | col % | col % | |
| REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES | | | | | |
| 1-2X/sem. | 3,1 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 156 |
| 3-5X/sem. | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 8,4 | 901 |
| 6-7X/sem. | 81,7 | 85,4 | 86,8 | 90,5 | 6921 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7978 |
| PETITS DEJEUNERS | | | | | |
| 1-2X/sem. | 9,8 | 6,1 | 5,6 | 5,2 | 413 |
| 3-5X/sem. | 6,7 | 5,8 | 4,9 | 3,8 | 383 |
| 6-7X/sem. | 83,5 | 88,1 | 89,4 | 91,0 | 6301 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7097 |
| COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES | | | | | |
| Moins que hebdomadaire | 13,3 | 14,2 | 18,1 | 22,6 | 1444 |
| Au moins hebdomadaire | 22,1 | 30,0 | 29,8 | 28,3 | 2399 |
| Quotidien ou presque | 64,6 | 55,8 | 52,1 | 49,0 | 4163 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8006 |
| PRODUITS LAITIERS | | | | | |
| Quotidienne ou presque | 77,2 | 76,0 | 73,7 | 70,9 | 6080 |
| Peu fréquente | 22,8 | 24,0 | 26,3 | 29,1 | 1844 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7924 |
| CONSOMMATION DE POISSON | | | | | |
| Au moins hebdomadaire | 70,2 | 70,0 | 72,6 | 74,9 | 5786 |
| Moins que hebdomadaire | 29,8 | 30,0 | 27,4 | 25,1 | 2242 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8028 |
| FRUITS ET LEGUMES | | | | | |
| >=2 portions par jour | 42,2 | 47,8 | 49,4 | 52,1 | 3783 |
| <2 portions par jour | 57,8 | 52,2 | 50,6 | 47,9 | 4228 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8011 |
| TYPE DE PAIN CONSOMME | | | | | |
| Pain gris prédominant | 50,9 | 53,4 | 51,6 | 46,3 | 3897 |
| Pain blanc prédominant | 49,1 | 46,6 | 48,4 | 53,7 | 4002 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7899 |

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | IMC | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|--------------|----------------|---------|-------|
| | Maigreur | Poids normal | Excès de poids | Obésité | N |
| | col % | col % | col % | col % | |
| REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES | | | | | |
| 1-2X/sem. | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 33 |
| 3-5X/sem. | 17,1 | 14,3 | 14,0 | 8,0 | 352 |
| 6-7X/sem. | 81,8 | 84,6 | 84,6 | 90,7 | 2390 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2775 |
| PETITS DEJEUNERS | | | | | |
| 1-2X/sem. | 10,2 | 5,5 | 5,1 | 5,7 | 137 |
| 3-5X/sem. | 6,9 | 5,1 | 5,2 | 2,4 | 125 |
| 6-7X/sem. | 82,9 | 89,4 | 89,7 | 91,9 | 2285 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2547 |
| COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES | | | | | |
| Moins que hebdomadaire | 9,6 | 11,9 | 17,5 | 19,9 | 444 |
| Au moins hebdomadaire | 23,3 | 31,8 | 28,6 | 30,2 | 830 |
| Quotidien ou presque | 67,1 | 56,3 | 53,9 | 49,9 | 1511 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2785 |
| PRODUITS LAITIERS | | | | | |
| Quotidienne ou presque | 73,6 | 72,6 | 69,8 | 60,0 | 1977 |
| Peu fréquente | 26,4 | 27,4 | 30,2 | 40,0 | 782 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2759 |
| CONSOMMATION DE POISSON | | | | | |
| Au moins hebdomadaire | 69,7 | 71,6 | 71,8 | 76,5 | 2030 |
| Moins que hebdomadaire | 30,3 | 28,4 | 28,2 | 23,5 | 759 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2789 |
| FRUITS ET LEGUMES | | | | | |
| >=2 portions par jour | 48,4 | 50,8 | 52,2 | 52,9 | 1450 |
| <2 portions par jour | 51,6 | 49,2 | 47,8 | 47,1 | 1338 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2788 |
| TYPE DE PAIN CONSOMME | | | | | |
| Pain gris prédominant | 64,6 | 63,4 | 62,5 | 55,9 | 1736 |
| Pain blanc prédominant | 35,4 | 36,6 | 37,5 | 44,1 | 1017 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2753 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | IMC | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|--------------|----------------|---------|-------|
| | Maigreur | Poids normal | Excès de poids | Obésité | N |
| | col % | col % | col % | col % | |
| REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES | | | | | |
| 1-2X/sem. | 5,5 | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 73 |
| 3-5X/sem. | 18,2 | 13,3 | 11,4 | 7,6 | 288 |
| 6-7X/sem. | 76,3 | 83,9 | 86,1 | 87,8 | 2029 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2390 |
| PETITS DEJEUNERS | | | | | |
| 1-2X/sem. | 6,6 | 8,2 | 8,8 | 6,7 | 150 |
| 3-5X/sem. | 6,6 | 6,0 | 3,4 | 5,5 | 121 |
| 6-7X/sem. | 86,8 | 85,7 | 87,8 | 87,8 | 1867 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2138 |
| COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES | | | | | |
| Moins que hebdomadaire | 12,7 | 17,0 | 19,9 | 23,0 | 466 |
| Au moins hebdomadaire | 22,6 | 28,3 | 34,0 | 28,6 | 753 |
| Quotidien ou presque | 64,7 | 54,8 | 46,2 | 48,3 | 1185 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2404 |
| PRODUITS LAITIERS | | | | | |
| Quotidienne ou presque | 79,2 | 79,3 | 74,0 | 77,9 | 1824 |
| Peu fréquente | 20,8 | 20,7 | 26,0 | 22,1 | 544 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2368 |
| CONSOMMATION DE POISSON | | | | | |
| Au moins hebdomadaire | 71,4 | 75,7 | 78,5 | 83,4 | 1863 |
| Moins que hebdomadaire | 28,6 | 24,3 | 21,5 | 16,6 | 550 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2413 |
| FRUITS ET LEGUMES | | | | | |
| >=2 portions par jour | 35,0 | 44,8 | 43,5 | 48,6 | 1086 |
| <2 portions par jour | 65,0 | 55,2 | 56,5 | 51,4 | 1317 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2403 |
| TYPE DE PAIN CONSOMME | | | | | |
| Pain gris prédominant | 42,9 | 45,4 | 47,6 | 42,8 | 1088 |
| Pain blanc prédominant | 57,1 | 54,6 | 52,4 | 57,2 | 1287 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2375 |

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | IMC | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|--------------|----------------|---------|-------|
| | Maigreur | Poids normal | Excès de poids | Obésité | N |
| | col % | col % | col % | col % | |
| REPAS CHAUDS AVEC LEGUMES | | | | | |
| 1-2X/sem. | 5,4 | 2,5 | 1,7 | ,2 | 50 |
| 3-5X/sem. | 10,6 | 10,1 | 7,5 | 9,1 | 261 |
| 6-7X/sem. | 84,0 | 87,4 | 90,8 | 90,7 | 2502 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2813 |
| PETITS DEJEUNERS | | | | | |
| 1-2X/sem. | 10,5 | 6,6 | 5,8 | 4,1 | 126 |
| 3-5X/sem. | 6,3 | 7,0 | 4,9 | 5,4 | 137 |
| 6-7X/sem. | 83,3 | 86,4 | 89,4 | 90,5 | 2149 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2412 |
| COLLATIONS OU BOISSONS SUCREES | | | | | |
| Moins que hebdomadaire | 19,9 | 17,5 | 18,7 | 26,0 | 534 |
| Au moins hebdomadaire | 19,7 | 27,1 | 30,8 | 25,9 | 816 |
| Quotidien ou presque | 60,4 | 55,4 | 50,5 | 48,1 | 1467 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2817 |
| PRODUITS LAITIERS | | | | | |
| Quotidienne ou presque | 82,5 | 81,3 | 80,7 | 82,9 | 2279 |
| Peu fréquente | 17,5 | 18,7 | 19,3 | 17,1 | 518 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2797 |
| CONSOMMATION DE POISSON | | | | | |
| Au moins hebdomadaire | 70,4 | 64,8 | 72,3 | 70,9 | 1893 |
| Moins que hebdomadaire | 29,6 | 35,2 | 27,7 | 29,1 | 933 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2826 |
| FRUITS ET LEGUMES | | | | | |
| >=2 portions par jour | 34,5 | 43,1 | 45,9 | 51,8 | 1247 |
| <2 portions par jour | 65,5 | 56,9 | 54,1 | 48,2 | 1573 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2820 |
| TYPE DE PAIN CONSOMME | | | | | |
| Pain gris prédominant | 30,4 | 36,8 | 33,4 | 34,5 | 1073 |
| Pain blanc prédominant | 69,6 | 63,2 | 66,6 | 65,5 | 1698 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2771 |

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | IMC | | | | Total |
|---|----------|--------------|----------------|---------|-------|
| | Maigreur | Poids normal | Excès de poids | Obésité | N |
| | col % | col % | col % | col % | |
| Corps gras sur le pain | | | | | |
| Pas de corps gras | 21,4 | 20,4 | 17,6 | 16,8 | 1322 |
| Beurre | 38,8 | 31,9 | 33,0 | 29,7 | 3032 |
| Margarine | 20,2 | 22,3 | 20,4 | 18,9 | 1611 |
| Margarine de régime | 17,2 | 23,1 | 26,3 | 31,3 | 1816 |
| Autre | ,5 | ,5 | ,4 | 1,2 | 55 |
| Beurre ou margarine | 1,4 | 1,4 | 1,5 | ,8 | 120 |
| Margarine ou huile | ,5 | ,4 | ,8 | 1,3 | 55 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8011 |
| GRAISSES DE CUISSON | | | | | |
| Pas de corps gras | 2,7 | ,8 | 2,2 | 2,2 | 105 |
| Beurre | 15,0 | 16,3 | 16,1 | 14,4 | 1204 |
| Margarine | 50,8 | 52,1 | 55,5 | 54,4 | 4008 |
| Huile | 22,0 | 18,2 | 16,0 | 16,5 | 1771 |
| Autre | ,0 | ,1 | ,1 | ,1 | 9 |
| Beurre/margarine | 4,7 | 4,7 | 4,0 | 4,9 | 402 |
| Margarine/huile | 3,8 | 6,1 | 4,1 | 5,5 | 389 |
| Produit de régime | ,9 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 101 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7989 |
| GRAISSES DE FRITURE | | | | | |
| Pas d'aliments frits | 11,6 | 7,6 | 6,7 | 6,0 | 895 |
| Graisse animale | 4,4 | 8,2 | 8,1 | 9,0 | 608 |
| Graisse végétale | 30,8 | 32,2 | 31,0 | 29,5 | 2352 |
| Huile | 47,6 | 46,5 | 47,1 | 48,5 | 3702 |
| Huile de composition mixte | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 4,7 | 264 |
| Autre | ,2 | ,2 | ,1 | ,3 | 20 |
| Matières grasses diverses | 1,0 | ,8 | 1,0 | ,9 | 66 |
| Huile de régime | 1,2 | ,7 | 1,5 | 1,0 | 48 |
| Belgique | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7955 |
| CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES | | | | | |
| Pas de crudités | 1,5 | 1,1 | 1,0 | ,4 | 80 |
| Pas d'huile | 15,0 | 11,8 | 12,0 | 5,9 | 692 |
| Huile | 80,5 | 83,5 | 82,7 | 90,0 | 6935 |
| Produit diététique | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 127 |
| Autre | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 160 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7994 |

REGIO: 1 Région Flamande

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | IMC | | | | Total |
|-------------------------------------|----------|--------------|----------------|---------|-------|
| | Maigreur | Poids normal | Excès de poids | Obésité | N |
| | col % | col % | col % | col % | |
| Corps gras sur le pain | | | | | |
| Pas de corps gras | 23,2 | 22,5 | 18,6 | 20,1 | 530 |
| Beurre | 29,9 | 22,0 | 24,2 | 17,7 | 665 |
| Margarine | 21,3 | 26,0 | 22,6 | 18,9 | 635 |
| Margarine de régime | 22,8 | 27,3 | 33,2 | 39,5 | 901 |
| Autre | ,3 | ,4 | ,2 | 1,1 | 11 |
| Beurre ou margarine | 1,9 | 1,7 | ,9 | ,9 | 41 |
| Margarine ou huile | ,5 | ,1 | ,3 | 1,9 | 6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2789 |
| GRAISSES DE CUISSON | | | | | |
| Pas de corps gras | 2,7 | ,8 | 2,1 | 3,0 | 45 |
| Beurre | 15,3 | 15,2 | 15,0 | 12,7 | 395 |
| Margarine | 52,0 | 54,4 | 59,0 | 60,0 | 1534 |
| Huile | 20,1 | 16,0 | 13,1 | 12,1 | 466 |
| Beurre/margarine | 4,2 | 4,7 | 3,6 | 4,9 | 120 |
| Margarine/huile | 4,2 | 7,0 | 4,4 | 3,6 | 153 |
| Produit de régime | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 3,6 | 67 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2780 |
| GRAISSES DE FRITURE | | | | | |
| Pas d'aliments frits | 9,3 | 5,5 | 5,7 | 6,3 | 202 |
| Graisse animale | 4,2 | 8,2 | 8,3 | 9,0 | 213 |
| Graisse végétale | 30,5 | 32,9 | 30,6 | 29,0 | 882 |
| Huile | 49,6 | 46,8 | 46,5 | 50,0 | 1286 |
| Huile de composition mixte | 3,6 | 4,6 | 5,9 | 4,2 | 119 |
| Autre | ,1 | ,1 | ,1 | ,0 | 5 |
| Matières grasses diverses | ,6 | 1,0 | ,7 | ,2 | 27 |
| Huile de régime | 2,2 | ,9 | 2,2 | 1,3 | 35 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2769 |
| CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES | | | | | |
| Pas de crudités | 1,9 | 1,7 | ,9 | ,7 | 40 |
| Pas d'huile | 20,8 | 16,2 | 16,9 | 8,1 | 419 |
| Huile | 74,2 | 78,0 | 78,0 | 88,3 | 2200 |
| Produit diététique | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 79 |
| Autre | 1,6 | 2,1 | 1,5 | ,6 | 41 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2779 |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | IMC | | | | Total |
|---------------------------------|----------|--------------|----------------|---------|-------|
| | Maigreur | Poids normal | Excès de poids | Obésité | N |
| | col % | col % | col % | col % | |
| ----- | | | | | |
| Corps gras sur le pain | | | | | |
| Pas de corps gras | 13,9 | 15,8 | 20,5 | 14,5 | 381 |
| Beurre | 51,5 | 40,3 | 34,8 | 38,0 | 974 |
| Margarine | 21,3 | 24,2 | 22,0 | 25,1 | 535 |
| Margarine de régime | 10,7 | 15,0 | 17,9 | 19,2 | 411 |
| Autre | ,6 | 2,2 | ,7 | ,8 | 27 |
| Beurre ou margarine | 1,2 | 2,1 | 2,7 | 1,9 | 51 |
| Margarine ou huile | ,9 | ,5 | 1,4 | ,6 | 20 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2399 |
| GRAISSES DE CUISSON | | | | | |
| Pas de corps gras | 1,1 | ,5 | 3,0 | ,9 | 25 |
| Beurre | 15,8 | 11,5 | 13,3 | 9,6 | 275 |
| Margarine | 32,7 | 34,9 | 35,1 | 34,4 | 895 |
| Huile | 35,8 | 39,9 | 36,7 | 43,7 | 876 |
| Autre | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2 |
| Beurre/margarine | 9,7 | 6,5 | 5,4 | 7,8 | 162 |
| Margarine/huile | 4,4 | 5,9 | 5,6 | 3,4 | 137 |
| Produit de régime | ,5 | ,7 | ,8 | ,2 | 21 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2393 |
| GRAISSES DE FRITURE | | | | | |
| Pas d'aliments frits | 20,8 | 20,2 | 16,7 | 10,6 | 469 |
| Graisse animale | 3,9 | 4,4 | 5,2 | 8,6 | 119 |
| Graisse végétale | 18,2 | 18,9 | 14,9 | 22,2 | 466 |
| Huile | 53,5 | 54,2 | 60,0 | 57,0 | 1242 |
| Huile de composition mixte | 2,1 | 1,4 | 1,6 | ,3 | 44 |
| Autre | ,0 | ,3 | ,0 | ,7 | 7 |
| Matières grasses diverses | 1,5 | ,5 | 1,0 | ,0 | 17 |
| Huile de régime | ,0 | ,1 | ,6 | ,6 | 8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2372 |
| CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES | | | | | |
| Pas de crudités | 2,6 | ,7 | ,3 | ,6 | 28 |
| Pas d'huile | 9,1 | 6,5 | 7,4 | 4,6 | 154 |
| Huile | 85,8 | 90,8 | 90,6 | 89,6 | 2159 |
| Produit diététique | ,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 25 |
| Autre | 2,2 | ,9 | ,6 | 4,3 | 30 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2396 |
| ----- | | | | | |

REGIO: 3 Wallonie

HABITUDES ALIMENTAIRES EN FONCTION DE L'IMC (NU05_5)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | IMC | | | | Total |
|---|----------|--------------|----------------|---------|-------|
| | Maigreur | Poids normal | Excès de poids | Obésité | N |
| | col % | col % | col % | col % | |
| Corps gras sur le pain | | | | | |
| Pas de corps gras | 21,4 | 18,1 | 15,0 | 13,2 | 411 |
| Beurre | 49,0 | 48,1 | 48,2 | 43,2 | 1393 |
| Margarine | 17,9 | 14,1 | 15,9 | 17,4 | 441 |
| Margarine de régime | 10,0 | 17,9 | 16,5 | 23,7 | 504 |
| Autre | ,8 | ,2 | ,7 | 1,5 | 17 |
| Beurre ou margarine | ,6 | ,7 | 2,0 | ,4 | 28 |
| Margarine ou huile | ,2 | ,8 | 1,6 | ,6 | 29 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2823 |
| GRAISSES DE CUISSON | | | | | |
| Pas de corps gras | 3,3 | ,9 | 2,1 | 1,6 | 35 |
| Beurre | 14,1 | 20,3 | 19,0 | 17,6 | 534 |
| Margarine | 56,4 | 54,1 | 55,1 | 51,9 | 1579 |
| Huile | 19,5 | 14,3 | 15,2 | 15,9 | 429 |
| Autre | ,0 | ,3 | ,2 | ,2 | 7 |
| Beurre/margarine | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 120 |
| Margarine/huile | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 8,3 | 99 |
| Produit de régime | ,1 | 1,6 | ,8 | ,4 | 13 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2816 |
| GRAISSES DE FRITURE | | | | | |
| Pas d'aliments frits | 11,7 | 6,9 | 5,7 | 4,7 | 224 |
| Graisse animale | 5,0 | 9,6 | 8,7 | 9,1 | 276 |
| Graisse végétale | 36,7 | 36,1 | 36,3 | 31,8 | 1004 |
| Huile | 41,7 | 42,9 | 44,4 | 44,7 | 1174 |
| Huile de composition mixte | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 6,4 | 101 |
| Autre | ,4 | ,2 | ,2 | ,5 | 8 |
| Matières grasses diverses | 1,5 | ,4 | 1,5 | 2,0 | 22 |
| Huile de régime | ,0 | ,5 | ,5 | ,8 | 5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2814 |
| CORPS GRAS AVEC LES CRUDITES | | | | | |
| Pas de crudités | ,1 | ,2 | 1,4 | ,1 | 12 |
| Pas d'huile | 7,5 | 5,2 | 4,6 | 3,4 | 119 |
| Huile | 89,2 | 91,5 | 88,9 | 92,2 | 2576 |
| Produit diététique | ,4 | ,7 | 1,6 | ,5 | 23 |
| Autre | 2,8 | 2,4 | 3,5 | 3,7 | 89 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2819 |