

ETAT NUTRITIONNEL (NU05_2)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CLASSES D'IMC (adultes)						Total
	< 18	[18-20[[20-25[[25-27[[27-30[30+	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	1,0	4,2	46,1	19,7	17,7	11,2	3935
Femme	4,0	11,2	50,8	12,7	10,8	10,5	4139
Total	2,5	7,7	48,5	16,2	14,2	10,8	8074
GROUPE AGE							
15-24	6,1	16,5	61,4	7,8	5,2	3,1	820
25-34	4,0	11,0	55,0	15,0	10,0	5,1	1623
35-44	2,1	7,2	50,1	17,1	12,0	11,5	1586
45-54	,5	3,7	44,7	17,3	19,7	14,1	1273
55-64	,8	2,4	35,9	19,4	22,9	18,6	1079
65-74	1,2	5,2	37,6	20,1	17,9	18,0	1049
75 +	3,2	7,0	45,0	19,6	17,1	8,2	644
Total	2,5	7,7	48,5	16,2	14,2	10,8	8074
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	1,2	7,2	31,9	15,1	22,1	22,5	273
Primaire	1,7	3,7	37,4	19,8	21,0	16,4	1136
Secondaire inférieur	2,2	6,1	45,2	18,0	16,3	12,2	1381
Secondaire supérieur	3,0	7,8	48,2	16,5	13,0	11,4	2295
Supérieur	2,6	10,0	55,3	14,0	11,4	6,7	2662
Total	2,5	7,8	48,3	16,3	14,3	10,8	7747
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	1,9	7,4	48,2	16,0	14,5	12,0	588
20.000-30.000	3,5	8,3	45,0	15,1	15,0	13,1	1582
30.000-40.000	2,5	5,6	43,9	19,1	17,1	11,8	1867
40.000-60.000	2,1	8,0	50,7	14,6	14,0	10,6	2576
>60.000	2,2	8,8	55,3	16,1	10,7	6,8	1089
Total	2,5	7,6	48,5	16,0	14,5	10,9	7702
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	2,2	7,8	50,6	16,7	13,5	9,2	5570
Très mauvaise à moyenne	3,1	6,6	41,4	15,1	17,1	16,6	1946
Total	2,4	7,5	48,6	16,4	14,3	10,8	7516
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	2,6	8,3	50,9	14,7	13,6	9,9	3459
Dans le passé	1,4	4,1	40,3	20,8	17,8	15,6	1875
Modéré (< 20)	2,8	10,4	51,2	16,3	12,0	7,2	1472
Gros fumeur	2,8	7,4	51,3	14,5	12,1	11,9	819
Total	2,4	7,7	48,5	16,4	14,1	11,0	7625
REGION DE RESIDENCE							
Région Flamande	2,7	7,2	49,6	16,9	13,9	9,6	2812
Région Bruxelloise	3,1	9,7	51,6	13,3	13,0	9,2	2427
Région Wallonne	2,0	8,0	45,2	15,9	15,2	13,7	2835
Belgique	2,5	7,7	48,5	16,2	14,2	10,8	8074

âge: 18 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

ETAT NUTRITIONNEL (NU05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CLASSES D'IMC (adultes)						T otal N
	< 18	[18-20[[20-25[[25-27[[27-30[30+	
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	,9	4,1	47,6	20,7	17,1	9,7	1389
Femme	4,5	10,5	51,7	13,1	10,8	9,5	1423
Total	2,7	7,2	49,6	16,9	13,9	9,6	2812
GROUPES AGE							
15-24	6,8	15,1	63,0	8,3	4,1	2,7	304
25-34	4,8	10,6	56,2	15,2	9,7	3,6	583
35-44	2,2	7,1	50,8	18,4	11,5	9,9	529
45-54	,2	2,9	48,6	16,9	19,4	11,9	459
55-64	,4	1,7	35,2	19,8	24,8	18,1	399
65-74	1,9	6,0	36,4	22,9	16,1	16,7	355
75 +	2,2	6,5	47,5	21,1	14,5	8,1	183
Total	2,7	7,2	49,6	16,9	13,9	9,6	2812
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	2,0	3,6	24,1	17,1	28,6	24,5	54
Primaire	,9	2,6	38,6	21,7	20,2	16,1	384
Secondaire inférieur	2,3	5,8	44,8	18,3	17,9	10,9	517
Secondaire supérieur	3,1	6,5	48,2	17,8	13,7	10,7	917
Supérieur	3,2	10,8	58,7	13,7	9,0	4,7	836
Total	2,7	7,3	49,5	17,0	13,9	9,7	2708
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	,0	4,8	48,5	20,5	11,7	14,5	95
20.000-30.000	3,8	5,8	45,9	15,0	17,7	11,9	505
30.000-40.000	3,1	5,3	44,1	20,5	17,3	9,8	682
40.000-60.000	2,4	7,6	52,2	15,5	12,8	9,5	992
>60.000	2,4	9,3	56,0	15,4	10,4	6,6	381
Total	2,7	6,9	49,7	16,7	14,3	9,7	2655
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	2,4	7,3	51,6	17,2	13,3	8,3	2140
Très mauvaise à moyenne	3,3	6,2	40,7	16,7	17,7	15,5	546
Total	2,5	7,0	49,6	17,1	14,1	9,6	2686
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	3,2	8,6	52,7	15,2	11,9	8,4	1274
Dans le passé	1,2	3,6	39,7	23,5	18,3	13,6	683
Modéré (< 20)	2,5	9,6	53,2	16,3	13,3	5,1	523
Gros fumeur	1,9	4,3	55,2	12,8	12,0	13,7	237
Total	2,5	7,2	49,9	17,2	13,7	9,6	2717

âge: 18 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ETAT NUTRITIONNEL (NU05_2)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CLASSES D'IMC (adultes)						T otal
	< 18	[18-20[[20-25[[25-27[[27-30[30+	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	1,6	6,0	53,3	16,1	15,1	8,0	1175
Femme	4,5	13,2	50,1	10,7	11,2	10,3	1252
Total	3,1	9,7	51,6	13,3	13,0	9,2	2427
GROUPE AGE							
15-24	7,0	18,8	61,9	4,4	4,8	3,0	237
25-34	3,4	13,1	54,1	13,7	9,2	6,4	490
35-44	2,9	8,7	57,7	10,6	10,9	9,2	472
45-54	,8	5,8	45,2	17,0	18,9	12,3	376
55-64	1,6	3,4	38,1	20,0	24,3	12,6	310
65-74	1,3	7,4	41,8	17,3	14,1	18,2	317
75 +	4,8	6,8	57,6	11,2	13,7	5,9	225
Total	3,1	9,7	51,6	13,3	13,0	9,2	2427
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	1,0	7,6	44,3	11,3	11,6	24,2	123
Primaire	3,5	6,0	43,8	17,6	17,6	11,4	299
Secondaire inférieur	5,6	7,8	46,5	16,4	11,8	12,0	354
Secondaire supérieur	2,8	11,9	53,9	11,3	12,7	7,3	571
Supérieur	3,1	10,0	56,9	12,4	12,2	5,5	955
Total	3,3	9,5	52,2	13,2	12,9	8,9	2302
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	3,9	10,1	51,7	11,7	13,8	8,8	270
20.000-30.000	3,3	11,0	47,5	13,6	13,6	11,0	470
30.000-40.000	3,1	9,0	45,9	17,1	10,4	14,5	487
40.000-60.000	2,4	10,7	55,3	10,8	12,9	7,9	653
>60.000	2,7	8,1	56,0	13,6	13,9	5,7	427
Total	3,0	9,9	51,4	13,3	12,9	9,6	2307
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	2,1	9,7	56,2	13,7	11,7	6,7	1593
Très mauvaise à moyenne	6,2	6,5	41,2	13,9	15,8	16,5	597
Total	3,1	8,9	52,4	13,7	12,7	9,2	2190
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	1,8	7,4	52,6	13,0	14,3	10,9	952
Dans le passé	2,8	4,5	51,0	15,4	14,7	11,6	550
Modéré (< 20)	3,7	14,8	54,0	11,9	8,6	7,0	431
Gros fumeur	6,7	12,9	48,9	13,2	11,5	6,8	268
Total	3,0	9,1	52,1	13,3	12,8	9,7	2201

âge: 18 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

ETAT NUTRITIONNEL NU05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CLASSES D'IMC (adultes)						T otal
	< 18	[18-20[[20-25[[25-27[[27-30[30+	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	1,1	4,0	41,1	19,2	19,7	14,9	1371
Femme	2,9	12,0	49,3	12,7	10,7	12,4	1464
Total	2,0	8,0	45,2	15,9	15,2	13,7	2835
GROUPES AGE							
15-24	4,8	17,8	58,4	8,0	7,1	3,9	279
25-34	2,6	10,8	53,2	15,0	10,8	7,6	550
35-44	1,7	7,1	46,8	16,6	13,0	14,8	585
45-54	,9	4,7	37,4	18,0	20,5	18,6	438
55-64	1,3	3,5	36,5	18,1	18,5	22,0	370
65-74	,2	3,2	38,1	16,9	21,9	19,8	377
75 +	3,6	7,7	34,9	21,7	22,6	9,5	236
Total	2,0	8,0	45,2	15,9	15,2	13,7	2835
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	,5	10,0	31,4	15,7	22,8	19,6	96
Primaire	2,6	4,8	33,3	17,4	23,4	18,5	453
Secondaire inférieur	1,3	6,2	45,4	18,0	14,4	14,6	510
Secondaire supérieur	2,9	9,5	46,7	15,1	11,8	14,0	807
Supérieur	1,5	8,7	49,1	15,2	15,1	10,4	871
Total	2,0	8,0	45,1	16,0	15,3	13,6	2737
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	2,2	7,7	46,1	15,1	16,9	12,0	223
20.000-30.000	3,0	11,3	42,8	15,7	11,3	15,8	607
30.000-40.000	1,5	5,2	43,2	17,5	18,4	14,1	698
40.000-60.000	1,6	8,1	46,5	13,9	16,6	13,3	931
>60.000	1,4	7,9	52,9	19,8	9,7	8,3	281
Total	1,9	8,0	45,5	15,9	15,3	13,5	2740
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	2,0	8,2	46,7	16,8	14,4	11,9	1837
Très mauvaise à moyenne	2,1	7,2	42,3	13,6	16,8	18,0	803
Total	2,0	7,9	45,5	15,9	15,1	13,6	2640
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	1,6	8,0	47,0	14,3	16,5	12,5	1233
Dans le passé	1,3	5,0	38,3	17,0	17,7	20,7	642
Modéré (< 20)	3,0	10,4	46,9	17,7	10,8	11,1	518
Gros fumeur	2,9	10,1	46,6	17,2	12,4	10,9	314
Total	2,0	8,1	44,9	16,0	15,1	13,9	2707

âge: 18 ans et plus

ETAT NUTRITIONNEL(NU05_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	IMC ou indice de masse corporelle (IMC)					N
	Moyenne	25 ^e Percentile	Mediane	75 ^e Percentile	90 ^e Percentile	
SEXE						
Homme	25,3	22,7	24,9	27,5	30,3	3935
Femme	24,1	21,0	23,3	26,5	30,1	4139
Total	24,7	21,7	24,2	27,0	30,1	8074
GROUPES AGE						
15-24	22,2	20,1	21,6	23,7	26,2	820
25-34	23,6	21,0	23,2	25,5	28,1	1623
35-44	24,7	21,9	24,2	26,7	30,4	1586
45-54	25,7	22,7	25,1	28,0	31,1	1273
55-64	26,6	23,6	26,2	28,7	31,9	1079
65-74	26,0	22,9	25,7	28,4	31,9	1049
75 +	24,9	22,4	24,5	27,1	29,4	644
Total	24,7	21,7	24,2	27,0	30,1	8074
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	26,9	23,3	26,7	29,4	33,6	273
Primaire	26,1	23,0	25,7	28,3	31,4	1136
Secondaire inférieur	25,2	22,2	24,7	27,4	30,5	1381
Secondaire supérieur	24,7	21,6	24,2	26,8	30,4	2295
Supérieur	23,8	21,2	23,3	26,0	28,7	2662
Total	24,7	21,7	24,2	27,0	30,1	7747
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	24,9	21,5	24,2	27,2	31,1	588
20.000-30.000	24,9	21,5	24,2	27,5	30,8	1582
30.000-40.000	25,1	22,1	24,8	27,5	30,7	1867
40.000-60.000	24,6	21,8	24,0	26,9	30,1	2576
>60.000	24,1	21,5	23,7	26,0	29,0	1089
Total	24,7	21,7	24,2	27,0	30,2	7702
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	24,5	21,6	24,0	26,7	29,7	5570
Très mauvaise à moyenne	25,6	22,1	24,9	28,4	32,0	1946
Total	24,7	21,7	24,2	27,0	30,1	7516
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	24,5	21,6	24,0	26,7	30,0	3459
Dans le passé	25,8	22,9	25,4	28,1	31,2	1875
Modéré (< 20)	24,0	21,2	23,3	26,2	29,0	1472
Gros fumeur	24,7	21,4	23,9	26,8	30,5	819
Total	24,7	21,7	24,2	27,0	30,3	7625
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	24,6	21,7	24,1	26,8	29,8	2812
Région Bruxelloise	24,3	21,4	23,6	26,6	29,7	2427
Région Wallonne	25,1	21,8	24,5	27,6	31,1	2835
Belgique	24,7	21,7	24,2	27,0	30,1	8074

âge: 18 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

ETAT NUTRITIONNEL(NU05_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

IMC ou indice de masse corporelle (IMC)						
	Moyenne	25 ^e Percentile	Mediane	75 ^e Percentile	90 ^e Percentile	N

SEXE						
Homme	25,2	22,6	24,8	27,2	30,0	1389
Femme	24,0	21,0	23,3	26,3	29,4	1423
Total	24,6	21,7	24,1	26,8	29,8	2812
GROUPES AGE						
15-24	22,1	20,1	21,6	23,7	26,1	304
25-34	23,4	20,9	23,1	25,3	27,7	583
35-44	24,5	22,0	24,1	26,5	30,0	529
45-54	25,5	22,6	24,9	27,6	30,4	459
55-64	26,8	23,9	26,2	29,1	31,9	399
65-74	25,8	22,9	25,6	27,7	31,9	355
75 +	25,0	22,7	24,8	26,7	29,3	183
Total	24,6	21,7	24,1	26,8	29,8	2812
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	27,5	23,8	27,3	30,0	34,6	54
Primaire	26,2	23,0	25,9	28,1	31,1	384
Secondaire inférieur	25,1	22,3	24,8	27,4	30,1	517
Secondaire supérieur	24,7	21,8	24,2	26,8	30,3	917
Supérieur	23,4	21,0	23,0	25,2	27,8	836
Total	24,6	21,7	24,1	26,8	29,9	2708
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	25,4	22,2	24,7	27,2	33,2	95
20.000-30.000	25,0	21,7	24,4	27,5	30,3	505
30.000-40.000	24,9	22,0	24,8	27,3	29,8	682
40.000-60.000	24,4	21,9	23,8	26,6	29,8	992
>60.000	24,1	21,5	23,7	25,7	29,1	381
Total	24,6	21,8	24,1	26,8	29,9	2655
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	24,4	21,6	24,0	26,5	29,4	2140
Très mauvaise à moyenne	25,6	22,3	25,0	28,2	31,6	546
Total	24,6	21,8	24,1	26,8	29,8	2686
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	24,2	21,6	23,8	26,3	29,4	1274
Dans le passé	25,7	23,0	25,4	28,0	30,6	683
Modéré (< 20)	23,9	21,3	23,2	26,2	28,7	523
Gros fumeur	24,9	21,4	23,8	27,1	31,1	237
Total	24,6	21,7	24,1	26,7	29,8	2717

âge: 18 ans et plus						

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ETAT NUTRITIONNEL (NU05_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

IMC ou indice de masse corporelle (IMC)						
	Moyenne	25è Percentile	Mediane	75è Percentile	90è Percentile	N

SEXE						
Homme	24,6	22,1	24,2	26,8	29,4	1175
Femme	24,0	20,9	23,1	26,2	30,1	1252
Total	24,3	21,4	23,6	26,6	29,7	2427
GROUPES AGE						
15-24	22,1	19,8	21,7	23,8	25,6	237
25-34	23,5	20,8	23,2	25,5	28,1	490
35-44	24,1	21,5	23,4	26,0	29,4	472
45-54	25,4	22,5	24,8	27,9	30,6	376
55-64	25,9	23,4	26,0	27,8	30,9	310
65-74	25,8	22,3	24,9	28,2	33,2	317
75 +	24,1	21,2	23,4	25,9	28,4	225
Total	24,3	21,4	23,6	26,6	29,7	2427
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	26,6	22,8	24,9	29,9	33,6	123
Primaire	25,2	22,5	24,4	27,4	30,5	299
Secondaire inférieur	24,6	21,6	23,9	26,8	30,8	354
Secondaire supérieur	23,9	21,0	23,4	26,0	28,9	571
Supérieur	23,7	21,2	23,1	25,7	28,0	955
Total	24,2	21,4	23,5	26,5	29,4	2302
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	24,0	21,0	23,5	26,4	29,6	270
20.000-30.000	24,6	21,5	23,7	27,0	30,8	470
30.000-40.000	24,9	21,6	24,2	27,0	31,6	487
40.000-60.000	24,0	21,4	23,4	25,9	29,4	653
>60.000	23,9	21,3	23,4	26,2	28,4	427
Total	24,3	21,4	23,7	26,6	29,8	2307
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	23,9	21,3	23,5	26,1	28,4	1593
Très mauvaise à moyenne	25,4	21,9	24,5	28,3	33,0	597
Total	24,3	21,5	23,7	26,6	29,6	2190
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	24,7	21,5	24,0	27,0	30,5	952
Dans le passé	25,0	22,2	24,4	27,3	30,5	550
Modéré (< 20)	23,5	20,8	22,8	25,4	28,7	431
Gros fumeur	23,5	20,7	23,2	26,2	29,1	268
Total	24,3	21,4	23,7	26,6	29,8	2201

âge: 18 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

ETAT NUTRITIONNEL (NU05_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

IMC ou indice de masse corporelle (IMC)						
	Moyenne	25è Percentile	Mediane	75è Percentile	90è Percentile	N

SEXE						
Homme	25,8	23,0	25,4	28,0	31,0	1371
Femme	24,3	20,9	23,4	26,7	31,2	1464
Total	25,1	21,8	24,5	27,6	31,1	2835
GROUPES AGE						
15-24	22,4	20,2	21,7	24,0	27,3	279
25-34	24,0	21,2	23,5	25,8	29,0	550
35-44	25,3	22,1	24,6	27,5	31,2	585
45-54	26,2	23,0	26,2	28,7	31,6	438
55-64	26,5	23,3	26,1	28,7	32,4	370
65-74	26,3	23,5	25,9	28,7	31,6	377
75 +	25,3	22,5	25,4	27,7	30,0	236
Total	25,1	21,8	24,5	27,6	31,1	2835
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	26,4	23,5	26,4	28,4	32,1	96
Primaire	26,3	23,1	25,8	28,9	32,0	453
Secondaire inférieur	25,4	22,2	24,7	27,6	31,2	510
Secondaire supérieur	24,8	21,6	24,2	27,1	31,2	807
Supérieur	24,5	21,3	23,8	27,1	30,1	871
Total	25,1	21,8	24,6	27,6	31,1	2737
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	25,0	21,3	24,4	28,0	30,7	223
20.000-30.000	24,9	21,3	24,2	27,4	31,6	607
30.000-40.000	25,5	22,4	25,0	28,0	31,2	698
40.000-60.000	25,1	21,8	24,4	27,7	30,7	931
>60.000	24,2	21,5	23,6	26,3	28,7	281
Total	25,0	21,8	24,5	27,5	31,0	2740
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	24,8	21,7	24,3	27,1	30,4	1837
Très mauvaise à moyenne	25,6	21,9	25,0	28,7	32,3	803
Total	25,0	21,8	24,5	27,6	31,0	2640
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	25,0	21,8	24,4	27,5	31,1	1233
Dans le passé	26,2	22,9	25,7	29,0	32,3	642
Modéré (< 20)	24,3	21,2	23,7	26,6	30,1	518
Gros fumeur	24,6	21,6	24,2	26,8	30,5	314
Total	25,1	21,8	24,6	27,6	31,1	2707

âge: 18 ans et plus

PREOCCUPATION POUR LE POIDS (NU01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PREOCCUPATION POUR LE POIDS				Total
	'Essaie de maigrir'	'Essaie de maintenir son poids'	'Essaie de prendre du poids'	'Pas concerné par le poids'	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	18,0	34,2	3,8	44,0	3981
Femme	28,1	42,1	2,1	27,7	4246
Total	23,1	38,2	2,9	35,8	8227
GROUPES AGE					
15-24	22,1	32,0	6,3	39,6	1101
25-34	24,1	34,3	2,9	38,7	1582
35-44	24,8	39,6	2,8	32,7	1565
45-54	25,9	42,1	1,1	30,9	1256
55-64	24,1	44,4	1,9	29,6	1059
65-74	17,8	40,5	1,7	40,0	1041
75 +	10,0	35,7	3,7	50,7	622
Total	23,1	38,2	2,9	35,8	8227
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	24,0	26,1	,7	49,2	265
Primaire	19,3	36,0	2,5	42,2	1156
Secondaire inférieur	20,6	40,4	2,8	36,2	1399
Secondaire supérieur	22,8	38,5	3,2	35,6	2354
Supérieur	25,9	38,3	3,1	32,7	2721
Total	23,1	38,1	2,9	35,9	7895
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	20,0	32,8	4,5	42,7	588
20.000-30.000	20,1	34,6	4,2	41,2	1623
30.000-40.000	24,4	38,3	2,1	35,3	1926
40.000-60.000	23,5	40,0	3,0	33,5	2620
>60.000	27,2	38,4	1,6	32,8	1096
Total	23,3	37,8	2,9	35,9	7853
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	23,3	39,1	2,4	35,3	5905
Très mauvaise à moyenne	23,3	36,8	4,7	35,1	2016
Total	23,3	38,6	2,9	35,2	7921
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	22,9	39,4	2,2	35,5	3715
Dans le passé	28,5	40,8	2,1	28,6	1919
Modéré (< 20)	20,2	34,1	4,8	40,9	1568
Gros fumeur	18,3	31,7	4,8	45,2	835
Total	23,2	37,8	3,0	36,0	8037
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	21,5	42,8	2,4	33,3	2916
Région Bruxelloise	27,8	30,2	4,7	37,3	2399
Région Wallonne	24,5	32,4	3,3	39,8	2912
Belgique	23,1	38,2	2,9	35,8	8227

REGIO: 1 Région Flamande

PREOCCUPATION POUR LE POIDS (NU01_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PREOCCUPATION POUR LE POIDS				Total
	'Essaie de maigrir'	'Essaie de maintenir son poids'	'Essaie de prendre du poids'	'Pas concerné par le poids'	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	17,7	38,3	3,1	40,8	1448
Femme	25,3	47,3	1,7	25,6	1468
Total	21,5	42,8	2,4	33,3	2916
GROUPES AGE					
15-24	19,6	35,4	5,1	39,9	417
25-34	21,2	37,6	2,7	38,5	580
35-44	23,6	47,2	2,0	27,3	527
45-54	25,2	46,7	,8	27,3	457
55-64	21,4	49,0	1,9	27,7	400
65-74	18,0	44,6	1,5	35,8	353
75 +	8,9	35,8	3,9	51,5	182
Total	21,5	42,8	2,4	33,3	2916
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	31,1	25,2	,0	43,7	55
Primaire	18,7	41,6	1,3	38,4	392
Secondaire inférieur	19,8	44,5	2,0	33,7	535
Secondaire supérieur	22,2	43,5	2,7	31,6	965
Supérieur	22,2	41,6	2,9	33,2	861
Total	21,5	42,6	2,4	33,5	2808
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	15,3	49,0	3,2	32,5	97
20.000-30.000	16,5	41,7	3,6	38,2	523
30.000-40.000	23,9	42,1	1,8	32,2	718
40.000-60.000	22,4	44,6	2,7	30,3	1023
>60.000	25,0	37,1	,8	37,1	390
Total	21,8	42,4	2,4	33,4	2751
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	21,4	43,8	2,0	32,8	2274
Très mauvaise à moyenne	23,1	40,0	4,0	32,9	570
Total	21,7	43,1	2,3	32,8	2844
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	20,8	44,2	1,5	33,4	1374
Dans le passé	27,4	45,0	1,5	26,1	701
Modéré (< 20)	18,8	36,8	4,4	40,1	560
Gros fumeur	16,0	38,2	5,5	40,2	241
Total	21,5	42,4	2,5	33,6	2876

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PREOCCUPATION POUR LE POIDS (NU01_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PREOCCUPATION POUR LE POIDS				Total
	'Essaie de maigrir'	'Essaie de maintenir son poids'	'Essaie de prendre du poids'	'Pas concerné par le poids'	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	19,8	28,5	6,1	45,6	1148
Femme	34,9	31,8	3,5	29,8	1251
Total	27,8	30,2	4,7	37,3	2399
GROUPE AGE					
15-24	25,4	26,1	10,0	38,4	291
25-34	28,8	27,5	3,9	39,8	467
35-44	30,0	26,3	4,3	39,4	460
45-54	31,7	34,8	1,8	31,6	366
55-64	33,1	33,9	2,4	30,7	296
65-74	22,8	35,2	6,5	35,5	308
75 +	13,4	35,8	3,5	47,4	211
Total	27,8	30,2	4,7	37,3	2399
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	25,3	17,7	1,4	55,6	112
Primaire	18,3	27,0	7,0	47,7	306
Secondaire inférieur	27,5	34,9	3,9	33,8	337
Secondaire supérieur	23,4	31,5	5,3	39,8	558
Supérieur	33,6	32,0	4,3	30,1	963
Total	27,7	30,7	4,6	36,9	2276
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	25,1	25,3	6,8	42,8	259
20.000-30.000	27,1	21,9	8,3	42,8	466
30.000-40.000	26,6	28,1	3,9	41,3	493
40.000-60.000	27,4	36,5	2,0	34,1	646
>60.000	33,0	37,9	3,7	25,4	421
Total	27,9	30,4	4,7	37,0	2285
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	27,0	32,0	4,2	36,9	1677
Très mauvaise à moyenne	30,2	25,8	6,8	37,2	618
Total	27,8	30,4	4,8	37,0	2295
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	28,1	29,9	3,4	38,6	1017
Dans le passé	32,3	30,8	4,5	32,4	558
Modéré (< 20)	25,9	33,0	6,8	34,4	459
Gros fumeur	20,7	23,0	7,3	48,9	278
Total	27,6	29,9	4,8	37,6	2312

REGIO: 3 Région Wallonne

PREOCCUPATION POUR LE POIDS (NU01_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PREOCCUPATION POUR LE POIDS				Total
	'Essaie de maigrir'	'Essaie de maintenir son poids'	'Essaie de prendre du poids'	'Pas concerné par le poids'	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	18,1	28,2	4,4	49,3	1385
Femme	30,7	36,4	2,3	30,6	1527
Total	24,5	32,4	3,3	39,8	2912
GROUPE AGE					
15-24	25,4	27,8	7,4	39,4	393
25-34	28,0	30,3	3,1	38,6	535
35-44	25,6	30,1	3,9	40,4	578
45-54	25,5	35,5	1,5	37,6	433
55-64	26,7	38,1	1,8	33,4	363
65-74	16,0	36,1	,5	47,5	380
75 +	9,9	35,7	3,4	51,0	229
Total	24,5	32,4	3,3	39,8	2912
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	17,5	31,6	,8	50,0	98
Primaire	20,6	29,3	3,2	47,0	458
Secondaire inférieur	20,6	34,2	4,1	41,1	527
Secondaire supérieur	23,9	29,4	3,7	42,9	831
Supérieur	28,9	35,2	3,0	32,9	897
Total	24,5	32,4	3,3	39,7	2811
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	20,8	25,2	4,4	49,7	232
20.000-30.000	23,3	27,9	3,7	45,1	634
30.000-40.000	24,6	34,7	2,1	38,6	715
40.000-60.000	24,6	31,9	3,9	39,5	951
>60.000	29,9	42,3	2,8	25,0	285
Total	24,5	32,2	3,4	39,9	2817
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	26,0	31,6	2,6	39,8	1954
Très mauvaise à moyenne	21,6	36,1	4,9	37,4	828
Total	24,8	32,8	3,2	39,2	2782
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	25,3	33,3	3,1	38,3	1324
Dans le passé	29,5	35,5	2,6	32,4	660
Modéré (< 20)	20,7	29,8	5,0	44,5	549
Gros fumeur	20,7	24,9	3,1	51,2	316
Total	24,7	32,1	3,4	39,8	2849

METHODES UTILISEES POUR MAIGRIR (NU02_1-NU02_6)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	91,9	40,7	,2	11,1	18,9	7,7	686
Femme	95,6	29,3	3,3	21,1	16,0	9,2	1225
Total	94,1	33,7	2,1	17,2	17,1	8,6	1911
GROUPES AGE							
15-24	93,1	48,9	,7	21,9	17,5	12,5	242
25-34	94,1	34,1	2,0	20,2	19,5	9,9	393
35-44	92,6	30,1	1,8	18,2	19,2	9,1	403
45-54	94,8	31,4	3,1	15,5	15,6	7,7	336
55-64	97,4	29,4	3,1	10,2	16,7	5,5	264
65-74	95,6	29,2	2,5	9,9	10,3	3,5	204
75 +	87,3	13,6	,0	23,9	3,5	4,5	69
Total	94,1	33,7	2,1	17,2	17,1	8,6	1911
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	89,6	35,6	5,0	33,3	34,7	12,9	57
Primaire	95,3	21,8	,4	20,5	28,4	7,1	203
Secondaire inférieur	92,5	37,9	2,2	16,5	19,3	7,2	298
Secondaire supérieur	94,9	33,9	1,3	19,3	14,4	8,7	542
Supérieur	94,7	34,8	3,1	14,0	14,0	9,7	721
Total	94,3	33,8	2,2	17,4	17,0	8,8	1821
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	94,8	27,0	1,4	20,0	19,8	12,3	132
20.000-30.000	91,7	35,2	1,7	19,8	25,4	7,5	338
30.000-40.000	94,3	32,7	1,9	13,6	15,7	11,4	433
40.000-60.000	95,5	34,8	2,9	18,6	13,0	7,8	614
>60.000	95,1	33,1	1,9	14,9	17,2	8,1	312
Total	94,4	33,7	2,2	17,0	16,8	8,9	1829
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	93,9	37,0	2,3	15,9	16,3	8,6	1369
Très mauvaise à moyenne	96,0	23,0	1,7	22,8	20,0	8,3	488
Total	94,3	34,0	2,1	17,4	17,1	8,6	1857
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	95,0	34,5	3,4	17,1	14,8	7,6	849
Dans le passé	94,2	36,6	1,1	16,8	14,9	10,2	533
Modéré (< 20)	94,9	34,3	1,2	19,7	20,7	8,4	330
Gros fumeur	87,3	18,7	1,1	11,6	27,6	9,7	154
Total	94,1	33,7	2,1	17,0	17,0	8,6	1866
REGION DE RESIDENCE							
Région Flamande	94,5	38,4	1,4	18,2	18,2	7,7	607
Région Bruxelloise	93,1	27,7	2,0	15,8	20,4	9,2	631
Région Wallonne	93,9	28,4	3,3	16,3	14,3	9,8	673
Total	94,1	33,7	2,1	17,2	17,1	8,6	1911

Légende:

1= Approche diététique
2= Exercice physique
3= Groupes de self help

4= Produits adjuvants
5= Jeûne
6= Autres méthodes

REGIO: 1 Région Flamande

METHODES UTILISEES POUR MAIGRIR (NU02_08-NU02_13)

Enquête de santé, Belgique, 1997.

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	92,3	44,3	,0	12,4	19,2	6,0	237
Femme	96,1	34,3	2,4	22,3	17,4	9,0	370
Total	94,5	38,4	1,4	18,2	18,2	7,7	607
GROUPE AGE							
15-24	95,1	56,0	,0	23,0	16,3	11,7	76
25-34	94,3	40,0	2,0	19,4	21,3	7,6	121
35-44	93,2	32,3	1,6	19,3	19,6	7,5	126
45-54	94,4	36,1	2,1	18,0	19,3	9,1	119
55-64	95,9	33,9	,0	13,1	19,6	6,1	84
65-74	99,0	35,6	2,3	8,7	5,0	1,1	64
75 +	81,7	20,2	,0	23,0	,0	,0	17
Total	94,5	38,4	1,4	18,2	18,2	7,7	607
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	87,9	33,6	6,3	43,8	26,2	10,2	15
Primaire	92,8	21,7	,8	23,0	26,7	9,1	67
Secondaire inférieur	93,1	47,4	2,0	15,1	19,5	6,1	107
Secondaire supérieur	96,5	40,2	1,5	21,4	16,8	7,6	201
Supérieur	94,9	38,4	,9	13,3	15,5	8,6	192
Total	94,8	38,8	1,4	18,4	18,0	7,9	582
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	87,4	14,6	,0	32,8	6,3	16,1	14
20.000-30.000	90,5	37,6	,4	19,6	30,4	6,9	82
30.000-40.000	94,4	41,7	2,7	12,3	14,5	12,9	154
40.000-60.000	96,1	39,7	1,8	19,7	14,3	4,9	229
>60.000	97,6	35,1	,0	16,8	20,9	8,6	97
Total	95,0	38,5	1,4	17,6	17,6	8,1	576
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	93,8	41,0	1,3	16,2	17,2	8,0	472
Très mauvaise à moyenne	97,0	27,7	1,8	28,0	23,8	6,2	126
Total	94,4	38,4	1,4	18,5	18,5	7,6	598
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	95,8	39,0	2,1	17,4	14,0	5,9	271
Dans le passé	93,3	39,9	,5	18,2	17,4	10,5	186
Modéré (< 20)	96,1	41,3	1,6	19,3	23,4	9,4	106
Gros fumeur	86,3	21,3	,0	13,3	30,3	5,2	36
Total	94,4	38,4	1,4	17,7	17,8	7,8	599

Légende:

1= Approche diététique
 2= Exercice physique
 3= Groupes de self help

4= Produits adjuvants
 5= Jeûne
 6= Autres méthodes

REGIO: 2 Région Bruxelloise

 METHODES UTILISEES POUR MAIGRIR (NU02_08-NU02_13)
 Enquête de santé, Belgique, 1997.

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	93,8	34,9	,8	11,7	29,6	12,2	224
Femme	92,8	24,0	2,6	17,8	15,8	7,7	407
Total	93,1	27,7	2,0	15,8	20,4	9,2	631
GROUPES AGE							
15-24	90,9	44,0	,0	26,4	17,3	10,3	65
25-34	92,8	29,5	1,2	21,1	27,4	14,5	130
35-44	93,7	25,0	3,6	12,7	15,1	6,7	133
45-54	94,8	18,3	3,1	11,1	15,4	5,8	115
55-64	98,4	32,0	3,3	11,4	25,9	9,8	86
65-74	84,8	17,5	,0	8,1	25,4	3,7	75
75 +	92,3	18,2	,0	13,4	10,9	11,6	27
Total	93,1	27,7	2,0	15,8	20,4	9,2	631
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	79,4	58,2	,0	23,4	51,4	16,8	19
Primaire	93,2	24,3	,0	23,7	29,6	3,8	52
Secondaire inférieur	91,3	35,3	1,0	23,3	18,5	6,7	80
Secondaire supérieur	93,9	19,4	1,6	12,5	14,4	9,3	144
Supérieur	94,4	27,4	2,9	13,1	18,7	10,2	296
Total	92,9	28,3	2,0	15,8	20,6	9,4	591
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	95,5	32,3	4,8	16,9	32,9	14,2	68
20.000-30.000	92,9	21,6	1,9	26,0	16,0	8,5	121
30.000-40.000	89,6	25,5	2,7	11,2	23,2	6,8	111
40.000-60.000	93,7	31,4	,9	14,3	21,0	10,5	157
>60.000	93,3	27,8	1,7	11,9	13,7	8,9	143
Total	92,9	27,5	2,1	16,0	20,1	9,5	600
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	94,2	31,1	2,9	15,3	18,6	8,3	433
Très mauvaise à moyenne	94,8	17,0	,0	17,4	21,9	12,6	174
Total	94,3	27,3	2,1	15,8	19,5	9,5	607
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	92,8	31,7	2,4	12,1	24,1	11,2	263
Dans le passé	94,2	25,0	1,3	20,3	14,8	7,7	172
Modéré (< 20)	95,5	28,3	,7	18,2	21,6	4,6	113
Gros fumeur	86,4	19,4	6,0	15,7	21,5	8,3	57
Total	93,1	28,3	2,1	15,7	21,0	8,7	605

Légende:

 1= Approche diététique
 2= Exercice physique
 3= Groupes de self help

 4= Produits adjuvants
 5= Jeûne
 6= Autres méthodes

REGIO: 3 Région Wallonne

METHODES UTILISEES POUR MAIGRIR (NU02_08-NU02_13)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	90,5	36,2	,4	8,7	14,8	9,3	225
Femme	95,8	24,0	5,0	20,7	13,9	10,2	448
Total	93,9	28,4	3,3	16,3	14,3	9,8	673
GROUPES AGE							
15-24	91,2	40,9	1,9	19,1	19,0	14,3	101
25-34	94,2	27,0	2,2	21,2	14,0	11,6	142
35-44	91,2	28,4	1,7	18,1	19,8	12,4	144
45-54	95,4	27,5	4,8	12,6	9,0	5,9	102
55-64	99,5	20,6	8,4	4,7	7,9	2,8	94
65-74	95,0	23,6	4,1	12,7	12,5	7,6	65
75 +	91,7	1,6	,0	32,2	3,5	6,0	25
Total	93,9	28,4	3,3	16,3	14,3	9,8	673
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	100,0	20,7	7,3	26,1	33,8	13,5	23
Primaire	100,0	21,3	,0	15,7	30,7	5,1	84
Secondaire inférieur	91,9	22,6	2,7	16,9	19,2	9,3	111
Secondaire supérieur	91,8	25,0	,7	16,8	9,4	10,8	197
Supérieur	94,5	33,5	6,0	15,3	10,2	10,8	233
Total	94,0	27,8	3,4	16,3	14,0	10,0	648
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	98,3	30,3	,0	15,1	18,8	9,1	50
20.000-30.000	92,6	37,7	3,0	17,7	23,6	7,8	135
30.000-40.000	95,3	20,6	,4	16,4	15,5	10,3	168
40.000-60.000	94,8	27,3	5,3	17,6	8,7	12,1	228
>60.000	90,3	32,0	6,5	12,3	10,4	6,3	72
Total	94,2	28,5	3,4	16,5	14,4	9,9	653
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	94,0	32,2	3,7	15,6	14,0	9,8	464
Très mauvaise à moyenne	95,0	19,0	2,3	18,0	13,9	9,5	188
Total	94,2	29,2	3,4	16,2	13,9	9,8	652
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	94,4	28,5	5,6	18,3	13,0	8,8	315
Dans le passé	95,7	34,4	2,1	13,1	10,4	10,3	175
Modéré (< 20)	92,8	25,5	,8	21,1	16,0	8,4	111
Gros fumeur	88,8	15,5	,8	8,4	26,6	15,2	61
Total	93,9	28,2	3,3	16,4	14,2	9,8	662

Légende: 1= Approche diététique
2= Exercice physique
3= Groupes de self help
4= Produits adjuvants
5= Jeûne
6= Autres méthodes

QUI CONSEILLE DE MAIGRIR (INDICATEUR NU0301 à NU0305)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

	Généraliste	Spécialiste	Diététicien	Moi-même	Autre	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	28,1	6,1	5,2	77,2	7,3	685
Femme	18,2	8,3	5,6	81,5	6,1	1210
Total	22,1	7,5	5,4	79,8	6,6	1895
GROUPES AGE						
15-24	8,1	3,4	7,4	92,6	12,2	238
25-34	11,5	2,8	5,3	91,1	7,0	387
35-44	16,8	4,3	3,9	83,1	6,9	400
45-54	27,3	9,0	6,8	79,1	4,8	338
55-64	40,9	15,8	4,6	57,6	5,5	262
65-74	48,4	20,2	3,6	51,9	1,1	204
75 +	49,0	16,1	4,7	56,1	,0	66
Total	22,1	7,5	5,4	79,8	6,6	1895
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	38,5	11,5	2,7	62,2	4,5	57
Primaire	34,3	12,6	3,3	63,4	3,2	202
Secondaire inférieur	29,3	11,1	4,9	75,7	4,7	298
Secondaire supérieur	19,4	8,5	7,6	80,1	7,5	539
Supérieur	16,9	3,8	4,6	86,4	8,1	713
Total	22,0	7,6	5,5	79,7	6,8	1809
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	27,9	12,2	4,7	72,5	,6	130
20.000-30.000	26,8	11,1	7,0	75,0	4,6	341
30.000-40.000	20,0	8,4	5,2	80,2	5,7	427
40.000-60.000	21,6	5,2	6,1	80,1	7,2	604
>60.000	20,4	5,8	2,9	84,9	9,2	311
Total	22,2	7,5	5,5	79,6	6,4	1813
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	16,5	4,5	4,9	84,7	6,3	1355
Très mauvaise à moyenne	40,0	17,7	6,9	63,0	8,5	485
Total	21,6	7,4	5,3	80,0	6,8	1840
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	20,8	6,0	4,3	81,0	8,5	842
Dans le passé	28,6	10,7	6,5	75,3	6,2	530
Modéré (< 20)	15,9	5,1	5,0	84,8	4,0	324
Gros fumeur	16,9	7,9	8,8	77,7	2,7	153
Total	21,8	7,4	5,4	79,8	6,6	1849
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	23,6	7,8	3,6	79,7	7,4	607
Région Bruxelloise	21,4	8,8	3,5	80,3	5,5	621
Région Wallonne	19,9	6,4	9,0	79,7	5,6	667
Total	22,1	7,5	5,4	79,8	6,6	1895

REGIO: 1 Région Flamande
INDICATEUR

QUI CONSEILLE DE MAIGRIR (INDICATEUR NU0301 à NU0305)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

	Généraliste	Spécialiste	Diététicien	Moi-même	Autre	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	30,6	6,8	4,5	75,8	10,0	238
Femme	18,6	8,6	2,9	82,5	5,6	369
Total	23,6	7,8	3,6	79,7	7,4	607
GROUPES AGE						
15-24	6,5	3,6	5,3	94,4	17,9	75
25-34	15,5	1,8	2,3	92,4	5,8	120
35-44	15,3	2,4	,0	82,9	10,1	126
45-54	27,0	9,9	7,4	80,9	4,0	121
55-64	51,2	19,3	2,9	53,0	4,4	84
65-74	45,9	25,7	4,0	50,2	,0	64
75 +	48,7	12,2	9,4	46,4	,0	17
Total	23,6	7,8	3,6	79,7	7,4	607
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	51,7	13,0	,0	57,3	,0	15
Primaire	35,0	13,8	2,4	60,8	4,1	67
Secondaire						
inférieur	34,7	12,2	3,9	70,6	7,1	109
supérieur	20,1	9,1	6,8	80,7	9,2	199
Supérieur	16,9	2,9	,6	89,7	8,1	192
Total	23,8	8,1	3,6	79,4	7,7	582
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	53,2	29,3	10,4	43,6	,0	14
20.000-30.000	32,9	12,8	5,1	66,2	6,6	85
30.000-40.000	20,2	8,6	2,9	82,5	6,0	154
40.000-60.000	21,2	5,0	3,6	83,3	8,1	226
>60.000	23,4	5,9	1,8	83,6	7,4	97
Total	23,8	7,8	3,5	79,7	7,0	576
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	18,2	4,4	2,8	84,6	6,1	471
Très mauvaise à moyenne	43,3	20,3	7,2	60,4	13,6	127
Total	23,1	7,6	3,7	79,8	7,6	598
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	20,4	6,1	1,9	82,8	9,4	271
Dans le passé	33,0	11,7	5,9	72,4	6,3	185
Modéré (< 20)	12,8	3,5	3,4	86,8	5,4	106
Gros fumeur	26,2	11,1	4,4	74,4	4,0	36
Total	23,3	7,7	3,5	79,8	7,4	598

REGIO: 2 Région Bruxelloise

QUI CONSEILLE DE MAIGRIR (INDICATEUR NU0301 à NU0305)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

	Généraliste	Spécialiste	Diététicien	Moi-même	Autre	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	22,8	9,3	2,6	83,1	6,8	223
Femme	20,6	8,6	4,0	78,9	4,8	398
Total	21,4	8,8	3,5	80,3	5,5	621
GROUPES AGE						
15-24	1,0	,0	7,6	95,9	2,5	64
25-34	9,4	6,9	3,6	91,3	10,4	126
35-44	15,0	8,0	2,2	87,1	5,3	132
45-54	30,8	15,3	2,2	70,7	7,0	115
55-64	33,8	10,0	2,9	68,9	2,8	85
65-74	49,6	8,0	3,7	52,7	,7	75
75 +	62,5	29,0	2,1	62,8	,0	24
Total	21,4	8,8	3,5	80,3	5,5	621
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	38,3	4,6	1,6	49,7	9,0	20
Primaire	37,4	15,7	5,5	61,5	3,2	52
Secondaire						
inférieur	22,6	9,9	4,4	86,0	3,4	78
supérieur	13,7	5,7	1,4	86,4	4,1	141
Supérieur	17,4	8,2	4,3	84,3	6,9	292
Total	20,2	8,3	3,6	80,9	5,6	583
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	16,5	11,5	,8	83,8	2,1	67
20.000-30.000	24,8	11,9	5,8	74,9	2,7	122
30.000-40.000	34,8	10,0	7,5	69,0	2,5	107
40.000-60.000	13,8	3,3	,7	88,6	9,1	152
>60.000	19,8	10,8	2,9	82,7	7,3	142
Total	21,9	9,1	3,6	80,0	5,2	590
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	13,3	4,8	3,2	89,5	5,3	427
Très mauvaise à moyenne	36,4	19,8	4,9	59,7	6,4	169
Total	19,5	8,8	3,7	81,4	5,6	596
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	21,0	8,6	3,7	76,4	7,5	262
Dans le passé	23,3	9,1	4,6	85,6	3,5	168
Modéré (< 20)	18,6	8,1	1,0	83,3	2,8	109
Gros fumeur	19,4	6,5	6,8	82,6	5,5	56
Total	20,9	8,4	3,7	80,5	5,4	595

REGIO: 3 Région Wallonne

QUI CONSEILLE DE MAIGRIR (INDICATEUR NU0301 à NU0305)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

	Généraliste	Spécialiste	Diététicien	Moi-même	Autre	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	25,2	3,8	7,2	77,7	2,4	224
Femme	16,9	7,9	9,9	80,8	7,4	443
Total	19,9	6,4	9,0	79,7	5,6	667
GROUPES AGE						
15-24	12,4	4,2	10,1	89,2	7,3	99
25-34	6,2	2,7	10,4	88,9	7,5	141
35-44	19,8	6,2	10,8	82,2	2,2	142
45-54	26,6	5,3	7,2	78,6	5,5	102
55-64	25,9	12,1	8,4	60,6	8,6	93
65-74	51,9	16,7	2,9	54,3	3,2	65
75 +	42,2	14,0	,0	64,9	,0	25
Total	19,9	6,4	9,0	79,7	5,6	667
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	19,2	15,1	7,5	79,9	7,5	22
Primaire	32,2	9,7	4,2	68,0	1,9	83
Secondaire						
inférieur	21,9	9,7	6,8	81,3	1,0	111
supérieur	19,4	8,1	10,6	77,5	5,2	199
Supérieur	16,5	3,1	9,9	83,2	8,8	229
Total	19,9	6,5	9,0	79,6	5,8	644
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	21,2	3,5	4,1	81,1	,0	49
20.000-30.000	20,9	8,9	9,5	84,5	3,1	134
30.000-40.000	15,8	7,6	8,2	79,6	6,0	166
40.000-60.000	24,3	5,9	11,8	72,4	5,2	226
>60.000	13,5	2,2	5,5	89,4	14,7	72
Total	19,9	6,4	9,2	79,4	5,7	647
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	14,6	4,5	9,0	83,4	6,9	457
Très mauvaise à moyenne	36,9	13,1	7,4	67,8	2,3	189
Total	19,8	6,5	8,6	79,8	5,9	646
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	21,3	5,0	8,3	79,9	7,3	309
Dans le passé	22,2	9,4	8,2	77,4	6,8	177
Modéré (< 20)	19,9	6,7	9,5	82,2	2,2	109
Gros fumeur	5,7	4,8	14,2	79,7	,2	61
Total	19,7	6,5	9,0	79,6	5,6	656

METHODES UTILISEES POUR MAINTENIR SON POIDS (INDICATEUR: NU02_1-NU02_6)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	86,7	41,1	,0	6,3	10,2	5,9	1214
Femme	93,0	32,5	,7	10,2	9,8	6,6	1545
Total	90,2	36,2	,4	8,5	10,0	6,3	2759
GROUPES AGE							
15-24	80,5	49,2	,7	6,3	15,2	12,2	305
25-34	86,2	41,0	,1	7,1	11,3	5,2	485
35-44	92,4	35,1	,5	11,2	14,3	8,1	517
45-54	92,6	28,2	,0	9,0	5,2	6,2	459
55-64	95,8	41,4	,8	7,2	6,8	3,5	400
65-74	91,5	28,8	,0	7,4	8,8	2,3	401
75 +	97,1	15,7	1,6	12,9	,4	2,3	192
Total	90,2	36,2	,4	8,5	10,0	6,3	2759
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	70,5	33,7	,0	4,3	24,6	1,3	50
Primaire	91,9	34,0	,6	5,5	11,3	6,8	359
Secondaire inférieur	87,8	34,5	,4	9,0	10,5	7,3	491
Secondaire supérieur	91,0	36,1	,5	8,3	11,6	5,3	799
Supérieur	92,4	37,6	,3	9,4	7,0	7,1	957
Total	90,6	36,0	,4	8,4	10,0	6,4	2656
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	83,5	30,6	,0	3,2	7,2	4,5	148
20.000-30.000	88,6	42,8	1,0	9,0	14,7	7,6	471
30.000-40.000	87,6	35,9	,4	7,0	10,0	7,3	646
40.000-60.000	92,7	33,1	,3	9,7	9,4	5,3	940
>60.000	91,9	38,1	,1	9,7	6,5	8,1	414
Total	90,2	36,1	,4	8,6	10,0	6,6	2619
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	90,3	39,7	,1	6,9	8,7	6,5	2055
Très mauvaise à moyenne	90,1	24,2	1,4	15,1	16,0	4,6	630
Total	90,3	36,5	,4	8,6	10,2	6,1	2685
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	92,1	41,1	,2	8,2	7,8	4,8	1296
Dans le passé	92,4	34,4	,1	7,4	4,8	8,0	699
Modéré (< 20)	88,0	31,2	,9	8,5	14,8	6,3	475
Gros fumeur	80,7	23,6	,5	11,7	24,5	10,3	204
Total	90,5	36,2	,3	8,3	9,7	6,3	2674
REGION DE RESIDENCE							
Région Flamande	89,9	42,7	,3	9,1	10,7	5,6	1154
Région Bruxelloise	90,9	22,8	,3	7,3	10,9	7,2	704
Région Wallonne	90,8	24,4	,6	7,4	7,9	7,7	901
Total	90,2	36,2	,4	8,5	10,0	6,3	2759

Légende: 1= Approche diététique
2= Exercice physique
3= Groupes de self help
4= Produits adjuvants
5= Jeûne
6= Autres méthodes

REGIO: 1 Région Flamande

METHODES UTILISEES POUR MAINTENIR SON POIDS (INDICATEUR:NU02_1-NU02_6)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	85,5	47,9	,0	6,7	11,7	4,8	514
Femme	93,4	38,6	,6	11,0	9,9	6,3	640
Total	89,9	42,7	,3	9,1	10,7	5,6	1154
GROUPES AGE							
15-24	78,4	54,1	,0	6,3	17,1	13,3	127
25-34	86,0	46,8	,0	7,0	11,9	3,8	214
35-44	91,9	40,5	,4	12,4	16,1	7,3	225
45-54	92,3	32,8	,0	7,6	5,2	5,2	194
55-64	95,3	51,0	1,0	9,3	8,1	1,8	176
65-74	93,8	38,2	,0	9,5	5,7	2,4	155
75 +	96,2	25,0	3,2	17,7	,0	3,1	63
Total	89,9	42,7	,3	9,1	10,7	5,6	1154
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	89,3	69,2	,0	4,6	14,6	,0	12
Primaire	91,1	42,2	,9	7,6	13,6	5,0	138
Secondaire inférieur	86,2	42,8	,0	9,9	11,7	7,7	211
Secondaire supérieur	91,0	38,3	,4	8,8	12,5	4,7	395
Supérieur	92,5	46,2	,3	9,7	7,4	6,0	357
Total	90,5	42,5	,3	9,1	10,8	5,7	1113
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	83,0	35,5	,0	1,5	5,5	3,3	42
20.000-30.000	87,9	53,8	,6	8,7	15,9	6,3	189
30.000-40.000	85,7	41,8	,7	9,0	9,0	6,9	285
40.000-60.000	92,9	36,5	,2	9,8	11,0	4,9	417
>60.000	91,9	47,9	,0	11,1	7,0	8,0	148
Total	89,8	42,5	,3	9,3	10,7	6,0	1081
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	90,0	45,3	,0	7,1	9,1	5,9	922
Très mauvaise à moyenne	90,3	30,1	1,9	19,5	19,7	4,6	211
Total	90,0	42,7	,3	9,2	10,9	5,7	1133
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	91,4	48,3	,2	8,9	8,9	3,7	560
Dans le passé	91,3	39,8	,0	5,7	4,2	8,8	293
Modéré (< 20)	89,8	35,4	,5	10,1	17,0	4,6	196
Gros fumeur	75,5	29,9	,0	16,0	30,6	8,5	82
Total	89,9	42,5	,2	8,8	10,8	5,5	1131

Légende: 1= Approche diététique
2= Exercice physique
3= Groupes de self help

4= Produits adjuvants
5= Jeûne
6= Autres méthodes

REGIO: 2 Région Bruxelloise

METHODES UTILISEES POUR MAINTENIR SON POIDS (INDICATEUR:NU02_1-NU02_6)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	90,3	25,1	,0	6,9	10,0	8,8	314
Femme	91,4	20,9	,6	7,5	11,6	5,9	390
Total	90,9	22,8	,3	7,3	10,9	7,2	704
GROUPES AGE							
15-24	81,3	37,7	,0	2,0	11,3	8,3	64
25-34	89,5	29,5	,9	11,6	9,7	6,6	123
35-44	91,3	22,1	,0	7,2	13,0	9,2	115
45-54	93,1	23,9	,4	9,5	10,5	8,8	117
55-64	96,8	11,9	,0	1,5	10,8	7,2	102
65-74	90,7	11,9	,5	6,2	14,5	4,7	118
75 +	95,9	13,0	,0	11,4	1,9	2,1	65
Total	90,9	22,8	,3	7,3	10,9	7,2	704
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	84,2	14,8	,0	,0	16,8	9,6	18
Primaire	92,7	22,6	,7	2,5	11,5	2,0	83
Secondaire inférieur	88,1	17,8	1,3	4,5	7,6	8,5	106
Secondaire supérieur	89,7	18,4	,0	6,4	12,3	6,6	163
Supérieur	91,7	28,6	,1	10,7	9,9	8,9	303
Total	90,5	23,3	,3	7,4	10,6	7,5	673
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	89,5	20,0	,0	1,5	7,0	1,5	47
20.000-30.000	88,1	20,4	1,5	2,8	16,1	5,2	104
30.000-40.000	88,0	23,5	,0	6,7	16,6	10,5	141
40.000-60.000	92,5	20,7	,3	7,0	5,9	7,4	236
>60.000	94,2	28,1	,0	13,9	11,1	8,0	148
Total	91,0	22,8	,3	7,3	10,8	7,1	676
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	90,3	25,9	,3	6,9	10,6	8,4	507
Très mauvaise à moyenne	91,7	14,0	,3	8,9	12,5	2,8	174
Total	90,6	23,4	,3	7,3	11,0	7,2	681
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	93,1	22,2	,4	7,4	6,9	8,7	303
Dans le passé	97,7	22,7	,3	8,9	6,3	8,5	186
Modéré (< 20)	86,2	27,3	,0	6,5	17,2	3,2	128
Gros fumeur	86,5	13,1	1,1	6,1	21,8	6,0	52
Total	92,0	22,8	,3	7,4	10,5	7,1	669

Légende: 1= Approche diététique
2= Exercice physique
3= Groupes de self help

4= Produits adjuvants
5= Jeûne
6= Autres méthodes

REGIO: 3 Région Wallonne
 METHODES UTILISEES POUR MAINTENIR SON POIDS (INDICATEUR:NU02_1-NU02_6)
 Enquête de santé, Belgique, 1997.

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	88,5	28,6	,0	5,0	6,5	8,0	386
Femme	92,5	21,4	1,0	9,1	9,0	7,4	515
Total	90,8	24,4	,6	7,4	7,9	7,7	901
GROUPES AGE							
15-24	84,7	41,6	2,5	7,5	12,2	10,8	114
25-34	85,6	30,3	,0	5,8	10,2	8,1	148
35-44	94,1	23,4	1,0	9,0	9,4	10,3	177
45-54	93,0	17,5	,0	12,3	3,9	8,1	148
55-64	96,9	23,8	,3	3,2	2,2	7,0	122
65-74	87,5	16,4	,0	3,8	12,8	1,4	128
75 +	98,7	3,8	,0	6,7	,5	1,3	64
Total	90,8	24,4	,6	7,4	7,9	7,7	901
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	54,1	14,6	,0	5,1	33,3	,0	20
Primaire	93,5	18,1	,0	1,6	5,8	12,2	138
Secondaire inférieur	91,6	17,8	1,4	7,8	8,3	5,8	174
Secondaire supérieur	91,4	33,4	,9	7,3	8,7	6,9	241
Supérieur	92,3	23,7	,3	8,4	5,3	8,7	297
Total	90,7	24,3	,6	7,1	7,8	7,8	870
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	81,5	28,5	,0	6,4	9,6	7,5	59
20.000-30.000	90,3	23,4	1,7	10,9	11,5	11,2	178
30.000-40.000	91,5	26,3	,0	3,2	10,8	7,3	220
40.000-60.000	92,4	27,3	,7	10,1	6,0	5,9	287
>60.000	90,8	18,0	,3	4,1	2,8	8,2	118
Total	90,9	25,1	,6	7,4	8,1	7,7	862
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	91,4	27,8	,5	6,4	6,8	7,8	626
Très mauvaise à moyenne	89,3	17,5	,9	10,0	11,2	5,1	245
Total	90,8	24,9	,6	7,4	8,1	7,0	871
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	93,6	27,8	,0	6,9	5,1	6,4	433
Dans le passé	93,8	23,9	,3	11,0	6,0	5,8	220
Modéré (< 20)	84,7	23,5	2,1	5,7	8,9	11,2	151
Gros fumeur	90,7	12,3	1,4	3,6	11,8	15,4	70
Total	91,7	24,7	,6	7,4	6,6	7,9	874

Légende:

1= Approche diététique
 2= Exercice physique
 3= Groupes de self help

4= Produits adjuvants
 5= Jeûne
 6= Autres méthodes