


Enquête de Santé par Interview Belgique 2001



Livre 5 Consommation de Soins



**Rue de Louvain, 44
1000 Bruxelles**

**Section d'Epidémiologie
Rue Juliette Wytsman, 14
1050 Bruxelles
Tél : 02/642.57.94
e-mail his@iph.fgov.be
[http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/
index4.htm](http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index4.htm)**

Equipe de recherche :

**Jamila Buziarsist
Stefaan Demarest
Lydia Gisle
Jean Tafforeau
Johan Van der Heyden
Herman Van Oyen**

Avec la collaboration de :

**Pieter-Jan Miermans
Francis Sartor**

Equipe logistique :

**Monique Schoonenburg
Véronique Verhocht**

Table des Matières

LIVRE 1 :

Pages

Introduction.....	8
--------------------------	----------

Objectifs de l'Enquête de Santé

I. Contenu du Questionnaire	8
II. Constitution de l'Echantillon.....	11
III. Présentation des Différents Intervenants	17
IV. Organisation du Travail sur le Terrain	19
V. Réseau d'Enquêteurs	20
VI. Contrôles de Qualité	24
VII. Degré de Participation.....	28
VIII. Facteurs de Pondération	33
IX. Tableaux de Base	34
X. Population de l'Etude	39

LIVRE 2 :

1. Etat de Santé	45
1.1. Santé Subjective	47
1.2. Santé Physique	81
1.2.1. Maladies et Affections Chroniques	81
1.2.2. Affections Aiguës	237
1.3. Santé Mentale	307
1.4. Limitations de l'Activité et Restriction de la Participation	419

LIVRE 3 :

2. Style de Vie	627
2.1. Activités Physiques	629
2.2. Nutrition	699
2.2.1. Etat Nutritionnel	699
2.2.2. Habitudes Nutritionnelles	769
2.3. Consommation d'Alcool	877
2.4. Consommation de Tabac	951
2.5. Usage de Drogues Illicites	1037
2.6. Santé et Sexualité	1081

Table des Matières

Pages

LIVRE 4 :

3. Prévention	1131
3.1. Vaccination chez les Adultes	1133
3.2. Prévention Cardiovasculaire	1201
3.3. Dépistage du Diabète	1277
3.4. Dépistage du Cancer du Sein	1319
3.5. Dépistage du Cancer du Col de l'Utérus	1375

LIVRE 5 :

4. Consommation de Soins	1401
4.1. Contacts avec des Professionnels de la Santé	1403
4.1.1. Contacts avec le Médecin Généraliste	1403
4.1.2. Contacts avec le Médecin Spécialiste	1533
4.1.3. Contacts avec le Service des Urgences	1629
4.1.4. Contacts avec le Dentiste	1679
4.1.5. Contacts avec les Professionnels Paramédicaux	1733
4.2. Hospitalisation	1773
4.3. Consommation de Médicaments	1857
4.4. Satisfaction du Patient	1985
4.5. Thérapies Non-Conventionnelles	2077

LIVRE 6 :

5. Santé et Société	2139
5.1. Accès aux Soins de Santé	2141
5.2. Différences Socio-Economiques en Matière de Santé	2187
5.3. Santé et Environnement	2193
5.4. Accidents, Sécurité Routière et Violence	2235
5.5. Santé Sociale	2339
5.6. Services Sociaux et Préventifs	2407



4.5. Thérapies Non-Conventionnelles



Cette enquête a été réalisée à l'initiative de :

J. Tavernier

*Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique
et de l'Environnement*

J. Chabert

*Ministre des Travaux Publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie
et de l'Aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale*

T. Detienne

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé de Région Wallonne

D. Gosuin

*Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature
et de la Propreté Publique, et du Commerce Extérieur de la Région Bruxelles-Capitale*

N. Maréchal

Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé de la Communauté Française

H. Niessen

*Ministre de la Jeunesse et de la Famille, des Monuments et Sites, de la Santé
et des Affaires Sociales de la Communauté Germanophone*


F. Vandenbroucke

Ministre des Affaires Sociales et des Pensions

M. Vogels

Ministre de l'Aide Sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances de la Communauté Flamande

4.5. Thérapies Non-Conventionnelles



I. Résumé

Les “thérapies non conventionnelles” font référence à l’ensemble des pratiques qui n’appartiennent pas au domaine des sciences médicales et qui permettent d’offrir des soins « alternatif » par rapport à ceux proposés habituellement.

Ces traitements peuvent soit s’inscrire dans la continuité des techniques traditionnelles, soit se baser sur des conceptions nouvelles. Les patients qui s’adressent à un thérapeute alternatif le font par curiosité et/ou parce qu’ils sont mécontents du traitement reçu dans les circuits habituels de la médecine. Le traitement alternatif peut compléter une thérapie conventionnelle ou même la remplacer complètement.

Bien que de grandes incertitudes subsistent dans le monde scientifique en ce qui concerne l’efficacité et la pertinence des thérapies non conventionnelles, on constate qu’elles deviennent de plus en plus populaires en Belgique. Les chiffres de l’Enquête Nationale de Santé de 1997 indiquaient que 8% de la population avait fait appel à une des thérapies non-conventionnelles. En 2001, 11% de la population a eu un contact avec un thérapeute non-conventionnel, une nette augmentation par rapport à 1997.

Cette augmentation correspond surtout au recours à l’homéopathie ainsi qu’à la combinaison ostéopathie-chiropraxie. Ces deux derniers types de soins non-conventionnels forment deux catégories de soins distinctes dans le questionnaire de 2001 mais ils étaient regroupés en une seule catégorie en 1997. On ne peut donc mesurer l’évolution individuelle de chacun de ces deux types de thérapie alternative entre 1997 et 2001. Toutefois, si on combine le nombre de personnes ayant un contact avec l’ostéopathie et la chiropraxie en 2001, on arrive à un chiffre nettement supérieur au taux de l’utilisation de 1997.

Les femmes ont plus fréquemment recours que les hommes aux thérapies non-conventionnelles. La seule thérapie alternative qui attire les hommes en plus grand nombre est la chiropraxie.

Les personnes du groupe d’âge de 35 à 44 ans sont plus nombreuses à utiliser ce type de thérapies. En revanche, le taux d’utilisation est nettement moins élevé dans les classes d’âge les plus avancées.

Les personnes avec un diplôme plus élevé utilisent davantage les thérapies non-conventionnelles. Cette tendance est surtout remarquée dans l'usage de l'homéopathie et de l'ostéopathie.

Le thérapeute alternatif n'a pas de diplôme de médecine dans 25% des cas seulement. Dans la grande majorité des cas, les soins homéopathiques et l'acupuncture sont dispensés par des médecins. Les ostéopathes et les chiropracteurs consultés sont médecins dans respectivement 35% et 52% des cas.

II. Introduction

L'Organisation mondiale de la santé a récemment publié un rapport¹ sur l'utilisation des thérapies non conventionnelles. Les statistiques se rapportant à la Belgique indiquent que 40% de la population du pays a déjà eu recours à l'une ou l'autre forme de thérapie non conventionnelle. Ces thérapies jouent donc, de toute évidence, un rôle non négligeable dans le secteur des soins de santé belge.

En Belgique, seuls les porteurs d'un diplôme de docteur en médecine, d'une licence en science dentaire et d'un titre légal de sage-femme ont le droit de poser un diagnostic et prescrire un traitement (articles 2 et 3 de l'A.R. n°78 du 10 novembre 1967 relatifs à l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales). Lorsqu'il s'agit de poser un diagnostic ou de prescrire un traitement, ces praticiens disposent d'une liberté de principe (article 11 du même A.R.). En matière de diagnostic et de traitement, ils peuvent donc utiliser les moyens qui leur conviennent : l'homéopathie, l'acupuncture, la chiropraxie, ... Ainsi, seules les personnes qui détiennent les diplômes sus-mentionnés sont autorisées à recourir à une pratique alternative dans le but de poser un diagnostic ou d'instaurer un traitement. Dans tous les autres cas, il s'agit de pratiques illégales.

Dans ce cadre, on peut aussi se référer à l'avis négatif rendu par l'Académie Royale de Médecine à l'égard de ces thérapies non conventionnelles.

De nombreux praticiens de ces thérapies non conventionnelles se situent cependant en dehors du cadre légal de l'exercice de ces fonctions. Dans la mesure où les différentes formes de thérapies non conventionnelles ont gagné en popularité, le besoin s'est fait sentir d'établir une réglementation globale pour ce secteur de soins. Ce faisant, les autorités politiques ne cherchent pas tant à promouvoir les thérapies non conventionnelles, mais à offrir au citoyen la garantie de qualité pour les soins alternatifs procurés.

En 1997, le Ministre de la Santé Publique en fonction, M. Colla, a organisé une table ronde autour des thérapies non conventionnelles avec des membres du Parlement, des représentants du corps médical et des différentes thérapies alternatives et des sceptiques. Depuis lors, une proposition de loi a été déposée pour quatre pratiques non conventionnelles : l'homéopathie, l'acupuncture, la chiropraxie et l'ostéopathie. Cette proposition a débouché sur la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales. Cette loi détermine la procédure qui, en fin de compte, peut donner lieu à « l'enregistrement » (différent de la « reconnaissance ») des praticiens des thérapies non conventionnelles. Le Ministre actuel de la Santé Publique s'attèle à l'exécution de cette loi. En juin 2002, une étape importante a été franchie dans le décours de cette procédure, avec l'approbation de l'A.R. concernant la constitution d'organisations professionnelles de praticiens d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle.

Une autre voie possible dans la réglementation des thérapies non conventionnelles est de les inclure dans la liste des compétences particulières, en application de l'article 35 de l'A.R. n°78 du 10 novembre 1997. Les compétences particulières prises en considération sont, pour les médecins, l'homéopathie, l'acupuncture, la chiropraxie et l'ostéopathie, et pour les kinésithérapeutes, l'acupuncture, la chiropraxie et l'ostéopathie. Cette piste n'est pas soumise aux clauses de la loi du 29 avril 1999, et pourrait être réalisée avant la fin de la législature actuelle. Le cadre légal ainsi créé pour les médecins et les paramédicaux pourra être élargi, par après, avec la mise en application de la loi de 1999.

¹ Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine : A Worldwide Review, WHO, February 2001.

Pour l'instant, rien n'est prévu pour le remboursement des soins alternatifs dans le chef des assurances-maladies officielles. Certaines caisses d'assurance maladie utilisent les fonds des assurances complémentaires pour le remboursement des médicaments homéopathiques à ses membres – notamment les Mutualités Neutres, qui était le premier organisme à instaurer un système général de remboursement des soins homéopathiques pour ses membres. En 2001, moins que 2% des membres de cet organisme ont demandé un remboursement pour des médicaments homéopathiques.

Les Mutualités Chrétiennes ont rapporté que pour l'année 2000, 3% de la totalité de leurs membres ont régulièrement fait appel à des thérapies alternatives pour lesquelles les Mutualités sont intervenues pour assurer une participation aux frais. Si l'on considère les membres entre 30 et 60 ans, la proportion s'élève à 6%. Et si l'on tient compte exclusivement des membres qui ont des problèmes de santé, c'est 15% d'entre eux qui ont recours aux thérapies alternatives. Les plus grands utilisateurs sont les femmes entre 30 et 60 ans. Une femme sur cinq se fait régulièrement traiter par une thérapie non conventionnelle.

III. Questions

Dans l'enquête de santé de 2001, les questions qui abordent les contacts avec un thérapeute alternatif ont trait au recours éventuel à une thérapie non conventionnelle et à l'identité (médecin ou non) du thérapeute :

OH.02: Au cours de l'année passée, avez-vous eu, pour vous-même, un contact avec une personne pratiquant...

- L'homéopathie?
- L'acupuncture?
- L'ostéopathie?
- La chiropraxie?
- Une autre forme de médecine alternative, c'est-à-dire...?

Si la réponse à une de ces questions est positive, la question suivante est alors d'application :

OH.03. S'agissait-il d'un médecin?

IV. Indicateurs

Plusieurs indicateurs ont été créés pour rendre compte des thérapies non conventionnelles en Belgique.

En premier lieu, les cinq questions ayant trait aux contacts avec les différentes thérapies non conventionnelles sont combinées en un indicateur global relatif à la consultation – ou non – auprès d'un thérapeute non conventionnel.

Dans le compte rendu de la situation en Belgique, l'indicateur "usage cumulé" permet d'évaluer dans quelle mesure les utilisateurs des thérapies non conventionnelles font appel à diverses formes de ces thérapies.

Les indicateurs suivants se réfèrent aux contacts individuels avec les différentes formes de thérapies : l'homéopathie, l'acupuncture, l'ostéopathie, la chiropraxie et d'autres. On examine ici le nombre de personnes (en pourcentage) qui ont consulté pour eux-mêmes et dans le passé, un thérapeute alternatif. La catégorie « autre » regroupe des thérapies comme la kinésiologie, la réflexologie et la naturothérapie.

La comparaison entre 1997 et 2001 n'est possible que pour ce qui concerne l'homéopathie, l'acupuncture et la catégorie « autre ». Les résultats pour l'ostéopathie et la chiropraxie, qui forment des catégories de réponse séparées en 2001, ne sont pas directement comparables à 1997, où ils étaient combinés en une catégorie de réponse unique. Une comparaison avec les données de 1997 impose donc que l'on regroupe a posteriori les deux types de thérapies pour les données de 2001.

Enfin, l'indicateur "identité du praticien" présente, parmi les thérapeutes non conventionnels consultés, le pourcentage de ceux qui sont médecins.

V. Résultats

V.1. Belgique

V.1.1. Contact avec un thérapeute non conventionnel (AG01)

En Belgique, 11% de la population rapporte avoir eu un contact avec un thérapeute non conventionnel au cours de l'année écoulée. Le Tableau 4.5.1.1 présente un aperçu de l'utilisation des différents types de thérapies non conventionnelles.


Tableau 4.5.1.1 : Nombre de personnes (en %) ayant rapporté un contact avec un thérapeute alternatif au cours de l'année précédente, par thérapie, Enquête de santé, Belgique, 2001.

Thérapies alternatives	%
Homéopathie	6,1
Acupuncture	1,5
Ostéopathie	4,2
Chiropraxie	1,6
Autre	0,9

Les femmes sont significativement plus nombreuses à se rendre chez un thérapeute alternatif que les hommes (13% versus 10% ; Tableau 4.5.1.2).

Les hommes comme les femmes sont proportionnellement plus nombreux à consulter un thérapeute non conventionnel dans la catégorie d'âge 35-44 ans, alors que le taux de ce type de consultation est au plus bas dans la tranche d'âge des aînés (75+) (Figure 4.5.1.1).

Figure 4.5.1.1 : Nombre de personnes (en %) ayant eu contact avec un thérapeute alternatif au cours de l'année précédente, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.




En ce qui concerne les contacts avec des thérapeutes non conventionnels, on n'observe pas de différence significative entre les trois régions du pays (Tableau 4.5.1.1). Le niveau d'urbanisation ne semble pas, lui non plus, influencer l'utilisation des thérapies alternatives.

En revanche, la proportion de personnes qui consultent des thérapeutes non conventionnels augmente avec leur niveau d'éducation. La différence n'est toutefois significative qu'entre les niveaux d'éducation le plus faible (6%) et le plus élevé (16%), après ajustement pour l'âge et le sexe (Tableau 4.5.1.2).

Pour ce qui est de l'évolution, entre 1997 et 2001, de l'utilisation des thérapies alternatives, celle-ci marque une augmentation, passant de 8% (en 1997) à 11% (en 2001). Chez les hommes, l'augmentation du taux de consultation pour le groupe d'âge 35-44 ans saute aux yeux (Figure 4.5.1.2).

Figure 4.5.1.2 : Différence (en % absolu) entre 1997 et 2001 du pourcentage de la population ayant eu un contact avec un thérapeute alternatif dans l'année précédente, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.1.2. Contact avec plusieurs types de thérapies non conventionnelles (AGcumul)

Parmi les personnes qui ont fait appel à un thérapeute alternatif au cours de l'année qui a précédé, 81% n'a eu recours qu'à un seul type de thérapies non conventionnelles, tandis que 15% et 3% ont eu recours à respectivement 2 et 3 types de ces thérapies. Environ 1% des utilisateurs de thérapies alternatives a eu recours à 4 ou 5 différents types de thérapies.

En 1997, la consultation cumulée des différentes thérapies non conventionnelles était moins fréquente. 88% des utilisateurs de ces thérapies n'avaient recours qu'à un seul type de thérapies, 10% avaient recours à 2 thérapies différentes et 1% faisaient appel à 3 ou 4 thérapies différentes.


Cette comparaison est toutefois audacieuse. En effet, dans l'enquête de 1997 a chiropraxie et l'ostéopathie formaient une seule catégorie de réponse. Ceci implique que le fait de cumuler plusieurs types de thérapies est quelque peu sous-estimé en 1997, vu que le recouvrement chiropraxie-ostéopathie (en 2001, 9% des patients qui ont eu recours à l'ostéopathie ont aussi consulté un chiropracteur). La comparaison avec 1997 n'a donc qu'une valeur d'indication.

V.1.3. Homéopathie (AG0201)

6% de la population de Belgique a consulté un homéopathe dans l'année qui a précédé l'enquête. Les femmes sont plus nombreuses à les avoir consulté que les hommes (7% versus 5% ; Tableau 4.5.1.3). L'âge ne joue pas un rôle important en ce qui concerne le recours à l'homéopathie.

Les personnes des groupes de scolarité plus élevée utilisent significativement plus souvent l'homéopathie que celles des groupes de scolarité moins élevée (8% versus 3% ; Tableau 4.5.1.3).


Figure 4.5.1.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un homéopathe au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Le niveau d'urbanisation n'influence pas le fait de consulter un homéopathe. En revanche, une différence semble se dessiner entre les régions du pays : on consulte plus volontiers un homéopathe à Bruxelles que dans les deux autres régions, mais cette différence n'est toutefois pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Il s'avère que l'utilisation de l'homéopathie a augmenté entre 1997 et 2001 – de 4% à 6%. Chez les femmes, cet accroissement est observé dans tous les groupes d'âge, sauf chez les aînées (75+ : *statut quo*) tandis que chez les hommes, cet accroissement est plus variable au travers des classes d'âge (Figure 4.5.1.4).


Figure 4.5.1.4 : Différence (en % absolu) entre 1997 et 2001 du pourcentage de la population ayant eu un contact avec un homéopathe dans l'année précédente, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.1.4. Acupuncture (AG0202)

2% de la population rapporte avoir eu un contact avec un acupuncteur. Les femmes sont quasiment deux fois plus nombreuses que les hommes à avoir recours à ce type de thérapie, mais la différence ne s'avère pas significative après standardisation pour le sexe. Le recours à l'acupuncture est plus courant chez les femmes entre 45 et 74 ans (Figure 4.5.1.5).

Figure 4.5.1.5 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un acupuncteur au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.



La consultation chez un acupuncteur est plus fréquente dans les groupes de niveau d'éducation plus élevé, mais la relation entre les deux n'est pas significative après ajustement pour l'âge et le sexe.

On n'observe pas de lien entre le fait de consulter un acupuncteur et le degré d'urbanisation ou la région de résidence.


L'utilisation de l'acupuncture n'a pas significativement augmenté entre 1997 et 2001.

V.1.5. Ostéopathie (AG0203)

4% des habitants de Belgique ont eu recours aux services d'un ostéopathe dans l'année précédent l'interview. La différence entre les femmes (5%) et les hommes (4%) quant à la consultation d'un ostéopathe n'est pas significative.

On constate une différence importante (courbe « normale ») dans l'utilisation de l'ostéopathie en fonction de l'âge. Le recours à l'ostéopathie augmente jusqu'à l'âge de 35-44 ans (9%) pour redescendre ensuite (Figure 4.5.1.6).

Figure 4.5.1.6 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un acupuncteur au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.




Le recours à l'ostéopathie augmente de manière significative en fonction du niveau d'éducation, la proportion de patients passant de 1% parmi les personnes du groupe d'éducation le plus faible, à 6% parmi les personnes du groupe des diplômés de l'enseignement supérieur.

Il existe des différences significatives entre les régions au regard de la consultation d'un ostéopathe. L'ostéopathie est moins populaire en Région flamande (3%) que dans les deux autres régions du pays (Bruxelles : 5% et Région wallonne 6%). En revanche, le recours à l'ostéopathie ne diffère pas selon le degré d'urbanisation.

V.1.6. Chiropraxie (AG0204)

2% de la population en Belgique rapporte avoir été se faire "croquer" par un chiropracteur au moins une fois au cours de l'année écoulée. La chiropraxie est la seule thérapie non conventionnelle qui connaît une popularité plus grande auprès des hommes (2%) qu'auprès des femmes (1%) (Tableau 4.5.1.6).

Figure 4.5.1.7 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un chiropracteur au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.



L'utilisation de la chiropraxie diffère de manière notable entre les trois régions du pays. Cette thérapie est la seule à être plus souvent utilisée en Région flamande par rapport aux deux autres régions.

Le degré d'urbanisation et le niveau d'éducation n'ont pas d'influence sur la consultation en chiropraxie.

V.1.7. Comparaison du recours à l'ostéopathie chiropraxie entre 1997-2001 (AG02034)

Afin de se faire une idée de l'évolution des consultations en ostéopathie et chiropraxie, ces deux types de thérapies sont combinés, en 2001, en une seule catégorie, laquelle correspond alors à la catégorie de 1997.

Ainsi, on constate que le recours à l'ostéopathie/chiropraxie est plus fréquent en 2001 (5% de la population) qu'en 1997 (3% de la population).

V.1.8. Autres types de thérapies non conventionnelles (AG0205)

1% de la population a consulté un praticien d'une thérapie non conventionnelle d'un autre ordre, comme la réflexologie du pied, la kinésiologie, le magnétisme, la naturothérapie... (Tableau 4.5.1.7).

V.1.9. Identité du thérapeute non conventionnel (AG03)

A proprement parler, les médecins sont les seuls à pouvoir dispenser des traitements alternatifs. Malgré cela, les différents types de thérapies non conventionnelles sont régulièrement dispensés par des personnes qui n'ont pas de formation médicale.

Les thérapeutes alternatifs ayant un diplôme de médecin sont moins nombreux dans les disciplines comme l'ostéopathie et celles reprises sous l'appellation « autres thérapies non conventionnelles » (35%), ainsi que la chiropraxie (52%). En revanche, les thérapeutes alternatifs consultés qui pratiquent l'acupuncture et l'homéopathie disposent le plus souvent d'un diplôme en médecine (respectivement 78% et 73%).

Tableau 4.5.1.2 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un thérapeute non conventionnel au cours de l'année écoulée, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag01 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	9,8	9,1 (8,0-10,3)	5887
Femme	12,9	12,4 (11,2-13,7)	6143
GROUPES D'AGE			
0-14	7,7	7,7 (6,1-9,7)	1939
15-24	9,5	9,5 (7,1-12,7)	1286
25-34	11,4	11,3 (9,1-14,0)	1729
35-44	18,7	18,7 (16,1-21,6)	1927
45-54	12,8	12,7 (10,7-15,0)	1673
55-64	11,2	11,1 (9,0-13,7)	1352
65-74	11,1	10,8 (8,3-14,1)	1226
75+	5,0	4,7 (3,4-6,6)	898
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	6,9	6,6 (2,8-14,9)	272
Enseignement primaire	6,4	6,1 (4,3-8,6)	1556
Secondaire inférieur	7,9	7,3 (5,7-9,2)	2189
Secondaire supérieur	10,7	9,9 (8,4-11,7)	3515
Enseignement supérieur	15,7	15,2 (13,4-17,3)	4118
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	12,9	12,2 (10,7-13,9)	2979
Zone urbaine	11,1	10,2 (8,1-12,8)	1918
Zone semi-urbaine	10,6	10,1 (8,7-11,7)	3881
Zone rurale	12,0	11,1 (9,4-13,1)	3252
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	10,8	10,2 (8,9-11,5)	4077
Région Bruxelloise	12,9	12,2 (10,7-13,9)	2979
Région Wallonne	12,0	11,2 (9,6-13,1)	4974
ANNEE			
1997	8,2	7,5 (6,6-8,5)	10118
2001	11,4	10,8 (9,9-11,8)	12030

Tableau 4.5.1.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un homéopathe au cours de l'année écoulée, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0201 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	4,9	4,7 (3,9- 5,5)	5882
Femme	7,2	7,1 (6,2- 8,2)	6144
GROUPES D'AGE			
0-14	6,6	6,5 (5,1- 8,4)	1939
15-24	5,6	5,5 (3,6- 8,3)	1286
25-34	5,0	5,0 (3,8- 6,5)	1729
35-44	7,9	7,8 (6,1- 9,9)	1925
45-54	6,2	6,1 (4,8- 7,9)	1672
55-64	5,8	5,7 (4,1- 7,7)	1351
65-74	6,7	6,5 (4,5- 9,2)	1227
75+	3,1	2,8 (1,8- 4,3)	897
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	4,0	3,8 (1,2-11,6)	272
Enseignement primaire	3,2	3,1 (1,9- 5,0)	1557
Secondaire inférieur	4,3	4,0 (2,8- 5,7)	2188
Secondaire supérieur	6,4	6,1 (4,9- 7,6)	3513
Enseignement supérieur	7,8	7,7 (6,3- 9,4)	4118
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	7,1	6,8 (5,6- 8,2)	2977
Zone urbaine	5,5	5,2 (3,7- 7,3)	1918
Zone semi-urbaine	5,9	5,7 (4,6- 7,1)	3880
Zone rurale	6,3	5,9 (4,7- 7,4)	3251
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	5,9	5,6 (4,7- 6,7)	4077
Région Bruxelloise	7,1	6,8 (5,6- 8,2)	2977
Région Wallonne	6,2	5,9 (4,6- 7,4)	4972
ANNEE			
1997	3,9	3,6 (3,0- 4,4)	10118
2001	6,1	5,8 (5,1- 6,6)	12026

Tableau 4.5.1.4 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un acupuncteur au cours de l'année écoulée, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0202 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	1,0	0,9 (0,6- 1,3)	5877
Femme	1,9	1,7 (1,3- 2,3)	6138
GROUPES D'AGE			
0-14	0,6	0,5 (0,2- 1,4)	1936
15-24	1,0	0,9 (0,5- 1,9)	1285
25-34	1,0	1,0 (0,6- 1,6)	1728
35-44	2,1	2,0 (1,2- 3,5)	1922
45-54	1,7	1,6 (1,1- 2,5)	1673
55-64	2,2	2,1 (1,2- 3,8)	1348
65-74	2,4	2,3 (1,4- 3,7)	1226
75+	1,1	1,0 (0,4- 2,1)	897
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,5	0,4 (0,1- 2,0)	272
Enseignement primaire	1,1	0,7 (0,4- 1,4)	1557
Secondaire inférieur	1,3	1,0 (0,6- 1,7)	2188
Secondaire supérieur	1,9	1,6 (1,1- 2,4)	3511
Enseignement supérieur	1,4	1,3 (0,8- 2,0)	4109
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	1,8	1,6 (1,1- 2,2)	2975
Zone urbaine	1,3	1,1 (0,6- 1,8)	1916
Zone semi-urbaine	1,4	1,2 (0,8- 1,9)	3878
Zone rurale	1,5	1,3 (0,9- 2,0)	3246
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	1,4	1,2 (0,8- 1,7)	4073
Région Bruxelloise	1,8	1,6 (1,1- 2,2)	2975
Région Wallonne	1,6	1,3 (0,9- 1,9)	4967
ANNEE			
1997	1,2	1,0 (0,8- 1,4)	10116
2001	1,5	1,2 (0,9- 1,6)	12015

Tableau 4.5.1.5 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un ostéopathe au cours de l'année écoulée, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0203 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	3,8	3,1 (2,5- 3,9)	5875
Femme	4,6	3,9 (3,2- 4,7)	6134
GROUPES D'AGE			
0-14	1,1	1,1 (0,6- 2,0)	1936
15-24	3,7	3,6 (2,3- 5,8)	1286
25-34	4,9	4,9 (3,4- 7,1)	1729
35-44	8,6	8,6 (6,8-10,7)	1922
45-54	4,9	4,9 (3,8- 6,2)	1670
55-64	4,5	4,5 (3,2- 6,4)	1347
65-74	2,9	2,8 (1,6- 4,9)	1223
75+	1,6	1,6 (0,9- 2,7)	896
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	1,7	1,5 (0,5- 4,5)	272
Enseignement primaire	1,4	1,2 (0,6- 2,6)	1556
Secondaire inférieur	2,8	2,3 (1,6- 3,3)	2187
Secondaire supérieur	3,7	3,0 (2,3- 4,0)	3509
Enseignement supérieur	6,5	5,6 (4,5- 6,9)	4107
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	5,1	4,2 (3,5- 5,2)	2972
Zone urbaine	3,6	2,8 (1,9- 4,3)	1915
Zone semi-urbaine	4,0	3,3 (2,6- 4,3)	3877
Zone rurale	4,6	3,7 (2,9- 4,9)	3245
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	3,4	2,8 (2,2- 3,6)	4073
Région Bruxelloise	5,1	4,2 (3,5- 5,2)	2972
Région Wallonne	5,6	4,6 (3,7- 5,9)	4964

Tableau 4.5.1.6 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un chiropracteur au cours de l'année écoulée, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0204 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	1,8	1,3 (0,9- 1,8)	5877
Femme	1,3	1,0 (0,6- 1,4)	6132
GROUPES D'AGE			
0-14	0,1	0,1 (0,0- 0,6)	1937
15-24	0,9	0,9 (0,4- 1,9)	1285
25-34	1,7	1,6 (0,8- 3,2)	1728
35-44	3,3	3,3 (2,3- 4,7)	1922
45-54	2,3	2,2 (1,4- 3,6)	1671
55-64	1,8	1,7 (1,0- 2,9)	1348
65-74	0,9	0,9 (0,4- 2,0)	1223
75+	1,2	1,2 (0,6- 2,6)	895
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	1,1	0,8 (0,2- 2,7)	272
Enseignement primaire	1,2	0,9 (0,3- 2,4)	1555
Secondaire inférieur	1,6	1,1 (0,6- 2,0)	2188
Secondaire supérieur	1,5	1,0 (0,6- 1,6)	3509
Enseignement supérieur	1,7	1,2 (0,8- 1,9)	4108
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	0,8	0,6 (0,3- 0,9)	2969
Zone urbaine	1,6	1,1 (0,6- 2,1)	1918
Zone semi-urbaine	1,7	1,2 (0,8- 1,7)	3878
Zone rurale	1,7	1,1 (0,7- 1,9)	3244
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	2,1	1,5 (1,1- 2,1)	4075
Région Bruxelloise	0,8	0,6 (0,3- 0,9)	2969
Région Wallonne	0,6	0,4 (0,2- 0,7)	4965

Tableau 4.5.1.7 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un autre type de thérapeute non conventionnel au cours de l'année écoulée, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0205 – Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	0,5	0,5 (0,3- 0,8)	5711
Femme	1,3	1,2 (0,9- 1,6)	5951
GROUPES D'AGE			
0-14	0,4	0,4 (0,1- 1,0)	1897
15-24	0,5	0,4 (0,2- 0,9)	1247
25-34	1,1	1,0 (0,5- 1,8)	1688
35-44	1,7	1,5 (0,9- 2,5)	1868
45-54	1,4	1,3 (0,8- 2,3)	1622
55-64	0,8	0,7 (0,4- 1,4)	1303
65-74	0,4	0,3 (0,1- 0,9)	1175
75+	1,2	1,0 (0,5- 2,2)	862
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,0	0,0 (0,0- 0,0)	266
Enseignement primaire	0,4	0,2 (0,1- 0,5)	1490
Secondaire inférieur	0,5	0,4 (0,2- 0,7)	2127
Secondaire supérieur	0,7	0,6 (0,3- 0,9)	3440
Enseignement supérieur	1,5	1,2 (0,8- 1,8)	3981
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	1,6	1,2 (0,8- 1,9)	2823
Zone urbaine	1,4	1,1 (0,6- 1,9)	1879
Zone semi-urbaine	0,8	0,6 (0,4- 1,1)	3811
Zone rurale	0,7	0,5 (0,3- 0,9)	3149
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	0,8	0,7 (0,4- 1,0)	4046
Région Bruxelloise	1,6	1,2 (0,8- 1,9)	2823
Région Wallonne	1,0	0,7 (0,5- 1,2)	4793
ANNEE			
1997	0,8	0,8 (0,5- 1,2)	10114
2001	0,9	0,9 (0,7- 1,1)	11662

V.2. Région flamande

V.2.1. Contact avec un thérapeute non conventionnel (AG01)


Le Tableau 4.5.2.1 présente un aperçu de l'utilisation des différents types de thérapies non conventionnelles. La thérapie la plus souvent utilisée est l'homéopathie, puisque quasi 6% des habitants de la Région flamande déclarent avoir fait appel à un homéopathe au cours de l'année écoulée.

Tableau 4.5.2.1 : Nombre de personnes (en %) ayant rapporté un contact avec un thérapeute alternatif au cours de l'année précédente, par thérapie, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

Thérapies alternatives	%
Homéopathie	5,8
Acupuncture	1,4
Ostéopathie	3,4
Chiropraxie	2,1
Autre	0,8

Les femmes de la Région flamande sont plus nombreuses à se rendre chez un thérapeute alternatif que les hommes (12% versus 10% ; Tableau 4.5.2.2), mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge.

Figure 4.5.2.1 : Nombre de personnes (en %) ayant eu contact avec un thérapeute alternatif au cours de l'année précédente, par sexe et par âge, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.




La proportion de personnes qui consultent des thérapeutes non conventionnels augmente avec leur niveau d'éducation. Les personnes ayant consulté un thérapeute alternatif sont proportionnellement moins nombreuses dans le groupe des diplômés du primaire (7%) et du secondaire inférieur (8%) que celles du groupe de diplômés du cycle supérieur (16%), et cette différence est significative après ajustement pour l'âge et le sexe (Tableau 4.5.2.2).

Le niveau d'urbanisation ne semble pas, en Flandre, influencer l'utilisation des thérapies alternatives.

Pour ce qui est de l'évolution, entre 1997 et 2001, de l'utilisation des thérapies alternatives, celle-ci marque une augmentation, passant de 8% (en 1997) à 11% (en 2001). Chez les hommes, l'augmentation du taux de consultation pour le groupe d'âge 35-44 ans saute aux yeux (Figure 4.5.2.2).


Figure 4.5.2.2 : Différence (en % absolu) entre 1997 et 2001 du pourcentage de la population ayant eu un contact avec un thérapeute alternatif dans l'année précédente, par sexe et par âge, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.2.2. Homéopathie (AG0201)

6% des habitants de la Région flamande ont consulté un homéopathe dans l'année écoulée. Les femmes sont plus nombreuses à les avoir consulté que les hommes (7% versus 5% ; différence non significative). L'âge ne joue pas un rôle important en ce qui concerne le recours à l'homéopathie (Tableau 4.5.2.3).


Figure 4.5.2.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un homéopathe au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Le niveau de scolarité et le niveau d'urbanisation n'ont pas, en Flandre, d'impact significatif sur le recours éventuel aux thérapies homéopathiques.

Il s'avère que l'utilisation de l'homéopathie a augmenté en Région flamande entre 1997 et 2001, passant de 4% à 6% de la population. Chez les femmes, cet accroissement est observé dans tous les groupes d'âge. Chez les hommes, cet accroissement est plus variable : pour certains classes d'âge il est même inexistant. (Figure 4.5.2.4).


Figure 4.5.2.4 : Différence (en % absolu) entre 1997 et 2001 du pourcentage de la population ayant eu un contact avec un homéopathe dans l'année précédente, par sexe et par âge, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.2.3. Acupuncture (AG0202)

1,4% des habitants de la Région flamande rapporte avoir eu un contact avec un acupuncteur dans l'année écoulée. Les femmes (2%) sont quasiment deux fois plus nombreuses que les hommes (1%) à avoir recours à ce type de thérapie, mais la différence ne s'avère pas significative après standardisation pour le sexe (Tableau 4.5.2.4).

Figure 4.5.2.5 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un acupuncteur au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



La consultation chez un acupuncteur ne diffère pas en fonction du niveau d'éducation ou du degré d'urbanisation en Région flamande.


On n'observe pas de différence entre 1997 et 2001 en ce qui concerne le recours à l'acupuncture.

V.2.4. Ostéopathie (AG0203)

3% des habitants de la Flandre ont eu recours aux services d'un ostéopathe dans l'année précédent l'interview. La différence entre les femmes (4%) et les hommes (3%) quant à la consultation d'un ostéopathe n'est pas significative (Tableau 4.5.2.5).

Il n'y a pas de relation claire entre l'âge des individus et le recours à l'ostéopathie (Figure 4.5.2.6).

Figure 4.5.2.6 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un ostéopathe au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.




Le recours à l'ostéopathie augmente de manière significative en fonction du niveau d'éducation, la proportion de patients passant de 2% parmi les personnes du groupe d'éducation le plus faible, à 8% parmi les personnes du groupe des diplômés de l'enseignement supérieur.

Le recours à l'ostéopathie ne diffère pas selon le degré d'urbanisation dans la Région flamande.

V.2.5. Chiropraxie (AG0204)

2% des habitants de la Région flamande rapporte avoir consulté un chiropracteur au cours de l'année écoulée. Les hommes (2%) sont proportionnellement plus nombreux que les femmes (1%) à avoir fait appel à la chiropraxie, mais cette différence n'est pas significative après ajustement pour l'âge (Tableau 4.5.2.6). Le taux de consultation est le plus élevé chez les hommes entre 35 et 54 ans (Figure 4.5.2.7).

Figure 4.5.2.7 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un chiropracteur au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.




Le degré d'urbanisation et le niveau d'éducation n'ont pas une influence respective sur la consultation en chiropraxie.

V.2.6. Autres types de thérapies non conventionnelles (AG0205)

1% de la population flamande a consulté un praticien d'une thérapie non conventionnelle d'un autre ordre (réflexologie, kinésiothérapie, magnétisme, naturothérapie), et cette utilisation est plus fréquente pour les femmes entre 25 et 54 ans (Figure 4.5.2.8).

Figure 4.5.2.8 : Pourcentage de personnes ayant consulté un autre type de thérapeute alternatif dans l'année écoulée, par sexe et par âge, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



On observe une proportion plus importante de personnes ayant recours à d'autres types de thérapies alternatives dans les zones urbaines (2%) que dans les zones moins urbanisées (moins d'1% dans chacune d'elles). Ce type de consultations alternatives est minimal dans les groupes à faible niveau d'éducation, alors qu'il est rapporté par 1% des personnes des groupes ayant un niveau d'éducation plus élevé.

Toutefois, en ce qui concerne le niveau d'urbanisation ou le niveau scolaire, les nombres de personnes observées dans les différentes catégories sont trop petits pour obtenir des différences qui soient statistiquement significatives.

Il n'y a pas de différence entre 1997 et 2001 quant à l'utilisation des thérapies alternatives autres que celles détaillées dans ce chapitre.

V.2.7. Identité du thérapeute non conventionnel (AG03)

Les thérapeutes alternatifs consultés en Région flamande qui pratiquent l'acupuncture et l'homéopathie disposent d'un diplôme en médecine dans respectivement 69% et 71% des cas. Ces pourcentages diminuent lorsqu'il s'agit de chiropracteurs (61%) ou – surtout – d'ostéopathes (36%).

Tableau 4.5.2.2 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un thérapeute non conventionnel au cours de l'année écoulée, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag01 - Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	9,6	8,9 (7,4-10,6)	2047
Femme	12,0	11,5 (9,9-13,3)	2030
GROUPES D'AGE			
0-14	8,3	8,3 (6,0-11,4)	596
15-24	8,7	8,7 (6,1-12,2)	455
25-34	10,7	10,6 (7,9-14,2)	574
35-44	17,9	17,9 (14,5-21,9)	653
45-54	12,1	12,1 (9,3-15,5)	592
55-64	10,2	10,2 (7,5-13,6)	519
65-74	10,8	10,6 (7,2-15,4)	422
75+	4,0	3,8 (2,2- 6,6)	266
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	9,5	9,8 (3,7-23,4)	79
Enseignement primaire	6,8	6,9 (4,2-11,4)	490
Secondaire inférieur	7,5	7,0 (4,9- 9,8)	753
Secondaire supérieur	10,5	9,5 (7,7-11,8)	1339
Enseignement supérieur	14,7	14,1 (11,6-17,0)	1360
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	11,5	10,6 (8,2-13,6)	940
Zone semi-urbaine	10,3	9,8 (8,2-11,7)	2041
Zone rurale	11,3	10,4 (8,0-13,4)	1096
ANNEE			
1997	8,0	7,2 (6,0- 8,6)	3498
2001	10,8	10,1 (8,9-11,5)	4077

Tableau 4.5.2.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un homéopathe au cours de l'année écoulée, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0201 - Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	5,0	4,7 (3,7- 6,0)	2047
Femme	6,7	6,6 (5,4- 8,0)	2030
GROUPES D'AGE			
0-14	7,5	7,4 (5,3-10,4)	597
15-24	4,4	4,4 (2,8- 6,8)	455
25-34	4,9	4,9 (3,3- 7,2)	574
35-44	7,3	7,3 (5,0-10,4)	652
45-54	5,9	5,8 (4,0- 8,4)	592
55-64	5,6	5,5 (3,7- 8,2)	519
65-74	6,5	6,3 (3,8-10,3)	422
75+	2,9	2,7 (1,4- 5,0)	266
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	5,7	6,1 (1,8-19,2)	79
Enseignement primaire	3,9	4,0 (2,1- 7,4)	490
Secondaire inférieur	4,6	4,5 (2,8- 7,1)	753
Secondaire supérieur	6,5	6,1 (4,5- 8,1)	1339
Enseignement supérieur	6,8	6,5 (4,8- 8,8)	1360
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	5,5	5,3 (3,6- 7,7)	940
Zone semi-urbaine	5,7	5,5 (4,3- 7,0)	2041
Zone rurale	6,5	6,0 (4,3- 8,5)	1096
ANNEE			
1997	3,6	3,4 (2,5- 4,5)	3499
2001	5,9	5,6 (4,6- 6,7)	4077

Tableau 4.5.2.4 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un acupuncteur au cours de l'année écoulée, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0202 - Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	0,9	0,9 (0,5- 1,5)	2044
Femme	1,8	1,6 (1,1- 2,4)	2029
GROUPES D'AGE			
0-14	0,7	0,7 (0,2- 2,2)	595
15-24	1,0	1,0 (0,4- 2,7)	455
25-34	0,8	0,8 (0,3- 1,7)	574
35-44	2,2	2,1 (0,9- 4,6)	652
45-54	1,3	1,2 (0,6- 2,4)	592
55-64	1,6	1,6 (0,7- 3,5)	517
65-74	2,2	2,1 (1,0- 4,4)	422
75+	1,4	1,3 (0,5- 3,2)	266
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,6	0,4 (0,1- 3,4)	79
Enseignement primaire	0,9	0,6 (0,2- 1,5)	490
Secondaire inférieur	1,3	1,1 (0,5- 2,1)	753
Secondaire supérieur	1,7	1,5 (0,9- 2,5)	1338
Enseignement supérieur	1,3	1,4 (0,7- 2,5)	1357
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	1,2	1,1 (0,6- 2,0)	939
Zone semi-urbaine	1,2	1,1 (0,6- 1,9)	2039
Zone rurale	1,7	1,5 (0,8- 2,7)	1095
ANNEE			
1997	1,1	1,0 (0,6- 1,5)	3497
2001	1,4	1,2 (0,8- 1,7)	4073

Tableau 4.5.2.5 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un ostéopathe au cours de l'année écoulée, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0203 - Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	3,2	2,7 (1,9- 3,7)	2044
Femme	3,7	3,2 (2,3- 4,2)	2029
GROUPES D'AGE			
0-14	1,0	1,0 (0,4- 2,7)	596
15-24	4,0	4,0 (2,2- 7,2)	455
25-34	3,3	3,3 (1,8- 6,1)	574
35-44	7,0	7,0 (5,1- 9,6)	652
45-54	4,1	4,1 (2,7- 6,0)	591
55-64	2,8	2,8 (1,6- 4,9)	517
65-74	2,6	2,6 (1,0- 6,4)	422
75+	1,6	1,5 (0,7- 3,4)	266
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	2,0	1,6 (0,4- 6,5)	79
Enseignement primaire	1,4	1,2 (0,4- 4,0)	490
Secondaire inférieur	2,3	1,9 (1,1- 3,4)	753
Secondaire supérieur	2,9	2,4 (1,7- 3,5)	1338
Enseignement supérieur	5,5	4,9 (3,5- 6,9)	1357
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	3,6	2,9 (1,8- 4,8)	939
Zone semi-urbaine	3,6	3,1 (2,3- 4,2)	2038
Zone rurale	3,0	2,5 (1,6- 4,1)	1096

Tableau 4.5.2.6 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un chiropracteur au cours de l'année écoulée, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0204 - Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	2,4	1,6 (1,1- 2,5)	2045
Femme	1,8	1,2 (0,8- 2,0)	2030
GROUPES D'AGE			
0-14	0,2	0,2 (0,0- 1,1)	596
15-24	1,3	1,2 (0,5- 2,8)	456
25-34	2,4	2,4 (1,2- 4,8)	574
35-44	4,7	4,6 (3,1- 6,8)	652
45-54	3,2	3,1 (1,8- 5,3)	592
55-64	2,1	2,1 (1,1- 4,0)	517
65-74	1,1	1,1 (0,4- 3,2)	422
75+	1,5	1,5 (0,6- 3,7)	266
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	1,7	1,2 (0,3- 4,2)	79
Enseignement primaire	1,7	1,3 (0,4- 4,2)	490
Secondaire inférieur	2,2	1,5 (0,7- 2,9)	753
Secondaire supérieur	1,8	1,2 (0,7- 2,1)	1338
Enseignement supérieur	2,5	1,7 (1,0- 2,8)	1359
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	1,8	1,2 (0,6- 2,4)	941
Zone semi-urbaine	2,2	1,5 (1,0- 2,3)	2039
Zone rurale	2,3	1,5 (0,8- 2,8)	1095

Tableau 4.5.2.7 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un autre type de thérapeute non conventionnel au cours de l'année écoulée, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0205 - Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	0,4		2032
Femme	1,3		2014
GROUPES D'AGE			
0-14	0,3	0,3 (0,0- 2,2)	592
15-24	0,0		453
25-34	1,2	1,0 (0,5- 2,2)	568
35-44	1,5	1,3 (0,6- 2,9)	646
45-54	1,4	1,3 (0,6- 2,9)	591
55-64	0,6	0,6 (0,2- 1,6)	512
65-74	0,3	0,3 (0,1- 1,1)	421
75+	1,2	0,9 (0,3- 2,7)	263
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,0		78
Enseignement primaire	0,1		484
Secondaire inférieur	0,4		752
Secondaire supérieur	0,7		1331
Enseignement supérieur	1,4		1346
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	1,7		924
Zone semi-urbaine	0,8		2029
Zone rurale	0,4		1093
ANNEE			
1997	0,8	0,7 (0,3- 1,3)	3494
2001	0,8	0,7 (0,5- 1,1)	4046

V.3. Région bruxelloise

V.3.1. Contact avec un thérapeute non conventionnel (AG01)


Le Tableau 4.5.3.1 présente un aperçu de l'utilisation des différents types de thérapies non conventionnelles. La thérapie la plus souvent utilisée à Bruxelles est l'homéopathie, puisque 7% des habitants y ont fait appel au cours de l'année écoulée, suivi de l'ostéopathie, qui concerne 5% des habitants.

Tableau 4.5.3.1 : Nombre de personnes (en %) ayant rapporté un contact avec un thérapeute alternatif au cours de l'année précédente, par thérapie, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

Thérapies alternatives	%
Homéopathie	7,0
Acupuncture	1,8
Ostéopathie	5,1
Chiropraxie	0,8
Autre	1,6

Les femmes de la Région bruxelloise sont plus nombreuses à se rendre chez un thérapeute alternatif que les hommes (16% versus 10% ; Tableau 4.5.3.2). Chez les deux sexes, bien que ce soit plus clair chez les femmes, les contacts avec un thérapeute alternatif sont proportionnellement plus fréquents entre 35 et 54 as (Figure 4.5.3.1).


Figure 4.5.3.1 : Nombre de personnes (en %) ayant eu contact avec un thérapeute alternatif au cours de l'année précédente, par sexe et par âge, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.



La proportion de personnes qui consultent des thérapeutes non conventionnels augmente progressivement avec leur niveau d'éducation : 2% dans le groupe des sans diplômes, 7% dans le groupe des diplômés du primaire, 8% dans celui des diplômés du secondaire inférieur, 10% dans celui des diplômés du secondaire supérieur et 20% dans celui des diplômés du cycle supérieur. Seule la différence entre le groupe des diplômés de l'enseignement supérieur diffère significativement des autres niveaux d'éducation, après ajustement pour l'âge et le sexe (Tableau 4.5.3.2).

Pour ce qui est de l'évolution, entre 1997 et 2001, de l'utilisation des thérapies alternatives, celle-ci marque une augmentation, passant de 9% (en 1997) à 13% (en 2001). Cette augmentation est plutôt à mettre sur le compte des femmes (Figure 4.5.3.2).


Figure 4.5.3.2 : Différence (en % absolu) entre 1997 et 2001 du pourcentage de la population ayant eu un contact avec un thérapeute alternatif dans l'année précédente, par sexe et par âge, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.3.2. Homéopathie (AG0201)

7% des habitants de la Région bruxelloise ont consulté un homéopathe dans l'année écoulée. Les femmes sont deux fois plus nombreuses à les avoir consulté que les hommes (9% versus 5%) et cette différence est significative (Tableau 4.5.3.3). Chez les femmes, on constate que ce sont surtout celles des âges intermédiaires qui consultent les les homéopathes (Figure 4.5.3.3) .


Figure 4.5.3.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un homéopathe au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Le recours aux thérapies homéopathiques varie, en Région bruxelloise, selon le niveau d'éducation : seules 2% des personnes du groupe des diplômés du primaire ont fait appel à l'homéopathie, contre 12% du groupe des diplômés du supérieur. La différence est significative entre les diplômés du supérieur, d'une part, et les autres niveaux d'éducation, d'autre part, et ce, après ajustement pour l'âge et le sexe.

Entre 1997 et 2001, l'utilisation de l'homéopathie a augmenté en Région bruxelloise, passant de 4% à 7% de la population. Chez les femmes, cet accroissement est observé dans tous les groupes d'âge, tandis que chez les hommes, cet accroissement touche davantage les plus âgés (Figure 4.5.3.4).


Figure 4.5.3.4 : Différence (en % absolu) entre 1997 et 2001 du pourcentage de la population ayant eu un contact avec un homéopathe dans l'année précédente, par sexe et par âge, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.3.3. Acupuncture (AG0202)

2% des Bruxellois rapporte avoir eu un contact avec un acupuncteur dans l'année écoulée. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir recours à ce type de thérapie (3% versus 1%), mais la différence ne s'avère pas significative après standardisation pour le sexe (Tableau 4.5.3.4).

Figure 4.5.3.5 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un acupuncteur au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.




La consultation chez un acupuncteur ne diffère pas en fonction du niveau d'éducation à Bruxelles.

On n'observe pas de différence entre 1997 et 2001 en ce qui concerne le recours à l'acupuncture, le taux étant proche de 1% pour ces deux années.

V.3.4. Ostéopathie (AG0203)

5% des Bruxellois ont eu recours aux services d'un ostéopathe dans l'année précédant l'interview. La différence entre les femmes (6%) et les hommes (4%) quant à la consultation d'un ostéopathe n'est pas significative après ajustement pour l'âge (Tableau 4.5.3.5). Tant chez les femmes que chez les hommes, le pourcentage de personnes ayant recours à l'ostéopathie est plus élevé aux âges intermédiaires (Figure 4.5.3.6).

Figure 4.5.3.6 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un acupuncteur au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.




Le recours à l'ostéopathie augmente en fonction du niveau d'éducation, la proportion de patients passant de 1% parmi les personnes du groupe des diplômés du primaire, à 9% parmi les personnes du groupe des diplômés de l'enseignement supérieur. L'utilisation de l'ostéopathie diffère de manière significative entre le groupe de diplômés de l'enseignement supérieur et les quatre autres niveaux de scolarité.

V.3.5. Chiropraxie (AG0204)

Moins d'1% des Bruxellois rapporte avoir consulté un chiropracteur au cours de l'année écoulée : cette proportion est de 0,6% chez les hommes et 1% chez les femmes. Cette différence n'est pas significative après ajustement pour l'âge (Tableau 4.5.3.6).

Figure 4.5.3.7 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un chiropracteur au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.




Le niveau d'éducation n'a pas d'influence sur la consultation en chiropraxie, et les taux ne changent pas de 1997 à 2001.

V.3.6. Autres types de thérapies non conventionnelles (AG0205)

Un peu plus de 1% des Bruxellois a consulté un praticien d'une thérapie non conventionnelle d'un autre ordre (réflexologie, kinésiologie, magnétisme, naturothérapie), et cette utilisation est plus fréquente chez les femmes (2%) que chez les hommes (1%). Cette différence n'est toutefois pas significative (Tableau 4.5.3.7).

Figure 4.5.3.8 : Pourcentage de personnes ayant consulté un autre type de thérapeute alternatif dans l'année écoulée, par sexe et par âge, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.



On n'observe pas de lien entre la consultation auprès d'autres types de thérapeutes alternatifs et le niveau d'éducation.

En 2001, les Bruxellois ont une relativement plus fréquemment recours à des thérapies non conventionnelles d'un autre ordre qu'en 1997 (2% versus 0,5%).

V.3.7. Identité du thérapeute non conventionnel (AG03)

A Bruxelles, les thérapeutes alternatifs consultés qui pratiquent l'acupuncture et l'homéopathie disposent d'un diplôme en médecine dans respectivement 86% et 77% des cas. Ces pourcentages diminuent lorsqu'il s'agit de d'ostéopathes (35%) ou de chiropracteurs (32%).

Tableau 4.5.3.2 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un thérapeute non conventionnel au cours de l'année écoulée, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag01 - Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	9,7	9,2 (7,6-11,0)	1409
Femme	16,0	15,3 (13,2-17,6)	1570
GROUPES D'AGE			
0-14	6,5	6,4 (4,4- 9,3)	505
15-24	8,7	8,6 (5,6-12,9)	266
25-34	12,0	11,8 (8,9-15,5)	481
35-44	18,3	18,0 (14,6-22,1)	517
45-54	18,1	17,8 (13,8-22,7)	367
55-64	14,4	14,0 (10,2-19,0)	299
65-74	12,9	12,3 (8,7-17,0)	275
75+	13,4	12,1 (8,4-17,2)	269
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	2,1	2,0 (0,5- 7,6)	134
Enseignement primaire	6,8	6,0 (3,8- 9,4)	403
Secondaire inférieur	7,9	6,9 (4,7-10,0)	404
Secondaire supérieur	10,4	9,3 (6,9-12,5)	689
Enseignement supérieur	19,7	18,7 (15,8-21,9)	1219
ANNEE			
1997	8,6	7,9 (6,5- 9,6)	3016
2001	12,9	12,2 (10,7-13,8)	2979

Tableau 4.5.3.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un homéopathe au cours de l'année écoulée, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0201 - Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	4,6	4,5 (3,4- 6,0)	1406
Femme	9,4	9,3 (7,7-11,2)	1571
GROUPES D'AGE			
0-14	5,6	5,4 (3,5- 8,2)	505
15-24	6,5	6,3 (3,8-10,3)	266
25-34	6,1	5,8 (3,7- 9,0)	481
35-44	8,1	7,7 (5,4-10,8)	517
45-54	9,2	8,8 (6,1-12,7)	366
55-64	7,9	7,4 (4,7-11,5)	299
65-74	6,3	5,8 (3,5- 9,4)	275
75+	6,6	5,6 (3,3- 9,5)	268
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	1,2	1,1 (0,2- 7,6)	134
Enseignement primaire	1,8	1,6 (0,5- 4,5)	404
Secondaire inférieur	3,4	3,0 (1,7- 5,0)	404
Secondaire supérieur	5,5	5,1 (3,2- 7,9)	687
Enseignement supérieur	11,8	11,2 (8,8-14,2)	1218
ANNEE			
1997	4,1	3,9 (3,0- 5,0)	3015
2001	7,1	6,6 (5,5- 8,0)	2977

Tableau 4.5.3.4 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un acupuncteur au cours de l'année écoulée, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0202 - Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	1,1	0,8 (0,4- 1,7)	1407
Femme	2,5	1,8 (1,1- 2,8)	1568
GROUPES D'AGE			
0-14	0,1	0,1 (0,0- 0,9)	506
15-24	1,2	1,2 (0,4- 3,4)	265
25-34	1,3	1,2 (0,6- 2,6)	480
35-44	2,6	2,4 (1,4- 4,4)	517
45-54	3,1	2,9 (1,5- 5,6)	367
55-64	2,4	2,2 (1,1- 4,5)	298
65-74	2,9	2,6 (1,2- 5,6)	274
75+	1,7	1,4 (0,4- 4,2)	268
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,0	0,0 (0,0- 0,0)	134
Enseignement primaire	2,0	1,3 (0,6- 3,1)	404
Secondaire inférieur	0,8	0,5 (0,2- 1,9)	404
Secondaire supérieur	2,0	1,3 (0,7- 2,5)	688
Enseignement supérieur	2,2	1,6 (0,8- 2,9)	1215
ANNEE			
1997	1,5	0,9 (0,6- 1,5)	3016
2001	1,8	1,2 (0,7- 1,9)	2975

Tableau 4.5.3.5 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un ostéopathe au cours de l'année écoulée, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0203 - Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	4,3	3,4 (2,5- 4,7)	1406
Femme	5,8	4,8 (3,7- 6,1)	1566
GROUPES D'AGE			
0-14	1,3	1,3 (0,6- 2,8)	506
15-24	1,4	1,4 (0,6- 3,4)	266
25-34	5,3	5,3 (3,5- 7,8)	481
35-44	8,0	7,9 (5,7-10,9)	517
45-54	8,0	8,0 (5,4-11,7)	365
55-64	7,2	7,1 (4,7-10,5)	297
65-74	6,0	5,8 (3,5- 9,6)	273
75+	3,8	3,6 (1,9- 6,8)	267
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,9	0,8 (0,1- 5,2)	134
Enseignement primaire	1,2	0,9 (0,3- 2,4)	403
Secondaire inférieur	3,2	2,4 (1,4- 4,3)	404
Secondaire supérieur	3,4	2,6 (1,7- 3,9)	686
Enseignement supérieur	8,5	7,0 (5,3- 9,2)	1215

Tableau 4.5.3.6 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un chiropracteur au cours de l'année écoulée, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0204 - Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	0,6	0,1 (0,0- 0,1)	1405
Femme	1,0	0,1 (0,1- 0,2)	1564
GROUPES D'AGE			
0-14	0,0	0,0 (0,0- 0,0)	506
15-24	0,6	0,6 (0,1- 2,4)	265
25-34	1,0	1,0 (0,4- 2,2)	480
35-44	0,7	0,7 (0,3- 1,8)	516
45-54	1,1	1,1 (0,4- 3,4)	365
55-64	1,4	1,4 (0,6- 3,3)	298
65-74	0,6	0,6 (0,1- 2,5)	272
75+	1,6	1,5 (0,5- 4,2)	267
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,0	0,0 (0,0- 0,0)	134
Enseignement primaire	0,7	0,1 (0,0- 0,2)	403
Secondaire inférieur	0,8	0,1 (0,0- 0,2)	404
Secondaire supérieur	0,9	0,1 (0,0- 0,2)	685
Enseignement supérieur	0,8	0,1 (0,0- 0,2)	1213

Tableau 4.5.3.7 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un autre type de thérapeute non conventionnel au cours de l'année écoulée, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0205 – Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	1,4	1,2 (0,7- 2,0)	1336
Femme	1,7	1,4 (0,9- 2,3)	1487
GROUPES D'AGE			
0-14	1,2	1,2 (0,5- 3,1)	490
15-24	1,6	1,6 (0,6- 4,3)	253
25-34	1,2	1,2 (0,5- 2,8)	457
35-44	2,7	2,6 (1,4- 5,0)	497
45-54	0,9	0,9 (0,3- 2,5)	347
55-64	2,6	2,6 (1,2- 5,6)	275
65-74	0,2	0,2 (0,0- 1,4)	250
75+	2,4	2,3 (0,8- 6,1)	254
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,0	0,0 (0,0- 0,0)	130
Enseignement primaire	1,6	1,3 (0,5- 3,1)	381
Secondaire inférieur	0,7	0,5 (0,1- 2,2)	384
Secondaire supérieur	1,1	0,9 (0,4- 2,1)	654
Enseignement supérieur	2,4	2,0 (1,2- 3,3)	1153
ANNEE			
1997	0,5	0,4 (0,3- 0,8)	3016
2001	1,6	1,4 (1,0- 2,1)	2823

V.4. Région wallonne

V.4.1. Contact avec un thérapeute non conventionnel (AG01)

Le Tableau 4.5.4.1 présente un aperçu de l'utilisation des différents types de thérapies non conventionnelles. La thérapie la plus souvent utilisée est l'homéopathie, puisque environ 6% des habitants de la Région wallonne déclarent avoir fait appel à un praticien de cette discipline au cours de l'année écoulée. L'ostéopathie vient juste après, par ordre d'importance, avec 5,6% de personnes qui y ont recours.


Tableau 4.5.4.1 : Nombre de personnes (en %) ayant rapporté un contact avec un thérapeute alternatif au cours de l'année précédente, par thérapie, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

Thérapies alternatives	%
Homéopathie	6,1
Acupuncture	1,6
Ostéopathie	5,6
Chiropraxie	0,6
Autre	1,0

Au total, 12% des habitants de la Région wallonne ont fait appel à une thérapie non conventionnelle dans l'année écoulée. On observe une différence significative dans l'utilisation de ces thérapies en fonction du sexe. Ainsi, les femmes sont plus nombreuses à se rendre chez un thérapeute alternatif que les hommes (14% versus 10% ; Tableau 4.5.4.2).

On note un pic dans le taux de consultation des thérapies alternatives chez les hommes de 35-44 ans, où la proportion est deux fois plus élevée que dans les autres tranches d'âge. Chez les femmes les plus âgées (75+), on observe une régression typique de celles qui consultent un thérapeute alternatif. Sans doute est-ce en partie dû au nombre plus important de femmes très âgées dans ce groupe, qui ont (encore) moins confiance en ce type de thérapies.

Figure 4.5.4.1 : Nombre de personnes (en %) ayant eu contact avec un thérapeute alternatif au cours de l'année précédente, par sexe et par âge, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.




La proportion de personnes qui consultent des thérapeutes non conventionnels augmente de manière significative avec le niveau d'éducation. Si l'on regarde la proportion entre le niveau de scolarité le plus bas (sans diplôme : 2%) et le plus haut (cycle supérieur : 16%), on constate une différence de 14%.

Le niveau d'urbanisation ne semble pas, en Wallonie, influencer l'utilisation des thérapies alternatives.

Pour ce qui est de l'évolution, entre 1997 et 2001, du recours aux thérapies alternatives, celle-ci marque une augmentation significative passant de 8% (en 1997) à 12% (en 2001). Chez es femmes, le recours aux thérapies alternatives augmente dans presque toutes les tranches d'âge, tandis que chez les hommes, l'augmentation du taux de consultation se marque surtout pour le groupe d'âge 35-44 ans (Figure 4.5.4.2).

Figure 4.5.4.2 : Différence (en % absolu) entre 1997 et 2001 du pourcentage de la population ayant eu un contact avec un thérapeute alternatif dans l'année précédente, par sexe et par âge, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.




V.4.2. Homéopathie (AG0201)

6% des habitants de la Région wallonne ont consulté un homéopathe dans l'année écoulée. Les femmes sont plus nombreuses à les avoir consulté que les hommes (8% versus 5% ; Tableau 4.5.2.3), mais cette différence n'est pas statistiquement significative.

En ce qui concerne l'âge, une différence significative n'est observée qu'entre la classe d'âge 35-44 ans, où l'utilisation est plus fréquente et la classe d'âge 75 ans et plus, où l'utilisation est moindre.

Figure 4.5.4.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un homéopathe au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.




Le niveau de scolarité induit un gradient dans la proportion de personnes qui consultent un homéopathe : celle-ci est de 0% chez les non diplômés, 2% chez les diplômés du primaire, 4% chez les diplômés du secondaire inférieur, 6% chez ceux du secondaire supérieur et enfin, 8% chez les diplômés du cycle supérieur. La différence de proportion est significative entre d'une part, le groupe des diplômés du cycle supérieur, et d'autre part les deux groupes des diplômés de l'école primaire et du secondaire inférieur.

Le niveau d'urbanisation n'a pas d'impact significatif sur le recours à l'homéopathie.

L'augmentation observée en Région wallonne entre 1997 et 2001, de 4% à 6% de la population, n'est pas statistiquement significative. Chez les femmes, cet accroissement est observé dans tous les groupes d'âge, sauf chez les aînées. Chez les hommes, cet accroissement est plus variable au travers des classes d'âge (Figure 4.5.4.4).


Figure 4.5.4.4 : Différence (en % absolu) entre 1997 et 2001 du pourcentage de la population ayant eu un contact avec un homéopathe dans l'année précédente, par sexe et par âge, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.4.3. Acupuncture (AG0202)

1,6% des habitants de la Région wallonne rapporte avoir eu un contact avec un acupuncteur dans l'année écoulée. Les femmes (2%) sont deux fois plus nombreuses que les hommes (1%) à avoir recours à ce type de thérapie, mais la différence n'est pas significative après standardisation pour le sexe (Tableau 4.5.2.4).

Figure 4.5.4.5 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un acupuncteur au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



La consultation chez un acupuncteur ne diffère pas de manière significative en fonction du niveau d'éducation ou du degré d'urbanisation en Région wallonne.


On n'observe pas de différence entre 1997 et 2001 en ce qui concerne le recours à l'acupuncture.

V.4.4. Ostéopathie (AG0203)

6% des habitants de la Wallonie ont eu recours aux services d'un ostéopathe dans l'année écoulée. La différence entre les femmes (6%) et les hommes (5%) quant à la consultation d'un ostéopathe n'est pas significative (Tableau 4.5.4.5).

En Wallonie, les hommes comme les femmes consultent plus fréquemment un ostéopathe dans la catégorie d'âge de 35-44 ans (Figure 4.5.4.6).

Figure 4.5.4.6 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un acupuncteur au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.




Le recours à l'ostéopathie augmente en fonction du niveau d'éducation, mais une différence significative n'est observée qu'entre le groupe des certifiés de l'école primaire (1,5% ont recours à l'ostéopathie) et le groupe des diplômés de l'enseignement supérieur (8% y ont recours).

Le recours à l'ostéopathie ne diffère pas selon le degré d'urbanisation dans la Région wallonne.

V.4.5. Chiropraxie (AG0204)

Moins d'1% des habitants de la Région wallonne rapporte avoir consulté un chiropracteur au cours de l'année écoulée. Les hommes (1%) sont proportionnellement plus nombreux que les femmes (0,3% ; Tableau 4.5.4.6).

Figure 4.5.4.7 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un chiropracteur au cours de l'année écoulée, par sexe et par âge, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.




Le degré d'urbanisation et le niveau d'éducation n'ont pas une influence respective sur la consultation en chiropraxie.

V.4.6. Autres types de thérapies non conventionnelles (AG0205)

1% de la population wallonne a consulté un praticien d'une thérapie non conventionnelle d'un autre ordre (réflexologie, kinésiologie, magnétisme, naturothérapie), et cette utilisation est plus fréquente chez les femmes (1%) que chez les hommes (0,5% ; Tableau 4.5.4.6).

Figure 4.5.4.8 : Pourcentage de personnes ayant consulté un autre type de thérapeute alternatif dans l'année écoulée, par sexe et par âge, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Le degré d'urbanisation et le niveau d'éducation n'ont pas une influence respective sur le fait de consulter des thérapeutes alternatifs autres que ceux déjà cités.

V.4.7. Identité du thérapeute non conventionnel (AG03)

Les thérapeutes alternatifs consultés en Région wallonne qui pratiquent l'acupuncture et l'homéopathie disposent d'un diplôme en médecine dans respectivement 74% et 78% des cas. Ces pourcentages diminuent lorsqu'il s'agit de chiropracteurs (44%) ou – surtout – d'ostéopathes (34%)

Tableau 4.5.4.2 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un thérapeute non conventionnel au cours de l'année écoulée, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag01 - Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	10,2	9,1 (7,5-11,2)	2431
Femme	13,8	13,0 (10,9-15,5)	2543
GROUPES D'AGE			
0-14	6,8	6,8 (4,8- 9,6)	838
15-24	11,7	11,6 (6,2-20,6)	565
25-34	12,9	12,9 (8,6-19,0)	674
35-44	20,6	20,6 (15,7-26,5)	757
45-54	12,4	12,2 (9,3-16,0)	714
55-64	12,3	12,2 (8,2-17,7)	534
65-74	11,1	10,8 (6,8-16,6)	529
75+	4,1	3,9 (2,0- 7,4)	363
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	2,3	1,9 (0,3-10,4)	59
Enseignement primaire	5,2	4,6 (2,8- 7,5)	663
Secondaire inférieur	8,8	7,7 (5,7-10,4)	1032
Secondaire supérieur	11,5	10,4 (7,7-13,9)	1487
Enseignement supérieur	16,3	15,4 (12,3-19,3)	1539
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	9,0	8,1 (5,2-12,4)	978
Zone semi-urbaine	11,7	10,7 (8,0-14,1)	1840
Zone rurale	12,9	11,7 (9,6-14,2)	2156
ANNEE			
1997	8,3	7,7 (6,3- 9,2)	3604
2001	12,0	11,4 (9,8-13,2)	4974

Tableau 4.5.4.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un homéopathe au cours de l'année écoulée, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0201 - Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	4,8	4,4 (3,3- 5,7)	2429
Femme	7,6	7,2 (5,6- 9,2)	2543
GROUPES D'AGE			
0-14	5,1	5,1 (3,4- 7,5)	837
15-24	7,7	7,5 (3,0-17,5)	565
25-34	4,9	4,9 (3,1- 7,4)	674
35-44	9,0	8,8 (6,1-12,7)	756
45-54	6,0	5,8 (3,8- 8,7)	714
55-64	5,5	5,4 (2,7-10,7)	533
65-74	7,3	6,9 (3,6-13,1)	530
75+	2,1	1,9 (0,7- 4,8)	363
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,0	0,0 (0,0- 0,0)	59
Enseignement primaire	2,3	2,0 (0,9- 4,2)	663
Secondaire inférieur	3,7	3,2 (2,0- 5,1)	1031
Secondaire supérieur	6,4	6,0 (4,0- 9,0)	1487
Enseignement supérieur	8,4	8,0 (5,7-11,2)	1540
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	5,3	4,7 (2,4- 9,2)	978
Zone semi-urbaine	6,5	6,0 (3,9- 9,2)	1839
Zone rurale	6,1	5,6 (4,3- 7,2)	2155
ANNEE			
1997	4,2	3,8 (3,0- 4,9)	3604
2001	6,2	5,8 (4,6- 7,3)	4972

Tableau 4.5.4.4 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un acupuncteur au cours de l'année écoulée, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0202 - Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	1,1		2426
Femme	2,0		2541
GROUPES D'AGE			
0-14	0,4	0,4 (0,1- 1,7)	835
15-24	0,7	0,7 (0,3- 1,7)	565
25-34	1,5	1,5 (0,7- 3,0)	674
35-44	1,8	1,7 (0,9- 3,4)	753
45-54	2,2	2,1 (1,0- 4,3)	714
55-64	3,6	3,4 (1,2- 9,2)	533
65-74	2,7	2,5 (1,3- 4,7)	530
75+	0,0		363
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,5		59
Enseignement primaire	1,2		663
Secondaire inférieur	1,2		1031
Secondaire supérieur	2,4		1485
Enseignement supérieur	1,1		1537
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	1,5		977
Zone semi-urbaine	1,9		1839
Zone rurale	1,3		2151
ANNEE			
1997	1,3	1,0 (0,6- 1,7)	3603
2001	1,6	1,2 (0,8- 1,8)	4967

Tableau 4.5.4.5 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un ostéopathe au cours de l'année écoulée, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0203 - Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	5,0	3,5 (2,5- 5,0)	2425
Femme	6,2	4,6 (3,4- 6,2)	2539
GROUPES D'AGE			
0-14	1,2	1,2 (0,5- 2,9)	834
15-24	3,7	3,7 (1,7- 7,8)	565
25-34	8,8	8,8 (5,2-14,6)	674
35-44	12,1	12,1 (8,2-17,5)	753
45-54	5,5	5,5 (3,6- 8,3)	714
55-64	7,4	7,4 (4,2-12,9)	533
65-74	2,4	2,3 (1,2- 4,4)	528
75+	0,9	0,8 (0,2- 3,0)	363
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	1,9	1,6 (0,2-12,6)	59
Enseignement primaire	1,5	1,2 (0,5- 2,9)	663
Secondaire inférieur	3,7	2,7 (1,6- 4,5)	1030
Secondaire supérieur	5,8	4,1 (2,5- 6,7)	1485
Enseignement supérieur	7,8	5,9 (4,2- 8,2)	1535
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	3,4	2,5 (1,5- 4,1)	976
Zone semi-urbaine	5,0	3,6 (2,4- 5,3)	1839
Zone rurale	6,5	4,7 (3,3- 6,7)	2149

Tableau 4.5.4.6 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un chiropracteur au cours de l'année écoulée, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0204 - Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	0,8	0,5 (0,3- 0,9)	2427
Femme	0,3	0,2 (0,1- 0,5)	2538
GROUPES D'AGE			
0-14	0,2	0,2 (0,0- 1,2)	835
15-24	0,3	0,2 (0,1- 1,1)	564
25-34	0,0	0,0 (0,0- 0,2)	674
35-44	1,4	1,2 (0,6- 2,4)	754
45-54	0,7	0,7 (0,2- 2,0)	714
55-64	1,1	1,0 (0,3- 3,3)	533
65-74	0,3	0,3 (0,1- 0,9)	529
75+	0,4	0,4 (0,1- 3,1)	362
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,0	0,0 (0,0- 0,0)	59
Enseignement primaire	0,3	0,1 (0,0- 0,7)	662
Secondaire inférieur	0,6	0,3 (0,1- 0,9)	1031
Secondaire supérieur	0,8	0,4 (0,2- 1,0)	1486
Enseignement supérieur	0,5	0,3 (0,1- 0,7)	1536
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	0,6	0,3 (0,1- 1,2)	977
Zone semi-urbaine	0,2	0,1 (0,0- 0,4)	1839
Zone rurale	0,9	0,4 (0,2- 0,9)	2149

Tableau 4.5.4.7 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un autre type de thérapeute non conventionnel au cours de l'année écoulée, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

ag0205 – Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	0,5	0,4 (0,2- 0,9)	2343
Femme	1,4	1,2 (0,7- 1,9)	2450
GROUPES D'AGE			
0-14	0,3	0,3 (0,1- 0,8)	815
15-24	1,1	0,9 (0,3- 2,8)	541
25-34	0,8	0,7 (0,2- 2,6)	663
35-44	1,7	1,5 (0,7- 3,2)	725
45-54	1,6	1,4 (0,8- 2,7)	684
55-64	0,6	0,5 (0,2- 1,5)	516
65-74	0,6	0,5 (0,1- 1,7)	504
75+	0,8	0,6 (0,1- 4,7)	345
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,0	0,0 (0,0- 0,0)	58
Enseignement primaire	0,4	0,3 (0,0- 1,9)	625
Secondaire inférieur	0,8	0,6 (0,2- 1,7)	991
Secondaire supérieur	0,8	0,6 (0,2- 1,3)	1455
Enseignement supérieur	1,3	1,0 (0,5- 1,8)	1482
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	0,2	0,1 (0,0- 0,6)	955
Zone semi-urbaine	0,9	0,7 (0,4- 1,4)	1782
Zone rurale	1,1	0,8 (0,4- 1,6)	2056
ANNEE			
1997	1,1	0,9 (0,5- 1,6)	3604
2001	1,0	0,8 (0,5- 1,3)	4793

VI. Bibliographie

- Legal Status of Traditional Medicine and Complementary Medecine : A Worldwide Review, 2001, WHO-rapport
- **Mutualités Chrétiennes, www.cm.be**
- **Vlaams Neutraal Ziekenfonds, www.vnz.be**

VII. Lecteurs externes

- Hugo Kesteloot, faculteit Geneeskunde, Katholieke Universiteit Leuven

BELGIQUE

NOMBRE DE PERSONNES (EN %) EN CONTACT AVEC MEDECINE ALTERNATIVE
DANS L ANNEE PASSEE

Enquête Nationale de Santé, Belgique, 2001

		thérapeute non-convention nelle	N
SEXE	Homme	9,8	5921
	Femme	12,9	6190
Total		11,4	12111
GROUPE D'AGE	0-14	7,7	1955
	15-24	9,5	1299
	25-34	11,4	1738
	35-44	18,7	1935
	45-54	12,8	1682
	55-64	11,2	1365
	65-74	11,1	1234
	75+	5,0	903
Total		11,4	12111
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	6,9	272
	Enseignement primaire	6,4	1568
	Secondaire inférieur	7,9	2201
	Secondaire supérieur	10,7	3529
	Enseignement supérieur	15,7	4151
Total		11,4	11721
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	12,9	3006
	Zone urbaine	11,1	1932
	Zone semi-urbaine	10,6	3905
	Zone rurale	12,0	3268
Total		11,4	12111
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	10,8	4100
	Région Bruxelloise	12,9	3006
	Région Wallonne	12,0	5005
Belgique		11,4	12111
ANNEE	1997,00	8,2	10221
	2001,00	11,4	12111
Total 1997 et 2001		9,9	22332

Indicateur ag01

BELGIQUE

NOMBRE DE PERSONNES (EN %) EN CONTACT AVEC MEDECINE ALTERNATIVE
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Contact avec homéopathie		Contact avec acupuncture		Contact avec ostéopathie		Contact avec chiropraxie	
		%	N	%	N	%	N	%	N
SEXE	Homme	4,9	5882	1,0	5877	3,8	5875	1,8	5877
	Femme	7,2	6144	1,9	6138	4,6	6134	1,3	6132
Total		6,1	12026	1,5	12015	4,2	12009	1,6	12009
GROUPE D'AGE	0-14	6,6	1939	,6	1936	1,1	1936	,1	1937
	15-24	5,6	1286	1,0	1285	3,7	1286	,9	1285
	25-34	5,0	1729	1,0	1728	4,9	1729	1,7	1728
	35-44	7,9	1925	2,1	1922	8,6	1922	3,3	1922
	45-54	6,2	1672	1,7	1673	4,9	1670	2,3	1671
	55-64	5,8	1351	2,2	1348	4,5	1347	1,8	1348
	65-74	6,7	1227	2,4	1226	2,9	1223	,9	1223
	75+	3,1	897	1,1	897	1,6	896	1,2	895
Total		6,1	12026	1,5	12015	4,2	12009	1,6	12009
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	4,0	272	,5	272	1,7	272	1,1	272
	Enseignement primaire	3,2	1557	1,1	1557	1,4	1556	1,2	1555
	Secondaire inférieur	4,3	2188	1,3	2188	2,8	2187	1,6	2188
	Secondaire supérieur	6,4	3513	1,9	3511	3,7	3509	1,5	3509
	Enseignement supérieur	7,8	4118	1,4	4109	6,5	4107	1,7	4108
Total		6,1	11648	1,5	11637	4,2	11631	1,6	11632
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	7,1	2977	1,8	2975	5,1	2972	,8	2969
	Zone urbaine	5,5	1918	1,3	1916	3,6	1915	1,6	1918
	Zone semi-urbaine	5,9	3880	1,4	3878	4,0	3877	1,7	3878
	Zone rurale	6,3	3251	1,5	3246	4,6	3245	1,7	3244
Total		6,1	12026	1,5	12015	4,2	12009	1,6	12009

Indicators oh0201-oh0204

BELGIE

FREQUENCE DE LA MEDECINE ALTERNATIVE ADMINISTREE PAR DES MEDECINS
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		homéopathie		acupuncture		ostéopathie		chiropractie	
		%	N	%	N	%	N	%	N
SEXE	Homme	72,1	244	73,5	49	38,7	173	59,6	52
	Femme	73,8	412	80,6	103	32,7	251	44,4	54
Total		73,2	656	78,3	152	35,1	424	51,9	106
GROUPE D'AGE	0-14	81,1	122	20,0	5	26,7	15	,0	1
	15-24	68,6	51	91,7	12	34,3	35	66,7	6
	25-34	67,8	87	71,4	21	31,7	60	53,3	15
	35-44	74,8	131	79,3	29	39,5	129	52,9	34
	45-54	64,2	109	75,8	33	34,9	86	61,9	21
	55-64	82,1	67	78,3	23	35,1	57	47,1	17
	65-74	75,8	62	88,0	25	21,4	28	28,6	7
	75+	63,0	27	100,0	4	50,0	14	40,0	5
Total		73,2	656	78,3	152	35,1	424	51,9	106
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	80,0	5	100,0	1	20,0	5	,	0
	Enseignement primaire	67,6	34	100,0	17	52,6	19	70,0	10
	Secondaire inférieur	73,2	71	73,7	19	43,9	41	61,1	18
	Secondaire supérieur	70,7	184	78,7	47	43,6	110	51,4	35
	Enseignement supérieur	76,1	327	73,8	65	28,4	236	45,2	42
Total		73,8	621	78,5	149	35,0	411	52,4	105
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	77,3	185	86,0	43	35,3	133	31,6	19
	Zone urbaine	78,9	76	76,5	17	27,8	54	33,3	12
	Zone semi-urbaine	70,9	196	78,4	51	38,0	108	54,8	42
	Zone rurale	69,3	199	70,7	41	35,7	129	66,7	33
Total		73,2	656	78,3	152	35,1	424	51,9	106

REGION FLAMANDE

NOMBRE DE PERSONNES (EN %) EN CONTACT AVEC MEDECINE ALTERNATIVE DANS
L'ANNEE PASSEE

Enquête Nationale de Santé, Belgique, 2001

		thérapeute non-convention nelle	N
SEXE	Homme	9,6	2057
	Femme	12,0	2043
Total		10,8	4100
GROUPE D'AGE	0-14	8,3	602
	15-24	8,7	459
	25-34	10,7	576
	35-44	17,9	655
	45-54	12,1	594
	55-64	10,2	524
	65-74	10,8	423
	75+	4,0	267
Total		10,8	4100
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	9,5	79
	Enseignement primaire	6,8	493
	Secondaire inférieur	7,5	755
	Secondaire supérieur	10,5	1342
	Enseignement supérieur	14,7	1372
Total		10,9	4041
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	11,5	948
	Zone semi-urbaine	10,3	2052
	Zone rurale	11,3	1100
Total		10,8	4100
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	10,8	4100
	Region flamande	10,8	4100
ANNEE	1997,00	8,0	3536
	2001,00	10,8	4100
Total 1997 et 2001		9,6	7636

Indicateur ag01

REGION FLAMANDE

NOMBRE DE PERSONNES (EN %) EN CONTACT AVEC MEDECINE ALTERNATIVE
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Contact avec homéopathie		Contact avec acupuncture		Contact avec ostéopathie		Contact avec chiropraxie	
		%	N	%	N	%	N	%	N
SEXE	Homme	5,0	2047	,9	2044	3,2	2044	2,4	2045
	Femme	6,7	2030	1,8	2029	3,7	2029	1,8	2030
Total		5,9	4077	1,4	4073	3,4	4073	2,1	4075
GROUPE D'AGE	0-14	7,5	597	,7	595	1,0	596	,2	596
	15-24	4,4	455	1,0	455	4,0	455	1,3	456
	25-34	4,9	574	,8	574	3,3	574	2,4	574
	35-44	7,3	652	2,2	652	7,0	652	4,7	652
	45-54	5,9	592	1,3	592	4,1	591	3,2	592
	55-64	5,6	519	1,6	517	2,8	517	2,1	517
	65-74	6,5	422	2,2	422	2,6	422	1,1	422
	75+	2,9	266	1,4	266	1,6	266	1,5	266
Total		5,9	4077	1,4	4073	3,4	4073	2,1	4075
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	5,7	79	,6	79	2,0	79	1,7	79
	Enseignement primaire	3,9	490	,9	490	1,4	490	1,7	490
	Secondaire inférieur	4,6	753	1,3	753	2,3	753	2,2	753
	Secondaire supérieur	6,5	1339	1,7	1338	2,9	1338	1,8	1338
	Enseignement supérieur	6,8	1360	1,3	1357	5,5	1357	2,5	1359
Total		5,9	4021	1,4	4017	3,5	4017	2,1	4019
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	5,5	940	1,2	939	3,6	939	1,8	941
	Zone semi-urbaine	5,7	2041	1,2	2039	3,6	2038	2,2	2039
	Zone rurale	6,5	1096	1,7	1095	3,0	1096	2,3	1095
Total		5,9	4077	1,4	4073	3,4	4073	2,1	4075

Indicators oh0201-oh0204

VLAAMS GEWEST

FREQUENCE DE LA MEDECINE ALTERNATIVE ADMINISTREE PAR DES MEDECINS
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		homéopathie		acupuncture		ostéopathie		chiropractie	
		%	N	%	N	%	N	%	N
SEXE	Homme	74,0	77	78,6	14	45,5	44	62,5	32
	Femme	65,4	127	67,9	28	30,4	69	59,4	32
Total		68,6	204	71,4	42	36,3	113	60,9	64
GROUPE D'AGE	0-14	82,1	39	33,3	3	,0	2	,	0
	15-24	66,7	21	100,0	4	37,5	16	60,0	5
	25-34	56,0	25	80,0	5	36,4	11	75,0	8
	35-44	73,2	41	60,0	10	31,6	38	50,0	24
	45-54	48,1	27	57,1	7	47,8	23	64,3	14
	55-64	80,0	25	80,0	5	33,3	15	75,0	8
	65-74	65,0	20	85,7	7	33,3	6	50,0	4
	75+	66,7	6	100,0	1	50,0	2	100,0	1
Total		68,6	204	71,4	42	36,3	113	60,9	64
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	100,0	4	,	0	50,0	2	,	0
	Enseignement primaire	64,7	17	100,0	3	57,1	7	66,7	6
	Secondaire inférieur	60,0	20	50,0	6	60,0	10	72,7	11
	Secondaire supérieur	59,2	76	82,4	17	41,2	34	60,0	20
	Enseignement supérieur	77,6	85	62,5	16	27,1	59	57,7	26
Total		68,3	202	71,4	42	36,6	112	61,9	63
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	81,4	43	57,1	7	20,7	29	30,0	10
	Zone semi-urbaine	67,3	110	70,8	24	44,1	59	57,9	38
	Zone rurale	60,8	51	81,8	11	36,0	25	87,5	16
Total		68,6	204	71,4	42	36,3	113	60,9	64

REGION BRUXELLOISE

OMBRE DE PERSONNES (EN %) EN CONTACT AVEC MEDECINE ALTERNATIVE DANS
L ANNEE PASSEE
Enquête Nationale de Santé, Belgique, 2001

		thérapeute non-convention nelle	N
SEXE	Homme	9,7	1419
	Femme	16,0	1587
Total		12,9	3006
GROUPE D'AGE	0-14	6,5	509
	15-24	8,7	270
	25-34	12,0	487
	35-44	18,3	518
	45-54	18,1	371
	55-64	14,4	302
	65-74	12,9	279
	75+	13,4	270
Total		12,9	3006
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	2,1	134
	Enseignement primaire	6,8	407
	Secondaire inférieur	7,9	408
	Secondaire supérieur	10,4	693
	Enseignement supérieur	19,7	1231
Total		12,9	2873
NIVEAU D'INSTRUCTION	Bruxelles	12,9	3006
Total		12,9	3006
LIEU DE RESIDENCE	Région Bruxelloise	12,9	3006
	Region bruxelloise	12,9	3006
ANNEE	1997,00	8,6	3051
	2001,00	12,9	3006
Total 1997 et 2001		10,8	6057

Indicateur ag01

REGION BRUXELLOISE

NOMBRE DE PERSONNES (EN %) EN CONTACT AVEC MEDECINE ALTERNATIVE
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Contact avec homéopathie		Contact avec acupuncture		Contact avec ostéopathie		Contact avec chiropraxie	
		%	N	%	N	%	N	%	N
SEXE	Homme	4,6	1406	1,1	1407	4,3	1406	,6	1405
	Femme	9,4	1571	2,5	1568	5,8	1566	1,0	1564
Total		7,1	2977	1,8	2975	5,1	2972	,8	2969
GROUPE D'AGE	0-14	5,6	505	,1	506	1,3	506	,0	506
	15-24	6,5	266	1,2	265	1,4	266	,6	265
	25-34	6,1	481	1,3	480	5,3	481	1,0	480
	35-44	8,1	517	2,6	517	8,0	517	,7	516
	45-54	9,2	366	3,1	367	8,0	365	1,1	365
	55-64	7,9	299	2,4	298	7,2	297	1,4	298
	65-74	6,3	275	2,9	274	6,0	273	,6	272
	75+	6,6	268	1,7	268	3,8	267	1,6	267
Total		7,1	2977	1,8	2975	5,1	2972	,8	2969
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	1,2	134	,0	134	,9	134	,0	134
	Enseignement primaire	1,8	404	2,0	404	1,2	403	,7	403
	Secondaire inférieur	3,4	404	,8	404	3,2	404	,8	404
	Secondaire supérieur	5,5	687	2,0	688	3,4	686	,9	685
	Enseignement supérieur	11,8	1218	2,2	1215	8,5	1215	,8	1213
Total		7,1	2847	1,8	2845	5,0	2842	,8	2839
NIVEAU GEOGRAPHIQUE	Bruxelles	7,1	2977	1,8	2975	5,1	2972	,8	2969
Total		7,1	2977	1,8	2975	5,1	2972	,8	2969

Indicators ag0201-ag0204

REGION BRUXELLOISE

FREQUENCE DE LA MEDECINE ALTERNATIVE ADMINISTREE PAR DES MEDECINS
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		homéopathie		acupuncture		ostéopathie		chiropractie	
		%	N	%	N	%	N	%	N
SEXE	Homme	77,6	58	71,4	14	38,9	54	42,9	7
	Femme	77,2	127	93,1	29	32,9	79	25,0	12
Total		77,3	185	86,0	43	35,3	133	31,6	19
GROUPE D'AGE	0-14	85,2	27	,	0	50,0	4	,	0
	15-24	72,7	11	100,0	2	50,0	2	,	0
	25-34	76,9	26	80,0	5	25,0	20	33,3	6
	35-44	77,8	36	90,0	10	44,4	36	33,3	3
	45-54	69,7	33	72,7	11	23,3	30	66,7	3
	55-64	100,0	19	100,0	6	38,9	18	,0	3
	65-74	72,2	18	83,3	6	28,6	14	,0	1
	75+	60,0	15	100,0	3	55,6	9	33,3	3
Total		77,3	185	86,0	43	35,3	133	31,6	19
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	,0	1	,	0	,0	2	,	0
	Enseignement primaire	66,7	6	100,0	6	80,0	5	100,0	2
	Secondaire inférieur	85,7	14	100,0	3	50,0	8	100,0	1
	Secondaire supérieur	86,2	29	85,7	7	42,9	21	42,9	7
	Enseignement supérieur	75,6	123	80,0	25	29,2	89	,0	9
Total		77,5	173	85,4	41	34,4	125	31,6	19
NIVEAU D'INSTRUCTION	Bruxelles	77,3	185	86,0	43	35,3	133	31,6	19
Total		77,3	185	86,0	43	35,3	133	31,6	19

REGION WALLONNE

NOMBRE DE PERSONNES (EN %) EN CONTACT AVEC MEDECINE ALTERNATIVE DANS
L'ANNEE PASSEE

Enquête Nationale de Santé, Belgique, 2001

		thérapeute non-convention nelle	N
SEXE	Homme	10,2	2445
	Femme	13,8	2560
Total		12,0	5005
GROUPE D'AGE	0-14	6,8	844
	15-24	11,7	570
	25-34	12,9	675
	35-44	20,6	762
	45-54	12,4	717
	55-64	12,3	539
	65-74	11,1	532
	75+	4,1	366
Total		12,0	5005
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	2,3	59
	Enseignement primaire	5,2	668
	Secondaire inférieur	8,8	1038
	Secondaire supérieur	11,5	1494
	Enseignement supérieur	16,3	1548
Total		11,9	4807
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	9,0	984
	Zone semi-urbaine	11,7	1853
	Zone rurale	12,9	2168
Total		12,0	5005
LIEU DE RESIDENCE	Région Wallonne	12,0	5005
	Region wallonne	12,0	5005
ANNEE	1997,00	8,3	3634
	2001,00	12,0	5005
Total 1997 et 2001		10,2	8639

Indicateur ag01

REGION WALLONNE

NOMBRE DE PERSONNES (EN %) EN CONTACT AVEC MEDECINE ALTERNATIVE
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Contact avec homéopathie		Contact avec acupuncture		Contact avec ostéopathie		Contact avec chiropraxie	
		%	N	%	N	%	N	%	N
SEXE	Homme	4,8	2429	1,1	2426	5,0	2425	,8	2427
	Femme	7,6	2543	2,0	2541	6,2	2539	,3	2538
Total		6,2	4972	1,6	4967	5,6	4964	,6	4965
GROUPE D'AGE	0-14	5,1	837	,4	835	1,2	834	,2	835
	15-24	7,7	565	,7	565	3,7	565	,3	564
	25-34	4,9	674	1,5	674	8,8	674	,0	674
	35-44	9,0	756	1,8	753	12,1	753	1,4	754
	45-54	6,0	714	2,2	714	5,5	714	,7	714
	55-64	5,5	533	3,6	533	7,4	533	1,1	533
	65-74	7,3	530	2,7	530	2,4	528	,3	529
	75+	2,1	363	,0	363	,9	363	,4	362
Total		6,2	4972	1,6	4967	5,6	4964	,6	4965
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	,0	59	,5	59	1,9	59	,0	59
	Enseignement primaire	2,3	663	1,2	663	1,5	663	,3	662
	Secondaire inférieur	3,7	1031	1,2	1031	3,7	1030	,6	1031
	Secondaire supérieur	6,4	1487	2,4	1485	5,8	1485	,8	1486
	Enseignement supérieur	8,4	1540	1,1	1537	7,8	1535	,5	1536
Total		6,1	4780	1,5	4775	5,6	4772	,6	4774
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	5,3	978	1,5	977	3,4	976	,6	977
	Zone semi-urbaine	6,5	1839	1,9	1839	5,0	1839	,2	1839
	Zone rurale	6,1	2155	1,3	2151	6,5	2149	,9	2149
Total		6,2	4972	1,6	4967	5,6	4964	,6	4965

Indicators oh0201-oh0204

REGION WALLONNE

FREQUENCE DE LA MEDECINE ALTERNATIVE ADMINISTREE PAR DES MEDECINS
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		homéopathie		acupuncture		ostéopathie		chiropractie	
		%	N	%	N	%	N	%	N
SEXE	Homme	67,9	109	71,4	21	34,7	75	61,5	13
	Femme	77,8	158	80,4	46	34,0	103	20,0	10
Total		73,8	267	77,6	67	34,3	178	43,5	23
GROUPE D'AGE	0-14	78,6	56	,0	2	22,2	9	,0	1
	15-24	68,4	19	83,3	6	29,4	17	100,0	1
	25-34	69,4	36	63,6	11	34,5	29	,0	1
	35-44	74,1	54	88,9	9	41,8	55	71,4	7
	45-54	69,4	49	86,7	15	36,4	33	50,0	4
	55-64	69,6	23	66,7	12	33,3	24	33,3	6
	65-74	87,5	24	91,7	12	,0	8	,0	2
	75+	66,7	6	,	0	33,3	3	,0	1
Total		73,8	267	77,6	67	34,3	178	43,5	23
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	,	0	100,0	1	,0	1	,	0
	Enseignement primaire	72,7	11	100,0	8	28,6	7	50,0	2
	Secondaire inférieur	75,7	37	80,0	10	34,8	23	33,3	6
	Secondaire supérieur	75,9	79	73,9	23	45,5	55	37,5	8
	Enseignement supérieur	75,6	119	75,0	24	28,4	88	57,1	7
Total		75,6	246	78,8	66	34,5	174	43,5	23
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	75,8	33	90,0	10	36,0	25	50,0	2
	Zone semi-urbaine	75,6	86	85,2	27	30,6	49	25,0	4
	Zone rurale	72,3	148	66,7	30	35,6	104	47,1	17
Total		73,8	267	77,6	67	34,3	178	43,5	23