



Statistique et  
Information économique

**Section d'Epidémiologie**

**Rue Juliette Wytman, 14  
1050 Bruxelles  
Tél : 02/642.57.94  
e-mail : his@iph.fgov.be**

**<http://www.iph.fgov.be/epidemi/epifr/index4.htm>**

**SPF Économie - Direction générale  
Statistique et Information économique**

**Rue de Louvain, 40  
1000 Bruxelles**

**<http://statbel.fgov.be>**

**Equipe de recherche : (par ordre alphabétique)**

**Kristina Bayingana  
Stefaan Demarest  
Lydia Gisle  
Edith Hesse  
Pieter-Jan Miermans  
Jean Tafforeau  
Johan Van der Heyden**

**Equipe logistique :**

**Monique Schoonenburg**

Les commanditaires de l'Enquête de Santé par Interview 2004

**B. Cerexhe**

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et de la Politique agricole – Région Bruxelloise

**R. Demotte**

Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Gouvernement fédéral

**C. Fonck**

Ministre de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse - Communauté Française

**B. Gentges**

Vize-Ministerpräsident, Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus - Deutschsprachige Gemeinschaft

**G. Vanhengel**

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de l'Informatique - Région Bruxelloise

**I. Vervotte**

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Vlaams regering

**C. Vienne**

Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances - Région Wallonne



# Livre V

## Consommation de Soins

---



# Enquête de Santé par Interview Belgique 2004



# Table des matières générales

---

## ***Livre I***

### **Introduction**

Rapport Méthodologique .....	5
------------------------------	---

## ***Livre II***

### **Etat de santé**

Santé subjective .....	9
Maladies et affections chroniques .....	47
Santé mentale .....	192
Incapacités physiques de longue durée.....	369
Incapacité temporaire .....	495

## ***Livre III***

### **Style de vie**

Activités physiques .....	5
Etat nutritionnel .....	111
Habitudes nutritionnelles.....	182
Consommation d'alcool .....	260
Consommation de tabac .....	386
Usages de drogues illicites .....	497
Santé et sexualité .....	543
Attitudes face au Sida .....	598

## ***Livre IV***

### **Prévention**

Vaccination .....	5
Prévention cardiovasculaire.....	112
Dépistage du diabète .....	181
Dépistage du cancer du sein .....	224
Dépistage du cancer du col de l'utérus.....	300

## Table des matières générales (suite)

---

### **Livre V**

#### **Consommation de soins**

##### **Contacts avec des professionnels de la santé**

<i>Contacts avec le médecin généraliste</i> .....	5
<i>Contacts avec le médecin spécialiste</i> .....	154
<i>Service des urgences</i> .....	277
<i>Contacts avec le dentiste</i> .....	339
<i>Contact avec les services paramédicaux</i> .....	469
<b>Hospitalisation</b> .....	528
<b>Consommation de médicaments</b> .....	651
<b>Thérapies non conventionnelles</b> .....	787

### **Livre VI**

#### **Santé et société**

<b>Accès aux soins de santé</b> .....	5
<b>Différences socio-économiques en matières de santé</b> .....	59
<b>Santé et environnement</b> .....	75
<b>Traumatismes</b> .....	149
<b>Santé sociale</b> .....	321
<b>Services sociaux et préventifs</b> .....	386

### **Livre VII**


<b>Personnes âgées</b> .....	4
------------------------------	---

### **Livre VIII**

<b>Comparaisons internationales</b> .....	5
---	---

# Thérapies non Conventionnelles

Edith Hesse  
Pieter-Jan Miermans



Enquête de santé par interview,  
Belgique 2004





## Table des matières

---

<b>RÉSUMÉ .....</b>	<b>787</b>
<b>REMERCIEMENTS .....</b>	<b>788</b>
<b>1. INTRODUCTION.....</b>	<b>789</b>
<b>2. QUESTIONS .....</b>	<b>791</b>
<b>3. INDICATEURS.....</b>	<b>792</b>
<b>4. RÉSULTATS.....</b>	<b>793</b>
4.1. CONTACTS AVEC LES THÉRAPIES NON CONVENTIONNELLES (OH02_1), TYPE DE THÉRAPIE NON CONVENTIONNELLE (OH0201_OH0204_1) ET IDENTITÉ DU THÉRAPEUTE (OH03_1, OH03_2) .....	793
4.1.1. <i>Belgique</i> .....	793
4.1.2. <i>Régions</i> .....	794
<b>TABLEAUX DE BASE .....</b>	<b>797</b>
<b>TABLEAUX STANDARDISÉS.....</b>	<b>814</b>



## Résumé

---

12% de la population a sollicité au cours des douze derniers mois les services d'un praticien de thérapies alternatives ou non conventionnelles 6% de la population a fait appel à un médecin pour une thérapie de ce genre et 4,6% à du personnel paramédical.

Ces contacts concernaient entre autre l'homéopathie (5,8% de la population), l'acupuncture (1,6%), l'ostéopathie (3,8%) et la chiropraxie (1,7%).

Les femmes ont sollicité plus souvent (13%) les services d'un praticien de thérapies alternatives

que les hommes (10%). Ce genre de thérapie est plus souvent utilisé les personnes d'âge moyen et celles qui ont un niveau d'instruction élevé.

Le recours à la chiropraxie et l'ostéopathie varie entre les régions: 3,4% de la population en Flandre a sollicité les services d'une thérapeute dans le domaine de la chiropraxie, contre seulement 0,6% à Bruxelles et 0,5% en Wallonie. Inversement l'ostéopathie est moins utilisée en Flandre (3,4%) qu'à Bruxelles (6%) et en Wallonie (5%).

## Remerciements

---

Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution, leur relecture de ce chapitre et pour leurs conseils avisés dans le domaine de la santé publique :

- Mevr. Heidi Cloots, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Gezondheidszorg
- Mr Michel Vigneul, Service des Soins de Santé, INAMI
- Mr Tite Kubushishi, Direction générale des Soins de Santé Primaires, SPF Santé Publique
- Dr Véronique Tellier, Observatoire de la Santé du Hainaut
- Mw Joanna Geerts, Departement Sociologie, Universiteit Antwerpen
- Dhr. Wim Peersman, Vakgroep Populationswet. en Soc Wet. Meth, UG
- Mme Véronique Rabenda, Service de SP, Epidémiologie et Economie de la Santé  
Université de Liège

## 1. Introduction

---

L'OMS a récemment<sup>1</sup> publié un rapport au sujet de l'utilisation des thérapies non conventionnelles. Il en ressort qu'en Belgique 40% de la population a déjà utilisé une forme de thérapie non conventionnelle. Ces dernières jouent donc un rôle non négligeable dans le domaine des soins de santé en Belgique.

En Belgique, seuls les détenteurs d'un diplôme de médecin, d'accoucheuse ou de licencié en sciences dentaires sont habilités à poser un diagnostic et à prescrire un traitement (article 2 en 3 de l'AR n 78 du 10 novembre 1967). Les praticiens disposent à ce sujet d'une liberté de principe (article 11 du même AR). Ils peuvent donc utiliser les moyens qu'ils jugent utiles, comme le cas échéant: homéopathie, médecine manuelle, acupuncture, chiropraxie, ... Donc, seuls les détenteurs des diplômes pré-cités peuvent poser des diagnostics et pratiquer ces thérapies alternatives. Dans tous les autres cas, il s'agit de pratique illégale de la médecine.

Il faut mentionner ici à ce sujet l'avis négatif de l'Académie Royale de Médecine au sujet des thérapies non conventionnelles.

Un grand nombre de praticiens dans le domaine des thérapies non conventionnelles tombent pour l'instant en dehors du cadre prévu par la loi. Etant donné toutefois le succès croissant de ces différentes thérapies, il devient nécessaire de réguler le secteur de manière globale. Mettre en place un nouveau cadre légal ne signifie pas que les autorités font la promotion de ces thérapies, mais cela offrira aux citoyens une sécurité sur la qualité des pratiques.

In 1997, le Ministre Colla (Ministre de la Santé Publique) a organisé une table ronde des thérapies non conventionnelles avec de parlementaires, des médecins, des représentants des différentes pratiques alternatives et des détracteurs de ces thérapies. Il a été convenu de fixer un cadre légal, au moins pour quatre types de pratiques : homéopathie, acupuncture, chiropraxie et ostéopathie. Une loi est donc sortie le 29 avril 1999 au sujet des thérapies non conventionnelles dans le domaine de la médecine, de la kinésithérapie, des soins infirmiers et des professions paramédicales. Cette dernière précise les modalités qui doivent aboutir à un enregistrement (différent de reconnaissance) des praticiens de médecine non conventionnelle.

Le ministre actuel travaille à la mise en application de cette loi avec une étape importante qui a été franchie en juin 2002 par l'approbation de l'AR sur les organisations professionnelles des praticiens de thérapies non conventionnelles

Une autre voie a été suivie aussi dans la définition d'un cadre légal pour les thérapies non conventionnelles : la liste des activités professionnelles spéciales (article 35ter de l'AR. nr. 78 du 10 novembre 1967). Cela concerne l'homéopathie, l'acupuncture et les thérapies manuelles pour les médecins et l'acupuncture et les thérapies manuelles pour les kinésithérapeutes. Cette voie n'est pas dépendante des définitions reprises dans la loi du 29/04/1999, et devrait aboutir avant la fin de la législature actuelle. Ce cadre limité aux médecins et paramédicaux, pourrait par la suite être étendu dans le cadre de la loi de 1999.

---

<sup>1</sup> Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine : A Worldwide Review, WHO, february 2001.

Il n'est pas prévu de rembourser les coûts des thérapies alternatives dans le cadre officiel de la sécurité sociale. Quelques caisses de maladie remboursent toutefois déjà certains montants sur leurs propres fonds d'assurance. La mutualité neutre a été la première à agir dans ce sens pour ses membres; en 2001, moins de 2% de ses membres ont demandé un remboursement pour un traitement homéopathique.

La mutualité chrétienne a annoncé qu'en 2000 3% de ses affiliés faisaient régulièrement appel à un praticien de médecine alternative pour laquelle la caisse d'assurance offre un remboursement (6% chez les 30 à 60 ans). Ce taux monte jusqu'à 15% si l'on se limite aux personnes qui ont des problèmes de santé. Les plus grands utilisateurs sont les femmes entre 30 et 60 ans (20%).

## 2. Questions

---

- OH02. Avez-vous, pour vous-même, au cours de la dernière année, c'est à dire depuis.../.../....., eu un contact avec quelqu'un qui ..
  - Pratique l'homéopathie
  - Pratique l'acupuncture
  - Pratique l'ostéopathie
  - Pratique la chiropraxie
  - Pratique une autre forme de médecine alternative. C'est-à-dire....
  
- OH03. S'agissait-il d'un médecin ?

### 3. Indicateurs

---

**OH02\_1** : pourcentage de la population qui a fait appel à une thérapie non conventionnelle au cours des douze derniers mois.

**OH03\_1 & OH03\_2** : pourcentage de la population qui a bénéficié d'une thérapie non conventionnelle qui a été fournie soit par un médecin (OH03\_1) soit par un thérapeute qui n'est pas médecin (OH03\_2).

**OH0201\_1-OH0204\_1** : pourcentage de la population qui a été en contact au cours des douze derniers mois avec certaines formes spécifiques de médecine alternative : homéopathie (OH0201\_1), acupuncture (OH0202\_1), chiropraxie (OH0203\_1) ou ostéopathie (OH0204\_1).



## 4. Résultats

### 4.1. Contacts avec les thérapies non conventionnelles (OH02\_1), type de thérapie non conventionnelle (OH0201\_OH0204\_1) et identité du thérapeute (OH03\_1, OH03\_2)

#### 4.1.1. Belgique

12% de la population a eu un contact avec un praticien de médecine non conventionnelle au cours des douze derniers mois. 6% de la population ont consulté un médecin dans le cadre d'une thérapie non conventionnelle et 4,6% de population du personnel paramédical.

Ces contacts concernaient la pratique de l'homéopathie (5,8% de la population), l'acupuncture (1,6%), l'ostéopathie (4,3%) et la chiropraxie (1,5%).

#### *Analyse en fonction du sexe et de l'âge*


Les femmes ont sollicité plus souvent (13%) un praticien de thérapies non conventionnelles que les hommes (10%). Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

Les femmes font aussi bien appel dans le cadre d'une thérapie non conventionnelle à un médecin (6%) qu'à un paramédical (5%) que les hommes (respectivement 5% et 4%).

Les personnes d'âge moyen (25-54 ans) font plus souvent appel à des praticiens de médecine non conventionnelle (+15%). Cette pratique est sensiblement plus rare chez les personnes âgées (6% chez les personnes âgées de 75 ans ou plus).

Les mêmes tendances sont observées pour chacune des thérapies spécifiques prises séparément.

Figure 1 Pourcentage de la population qui a fait appel à une thérapie non conventionnelle au cours des douze derniers mois, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2004.



### Analyse en fonction du niveau d'éducation

L'utilisation de la médecine alternative varie en fonction du niveau d'instruction. Le pourcentage de la population qui a eu un contact avec un praticien de médecine non conventionnelle au cours des douze derniers mois est de 4% chez les personnes sans diplôme ou seulement un diplôme de l'enseignement primaire, de 8% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, 10% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et 17% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, ces différences sont significatives.

### Analyse en fonction du niveau d'urbanisation

On n'observe pas ici de différence en fonction du niveau d'urbanisation.

### Evolution au cours du temps

Le pourcentage de la population qui a eu un contact avec un praticien de médecine non conventionnelle a augmenté au cours du temps : 8% en 1997, 11% en 2001 et 12% en 2004. Seule la différence entre 1997 et 2001 est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.


Le pourcentage de population qui a consulté un médecin dans le cadre d'une thérapie non conventionnelle ou du personnel paramédical n'a pas changé entre 2001 et 2004.

## 4.1.2. Régions

En Flandre, 11% de la population a eu un contact avec un praticien de médecine non conventionnelle, 13% à Bruxelles et 12% en Wallonie. Ces différences ne sont pas significatives. On n'observe pas de différences non plus entre les régions suivant qu'il s'agisse d'un médecin ou du personnel paramédical qui dispense ces thérapies.

L'ostéopathie est moins souvent utilisée en Flandre (3,4%) qu'à Bruxelles (6%) et en Wallonie (5%). La chiropraxie est par contre plus souvent utilisée en Flandre (3,4%) par rapport à Bruxelles (0,6%) et en Wallonie (0,5%). Ces différences sont significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.


Figure 2 Pourcentage de la population qui a fait appel à une thérapie non conventionnelle au cours des douze derniers mois, par région et par année, Enquête de Santé, Belgique, 2004.



### Région flamande

En Flandre, 11% de la population a eu un contact avec un praticien de médecine non conventionnelle au cours des douze derniers mois. On observe ici le même profil que celui qui a été décrit pour la Belgique dans son ensemble.


Figure 3 Pourcentage de la population qui a fait appel à une thérapie non conventionnelle au cours des douze derniers mois, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique 2004, Région flamande.



### Région bruxelloise

En Région bruxelloise, 13% de la population a eu un contact avec un praticien de médecine non conventionnelle au cours des douze derniers mois. On observe ici le même profil que celui qui a été décrit pour la Belgique dans son ensemble. On observe notamment une différence entre les hommes (10%) et les femmes (15%) et cette dernière est plus marquée qu'au niveau de la Belgique.


Figure 4 Pourcentage de la population qui a fait appel à une thérapie non conventionnelle au cours des douze derniers mois, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2004, Région bruxelloise.



**Région wallonne**

En Région wallonne, 12% de la population a eu un contact avec un praticien de médecine non conventionnelle au cours des douze derniers mois. On observe ici le même profil que celui qui a été décrit pour la Belgique dans son ensemble.

Figure 5 Pourcentage de la population qui a fait appel à une thérapie non conventionnelle au cours des douze derniers mois, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique 2004, Région wallonne.



## Tableaux de base

---

### **Belgique**

OH02_1 :	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée	798
OH03_1 :	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée	799
OH03_2 :	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical au cours de l'année passée	800
OH0201_1, OH0205_1 :	Pourcentage de la population ayant un contact avec un praticien de ...	801

### **Région flamande**

OH02_1 :	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée	802
OH03_1 :	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée	803
OH03_2 :	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical au cours de l'année passée	804
OH0201_1, OH0205_1 :	Pourcentage de la population ayant un contact avec un praticien de ...	805

### **Région bruxelloise**

OH02_1 :	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée	806
OH03_1 :	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée	807
OH03_2 :	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical au cours de l'année passée	808
OH0201_1, OH0205_1 :	Pourcentage de la population ayant un contact avec un praticien de ...	809

### **Région wallonne**

OH02_1 :	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée	810
OH03_1 :	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée	811
OH03_2 :	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical au cours de l'année passée	812
OH0201_1, OH0205_1 :	Pourcentage de la population ayant un contact avec un praticien de ...	813

## BELGIQUE

**Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie  
non-conventionnelle au cours de l'année passée**

OH02_1		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	10.2	89.8	5961
	Femme	12.7	87.3	6735
	Total	11.5	88.5	12696
GROUPE D'AGE	0 - 14	9.8	90.2	1701
	15 - 24	8.2	91.8	1235
	25 - 34	14.4	85.6	1564
	35 - 44	15.1	84.9	1757
	45 - 54	13.4	86.6	1619
	55 - 64	11.2	88.8	1405
	65 - 74	9.6	90.4	1508
	75 +	6.2	93.8	1907
	Total	11.5	88.5	12696
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	4.0	96.0	2040
	Secondaire inférieur	7.8	92.2	2175
	Secondaire supérieur	9.5	90.5	3581
	Enseignement supérieur	17.2	82.8	4431
	Total	11.5	88.5	12227
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	11.4	88.6	5161
	Zone semi-urbaine	10.9	89.1	3780
	Zone rurale	12.2	87.8	3755
	Total	11.5	88.5	12696
LIEU DE RESIDENCE	Région flamande	10.8	89.2	4458
	Région bruxelloise	12.7	87.3	3347
	Région wallonne	12.3	87.7	4891
	Total	11.5	88.5	12696
ANNEE D'ENQUETE	1997	8.2	91.8	10118
	2001	11.2	88.8	11755
	2004	11.5	88.5	12696
	Total des années	10.4	89.6	34569

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## BELGIQUE

**Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée  
par un médecin au cours de l'année passée**

OH03_1		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	5.4	94.6	5644
	Femme	6.4	93.6	6222
	Total	5.9	94.1	11866
GROUPE D'AGE	0 - 14	6.6	93.4	1613
	15 - 24	4.1	95.9	1177
	25 - 34	6.0	94.0	1427
	35 - 44	7.9	92.1	1595
	45 - 54	6.7	93.3	1478
	55 - 64	4.7	95.3	1302
	65 - 74	5.5	94.5	1429
	75 +	3.2	96.8	1845
	Total	5.9	94.1	11866
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	1.5	98.5	1990
	Secondaire inférieur	3.7	96.3	2063
	Secondaire supérieur	4.6	95.4	3373
	Enseignement supérieur	9.7	90.3	4002
	Total	6.0	94.0	11428
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	5.4	94.6	4819
	Zone semi-urbaine	5.8	94.2	3550
	Zone rurale	6.5	93.5	3497
	Total	5.9	94.1	11866
LIEU DE RESIDENCE	Région flamande	5.5	94.5	4213
	Région bruxelloise	6.2	93.8	3114
	Région wallonne	6.4	93.6	4539
	Total	5.9	94.1	11866
ANNEE D'ENQUETE	2001	6.0	94.0	11071
	2004	5.9	94.1	11866
	Total des années	5.9	94.1	22937

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## BELGIQUE

**Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée  
par un thérapeute paramédical au cours de l'année passée**

OH03_2		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	3.9	96.1	5617
	Femme	5.2	94.8	6201
	Total	4.6	95.4	11818
GROUPE D'AGE	0 - 14	3.5	96.5	1598
	15 - 24	2.8	97.2	1174
	25 - 34	6.0	94.0	1431
	35 - 44	6.5	93.5	1608
	45 - 54	6.2	93.8	1481
	55 - 64	4.9	95.1	1293
	65 - 74	2.8	97.2	1412
	75 +	2.1	97.9	1821
	Total	4.6	95.4	11818
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	1.3	98.7	1983
	Secondaire inférieur	2.8	97.2	2041
	Secondaire supérieur	4.2	95.8	3371
	Enseignement supérieur	7.0	93.0	3977
	Total	4.6	95.4	11372
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	5.0	95.0	4810
	Zone semi-urbaine	3.8	96.2	3522
	Zone rurale	5.1	94.9	3486
	Total	4.6	95.4	11818
LIEU DE RESIDENCE	Région flamande	4.2	95.8	4186
	Région bruxelloise	5.9	94.1	3118
	Région wallonne	4.7	95.3	4514
	Total	4.6	95.4	11818
ANNEE D'ENQUETE	2001	4.5	95.5	10880
	2004	4.6	95.4	11818
	Total des années	4.5	95.5	22698

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004



## BELGIQUE

## Pourcentage de la population ayant un contact avec un praticien de...

OH0201_1-OH0205_1		homéo- pathie	acu- puncture	ostéo- pathie	chiro- practie	autre médec. alternat.	N
		%	%	%	%	%	
SEXE	Homme	4.8	1.5	3.8	1.7	1.0	5934
	Femme	6.8	1.7	4.7	1.4	1.8	6693
	Total	5.8	1.6	4.3	1.5	1.4	12627
GROUPE D'AGE	0 - 14	7.2	.6	3.2	.5	1.1	1694
	15 - 24	5.3	.9	2.0	.8	.6	1233
	25 - 34	7.0	1.8	5.7	2.0	1.2	1554
	35 - 44	6.0	2.5	6.8	3.4	1.4	1748
	45 - 54	5.9	1.5	5.8	2.1	2.1	1596
	55 - 64	5.2	2.3	4.1	1.1	1.7	1401
	65 - 74	5.2	1.9	2.7	.8	1.6	1496
	75 +	2.5	1.3	1.9	.7	1.0	1905
	Total	5.8	1.6	4.3	1.5	1.4	12627
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	1.9	1.1	1.3	.3	.5	2039
	Secondaire inférieur	3.5	1.3	2.6	1.1	1.2	2166
	Secondaire supérieur	4.3	1.3	3.6	1.6	1.0	3564
	Enseignement supérieur	9.5	2.2	6.6	2.1	1.9	4393
	Total	5.9	1.6	4.3	1.5	1.3	12162
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	5.6	1.5	4.2	1.7	1.5	5124
	Zone semi-urbaine	5.5	1.4	4.1	1.7	1.5	3774
	Zone rurale	6.5	1.9	4.6	1.2	1.0	3729
	Total	5.8	1.6	4.3	1.5	1.4	12627
LIEU DE RESIDENCE	Région flamande	5.6	1.4	3.4	2.3	1.3	4445
	Région bruxelloise	6.2	1.7	5.6	.6	2.0	3324
	Région wallonne	6.1	1.8	5.4	.5	1.3	4858
	Total	5.8	1.6	4.3	1.5	1.4	12627
ANNEE D'ENQUETE	1997	3.9	1.2	.	.	.8	10114
	2001	5.9	1.5	3.9	1.6	.9	11663
	2004	5.8	1.6	4.3	1.5	1.4	12627
	Total des années	5.3	1.4	4.1	1.6	1.1	34404

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## REGION FLAMANDE

## Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée

OH02_1		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	9.4	90.6	2142
	Femme	12.1	87.9	2316
	Total	10.8	89.2	4458
GROUPE D'AGE	0 - 14	10.1	89.9	543
	15 - 24	8.3	91.7	435
	25 - 34	13.9	86.1	531
	35 - 44	14.8	85.2	606
	45 - 54	13.0	87.0	597
	55 - 64	8.6	91.4	522
	65 - 74	7.5	92.5	594
	75 +	4.6	95.4	630
	Total	10.8	89.2	4458
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	3.7	96.3	740
	Secondaire inférieur	5.4	94.6	725
	Secondaire supérieur	10.5	89.5	1366
	Enseignement supérieur	15.5	84.5	1509
	Total	10.8	89.2	4340
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	10.5	89.5	999
	Zone semi-urbaine	10.2	89.8	2197
	Zone rurale	11.9	88.1	1262
	Total	10.8	89.2	4458
ANNEE D'ENQUETE	1997	8.0	92.0	3498
	2001	11.2	88.8	4059
	2004	10.8	89.2	4458
	Total des années	10.1	89.9	12015

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## REGION FLAMANDE

## Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée

OH03_1		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	5.2	94.8	2053
	Femme	5.9	94.1	2160
	Total	5.5	94.5	4213
GROUPE D'AGE	0 - 14	7.5	92.5	523
	15 - 24	3.5	96.5	416
	25 - 34	5.0	95.0	487
	35 - 44	8.3	91.7	555
	45 - 54	7.0	93.0	557
	55 - 64	2.6	97.4	491
	65 - 74	4.0	96.0	569
	75 +	2.3	97.7	615
	Total	5.5	94.5	4213
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	1.5	98.5	722
	Secondaire inférieur	3.0	97.0	705
	Secondaire supérieur	5.0	95.0	1279
	Enseignement supérieur	8.6	91.4	1395
	Total	5.6	94.4	4101
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	4.6	95.4	944
	Zone semi-urbaine	5.5	94.5	2076
	Zone rurale	6.3	93.7	1193
	Total	5.5	94.5	4213
ANNEE D'ENQUETE	2001	5.9	94.1	3818
	2004	5.5	94.5	4213
	Total des années	5.7	94.3	8031

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## REGION FLAMANDE

## Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical au cours de l'année passée

OH03_2		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	3.5	96.5	2029
	Femme	4.9	95.1	2157
	Total	4.2	95.8	4186
GROUPE D'AGE	0 - 14	2.9	97.1	503
	15 - 24	2.4	97.6	411
	25 - 34	5.8	94.2	484
	35 - 44	6.2	93.8	557
	45 - 54	6.5	93.5	558
	55 - 64	4.1	95.9	494
	65 - 74	2.2	97.8	566
	75 +	1.8	98.2	613
	Total	4.2	95.8	4186
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	1.8	98.2	724
	Secondaire inférieur	1.9	98.1	697
	Secondaire supérieur	4.6	95.4	1282
	Enseignement supérieur	5.9	94.1	1370
	Total	4.3	95.7	4073
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	4.8	95.2	941
	Zone semi-urbaine	3.6	96.4	2060
	Zone rurale	4.8	95.2	1185
	Total	4.2	95.8	4186
ANNEE D'ENQUETE	2001	4.4	95.6	3765
	2004	4.2	95.8	4186
	Total des années	4.3	95.7	7951

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## REGION FLAMANDE

## Pourcentage de la population ayant un contact avec un praticien de...

OH0201_1-OH0205_1		homéo- pathie	acu- puncture	ostéo- pathie	chiro- practie	autre médec. alternat.	N
		%	%	%	%	%	
SEXE	Homme	4.6	1.5	2.8	2.4	.9	2135
	Femme	6.6	1.4	4.0	2.1	1.7	2310
	Total	5.6	1.4	3.4	2.3	1.3	4445
GROUPE D'AGE	0 - 14	7.8	.9	2.6	.8	1.3	543
	15 - 24	5.8	1.3	.7	1.4	.3	435
	25 - 34	7.4	1.6	4.1	3.1	1.0	529
	35 - 44	5.5	2.5	5.9	5.2	1.1	602
	45 - 54	5.9	.9	5.1	3.0	2.7	592
	55 - 64	3.7	1.9	2.7	1.3	1.4	522
	65 - 74	4.6	1.3	2.4	1.0	1.0	590
	75 +	.9	.9	1.8	.8	.8	632
	Total	5.6	1.4	3.4	2.3	1.3	4445
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	1.9	.9	.8	.3	.7	741
	Secondaire inférieur	1.9	.6	2.1	1.7	.5	725
	Secondaire supérieur	5.0	1.3	3.2	2.6	1.1	1357
	Enseignement supérieur	8.7	2.2	4.8	2.9	1.9	1505
	Total	5.6	1.5	3.4	2.3	1.3	4328
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	5.0	1.6	2.8	3.2	1.0	994
	Zone semi-urbaine	5.6	1.1	3.4	2.1	1.6	2195
	Zone rurale	6.2	1.9	3.8	1.7	.9	1256
	Total	5.6	1.4	3.4	2.3	1.3	4445
ANNEE D'ENQUETE	1997	3.6	1.1	.	.	.8	3494
	2001	6.0	1.5	3.5	2.3	.9	4046
	2004	5.6	1.4	3.4	2.3	1.3	4445
	Total des années	5.2	1.4	3.5	2.3	1.0	11985

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## REGION BRUXELLOISE

## Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée

OH02_1		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	10.3	89.7	1527
	Femme	15.0	85.0	1820
	Total	12.7	87.3	3347
GROUPE D'AGE	0 - 14	8.1	91.9	446
	15 - 24	8.1	91.9	326
	25 - 34	16.4	83.6	496
	35 - 44	13.7	86.3	467
	45 - 54	18.1	81.9	371
	55 - 64	14.3	85.7	309
	65 - 74	10.5	89.5	372
	75 +	12.1	87.9	560
	Total	12.7	87.3	3347
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	5.0	95.0	513
	Secondaire inférieur	8.2	91.8	563
	Secondaire supérieur	7.9	92.1	775
	Enseignement supérieur	20.2	79.8	1351
	Total	12.9	87.1	3202
ANNEE D'ENQUETE	1997	8.6	91.4	3016
	2001	14.0	86.0	2862
	2004	12.7	87.3	3347
	Total des années	11.8	88.2	9225

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## REGION BRUXELLOISE

## Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée

OH03_1		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	5.4	94.6	1446
	Femme	7.0	93.0	1668
	Total	6.2	93.8	3114
GROUPE D'AGE	0 - 14	3.8	96.2	423
	15 - 24	4.1	95.9	311
	25 - 34	9.4	90.6	453
	35 - 44	6.8	93.2	432
	45 - 54	7.5	92.5	330
	55 - 64	6.4	93.6	282
	65 - 74	4.8	95.2	350
	75 +	6.6	93.4	533
	Total	6.2	93.8	3114
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	2.8	97.2	501
	Secondaire inférieur	4.9	95.1	541
	Secondaire supérieur	3.2	96.8	733
	Enseignement supérieur	10.1	89.9	1200
	Total	6.3	93.7	2975
ANNEE D'ENQUETE	2001	8.1	91.9	2667
	2004	6.2	93.8	3114
	Total des années	7.1	92.9	5781

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## REGION BRUXELLOISE

## Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical au cours de l'année passée

OH03_2		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	5.3	94.7	1452
	Femme	6.5	93.5	1666
	Total	5.9	94.1	3118
GROUPE D'AGE	0 - 14	4.8	95.2	428
	15 - 24	3.4	96.6	310
	25 - 34	7.8	92.2	458
	35 - 44	7.1	92.9	432
	45 - 54	7.8	92.2	329
	55 - 64	5.8	94.2	286
	65 - 74	5.0	95.0	352
	75 +	4.4	95.6	523
	Total	5.9	94.1	3118
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	1.3	98.7	500
	Secondaire inférieur	3.4	96.6	532
	Secondaire supérieur	3.3	96.7	734
	Enseignement supérieur	10.3	89.7	1211
	Total	6.0	94.0	2977
ANNEE D'ENQUETE	2001	5.7	94.3	2605
	2004	5.9	94.1	3118
	Total des années	5.8	94.2	5723

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004



## REGION BRUXELLOISE

## Pourcentage de la population ayant un contact avec un praticien de...

OH0201_1-OH0205_1		homéo- pathie	acu- puncture	ostéo- pathie	chiro- practie	autre médec. alternat.	N
		%	%	%	%	%	
SEXE	Homme	5.0	1.1	4.7	.7	1.3	1518
	Femme	7.3	2.2	6.4	.6	2.6	1806
	Total	6.2	1.7	5.6	.6	2.0	3324
GROUPE D'AGE	0 - 14	5.9	.5	2.2	.2	.9	443
	15 - 24	5.0	.1	2.4	.0	1.8	327
	25 - 34	6.8	1.6	8.2	.9	3.5	491
	35 - 44	5.6	2.2	7.1	1.0	2.0	467
	45 - 54	9.6	3.0	8.8	.9	1.7	362
	55 - 64	6.4	1.4	6.7	1.5	.7	309
	65 - 74	3.5	2.8	6.3	.5	2.1	368
	75 +	5.4	3.1	3.0	.2	2.9	557
	Total	6.2	1.7	5.6	.6	2.0	3324
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	1.9	.7	1.6	.2	1.0	511
	Secondaire inférieur	4.1	1.5	3.0	.0	2.0	562
	Secondaire supérieur	2.9	.6	3.5	.5	1.5	771
	Enseignement supérieur	10.5	2.7	9.6	1.1	2.5	1335
	Total	6.3	1.7	5.7	.6	1.9	3179
ANNEE D'ENQUETE	1997	4.1	1.5	.	.	.5	3016
	2001	7.3	1.9	5.5	1.0	1.6	2823
	2004	6.2	1.7	5.6	.6	2.0	3324
	Total des années	5.9	1.7	5.6	.8	1.4	9163

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## REGION WALLONNE

## Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée

OH02_1		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	11.5	88.5	2292
	Femme	13.0	87.0	2599
	Total	12.3	87.7	4891
GROUPE D'AGE	0 - 14	9.7	90.3	712
	15 - 24	8.2	91.8	474
	25 - 34	14.4	85.6	537
	35 - 44	16.1	83.9	684
	45 - 54	12.7	87.3	651
	55 - 64	15.5	84.5	574
	65 - 74	13.5	86.5	542
	75 +	6.9	93.1	717
	Total	12.3	87.7	4891
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	4.0	96.0	787
	Secondaire inférieur	11.6	88.4	887
	Secondaire supérieur	8.3	91.7	1440
	Enseignement supérieur	19.7	80.3	1571
	Total	12.3	87.7	4685
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	11.3	88.7	815
	Zone semi-urbaine	12.5	87.5	1583
	Zone rurale	12.6	87.4	2493
	Total	12.3	87.7	4891
ANNEE D'ENQUETE	1997	8.3	91.7	3604
	2001	10.2	89.8	4834
	2004	12.3	87.7	4891
	Total des années	10.4	89.6	13329

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## REGION WALLONNE

## Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée

OH03_1		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	5.8	94.2	2145
	Femme	7.0	93.0	2394
	Total	6.4	93.6	4539
GROUPE D'AGE	0 - 14	5.9	94.1	667
	15 - 24	5.0	95.0	450
	25 - 34	6.5	93.5	487
	35 - 44	7.4	92.6	608
	45 - 54	5.9	94.1	591
	55 - 64	8.3	91.7	529
	65 - 74	8.7	91.3	510
	75 +	3.7	96.3	697
	Total	6.4	93.6	4539
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	1.0	99.0	767
	Secondaire inférieur	4.7	95.3	817
	Secondaire supérieur	4.2	95.8	1361
	Enseignement supérieur	12.1	87.9	1407
	Total	6.5	93.5	4352
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	5.8	94.2	761
	Zone semi-urbaine	6.5	93.5	1474
	Zone rurale	6.8	93.2	2304
	Total	6.4	93.6	4539
ANNEE D'ENQUETE	2001	5.5	94.5	4586
	2004	6.4	93.6	4539
	Total des années	5.9	94.1	9125

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## REGION WALLONNE

## Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical au cours de l'année passée

OH03_2		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	4.4	95.6	2136
	Femme	5.1	94.9	2378
	Total	4.7	95.3	4514
GROUPE D'AGE	0 - 14	4.0	96.0	667
	15 - 24	3.4	96.6	453
	25 - 34	5.8	94.2	489
	35 - 44	6.8	93.2	619
	45 - 54	5.2	94.8	594
	55 - 64	6.3	93.7	513
	65 - 74	3.3	96.7	494
	75 +	1.6	98.4	685
	Total	4.7	95.3	4514
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	.5	99.5	759
	Secondaire inférieur	4.2	95.8	812
	Secondaire supérieur	3.7	96.3	1355
	Enseignement supérieur	8.0	92.0	1396
	Total	4.8	95.2	4322
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	4.0	96.0	751
	Zone semi-urbaine	4.4	95.6	1462
	Zone rurale	5.4	94.6	2301
	Total	4.7	95.3	4514
ANNEE D'ENQUETE	2001	4.3	95.7	4510
	2004	4.7	95.3	4514
	Total des années	4.5	95.5	9024

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## REGION WALLONNE

## Pourcentage de la population ayant un contact avec un praticien de...

OH0201_1-OH0205_1		homéo- pathie	acu- puncture	ostéo- pathie	chiro- practie	autre médec. alternat.	N
		%	%	%	%	%	
SEXE	Homme	5.0	1.8	5.2	.6	1.0	2281
	Femme	7.1	1.9	5.6	.5	1.7	2577
	Total	6.1	1.8	5.4	.5	1.3	4858
GROUPE D'AGE	0 - 14	6.7	.2	4.4	.2	.8	708
	15 - 24	4.5	.3	4.0	.1	.7	471
	25 - 34	6.4	2.4	7.6	.6	.7	534
	35 - 44	7.0	2.6	8.3	.9	1.6	679
	45 - 54	4.9	2.3	6.2	.9	1.4	642
	55 - 64	7.6	3.3	6.1	.6	2.7	570
	65 - 74	6.7	3.0	2.4	.6	2.7	538
	75 +	4.1	1.5	1.5	.6	.7	716
	Total	6.1	1.8	5.4	.5	1.3	4858
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	1.8	1.5	2.0	.2	.0	787
	Secondaire inférieur	6.0	2.5	3.2	.4	2.2	879
	Secondaire supérieur	3.4	1.5	4.2	.4	.8	1436
	Enseignement supérieur	10.8	2.1	9.1	.8	1.5	1553
	Total	6.2	1.9	5.5	.5	1.2	4655
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	5.8	.9	4.6	.5	2.0	806
	Zone semi-urbaine	5.4	2.4	5.8	.6	1.1	1579
	Zone rurale	6.8	1.9	5.6	.6	1.2	2473
	Total	6.1	1.8	5.4	.5	1.3	4858
ANNEE D'ENQUETE	1997	4.2	1.3	.	.	1.1	3604
	2001	5.3	1.3	4.1	.6	.9	4794
	2004	6.1	1.8	5.4	.5	1.3	4858
	Total des années	5.2	1.5	4.8	.6	1.1	13256

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

## Tableaux standardisés

### *Belgique*

OH02_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée	816
OH03_1	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée	817
OH03_2	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical, au cours de l'année passée	818
OH0201_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'homéopathie au cours de l'année passée	819
OH0202_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'acupuncture au cours de l'année passée	820
OH0203_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'ostéopathie au cours de l'année passée	821
OH0204_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de la chiropractie au cours de l'année passée	822
OH0205_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de médecine alternative au cours de l'année passée	823

### *Région flamande*

OH02_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée	824
OH03_1	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée	825
OH03_2	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical, au cours de l'année passée	826
OH0201_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'homéopathie au cours de l'année passée	827
OH0202_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'acupuncture au cours de l'année passée	828
OH0203_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'ostéopathie au cours de l'année passée	829
OH0204_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de la chiropractie au cours de l'année passée	830
OH0205_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de médecine alternative au cours de l'année passée	831

**Région bruxelloise**

OH02_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée	832
OH03_1	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée	833
OH03_2	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical, au cours de l'année passée	834
OH0201_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'homéopathie au cours de l'année passée	835
OH0202_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'acupuncture au cours de l'année passée	836
OH0203_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'ostéopathie au cours de l'année passée	837
OH0204_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de la chiropractie au cours de l'année passée	838
OH0205_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de médecine alternative au cours de l'année passée	839

**Région wallonne**

OH02_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée	840
OH03_1	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée	841
OH03_2	Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical, au cours de l'année passée	842
OH0201_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'homéopathie au cours de l'année passée	843
OH0202_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'acupuncture au cours de l'année passée	844
OH0203_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'ostéopathie au cours de l'année passée	845
OH0204_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de la chiropractie au cours de l'année passée	846
OH0205_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de médecine alternative au cours de l'année passée	847

OH02\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée

Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	10,2	9,7 (8,6-11,0)	5964
Femme	12,8	12,5 (11,3-13,8)	6739
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	9,9	9,8 (7,7-12,4)	1702
15-24	8,4	8,3 (5,9-11,5)	1237
25-34	14,2	14,2 (11,9-16,8)	1565
35-44	15,1	15,1 (12,9-17,5)	1757
45-54	13,6	13,5 (11,3-16,0)	1620
55-64	11,4	11,3 (9,2-13,8)	1405
65-74	9,6	9,4 (7,6-11,6)	1509
75+	6,1	5,9 (4,5-7,7)	1908
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	4,0	3,8 (2,7-5,4)	2040
Secondaire inférieur	7,7	7,4 (6,0-9,1)	2175
Secondaire supérieur	9,5	9,3 (7,7-11,1)	3585
Enseignement supérieur	17,4	17,1 (15,1-19,3)	4432
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	11,4	10,9 (9,4-12,6)	5165
Zone semi-urbaine	10,9	10,5 (8,9-12,3)	3782
Zone rurale	12,3	11,9 (10,1-13,9)	3756
<b>REGION</b>			
Région flamande	10,8	10,4 (9,0-12,0)	4459
Région bruxelloise	12,8	12,2 (10,7-14,0)	3351
Région wallonne	12,3	11,8 (10,4-13,4)	4893
<b>ANNEE</b>			
1997	8,2	7,5 (6,7-8,5)	10118
2001	11,2	10,6 (9,8-11,6)	11755
2004	11,5	10,9 (10,0-12,0)	12703

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique



## OH03\_1 Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée

Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	5,4	5,1 (4,3-6,1)	5647
Femme	6,4	6,2 (5,3-7,3)	6226
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	6,6	6,6 (4,7-9,1)	1614
15-24	4,1	4,1 (2,6-6,4)	1179
25-34	6,0	6,0 (4,6-7,9)	1428
35-44	7,8	7,8 (6,1-10,0)	1595
45-54	6,8	6,8 (5,1-8,9)	1479
55-64	4,7	4,7 (3,5-6,3)	1302
65-74	5,5	5,5 (3,9-7,5)	1430
75+	3,1	3,0 (2,1-4,4)	1846
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,5	1,5 (0,9-2,4)	1990
Secondaire inférieur	3,7	3,6 (2,6-5,0)	2063
Secondaire supérieur	4,6	4,5 (3,3-6,1)	3377
Enseignement supérieur	9,8	9,6 (7,9-11,6)	4003
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	5,4	5,2 (4,1-6,5)	4823
Zone semi-urbaine	5,8	5,6 (4,3-7,3)	3552
Zone rurale	6,6	6,3 (4,9-8,0)	3498
<b>VERBLIJFPLAATS</b>			
Région flamande	5,5	5,3 (4,3-6,7)	4214
Région bruxelloise	6,2	6,0 (4,9-7,4)	3118
Région wallonne	6,4	6,2 (5,0-7,6)	4541
<b>ANNEE</b>			
2001	6,0	5,7 (5,1-6,4)	11071
2004	5,9	5,6 (4,8-6,5)	11873

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH03\_2 Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical, au cours de l'année passée

Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	3,9	3,6 (3,0-4,3)	5620
Femme	5,2	4,9 (4,2-5,7)	6205
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	3,5	3,4 (2,4-4,9)	1599
15-24	2,9	2,9 (1,8-4,6)	1176
25-34	6,1	6,0 (4,5-8,1)	1432
35-44	6,5	6,4 (5,1-8,2)	1608
45-54	6,2	6,2 (4,7-8,1)	1482
55-64	4,9	4,9 (3,3-7,1)	1293
65-74	2,8	2,7 (1,9-3,8)	1413
75+	2,0	2,0 (1,2-3,2)	1822
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,3	1,3 (0,7-2,5)	1983
Secondaire inférieur	2,8	2,6 (1,9-3,7)	2041
Secondaire supérieur	4,1	3,9 (3,0-5,0)	3375
Enseignement supérieur	7,1	6,7 (5,6-8,0)	3978
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	5,0	4,6 (3,7-5,7)	4814
Zone semi-urbaine	3,8	3,5 (2,8-4,4)	3524
Zone rurale	5,1	4,8 (3,8-6,0)	3487
<b>VERBLIJFPLAATS</b>			
Région flamande	4,3	3,9 (3,2-4,8)	4187
Région bruxelloise	6,0	5,5 (4,5-6,7)	3122
Région wallonne	4,7	4,4 (3,5-5,4)	4516
<b>ANNEE</b>			
2001	4,5	4,1 (3,6-4,7)	10880
2004	4,6	4,1 (3,6-4,8)	11825

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0201\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'homéopathie au cours de l'année passée

Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	4,8	4,5 (3,7-5,5)	6027
Femme	6,9	6,7 (5,8-7,8)	6819
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	7,3	7,2 (5,4-9,7)	1713
15-24	5,4	5,3 (3,3-8,4)	1248
25-34	6,9	6,8 (5,2-8,9)	1583
35-44	6,0	5,9 (4,5-7,7)	1777
45-54	6,0	5,9 (4,5-7,7)	1621
55-64	5,2	5,1 (3,7-6,9)	1416
65-74	5,2	5,0 (3,7-6,7)	1535
75+	2,5	2,3 (1,6-3,4)	1953
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,9	1,8 (1,1-3,0)	2068
Secondaire inférieur	3,5	3,4 (2,5-4,7)	2205
Secondaire supérieur	4,4	4,2 (3,0-5,7)	3623
Enseignement supérieur	9,6	9,3 (7,7-11,2)	4467
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	5,6	5,3 (4,2-6,6)	5252
Zone semi-urbaine	5,5	5,3 (4,1-6,8)	3804
Zone rurale	6,5	6,2 (4,8-7,9)	3790
<b>REGION</b>			
Région flamande	5,7	5,4 (4,3-6,7)	4480
Région bruxelloise	6,2	5,8 (4,7-7,2)	3423
Région wallonne	6,1	5,7 (4,7-7,0)	4943
<b>ANNEE</b>			
1997	3,9	3,6 (3,0-4,3)	10118
2001	5,9	5,6 (5,0-6,4)	12027
2004	5,9	5,6 (4,8-6,4)	12846

\* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

## OH0202\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'acupuncture au cours de l'année passée

Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	1,5	1,4 (1,0-1,9)	6019
Femme	1,6	1,5 (1,1-1,9)	6815
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	0,6	0,6 (0,3-1,4)	1710
15-24	0,9	0,9 (0,3-2,4)	1248
25-34	1,8	1,8 (1,2-2,7)	1580
35-44	2,5	2,5 (1,6-3,9)	1775
45-54	1,5	1,5 (0,9-2,4)	1620
55-64	2,4	2,4 (1,3-4,1)	1416
65-74	1,9	1,9 (1,2-2,9)	1532
75+	1,3	1,3 (0,8-2,2)	1953
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,1	0,9 (0,4-1,7)	2071
Secondaire inférieur	1,3	1,1 (0,7-1,9)	2203
Secondaire supérieur	1,3	1,2 (0,8-1,8)	3619
Enseignement supérieur	2,2	2,1 (1,5-2,9)	4458
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	1,4	1,3 (0,9-1,9)	5249
Zone semi-urbaine	1,4	1,3 (0,9-1,8)	3800
Zone rurale	1,9	1,7 (1,2-2,6)	3785
<b>REGION</b>			
Région flamande	1,4	1,3 (0,9-1,8)	4478
Région bruxelloise	1,7	1,5 (1,1-2,1)	3420
Région wallonne	1,8	1,7 (1,3-2,2)	4936
<b>ANNEE</b>			
1997	1,2	1,1 (0,8-1,4)	10116
2001	1,5	1,3 (1,0-1,6)	12018
2004	1,6	1,4 (1,1-1,7)	12834

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0203\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'ostéopathie au cours de l'année passée

Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	3,8	3,4 (2,8-4,1)	6021
Femme	4,8	4,4 (3,7-5,1)	6811
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	3,3	3,2 (2,2-4,8)	1712
15-24	2,0	2,0 (1,1-3,5)	1249
25-34	5,7	5,7 (4,4-7,4)	1580
35-44	6,8	6,7 (5,3-8,5)	1776
45-54	5,7	5,7 (4,4-7,3)	1618
55-64	4,2	4,1 (3,0-5,6)	1416
65-74	2,7	2,7 (1,9-3,8)	1529
75+	1,9	1,8 (1,1-3,0)	1952
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,3	1,3 (0,7-2,2)	2071
Secondaire inférieur	2,5	2,4 (1,7-3,4)	2200
Secondaire supérieur	3,5	3,2 (2,5-4,1)	3618
Enseignement supérieur	6,7	6,1 (5,1-7,4)	4462
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	4,2	3,7 (3,0-4,7)	5248
Zone semi-urbaine	4,1	3,7 (3,0-4,6)	3799
Zone rurale	4,6	4,2 (3,3-5,2)	3785
<b>VERBLIJFPLAATS</b>			
Région flamande	3,4	3,1 (2,5-3,7)	4472
Région bruxelloise	5,6	5,1 (4,2-6,2)	3420
Région wallonne	5,4	4,9 (4,0-6,1)	4940
<b>ANNEE</b>			
2001	3,9	3,5 (3,0-4,0)	12012
2004	4,3	3,8 (3,4-4,4)	12832

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0204\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de la chiropractie au cours de l'année passée

Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	1,7	1,3 (0,9-1,9)	6010
Femme	1,4	1,2 (0,9-1,6)	6805
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	0,5	0,5 (0,2-1,5)	1710
15-24	0,8	0,8 (0,3-1,9)	1247
25-34	2,0	2,0 (1,2-3,4)	1578
35-44	3,4	3,4 (2,3-5,0)	1775
45-54	2,2	2,2 (1,4-3,4)	1617
55-64	1,1	1,1 (0,6-2,1)	1411
65-74	0,8	0,8 (0,4-1,5)	1529
75+	0,7	0,7 (0,3-1,5)	1948
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	0,3	0,2 (0,1-0,6)	2067
Secondaire inférieur	1,1	0,9 (0,5-1,8)	2200
Secondaire supérieur	1,7	1,4 (1,0-2,0)	3617
Enseignement supérieur	2,1	1,7 (1,1-2,5)	4449
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	1,7	1,4 (1,0-2,0)	5240
Zone semi-urbaine	1,7	1,4 (0,9-2,1)	3799
Zone rurale	1,2	1,0 (0,6-1,6)	3776
<b>VERBLIJFPLAATS</b>			
Région flamande	2,3	1,8 (1,4-2,5)	4474
Région bruxelloise	0,6	0,5 (0,3-0,8)	3413
Région wallonne	0,6	0,4 (0,3-0,7)	4928
<b>ANNEE</b>			
2001	1,6	1,2 (1,0-1,6)	12012
2004	1,6	1,2 (0,9-1,6)	12815

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0205\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de médecine alternative au cours de l'année passée

Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	0,9	0,9 (0,6-1,2)	5937
Femme	1,8	1,7 (1,3-2,2)	6697
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	1,1	1,1 (0,6-1,9)	1695
15-24	0,6	0,6 (0,3-1,3)	1235
25-34	1,2	1,2 (0,8-1,9)	1555
35-44	1,3	1,3 (0,8-2,0)	1748
45-54	2,2	2,1 (1,3-3,4)	1597
55-64	1,7	1,7 (1,0-2,8)	1401
65-74	1,6	1,5 (0,8-2,8)	1497
75+	1,0	0,9 (0,4-1,9)	1906
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	0,5	0,4 (0,2-1,1)	2039
Secondaire inférieur	1,2	1,0 (0,6-1,7)	2166
Secondaire supérieur	1,0	0,9 (0,6-1,4)	3568
Enseignement supérieur	1,9	1,8 (1,3-2,5)	4394
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	1,5	1,4 (1,0-1,9)	5128
Zone semi-urbaine	1,5	1,3 (0,9-2,0)	3776
Zone rurale	1,0	0,9 (0,6-1,4)	3730
<b>REGION</b>			
Région flamande	1,3	1,1 (0,8-1,6)	4446
Région bruxelloise	1,9	1,8 (1,3-2,5)	3328
Région wallonne	1,3	1,2 (0,8-1,7)	4860
<b>ANNEE</b>			
1997	0,8	0,8 (0,5-1,2)	10114
2001	0,9	0,9 (0,7-1,1)	11663
2004	1,4	1,3 (1,0-1,6)	12634

\* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

## OH02\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée

Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	9,4	8,9 (7,3-10,7)	2143
Femme	12,2	11,7 (10,0-13,7)	2316
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	10,3	10,3 (7,2-14,5)	543
15-24	8,4	8,4 (5,0-13,8)	435
25-34	13,7	13,6 (10,3-17,7)	531
35-44	14,8	14,8 (11,7-18,5)	606
45-54	13,3	13,2 (10,1-17,1)	598
55-64	8,8	8,7 (6,0-12,4)	522
65-74	7,6	7,4 (5,3-10,4)	594
75+	4,6	4,5 (2,7-7,3)	630
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	3,7	3,8 (2,3-6,2)	740
Secondaire inférieur	5,3	5,2 (3,5-7,7)	725
Secondaire supérieur	10,6	10,1 (7,8-13,1)	1366
Enseignement supérieur	15,6	15,1 (12,4-18,3)	1509
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	10,5	9,9 (7,3-13,1)	999
Zone semi-urbaine	10,3	9,7 (7,8-12,0)	2198
Zone rurale	12,1	11,5 (8,8-14,8)	1262
<b>ANNEE</b>			
1997	8,0	7,3 (6,1-8,7)	3498
2001	11,2	10,5 (9,3-11,9)	4059
2004	10,8	10,2 (8,8-11,8)	4459

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique



OH03\_1 Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée

Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	5,2	4,6 (3,5-6,0)	2054
Femme	5,9	5,5 (4,2-7,1)	2160
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	7,5	7,5 (4,8-11,6)	523
15-24	3,6	3,6 (1,8-7,1)	416
25-34	5,0	5,0 (3,2-7,7)	487
35-44	8,3	8,3 (5,8-11,7)	555
45-54	7,0	7,0 (4,7-10,5)	558
55-64	2,7	2,7 (1,4-5,0)	491
65-74	4,1	4,1 (2,4-7,0)	569
75+	2,2	2,2 (1,1-4,4)	615
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,6	1,6 (0,8-3,1)	722
Secondaire inférieur	3,0	2,9 (1,6-5,0)	705
Secondaire supérieur	5,0	4,7 (3,0-7,4)	1279
Enseignement supérieur	8,6	7,9 (5,8-10,8)	1395
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	4,5	4,1 (2,6-6,4)	944
Zone semi-urbaine	5,5	5,1 (3,6-7,2)	2077
Zone rurale	6,4	5,8 (3,9-8,6)	1193
<b>ANNEE</b>			
2001	5,9	5,5 (4,6-6,6)	3818
2004	5,5	5,1 (4,1-6,5)	4214

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH03\_2 Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical, au cours de l'année passée

Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	3,5	3,1 (2,4-4,2)	2030
Femme	5,0	4,6 (3,6-5,8)	2157
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	2,9	2,8 (1,6-4,9)	503
15-24	2,4	2,4 (1,1-5,2)	411
25-34	5,8	5,7 (3,5-9,2)	484
35-44	6,2	6,2 (4,3-8,8)	557
45-54	6,7	6,7 (4,5-9,7)	559
55-64	4,1	4,1 (2,1-7,7)	494
65-74	2,2	2,2 (1,3-3,6)	566
75+	1,8	1,7 (0,7-4,1)	613
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,8	1,7 (0,7-4,0)	724
Secondaire inférieur	1,8	1,7 (0,9-3,2)	697
Secondaire supérieur	4,6	4,1 (2,9-5,9)	1282
Enseignement supérieur	6,0	5,5 (4,0-7,3)	1370
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	4,8	4,3 (2,8-6,6)	941
Zone semi-urbaine	3,6	3,2 (2,4-4,3)	2061
Zone rurale	4,9	4,4 (3,0-6,4)	1185
<b>ANNEE</b>			
2001	4,4	3,8 (3,1-4,7)	3765
2004	4,3	3,7 (3,0-4,6)	4187

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0201\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'homéopathie au cours de l'année passée

Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	4,6	4,1 (3,0-5,6)	2151
Femme	6,7	6,1 (4,9-7,7)	2329
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	8,0	7,9 (5,2-11,8)	543
15-24	5,9	5,8 (2,9-11,4)	437
25-34	7,2	7,1 (4,7-10,7)	532
35-44	5,5	5,4 (3,5-8,3)	608
45-54	6,0	5,9 (3,9-8,8)	598
55-64	3,8	3,7 (2,1-6,4)	524
65-74	4,7	4,6 (3,0-6,9)	597
75+	0,9	0,9 (0,3-2,1)	641
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,9	2,0 (0,9-4,2)	743
Secondaire inférieur	1,9	1,8 (0,9-3,6)	732
Secondaire supérieur	5,1	4,6 (3,0-7,1)	1366
Enseignement supérieur	8,8	7,9 (5,8-10,7)	1517
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	5,1	4,4 (2,7-7,1)	1002
Zone semi-urbaine	5,6	5,0 (3,6-6,9)	2208
Zone rurale	6,3	5,6 (3,7-8,5)	1270
<b>ANNEE</b>			
1997	3,6	3,3 (2,5-4,5)	3499
2001	6,0	5,6 (4,7-6,8)	4078
2004	5,7	5,3 (4,2-6,7)	4480

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0202\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'acupuncture au cours de l'année passée

Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	1,5	1,3 (0,8-2,1)	2150
Femme	1,4	1,3 (0,9-2,0)	2328
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	0,9	0,9 (0,3-2,4)	543
15-24	1,4	1,4 (0,4-4,2)	436
25-34	1,5	1,5 (0,7-2,9)	531
35-44	2,5	2,5 (1,3-4,8)	609
45-54	0,8	0,8 (0,4-1,8)	597
55-64	1,9	1,9 (0,7-5,3)	524
65-74	1,3	1,3 (0,6-2,7)	597
75+	0,9	0,9 (0,3-2,4)	641
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	0,9	0,8 (0,3-1,9)	744
Secondaire inférieur	0,6	0,5 (0,2-2,0)	730
Secondaire supérieur	1,3	1,2 (0,6-2,1)	1366
Enseignement supérieur	2,1	2,0 (1,3-3,2)	1516
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	1,6	1,4 (0,7-2,8)	1003
Zone semi-urbaine	1,1	1,0 (0,6-1,6)	2206
Zone rurale	1,9	1,8 (1,0-3,2)	1269
<b>ANNEE</b>			
1997	1,1	1,0 (0,7-1,5)	3497
2001	1,5	1,4 (1,0-1,9)	4074
2004	1,4	1,3 (0,9-1,9)	4478

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0203\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'ostéopathie au cours de l'année passée

Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	2,8	2,4 (1,7-3,2)	2149
Femme	4,0	3,4 (2,6-4,5)	2323
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	2,7	2,7 (1,5-4,8)	544
15-24	0,7	0,7 (0,3-1,9)	435
25-34	4,1	4,1 (2,5-6,7)	531
35-44	5,9	5,9 (4,0-8,5)	607
45-54	5,0	4,9 (3,2-7,5)	594
55-64	2,7	2,7 (1,5-5,0)	524
65-74	2,4	2,3 (1,4-4,0)	597
75+	1,8	1,7 (0,8-3,8)	640
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	0,8	0,7 (0,3-1,5)	743
Secondaire inférieur	2,0	1,7 (0,9-3,2)	729
Secondaire supérieur	3,2	2,7 (1,9-3,9)	1363
Enseignement supérieur	5,0	4,3 (3,2-5,8)	1515
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	2,8	2,4 (1,5-3,7)	1002
Zone semi-urbaine	3,5	2,9 (2,1-4,0)	2203
Zone rurale	3,8	3,2 (2,2-4,7)	1267
<b>ANNEE</b>			
2001	3,5	3,2 (2,5-4,0)	4074
2004	3,4	3,1 (2,5-3,8)	4472

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0204\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de la chiropractie au cours de l'année passée

Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	2,4	1,9 (1,2-2,9)	2150
Femme	2,1	1,7 (1,2-2,4)	2324
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	0,8	0,8 (0,2-2,7)	544
15-24	1,4	1,4 (0,6-3,4)	435
25-34	3,1	3,1 (1,8-5,5)	530
35-44	5,2	5,2 (3,4-7,9)	608
45-54	3,1	3,1 (1,8-5,1)	598
55-64	1,4	1,4 (0,6-3,0)	522
65-74	0,9	1,0 (0,4-2,2)	597
75+	0,8	0,8 (0,3-2,5)	640
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	0,3	0,3 (0,1-1,0)	741
Secondaire inférieur	1,7	1,5 (0,7-3,2)	731
Secondaire supérieur	2,6	2,1 (1,4-3,1)	1366
Enseignement supérieur	2,9	2,3 (1,5-3,6)	1514
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	3,2	2,6 (1,7-3,9)	1003
Zone semi-urbaine	2,1	1,7 (1,1-2,7)	2207
Zone rurale	1,7	1,4 (0,8-2,4)	1264
<b>ANNEE</b>			
2001	2,3	1,7 (1,3-2,3)	4077
2004	2,3	1,8 (1,3-2,4)	4474

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0205\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de médecine alternative au cours de l'année passée

Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	0,9	0,7 (0,4-1,3)	2136
Femme	1,7	1,4 (0,9-2,2)	2310
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	1,3	1,3 (0,6-2,9)	543
15-24	0,3	0,3 (0,1-1,4)	435
25-34	1,0	1,0 (0,4-2,1)	529
35-44	1,1	1,1 (0,5-2,2)	602
45-54	2,7	2,6 (1,4-5,0)	593
55-64	1,4	1,3 (0,7-2,7)	522
65-74	1,0	0,9 (0,3-2,6)	590
75+	0,8	0,7 (0,2-2,9)	632
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	0,7	0,5 (0,1-1,9)	741
Secondaire inférieur	0,5	0,4 (0,1-1,4)	725
Secondaire supérieur	1,1	0,9 (0,5-1,7)	1357
Enseignement supérieur	2,0	1,7 (1,1-2,6)	1505
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	1,0	0,8 (0,4-1,7)	994
Zone semi-urbaine	1,6	1,3 (0,8-2,2)	2196
Zone rurale	0,9	0,7 (0,4-1,5)	1256
<b>ANNEE</b>			
1997	0,8	0,7 (0,4-1,3)	3494
2001	0,9	0,8 (0,5-1,2)	4046
2004	1,3	1,1 (0,8-1,6)	4446

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH02\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée

Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	10,3	9,9 (8,1-12,0)	1529
Femme	15,0	14,5 (12,5-16,8)	1822
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	8,1	8,0 (5,5-11,6)	447
15-24	8,2	8,1 (5,2-12,3)	328
25-34	16,3	16,2 (12,4-20,8)	497
35-44	13,7	13,6 (10,4-17,7)	467
45-54	18,4	18,1 (13,8-23,4)	371
55-64	14,3	14,1 (9,8-19,7)	309
65-74	10,7	10,2 (7,3-14,2)	372
75+	12,2	11,3 (8,1-15,5)	560
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	4,9	4,7 (2,6-8,5)	513
Secondaire inférieur	8,4	7,9 (5,6-11,0)	563
Secondaire supérieur	7,8	7,5 (5,6-10,1)	779
Enseignement supérieur	20,4	19,7 (16,5-23,3)	1351
<b>ANNEE</b>			
1997	8,6	7,9 (6,6-9,5)	3016
2001	14,0	13,3 (11,8-15,0)	2862
2004	12,8	12,1 (10,6-13,9)	3351

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique



OH03\_1 Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée

Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	5,4	5,1 (3,8-6,8)	1448
Femme	7,1	6,7 (5,3-8,5)	1670
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	3,7	3,7 (2,2-6,1)	424
15-24	4,3	4,3 (2,2-8,2)	313
25-34	9,3	9,3 (6,0-14,0)	454
35-44	6,8	6,8 (4,5-9,9)	432
45-54	7,6	7,6 (5,0-11,3)	330
55-64	6,4	6,3 (3,1-12,4)	282
65-74	4,9	4,8 (2,8-8,1)	350
75+	6,7	6,4 (3,8-10,3)	533
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	2,8	2,8 (1,0-7,1)	501
Secondaire inférieur	5,0	4,8 (3,0-7,6)	541
Secondaire supérieur	3,1	3,0 (1,9-4,7)	737
Enseignement supérieur	10,2	9,7 (7,3-12,7)	1200
<b>ANNEE</b>			
2001	8,1	7,7 (6,4-9,1)	2667
2004	6,2	5,9 (4,7-7,3)	3118

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH03\_2 Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical, au cours de l'année passée

Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	5,4	5,1 (3,8-6,8)	1454
Femme	6,5	6,3 (5,1-7,9)	1668
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	4,8	4,8 (2,9-8,0)	429
15-24	3,4	3,4 (1,8-6,2)	312
25-34	7,8	7,9 (5,4-11,3)	459
35-44	7,1	7,1 (4,8-10,6)	432
45-54	8,0	8,0 (5,1-12,3)	329
55-64	5,7	5,7 (3,5-9,1)	286
65-74	5,0	4,9 (3,1-7,8)	352
75+	4,4	4,3 (2,2-7,9)	523
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,2	1,2 (0,5-3,1)	500
Secondaire inférieur	3,5	3,4 (2,0-5,7)	532
Secondaire supérieur	3,3	3,3 (2,1-5,0)	738
Enseignement supérieur	10,4	10,1 (7,9-12,9)	1211
<b>ANNEE</b>			
2001	5,7	5,3 (4,4-6,4)	2605
2004	6,0	5,6 (4,5-6,9)	3122

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0201\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'homéopathie au cours de l'année passée

Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	5,0	4,8 (3,6-6,4)	1558
Femme	7,3	7,1 (5,7-8,9)	1865
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	5,8	5,8 (3,7-8,9)	453
15-24	5,2	5,1 (2,9-8,9)	337
25-34	6,8	6,7 (4,1-10,7)	507
35-44	5,6	5,5 (3,5-8,6)	477
45-54	9,7	9,5 (6,5-13,6)	373
55-64	6,4	6,3 (3,3-11,7)	314
65-74	3,6	3,5 (1,9-6,4)	382
75+	5,5	5,1 (3,0-8,5)	580
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,9	1,8 (0,6-5,9)	528
Secondaire inférieur	4,2	4,0 (2,4-6,7)	578
Secondaire supérieur	2,9	2,8 (1,7-4,6)	801
Enseignement supérieur	10,6	10,3 (7,9-13,3)	1366
<b>ANNEE</b>			
1997	4,1	3,9 (3,0-5,0)	3015
2001	7,3	6,9 (5,8-8,2)	2977
2004	6,2	5,9 (4,8-7,3)	3423

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0202\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'acupuncture au cours de l'année passée

Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	1,1	0,8 (0,4-1,7)	1557
Femme	2,2	1,6 (1,0-2,4)	1863
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	0,5	0,5 (0,1-2,4)	451
15-24	0,1	0,1 (0,0-0,9)	338
25-34	1,6	1,5 (0,6-3,6)	506
35-44	2,2	2,1 (1,2-3,7)	476
45-54	3,0	2,8 (1,5-5,2)	373
55-64	1,4	1,3 (0,6-3,0)	315
65-74	2,9	2,7 (1,4-4,9)	381
75+	3,1	2,7 (1,4-5,1)	580
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	0,7	0,4 (0,2-1,1)	529
Secondaire inférieur	1,5	0,9 (0,5-1,8)	579
Secondaire supérieur	0,5	0,4 (0,2-0,9)	800
Enseignement supérieur	2,7	2,0 (1,1-3,6)	1362
<b>ANNEE</b>			
1997	1,5	1,1 (0,7-1,7)	3016
2001	1,9	1,4 (1,0-2,0)	2975
2004	1,7	1,3 (0,8-2,0)	3420

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0203\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'ostéopathie au cours de l'année passée

Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	4,7	4,1 (3,0-5,6)	1557
Femme	6,5	5,8 (4,6-7,2)	1863
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	2,2	2,2 (1,0-4,6)	452
15-24	2,3	2,3 (1,1-4,7)	338
25-34	8,2	8,1 (5,7-11,3)	506
35-44	7,1	7,1 (4,7-10,4)	477
45-54	9,0	8,9 (5,8-13,4)	372
55-64	6,7	6,6 (4,1-10,4)	314
65-74	6,4	6,2 (4,1-9,3)	381
75+	3,0	2,8 (1,5-5,3)	580
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,6	1,5 (0,5-4,2)	530
Secondaire inférieur	3,1	2,8 (1,6-4,9)	577
Secondaire supérieur	3,4	3,1 (2,0-4,7)	801
Enseignement supérieur	9,6	8,5 (6,5-11,0)	1363
<b>ANNEE</b>			
2001	5,5	4,6 (3,8-5,6)	2972
2004	5,6	4,8 (3,8-5,9)	3420

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0204\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de la chiropractie au cours de l'année passée

Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	0,7	0,1 (0,1-0,2)	1551
Femme	0,6	0,1 (0,0-0,2)	1858
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	0,2	0,2 (0,0-1,2)	450
15-24	0,9	0,0 (0,0-0,0)	336
25-34	1,0	0,9 (0,2-3,0)	504
35-44	0,9	1,0 (0,4-2,6)	477
45-54	1,5	0,9 (0,3-2,5)	370
55-64	0,5	1,5 (0,6-3,7)	315
65-74	0,2	0,5 (0,1-2,0)	380
75+	0,2	0,2 (0,1-1,1)	577
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	0,5	0,0 (0,0-0,1)	528
Secondaire inférieur	1,1	0,0 (0,0-0,0)	576
Secondaire supérieur	1,0	0,1 (0,0-0,2)	795
Enseignement supérieur	0,6	0,2 (0,1-0,3)	1361
<b>ANNEE</b>			
2001		0,7 (0,4-1,2)	2970
2004		0,5 (0,3-0,9)	3409

\* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

## OH0205\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de médecine alternative au cours de l'année passée

Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	1,3	1,1 (0,7-1,9)	1520
Femme	2,5	2,2 (1,5-3,3)	1808
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	0,9	0,8 (0,3-2,4)	444
15-24	1,8	1,7 (0,8-3,8)	329
25-34	3,5	3,4 (1,9-6,0)	492
35-44	2,0	1,9 (0,9-4,2)	467
45-54	1,7	1,6 (0,8-3,5)	362
55-64	0,7	0,7 (0,2-2,1)	309
65-74	2,1	1,9 (0,7-4,7)	368
75+	2,9	2,6 (1,1-5,6)	557
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,0	0,8 (0,3-2,3)	511
Secondaire inférieur	2,0	1,5 (0,8-3,1)	562
Secondaire supérieur	1,5	1,2 (0,5-2,5)	775
Enseignement supérieur	2,5	2,0 (1,2-3,2)	1335
<b>ANNEE</b>			
1997	0,5	0,4 (0,3-0,8)	3016
2001	1,6	1,4 (1,0-2,1)	2823
2004	1,9	1,7 (1,3-2,4)	3328

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH02\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de thérapie non-conventionnelle au cours de l'année passée

Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	11,4	11,0 (9,2-13,0)	2292
Femme	13,1	12,8 (11,1-14,9)	2601
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	9,7	9,7 (6,8-13,6)	712
15-24	8,3	8,3 (5,1-13,2)	474
25-34	14,4	14,4 (11,0-18,6)	537
35-44	16,1	16,0 (12,8-19,8)	684
45-54	12,8	12,8 (9,7-16,6)	651
55-64	15,5	15,5 (12,0-19,6)	574
65-74	13,4	13,3 (9,6-17,9)	543
75+	6,8	6,6 (4,3-10,0)	718
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	4,0	3,8 (2,2-6,7)	787
Secondaire inférieur	11,6	11,1 (8,4-14,4)	887
Secondaire supérieur	8,2	8,1 (6,3-10,5)	1440
Enseignement supérieur	19,9	19,5 (16,3-23,2)	1572
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	11,2	10,9 (8,0-14,8)	815
Zone semi-urbaine	12,6	12,1 (9,7-15,1)	1584
Zone rurale	12,7	12,3 (10,3-14,6)	2494
<b>ANNEE</b>			
1997	8,3	7,7 (6,4-9,3)	3604
2001	10,2	9,8 (8,6-11,2)	4834
2004	12,3	11,8 (10,3-13,4)	4893

- Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique



OH03\_1 Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un médecin au cours de l'année passée

Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	5,8	5,7 (4,3-7,4)	2145
Femme	7,0	6,9 (5,5-8,6)	2396
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	5,9	5,9 (3,4-10,0)	667
15-24	5,1	5,0 (2,4-10,1)	450
25-34	6,5	6,5 (4,1-10,0)	487
35-44	7,4	7,4 (5,0-10,7)	608
45-54	6,1	6,1 (3,9-9,3)	591
55-64	8,3	8,2 (5,9-11,4)	529
65-74	8,6	8,4 (5,4-12,9)	511
75+	3,6	3,4 (1,9-6,1)	698
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,0	1,0 (0,5-2,0)	767
Secondaire inférieur	4,7	4,4 (2,9-6,7)	817
Secondaire supérieur	4,2	4,2 (2,9-6,1)	1361
Enseignement supérieur	12,1	12,1 (9,1-15,9)	1408
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	5,8	5,6 (3,2-9,8)	761
Zone semi-urbaine	6,5	6,3 (4,3-9,1)	1475
Zone rurale	6,8	6,6 (5,1-8,5)	2305
<b>ANNEE</b>			
2001	5,5	5,1 (4,3-6,1)	4586
2004	6,4	6,0 (4,8-7,4)	4541

- Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH03\_2 Pourcentage de la population ayant suivi une thérapie non-conventionnelle dispensée par un thérapeute paramédical, au cours de l'année passée

Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	4,3	3,9 (3,0-5,1)	2136
Femme	5,1	4,9 (3,8-6,3)	2380
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	4,0	4,0 (2,2-7,1)	667
15-24	3,6	3,6 (1,7-7,3)	453
25-34	5,8	5,8 (3,8-8,9)	489
35-44	6,7	6,7 (4,7-9,4)	619
45-54	4,8	4,8 (3,1-7,3)	594
55-64	6,3	6,3 (3,9-9,8)	513
65-74	3,3	3,2 (1,8-5,7)	495
75+	1,6	1,6 (0,7-3,5)	686
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	0,5	0,5 (0,2-1,4)	759
Secondaire inférieur	4,3	4,2 (2,6-6,5)	812
Secondaire supérieur	3,5	3,4 (2,2-5,2)	1355
Enseignement supérieur	8,1	7,6 (5,8-10,1)	1397
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	3,9	3,7 (2,1-6,5)	751
Zone semi-urbaine	4,3	4,0 (2,8-5,7)	1463
Zone rurale	5,4	5,1 (3,9-6,7)	2302
<b>ANNEE</b>			
2001	4,3	3,9 (3,2-4,9)	4510
2004	4,7	4,3 (3,5-5,3)	4516

- Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0201\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'homéopathie au cours de l'année passée

Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	5,0	4,8 (3,8-6,2)	2318
Femme	7,1	7,0 (5,7-8,7)	2625
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	6,7	6,6 (4,1-10,4)	717
15-24	4,6	4,5 (2,4-8,4)	474
25-34	6,4	6,3 (4,2-9,3)	544
35-44	7,0	6,9 (4,9-9,7)	692
45-54	5,0	4,9 (3,2-7,3)	650
55-64	7,5	7,4 (5,0-10,7)	578
65-74	6,6	6,3 (4,1-9,8)	556
75+	4,2	3,9 (2,2-6,7)	732
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,8	1,7 (0,8-3,4)	797
Secondaire inférieur	6,0	5,7 (3,9-8,4)	895
Secondaire supérieur	3,5	3,3 (2,2-5,1)	1456
Enseignement supérieur	10,8	10,5 (8,1-13,6)	1584
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	5,8	5,6 (3,5-8,9)	827
Zone semi-urbaine	5,4	5,1 (3,5-7,5)	1596
Zone rurale	6,8	6,6 (5,1-8,4)	2520
<b>ANNEE</b>			
1997	4,2	3,9 (3,0-5,0)	3604
2001	5,3	5,0 (4,1-6,2)	4972
2004	6,1	5,8 (4,7-7,0)	4943

❖ Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0202\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'acupuncture au cours de l'année passée

Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	1,8	1,3 (0,8-2,0)	2312
Femme	1,9	1,3 (0,9-1,9)	2624
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	0,2	0,2 (0,1-0,7)	716
15-24	0,3	0,3 (0,1-1,1)	474
25-34	2,4	2,4 (1,2-4,7)	543
35-44	2,6	2,6 (1,4-5,0)	690
45-54	2,2	2,2 (1,0-4,8)	650
55-64	3,4	3,4 (2,0-5,8)	577
65-74	3,0	3,0 (1,6-5,4)	554
75+	1,5	1,5 (0,6-3,5)	732
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	1,5	1,0 (0,3-3,2)	798
Secondaire inférieur	2,5	1,6 (0,9-2,8)	894
Secondaire supérieur	1,5	1,1 (0,6-1,9)	1453
Enseignement supérieur	2,1	1,5 (0,9-2,6)	1580
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	0,9	0,7 (0,3-1,4)	826
Zone semi-urbaine	2,4	1,7 (1,0-2,8)	1594
Zone rurale	1,9	1,4 (0,9-2,0)	2516
<b>ANNEE</b>			
1997	1,3	1,0 (0,6-1,5)	3603
2001	1,3	0,9 (0,7-1,3)	4969
2004	1,8	1,3 (1,0-1,8)	4936

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0203\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de l'ostéopathie au cours de l'année passée

Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	5,2	4,6 (3,5-6,0)	2315
Femme	5,6	5,2 (4,1-6,6)	2625
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	4,4	4,4 (2,5-7,9)	716
15-24	4,0	4,0 (1,8-8,8)	476
25-34	7,6	7,6 (5,2-11,0)	543
35-44	8,3	8,3 (6,0-11,3)	692
45-54	6,1	6,1 (4,1-9,0)	652
55-64	6,1	6,1 (4,2-8,8)	578
65-74	2,4	2,4 (1,3-4,3)	551
75+	1,5	1,5 (0,7-3,3)	732
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	2,0	2,1 (0,9-5,1)	798
Secondaire inférieur	3,3	3,1 (1,9-5,1)	894
Secondaire supérieur	4,0	3,7 (2,5-5,4)	1454
Enseignement supérieur	9,3	8,3 (6,2-10,9)	1584
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	4,5	4,1 (2,3-7,3)	826
Zone semi-urbaine	5,8	5,2 (3,8-7,2)	1596
Zone rurale	5,6	5,1 (3,9-6,5)	2518
<b>ANNEE</b>			
2001	4,1	3,6 (2,9-4,4)	4966
2004	5,4	4,7 (3,8-5,8)	4940

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0204\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de la chiropractie au cours de l'année passée

Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	0,6	0,5 (0,2-0,9)	2307
Femme	0,5	0,4 (0,2-0,8)	2621
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	0,2	0,2 (0,0-1,3)	715
15-24	0,1	0,1 (0,0-0,4)	474
25-34	0,6	0,6 (0,2-1,9)	543
35-44	0,9	0,9 (0,4-1,9)	690
45-54	1,0	1,0 (0,4-2,3)	649
55-64	0,6	0,6 (0,2-1,6)	574
65-74	0,6	0,6 (0,2-1,7)	552
75+	0,5	0,5 (0,2-1,7)	731
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	0,2	0,1 (0,0-0,3)	798
Secondaire inférieur	0,4	0,2 (0,1-0,6)	893
Secondaire supérieur	0,4	0,3 (0,1-0,7)	1452
Enseignement supérieur	0,8	0,5 (0,3-1,0)	1574
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	0,5	0,4 (0,1-1,4)	824
Zone semi-urbaine	0,6	0,4 (0,2-1,0)	1592
Zone rurale	0,6	0,5 (0,3-0,9)	2512
<b>ANNEE</b>			
2001	0,6	0,4 (0,3-0,7)	4965
2004	0,6	0,4 (0,2-0,8)	4928

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique

## OH0205\_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un praticien de médecine alternative au cours de l'année passée

Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
<b>SEXE</b>			
Homme	1,0	0,8 (0,5-1,5)	2281
Femme	1,7	1,5 (1,0-2,2)	2579
<b>GROUPE D'AGE</b>			
0-14	0,7	0,7 (0,3-1,7)	708
15-24	0,9	0,8 (0,2-3,0)	471
25-34	0,7	0,7 (0,2-1,8)	534
35-44	1,6	1,5 (0,8-2,9)	679
45-54	1,3	1,3 (0,6-2,6)	642
55-64	2,7	2,6 (1,2-5,7)	570
65-74	2,7	2,5 (1,0-6,2)	539
75+	0,7	0,6 (0,1-2,4)	717
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>			
Primaire ou sans diplôme	0,0	0,0 (0,0-0,1)	787
Secondaire inférieur	2,2	1,7 (0,9-3,1)	879
Secondaire supérieur	0,8	0,7 (0,3-1,3)	1436
Enseignement supérieur	1,6	1,4 (0,8-2,4)	1554
<b>DEGRE D'URBANISATION</b>			
Zone urbaine	1,9	1,6 (0,8-3,1)	806
Zone semi-urbaine	1,1	0,9 (0,5-1,9)	1580
Zone rurale	1,2	1,0 (0,6-1,7)	2474
<b>ANNEE</b>			
1997	1,1	1,0 (0,6-1,8)	3604
2001	0,9	0,8 (0,6-1,2)	4794
2004	1,3	1,2 (0,9-1,8)	4860

\* Corrigé pour age et/ou sexe sur base d'un model de régression logistique