

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$01)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN KINESITHERAPEUTE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	11,5	88,5	4944
Femme	17,5	82,5	5180
Total	14,5	85,5	10124
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	5,7	94,3	1618
15-24	11,9	88,1	1142
25-34	16,3	83,7	1635
35-44	16,3	83,7	1601
45-54	13,6	86,4	1287
55-64	16,9	83,1	1091
65-74	19,4	80,6	1074
75 +	31,1	68,9	676
Total	14,5	85,5	10124
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	15,9	84,1	349
Ecole primaire	15,4	84,6	1281
Secondaire inférieur	14,4	85,6	1657
Secondaire supérieur	14,2	85,8	2926
Supérieur	14,4	85,6	3494
Total	14,5	85,5	9707
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	12,0	88,0	787
20.000-30.000	13,8	86,2	2024
30.000-40.000	15,3	84,7	2351
40.000-60.000	14,9	85,1	3222
>60.000	15,3	84,7	1282
Total	14,6	85,4	9666
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	12,8	87,2	5883
Très mauvaise à moyenne	27,9	72,1	2019
Total	16,1	83,9	7902
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	16,3	83,7	3701
Dans le passé	17,7	82,3	1915
Modéré (<20)	13,4	86,6	1568
Gros fumeur	14,2	85,8	829
Total	15,8	84,2	8013
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région flamande	15,5	84,5	3506
Région bruxelloise	14,9	85,1	3013
Région wallonne	12,5	87,5	3605
Belgique	14,5	85,5	10124



REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN KINESITHERAPEUTE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	12,6	87,4	1745
Femme	18,5	81,5	1761
Total	15,5	84,5	3506
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	4,7	95,3	535
15-24	14,4	85,6	426
25-34	19,7	80,3	589
35-44	19,0	81,0	527
45-54	14,4	85,6	466
55-64	16,7	83,3	406
65-74	18,4	81,6	363
75 +	25,6	74,4	194
Total	15,5	84,5	3506
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	25,3	74,7	65
Ecole primaire	16,5	83,5	420
Secondaire inférieur	15,2	84,8	604
Secondaire supérieur	14,9	85,1	1166
Supérieur	15,6	84,4	1129
Total	15,6	84,4	3384
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	22,9	77,1	119
20.000-30.000	15,5	84,5	601
30.000-40.000	15,6	84,4	856
40.000-60.000	15,2	84,8	1277
>60.000	16,2	83,8	460
Total	15,8	84,2	3313
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	14,0	86,0	2266
Très mauvaise à moyenne	32,7	67,3	568
Total	17,4	82,6	2834
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	17,4	82,6	1369
Dans le passé	18,2	81,8	698
Modéré (<20)	14,5	85,5	558
Gros fumeur	17,1	82,9	241
Total	17,0	83,0	2866

REGIO: 2 Région bruxelloise

## CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN KINESITHERAPEUTE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	12,2	87,8	1458
Femme	17,5	82,5	1555
<b>Total</b>	<b>14,9</b>	<b>85,1</b>	<b>3013</b>
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	10,1	89,9	468
15-24	11,7	88,3	312
25-34	9,0	91,0	496
35-44	14,4	85,6	487
45-54	15,2	84,8	380
55-64	16,4	83,6	311
65-74	26,0	74,0	323
75 +	33,3	66,7	236
<b>Total</b>	<b>14,9</b>	<b>85,1</b>	<b>3013</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	13,0	87,0	165
Ecole primaire	9,9	90,1	364
Secondaire inférieur	13,9	86,1	422
Secondaire supérieur	17,3	82,7	701
Supérieur	16,1	83,9	1196
<b>Total</b>	<b>15,1</b>	<b>84,9</b>	<b>2848</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	5,8	94,2	367
20.000-30.000	13,0	87,0	622
30.000-40.000	17,8	82,2	601
40.000-60.000	17,2	82,8	781
>60.000	19,0	81,0	495
<b>Total</b>	<b>15,0</b>	<b>85,0</b>	<b>2866</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	12,9	87,1	1670
Très mauvaise à moyenne	23,2	76,8	619
<b>Total</b>	<b>15,5</b>	<b>84,5</b>	<b>2289</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	16,7	83,3	1010
Dans le passé	16,4	83,6	559
Modéré (<20)	15,1	84,9	459
Gros fumeur	12,5	87,5	274
<b>Total</b>	<b>15,8</b>	<b>84,2</b>	<b>2302</b>



REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN KINESITHEREPEUTE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	9,3	90,7	1741
Femme	15,8	84,2	1864
Total	12,5	87,5	3605
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	6,0	94,0	615
15-24	7,7	92,3	404
25-34	12,3	87,7	550
35-44	12,3	87,7	587
45-54	11,7	88,3	441
55-64	17,7	82,3	374
65-74	18,8	81,2	388
75 +	38,0	62,0	246
Total	12,5	87,5	3605
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	9,1	90,9	119
Ecole primaire	15,4	84,6	497
Secondaire inférieur	13,2	86,8	631
Secondaire supérieur	11,8	88,2	1059
Supérieur	11,7	88,3	1169
Total	12,3	87,7	3475
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	8,2	91,8	301
20.000-30.000	11,5	88,5	801
30.000-40.000	14,2	85,8	894
40.000-60.000	13,6	86,4	1164
>60.000	10,5	89,5	327
Total	12,6	87,4	3487
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	10,5	89,5	1947
Très mauvaise à moyenne	23,4	76,6	832
Total	14,0	86,0	2779
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	14,0	86,0	1322
Dans le passé	17,1	82,9	658
Modéré (<20)	11,1	88,9	551
Gros fumeur	10,6	89,4	314
Total	13,7	86,3	2845

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$02)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN DIETETICIEN(NE) AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	,8	99,2	4941
Femme	2,6	97,4	5177
Total	1,7	98,3	10118
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	,6	99,4	1618
15-24	1,8	98,2	1141
25-34	1,8	98,2	1633
35-44	1,6	98,4	1599
45-54	2,5	97,5	1287
55-64	2,6	97,4	1091
65-74	1,5	98,5	1074
75 +	1,5	98,5	675
Total	1,7	98,3	10118
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	,4	99,6	349
Ecole primaire	1,6	98,4	1282
Secondaire inférieur	2,3	97,7	1654
Secondaire supérieur	1,8	98,2	2927
Supérieur	1,3	98,7	3489
Total	1,7	98,3	9701
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	1,3	98,7	787
20.000-30.000	2,4	97,6	2024
30.000-40.000	1,1	98,9	2350
40.000-60.000	1,8	98,2	3217
>60.000	1,8	98,2	1281
Total	1,8	98,2	9659
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	1,7	98,3	5880
Très mauvaise à moyenne	2,4	97,6	2017
Total	1,8	98,2	7897
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	2,0	98,0	3695
Dans le passé	2,6	97,4	1915
Modéré (<20)	1,1	98,9	1567
Gros fumeur	,6	99,4	829
Total	1,8	98,2	8006
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région flamande	1,6	98,4	3498
Région bruxelloise	1,4	98,6	3017
Région wallonne	2,1	97,9	3603
Belgique	1,7	98,3	10118



REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$02)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN DIETETICIEN(NE) AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	,9	99,1	1742
Femme	2,2	97,8	1756
Total	1,6	98,4	3498
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	,5	99,5	534
15-24	1,3	98,7	425
25-34	1,1	98,9	587
35-44	1,3	98,7	526
45-54	2,7	97,3	465
55-64	3,0	97,0	406
65-74	2,0	98,0	362
75 +	1,1	98,9	193
Total	1,6	98,4	3498
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	,9	99,1	65
Ecole primaire	2,0	98,0	421
Secondaire inférieur	2,7	97,3	601
Secondaire supérieur	1,3	98,7	1167
Supérieur	1,0	99,0	1123
Total	1,5	98,5	3377
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	3,8	96,2	119
20.000-30.000	2,7	97,3	599
30.000-40.000	1,1	98,9	856
40.000-60.000	1,1	98,9	1272
>60.000	1,8	98,2	459
Total	1,6	98,4	3305
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	1,5	98,5	2263
Très mauvaise à moyenne	2,5	97,5	566
Total	1,7	98,3	2829
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	1,6	98,4	1365
Dans le passé	2,6	97,4	697
Modéré (<20)	,9	99,1	557
Gros fumeur	,5	99,5	241
Total	1,6	98,4	2860

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$02)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN DIETETICIEN(NE) AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	,8	99,2	1458
Femme	2,1	97,9	1559
Total	1,4	98,6	3017
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	,3	99,7	469
15-24	1,0	99,0	312
25-34	1,7	98,3	497
35-44	1,3	98,7	487
45-54	2,7	97,3	381
55-64	1,9	98,1	311
65-74	2,0	98,0	324
75 +	,4	99,6	236
Total	1,4	98,6	3017
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	,4	99,6	165
Ecole primaire	1,5	98,5	364
Secondaire inférieur	1,3	98,7	422
Secondaire supérieur	1,1	98,9	703
Supérieur	1,5	98,5	1197
Total	1,3	98,7	2851
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	,7	99,3	367
20.000-30.000	1,3	98,7	624
30.000-40.000	1,7	98,3	601
40.000-60.000	1,8	98,2	782
>60.000	1,7	98,3	495
Total	1,5	98,5	2869
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	1,4	98,6	1671
Très mauvaise à moyenne	2,4	97,6	620
Total	1,6	98,4	2291
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	1,6	98,4	1010
Dans le passé	2,2	97,8	560
Modéré (<20)	,7	99,3	459
Gros fumeur	1,1	98,9	274
Total	1,5	98,5	2303



REGIO: 3 Région wallonne

## CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$02)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN DIETETICIEN(NE) AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	,7	99,3	1741
Femme	3,5	96,5	1862
Total	2,1	97,9	3603
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	,8	99,2	615
15-24	3,0	97,0	404
25-34	3,1	96,9	549
35-44	2,3	97,7	586
45-54	2,0	98,0	441
55-64	2,1	97,9	374
65-74	,5	99,5	388
75 +	2,6	97,4	246
Total	2,1	97,9	3603
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	,0	100,0	119
Ecole primaire	1,1	98,9	497
Secondaire inférieur	1,9	98,1	631
Secondaire supérieur	2,9	97,1	1057
Supérieur	1,7	98,3	1169
Total	2,0	98,0	3473
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	,0	100,0	301
20.000-30.000	2,5	97,5	801
30.000-40.000	1,0	99,0	893
40.000-60.000	3,1	96,9	1163
>60.000	1,9	98,1	327
Total	2,1	97,9	3485
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	2,1	97,9	1946
Très mauvaise à moyenne	2,3	97,7	831
Total	2,1	97,9	2777
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	3,0	97,0	1320
Dans le passé	2,7	97,3	658
Modéré (<20)	1,6	98,4	551
Gros fumeur	,6	99,4	314
Total	2,4	97,6	2843



CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$07)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	2,6	97,4	4938
Femme	3,7	96,3	5177
Total	3,2	96,8	10115
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	,6	99,4	1616
15-24	1,3	98,7	1141
25-34	1,5	98,5	1634
35-44	2,9	97,1	1598
45-54	2,3	97,7	1287
55-64	4,2	95,8	1091
65-74	9,5	90,5	1074
75 +	17,1	82,9	674
Total	3,2	96,8	10115
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	8,9	91,1	349
Ecole primaire	6,7	93,3	1280
Secondaire inférieur	4,0	96,0	1654
Secondaire supérieur	2,6	97,4	2928
Supérieur	1,7	98,3	3487
Total	3,2	96,8	9698
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	5,0	95,0	787
20.000-30.000	4,3	95,7	2023
30.000-40.000	4,3	95,7	2348
40.000-60.000	2,2	97,8	3218
>60.000	1,3	98,7	1280
Total	3,2	96,8	9656
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	1,7	98,3	5879
Très mauvaise à moyenne	9,4	90,6	2017
Total	3,4	96,6	7896
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	3,3	96,7	3696
Dans le passé	3,9	96,1	1915
Modéré (<20)	2,7	97,3	1566
Gros fumeur	3,7	96,3	829
Total	3,4	96,6	8006
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région flamande	2,6	97,4	3494
Région bruxelloise	2,4	97,6	3017
Région wallonne	4,3	95,7	3604
Belgique	3,2	96,8	10115



REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	2,1	97,9	1739
Femme	3,2	96,8	1755
Total	2,6	97,4	3494
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	,3	99,7	532
15-24	1,7	98,3	425
25-34	1,2	98,8	587
35-44	2,5	97,5	525
45-54	1,7	98,3	465
55-64	2,9	97,1	406
65-74	9,4	90,6	362
75 +	15,0	85,0	192
Total	2,6	97,4	3494
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	15,2	84,8	65
Ecole primaire	4,7	95,3	419
Secondaire inférieur	3,2	96,8	601
Secondaire supérieur	2,1	97,9	1167
Supérieur	1,7	98,3	1121
Total	2,7	97,3	3373
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	6,1	93,9	119
20.000-30.000	3,5	96,5	598
30.000-40.000	4,3	95,7	854
40.000-60.000	1,9	98,1	1272
>60.000	,9	99,1	458
Total	2,7	97,3	3301
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	1,4	98,6	2262
Très mauvaise à moyenne	8,9	91,1	565
Total	2,8	97,2	2827
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	2,6	97,4	1365
Dans le passé	3,0	97,0	697
Modéré (<20)	2,7	97,3	556
Gros fumeur	2,9	97,1	241
Total	2,8	97,2	2859

REGIO: 2 Région bruxelloise

## CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	2,1	97,9	1458
Femme	2,6	97,4	1559
<b>Total</b>	<b>2,4</b>	<b>97,6</b>	<b>3017</b>
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	,1	99,9	469
15-24	,5	99,5	312
25-34	1,7	98,3	497
35-44	2,1	97,9	487
45-54	1,2	98,8	381
55-64	2,9	97,1	311
65-74	5,0	95,0	324
75 +	11,5	88,5	236
<b>Total</b>	<b>2,4</b>	<b>97,6</b>	<b>3017</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	1,2	98,8	165
Ecole primaire	5,5	94,5	364
Secondaire inférieur	4,8	95,2	422
Secondaire supérieur	1,7	98,3	703
Supérieur	1,2	98,8	1197
<b>Total</b>	<b>2,4</b>	<b>97,6</b>	<b>2851</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	1,8	98,2	367
20.000-30.000	2,2	97,8	624
30.000-40.000	4,2	95,8	601
40.000-60.000	1,3	98,7	782
>60.000	2,0	98,0	495
<b>Total</b>	<b>2,3</b>	<b>97,7</b>	<b>2869</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	1,0	99,0	1671
Très mauvaise à moyenne	6,6	93,4	620
<b>Total</b>	<b>2,4</b>	<b>97,6</b>	<b>2291</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	1,9	98,1	1010
Dans le passé	2,6	97,4	560
Modéré (<20)	3,7	96,3	459
Gros fumeur	2,0	98,0	274
<b>Total</b>	<b>2,4</b>	<b>97,6</b>	<b>2303</b>



REGIO: 3 Région wallonne

## CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	3,6	96,4	1741
Femme	5,1	94,9	1863
<b>Total</b>	<b>4,3</b>	<b>95,7</b>	<b>3604</b>
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	1,3	98,7	615
15-24	1,0	99,0	404
25-34	2,2	97,8	550
35-44	3,7	96,3	586
45-54	3,6	96,4	441
55-64	7,5	92,5	374
65-74	11,1	88,9	388
75 +	23,1	76,9	246
<b>Total</b>	<b>4,3</b>	<b>95,7</b>	<b>3604</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	8,3	91,7	119
Ecole primaire	10,4	89,6	497
Secondaire inférieur	5,0	95,0	631
Secondaire supérieur	4,1	95,9	1058
Supérieur	1,9	98,1	1169
<b>Total</b>	<b>4,3</b>	<b>95,7</b>	<b>3474</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	6,0	94,0	301
20.000-30.000	6,1	93,9	801
30.000-40.000	4,5	95,5	893
40.000-60.000	3,0	97,0	1164
>60.000	2,1	97,9	327
<b>Total</b>	<b>4,2</b>	<b>95,8</b>	<b>3486</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	2,6	97,4	1946
Très mauvaise à moyenne	11,0	89,0	832
<b>Total</b>	<b>4,9</b>	<b>95,1</b>	<b>2778</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	5,0	95,0	1321
Dans le passé	6,1	93,9	658
Modéré (<20)	2,3	97,7	551
Gros fumeur	5,3	94,7	314
<b>Total</b>	<b>4,8</b>	<b>95,2</b>	<b>2844</b>



CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$09)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N(*)
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	18,4	81,6	1796
Femme	15,5	84,5	1363
Total	17,2	82,8	3159
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	13,2	86,8	253
25-34	15,9	84,1	1053
35-44	21,6	78,4	984
45-54	16,4	83,6	685
55-64	9,1	90,9	174
65-74	16,4	83,6	9
75 +	,0	100,0	1
Total	17,2	82,8	3159
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	29,0	71,0	56
Ecole primaire	18,8	81,2	184
Secondaire inférieur	29,2	70,8	407
Secondaire supérieur	17,4	82,6	993
Supérieur	12,1	87,9	1407
Total	16,9	83,1	3047
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	29,8	70,2	102
20.000-30.000	16,0	84,0	317
30.000-40.000	22,8	77,2	569
40.000-60.000	16,7	83,3	1426
>60.000	11,6	88,4	626
Total	17,1	82,9	3040
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	17,5	82,5	2579
Très mauvaise à moyenne	18,2	81,8	412
Total	17,6	82,4	2991
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	17,6	82,4	1298
Dans le passé	14,4	85,6	702
Modéré (<20)	20,3	79,7	667
Gros fumeur	17,9	82,1	373
Total	17,5	82,5	3040
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région flamande	16,4	83,6	1220
Région bruxelloise	12,0	88,0	889
Région wallonne	20,6	79,4	1050
Belgique	17,2	82,8	3159

(\*) N = nombre total d'employés, salariés et fonctionnaires interrogés

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$09)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	17,9	82,1	703
Femme	14,2	85,8	517
Total	16,4	83,6	1220
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	12,9	87,1	123
25-34	15,9	84,1	437
35-44	20,9	79,1	357
45-54	13,9	86,1	255
55-64	5,8	94,2	46
65-74	58,3	41,7	2
Total	16,4	83,6	1220
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	23,4	76,6	16
Ecole primaire	14,2	85,8	69
Secondaire inférieur	28,5	71,5	167
Secondaire supérieur	17,9	82,1	429
Supérieur	10,3	89,7	497
Total	16,0	84,0	1178
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	12,7	87,3	9
20.000-30.000	16,3	83,7	107
30.000-40.000	21,4	78,6	221
40.000-60.000	16,5	83,5	592
>60.000	10,9	89,1	233
Total	16,2	83,8	1162
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	16,9	83,1	1063
Très mauvaise à moyenne	15,1	84,9	123
Total	16,7	83,3	1186
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	17,5	82,5	545
Dans le passé	11,2	88,8	279
Modéré (<20)	20,0	80,0	265
Gros fumeur	17,7	82,3	110
Total	16,6	83,4	1199

(\*) N = nombre total d'employés, salariés et fonctionnaires interrogés

REGIO: 2 Région bruxelloise

## CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$09)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	13,0	87,0	478
Femme	10,8	89,2	411
Total	12,0	88,0	889
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	9,9	90,1	47
25-34	12,4	87,6	269
35-44	11,9	88,1	283
45-54	13,1	86,9	217
55-64	9,0	91,0	68
65-74	,0	100,0	4
75 +	,0	100,0	1
Total	12,0	88,0	889
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	23,5	76,5	27
Ecole primaire	17,6	82,4	66
Secondaire inférieur	19,8	80,2	90
Secondaire supérieur	9,5	90,5	211
Supérieur	10,7	89,3	462
Total	12,3	87,7	856
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	23,1	76,9	58
20.000-30.000	8,3	91,7	92
30.000-40.000	15,4	84,6	135
40.000-60.000	10,1	89,9	336
>60.000	12,8	87,2	232
Total	12,4	87,6	853
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	12,6	87,4	681
Très mauvaise à moyenne	11,3	88,7	130
Total	12,4	87,6	811
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	12,5	87,5	317
Dans le passé	8,0	92,0	191
Modéré (<20)	10,5	89,5	191
Gros fumeur	20,4	79,6	123
Total	12,3	87,7	822

(\*) N = nombre total d'employés, salariés et fonctionnaires interrogés



REGIO: 3 Région wallonne

## CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$09)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	20,9	79,1	615
Femme	20,3	79,7	435
Total	20,6	79,4	1050
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	14,8	85,2	83
25-34	17,0	83,0	347
35-44	26,1	73,9	344
45-54	22,4	77,6	213
55-64	14,0	86,0	60
65-74	,0	100,0	3
Total	20,6	79,4	1050
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	48,0	52,0	13
Ecole primaire	35,7	64,3	49
Secondaire inférieur	32,7	67,3	150
Secondaire supérieur	18,0	82,0	353
Supérieur	16,0	84,0	448
Total	20,2	79,8	1013
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	42,8	57,2	35
20.000-30.000	18,1	81,9	118
30.000-40.000	27,1	72,9	213
40.000-60.000	18,9	81,1	498
>60.000	13,1	86,9	161
Total	20,4	79,6	1025
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	20,4	79,6	835
Très mauvaise à moyenne	24,7	75,3	159
Total	21,1	78,9	994
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	19,2	80,8	436
Dans le passé	23,0	77,0	232
Modéré (<20)	24,2	75,8	211
Gros fumeur	17,4	82,6	140
Total	20,9	79,1	1019

(\*) N = nombre total d'employés, salariés et fonctionnaires interrogés



CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : \$PC\_OLD)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

Total	UTILISATIONS DE SERVICES POUR				
	Femme de ménage privée	Service de nettoyage (personnes âgées)	Aide familiale ou aide senior	Repas chauds à domicile	Aide d'un centr pe
N	%	%	%	%	%
<b>SEXE</b>					
Homme 993	11,7	2,9	2,4	2,7	,
Femme 1253	14,8	7,7	5,8	3,6	,
Total 2246	13,4	5,6	4,3	3,2	,
<b>GROUPE AGE</b>					
60-64 521	7,8	1,2	1,7	,2	,
65-69 561	12,2	2,2	3,3	2,6	,
70-74 497	15,0	4,9	3,9	3,5	,
75-79 330	19,7	8,4	2,6	4,6	,
80-84 189	12,9	21,0	13,1	9,2	,
85 + 148	26,5	19,2	17,3	8,9	1,
Total 2246	13,4	5,6	4,3	3,2	,
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme 109	3,4	8,0	5,9	5,2	,1
Ecole primaire 646	6,7	7,2	5,3	5,0	,,
Secondaire inférieur 482	10,0	5,6	7,4	3,8	,4
Secondaire supérieur 475	12,0	5,1	2,2	2,7	,6
Supérieur 429	34,6	3,3	1,9	,3	,1
Total 2141	13,6	5,7	4,4	3,3	,
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					



N	Femme de ménage privée	Service de nettoyage (personnes âgées)	Aide familiale ou aide senior	Repas chauds à domicile	Aide d'un centr jour	pe
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Homme	8,0	3,9	1,9	3,4		,
347						
Femme	13,0	8,7	5,3	2,4		,
412						
Total	10,8	6,5	3,8	2,9		,
759						
<b>GROUPES AGE</b>						
60-64	4,5	1,1	,9	,0		,
208						
65-69	9,4	1,4	,9	,4		,
188						
70-74	14,8	6,0	4,4	5,5		,
170						
75-79	11,6	8,9	1,6	2,1		,
93						
80-84	11,9	29,1	14,8	13,6		,1
59						
85 +	32,4	28,3	21,6	6,3		,
41						
Total	10,8	6,5	3,8	2,9		,
759						
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	5,8	19,4	17,6	15,8		,0
26						
Ecole primaire	7,7	7,4	5,5	5,9		,:
244						
Secondaire inférieur	3,9	8,1	2,5	1,0		,0
168						
Secondaire supérieur	12,6	4,3	2,0	1,1		,5
190						
Supérieur	28,2	4,5	2,2	,2		,
104						
Total	10,9	6,7	3,7	3,0		,
732						
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	5,6	8,5	8,1	6,6		2,:
44						
20.000-30.000	2,3	12,8	6,0	1,5		,1
193						
30.000-40.000	7,7	5,8	2,5	1,8		,1
263						
40.000-60.000	17,3	3,0	3,0	5,3		,:
172						

>60.000 51	41,1	,0	1,5	,0	,
Total 723	10,6	7,0	4,0	2,9	,
SANTÉ SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne 432	11,2	2,6	1,6	,4	,4
Très mauvaise à moyenne 279	8,5	11,6	6,8	4,3	,5
Total 711	10,2	6,1	3,6	1,9	,
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais 373	10,6	8,0	4,4	2,0	,
Dans le passé 242	12,2	4,9	3,7	2,6	,1
Modéré (<20) 81	3,0	2,2	,5	,0	,
Gros fumeur 28	9,2	1,3	,0	21,2	,1
Total 724	10,2	5,9	3,5	3,1	,

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : \$PC\_OLD)

Enquête de santé, Belgique, 1997

Total N	UTILISATIONS DE SERVICES POUR				
	Femme de ménage privée	Service de nettoyage (personnes âgées)	Aide familiale ou aide senior	Repas chauds à domicile	Aide d'un centr jour
	%	%	%	%	%
<b>SEXE</b>					
Homme 300	11,9	1,3	4,7	3,8	1,
Femme 388	17,5	8,3	4,7	7,4	1,
Total 688	15,3	5,6	4,7	6,0	1,
<b>GROUPE AGE</b>					
60-64 140	12,1	,0	2,4	1,7	3,
65-69 169	7,4	7,3	1,3	6,1	,
70-74 148	17,5	2,9	8,5	2,5	,
75-79 111	21,7	10,6	1,6	11,6	,1
80-84 60	14,7	3,7	13,3	5,3	3,
85 + 60	31,4	9,7	13,0	11,5	7,
Total 688	15,3	5,6	4,7	6,0	1,
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme 31	3,6	,0	1,6	1,7	,1
Ecole primaire 123	6,4	4,5	7,1	5,8	4,1
Secondaire inférieur 140	10,8	4,9	10,6	8,1	3,4
Secondaire supérieur 156	9,7	12,8	2,4	12,4	,7
Supérieur 182	36,1	1,6	4,1	1,1	,1

Total 632	15,4	5,7	4,9	6,4	1,7
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000 39	6,1	6,3	2,7	3,9	1,7
20.000-30.000 147	10,8	2,3	4,6	2,6	1,0
30.000-40.000 185	12,0	4,4	10,2	3,2	1,4
40.000-60.000 165	13,8	1,6	3,6	6,0	2,5
>60.000 100	29,3	18,9	,8	18,3	,1
Total 636	14,9	6,0	4,9	6,5	1,7
SANTÉ SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne 339	15,5	5,1	2,5	4,3	,4
Très mauvaise à moyenne 268	15,6	7,2	7,5	8,1	2,3
Total 607	15,6	6,1	4,8	6,0	1,7
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais 296	11,2	8,6	4,6	7,9	,1
Dans le passé 217	16,2	2,3	5,1	3,3	1,0
Modéré (<20) 73	26,9	3,3	4,3	10,5	5,1
Gros fumeur 25	16,7	7,5	7,9	,0	7,1
Total 611	14,7	6,1	4,8	6,4	1,7

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : \$PC\_OLD)

Enquête de santé, Belgique, 1997

Total N	UTILISATIONS DE SERVICES POUR				
	Femme de ménage privée	Service de nettoyage (personnes âgées)	Aide familiale ou aide senior	Repas chauds à domicile	Aide d'un centr jour
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme 346	17,8	1,7	2,4	1,2	,
Femme 453	16,5	5,9	7,2	4,0	,
Total 799	17,1	4,1	5,1	2,8	,
GROUPES AGE					
60-64 173	13,1	1,7	3,0	,0	,
65-69 204	17,7	1,8	7,5	4,4	,
70-74 179	14,6	3,7	1,6	,7	,
75-79 126	28,9	6,5	4,4	4,0	,
80-84 70	13,6	15,1	10,0	3,6	,
85 + 47	12,1	7,8	11,8	12,1	,
Total 799	17,1	4,1	5,1	2,8	,
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme 52	1,7	4,5	,5	,2	,1
Ecole primaire 279	5,1	7,4	4,7	3,2	,1
Secondaire inférieur 174	20,5	1,5	15,1	7,5	,3
Secondaire supérieur 129	11,9	2,4	2,7	1,3	1,1
Supérieur 143	39,6	2,9	,7	,0	,1

Total 777	17,2	4,1	5,2	2,8	,
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000 56	16,8	4,1	8,8	,1	1,
20.000-30.000 189	3,1	8,1	6,3	2,8	,0
30.000-40.000 244	7,0	3,8	2,1	1,3	,0
40.000-60.000 221	33,3	2,5	8,8	5,8	,0
>60.000 48	47,5	,0	,0	2,0	2,
Total 758	17,4	4,1	5,3	2,9	,
SANTÉ SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne 342	16,9	1,2	4,5	3,5	,0
Très mauvaise à moyenne 391	17,9	6,1	5,8	1,7	,2
Total 733	17,4	3,8	5,2	2,6	,
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais 393	18,1	4,6	8,4	4,2	,
Dans le passé 235	18,6	3,7	3,7	1,7	,0
Modéré (<20) 93	12,9	,6	1,4	,0	,0
Gros fumeur 24	30,1	5,2	,0	,0	,0
Total 745	18,0	3,8	5,5	2,6	,

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : PC02\$99)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN PRATICIEN ALTERNATIF AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	6,5	93,5	4941
Femme	8,5	91,5	5178
Total	7,5	92,5	10119
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	5,2	94,8	1617
15-24	4,5	95,5	1141
25-34	8,4	91,6	1632
35-44	9,8	90,2	1600
45-54	10,1	89,9	1288
55-64	6,8	93,2	1091
65-74	8,0	92,0	1075
75 +	3,9	96,1	675
Total	7,5	92,5	10119
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	2,9	97,1	349
Ecole primaire	4,7	95,3	1281
Secondaire inférieur	5,2	94,8	1655
Secondaire supérieur	6,1	93,9	2927
Supérieur	11,2	88,8	3490
Total	7,5	92,5	9702
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	3,8	96,2	787
20.000-30.000	5,7	94,3	2025
30.000-40.000	6,4	93,6	2351
40.000-60.000	8,7	91,3	3216
>60.000	10,0	90,0	1281
Total	7,4	92,6	9660
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	7,4	92,6	5881
Très mauvaise à moyenne	11,4	88,6	2018
Total	8,3	91,7	7899
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	8,1	91,9	3697
Dans le passé	11,5	88,5	1917
Modéré (<20)	6,8	93,2	1566
Gros fumeur	3,6	96,4	828
Total	8,1	91,9	8008
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région flamande	7,3	92,7	3499
Région bruxelloise	8,3	91,7	3016
Région wallonne	7,6	92,4	3604
Belgique	7,5	92,5	10119

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : PC02\$99)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN PRATICIEN ALTERNATIF AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	6,1	93,9	1742
Femme	8,5	91,5	1757
Total	7,3	92,7	3499
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	5,1	94,9	533
15-24	3,7	96,3	425
25-34	8,6	91,4	587
35-44	8,9	91,1	526
45-54	10,4	89,6	466
55-64	6,5	93,5	406
65-74	8,7	91,3	363
75 +	1,7	98,3	193
Total	7,3	92,7	3499
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	2,3	97,7	65
Ecole primaire	6,4	93,6	420
Secondaire inférieur	5,1	94,9	602
Secondaire supérieur	5,2	94,8	1167
Supérieur	11,4	88,6	1124
Total	7,4	92,6	3378
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	3,8	96,2	119
20.000-30.000	5,1	94,9	599
30.000-40.000	6,9	93,1	857
40.000-60.000	8,5	91,5	1272
>60.000	8,0	92,0	459
Total	7,2	92,8	3306
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	7,0	93,0	2264
Très mauvaise à moyenne	12,4	87,6	567
Total	8,0	92,0	2831
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	7,6	92,4	1367
Dans le passé	10,9	89,1	698
Modéré (<20)	6,9	93,1	556
Gros fumeur	3,1	96,9	241
Total	7,8	92,2	2862



REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : PC02\$99)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN PRATICIEN ALTERNATIF AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	7,0	93,0	1457
Femme	9,5	90,5	1559
Total	8,3	91,7	3016
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	5,7	94,3	469
15-24	7,3	92,7	312
25-34	6,2	93,8	496
35-44	10,3	89,7	487
45-54	13,8	86,2	381
55-64	8,9	91,1	311
65-74	9,8	90,2	324
75 +	3,5	96,5	236
Total	8,3	91,7	3016
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	6,8	93,2	165
Ecole primaire	2,6	97,4	364
Secondaire inférieur	6,0	94,0	422
Secondaire supérieur	5,5	94,5	702
Supérieur	12,8	87,2	1197
Total	8,2	91,8	2850
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	3,9	96,1	367
20.000-30.000	5,3	94,7	624
30.000-40.000	6,4	93,6	601
40.000-60.000	10,8	89,2	781
>60.000	11,4	88,6	495
Total	7,7	92,3	2868
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	8,1	91,9	1670
Très mauvaise à moyenne	11,9	88,1	620
Total	9,0	91,0	2290
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	9,3	90,7	1010
Dans le passé	10,9	89,1	560
Modéré (<20)	9,2	90,8	459
Gros fumeur	3,7	96,3	273
Total	9,0	91,0	2302



REGIO: 3 Région wallonne

## CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : PC02\$99)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN PRATICIEN ALTERNATIF AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	6,9	93,1	1742
Femme	8,3	91,7	1862
Total	7,6	92,4	3604
<b>GROUPES AGE</b>			
0-14	5,2	94,8	615
15-24	5,1	94,9	404
25-34	8,9	91,1	549
35-44	11,2	88,8	587
45-54	8,5	91,5	441
55-64	6,9	93,1	374
65-74	6,2	93,8	388
75 +	7,3	92,7	246
Total	7,6	92,4	3604
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	,8	99,2	119
Ecole primaire	2,6	97,4	497
Secondaire inférieur	5,2	94,8	631
Secondaire supérieur	8,1	91,9	1058
Supérieur	10,3	89,7	1169
Total	7,5	92,5	3474
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	3,7	96,3	301
20.000-30.000	6,8	93,2	802
30.000-40.000	5,7	94,3	893
40.000-60.000	8,7	91,3	1163
>60.000	15,1	84,9	327
Total	7,7	92,3	3486
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	8,1	91,9	1947
Très mauvaise à moyenne	10,0	90,0	831
Total	8,6	91,4	2778
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	8,5	91,5	1320
Dans le passé	12,8	87,2	659
Modéré (<20)	5,7	94,3	551
Gros fumeur	4,2	95,8	314
Total	8,3	91,7	2844



CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : \$PC\_ALT)  
Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE PRATICIEN ALTERNATIF QUI A ETE CONTACTE			Total N(*)
	Homeop.	Chiropr. ou osteop.	Acupunct.	
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	45,2	42,7	12,2	352
Femme	45,0	39,2	15,9	560
Total	45,1	40,6	14,3	912
<b>GROUPES AGE</b>				
0-14	84,4	14,1	1,5	109
15-24	52,0	28,2	19,8	74
25-34	37,4	48,7	13,9	157
35-44	38,9	50,6	10,5	199
45-54	44,3	42,7	13,0	154
55-64	39,1	42,6	18,3	98
65-74	35,7	30,3	33,9	88
75 +	33,2	43,0	23,8	33
Total	45,1	40,6	14,3	912
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	12,9	60,6	26,6	10
Ecole primaire	46,2	36,0	17,9	53
Secondaire inférieur	42,9	47,8	9,3	111
Secondaire supérieur	41,3	46,9	11,8	217
Supérieur	48,2	36,2	15,5	482
Total	45,3	40,7	14,1	873
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	50,0	36,5	13,4	39
20.000-30.000	42,0	50,8	7,2	131
30.000-40.000	48,1	30,9	20,9	168
40.000-60.000	46,1	38,3	15,6	340
>60.000	35,8	51,8	12,4	178
Total	44,1	41,1	14,7	856
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	39,1	46,7	14,2	519
Très mauvaise à moyenne	43,9	39,7	16,4	248
Total	40,6	44,5	14,9	767
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	44,0	44,1	12,0	358
Dans le passé	36,2	43,5	20,3	234
Modéré (<20)	41,3	43,8	14,9	139
Gros fumeur	38,9	50,8	10,3	36
Total	40,8	44,1	15,1	767
<b>REGION DE RESIDENCE</b>				
Région flamande	45,4	40,6	14,0	266
Région bruxelloise	41,3	43,5	15,2	324
Région wallonne	45,9	39,5	14,5	322
Belgique	45,1	40,6	14,3	912

(\*) N = Nombre total de contacts avec le praticien  
alternatif au cours de la dernière année

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : \$PC\_ALT)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE PRATICIEN ALTERNATIF QUI A ETE CONTACTE			Total N(*)
	Homeop.	Chiropr. ou osteop.	Acupunct.	
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	49,0	40,2	10,8	100
Femme	42,9	41,0	16,1	166
Total	45,4	40,6	14,0	266
<b>GROUPES AGE</b>				
0-14	88,3	9,3	2,5	27
15-24	42,0	30,7	27,3	21
25-34	34,1	53,2	12,7	56
35-44	38,8	50,1	11,1	55
45-54	47,7	39,6	12,6	48
55-64	40,3	51,3	8,4	32
65-74	46,3	21,1	32,6	22
75 +	27,3	21,3	51,4	5
Total	45,4	40,6	14,0	266
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	,0	18,3	81,7	4
Ecole primaire	47,6	33,7	18,7	18
Secondaire inférieur	43,2	50,7	6,1	33
Secondaire supérieur	36,1	51,1	12,8	68
Supérieur	50,9	36,2	12,8	138
Total	45,8	41,2	13,0	261
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	32,8	46,0	21,2	7
20.000-30.000	44,1	52,2	3,8	32
30.000-40.000	51,6	24,6	23,8	56
40.000-60.000	43,5	42,0	14,5	115
>60.000	33,3	57,7	9,0	38
Total	43,6	41,9	14,5	248
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	36,4	48,3	15,2	165
Très mauvaise à moyenne	51,6	37,2	11,2	68
Total	41,0	45,0	14,0	233
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	43,9	44,7	11,4	105
Dans le passé	35,1	44,6	20,3	76
Modéré (<20)	40,0	48,5	11,5	43
Gros fumeur	58,5	31,6	9,8	8
Total	40,7	44,9	14,3	232

(\*) N = Nombre total de contacts avec le praticien  
alternatif au cours de la dernière année



REGIO: 2 Région bruxelloise

## CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : \$PC\_ALT)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE PRATICIEN ALTERNATIF QUI A ETE CONTACTE			Total
	Homeop.	Chiropr. ou osteop.	Acupunct.	N(*)
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	42,0	44,1	13,9	113
Femme	40,9	43,1	16,1	211
Total	41,3	43,5	15,2	324
<b>GROUPES AGE</b>				
0-14	83,7	16,3	,0	34
15-24	54,9	29,6	15,5	30
25-34	27,7	45,9	26,5	46
35-44	37,3	51,3	11,3	69
45-54	37,9	44,8	17,3	63
55-64	47,9	35,7	16,4	37
65-74	18,4	66,5	15,1	35
75 +	29,2	65,7	5,0	10
Total	41,3	43,5	15,2	324
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	5,8	94,2	,0	5
Ecole primaire	35,1	55,5	9,4	14
Secondaire inférieur	38,9	39,1	22,0	34
Secondaire supérieur	38,0	36,9	25,2	53
Supérieur	46,1	39,6	14,3	197
Total	41,5	42,4	16,1	303
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	40,7	35,5	23,8	21
20.000-30.000	46,1	41,2	12,7	41
30.000-40.000	47,2	44,4	8,4	53
40.000-60.000	42,7	37,1	20,2	107
>60.000	40,5	44,3	15,2	76
Total	43,2	40,5	16,3	298
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	41,7	44,7	13,6	181
Très mauvaise à moyenne	29,1	50,4	20,5	87
Total	37,4	46,6	15,9	268
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	35,4	50,1	14,5	128
Dans le passé	44,1	34,8	21,0	70
Modéré (<20)	38,2	49,1	12,7	58
Gros fumeur	32,7	44,0	23,3	13
Total	37,9	46,0	16,1	269

(\*) N = Nombre total de contacts avec le praticien

**alternatif au cours de la dernière année**

REGIO: 3 Région wallonne

## CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : \$PC\_ALT)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE PRATICIEN ALTERNATIF QUI A ETE CONTACTE			Total
	Homeop.	Chiropr. ou osteop.	Acupunct.	N(*)
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	40,7	45,8	13,5	139
Femme	49,9	34,8	15,3	183
Total	45,9	39,5	14,5	322
<b>GROUPE AGE</b>				
0-14	79,4	20,1	,5	48
15-24	65,5	23,7	10,8	23
25-34	45,3	42,4	12,3	55
35-44	39,7	51,0	9,3	75
45-54	40,7	47,5	11,8	43
55-64	31,7	27,8	40,4	29
65-74	23,6	30,2	46,2	31
75 +	35,1	43,6	21,3	18
Total	45,9	39,5	14,5	322
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	100,0	,0	,0	1
Ecole primaire	44,7	37,7	17,6	21
Secondaire inférieur	43,7	46,6	9,7	44
Secondaire supérieur	48,1	43,6	8,3	96
Supérieur	44,5	34,8	20,6	147
Total	45,8	39,2	15,0	309
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	69,3	30,7	,0	11
20.000-30.000	39,0	51,9	9,1	58
30.000-40.000	42,5	38,1	19,4	59
40.000-60.000	51,9	31,8	16,2	118
>60.000	36,7	48,3	15,0	64
Total	45,2	40,2	14,6	310
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	42,6	44,6	12,8	173
Très mauvaise à moyenne	38,1	39,4	22,5	93
Total	41,2	42,9	15,9	266
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	47,0	41,0	12,0	125
Dans le passé	36,1	43,8	20,2	88
Modéré (<20)	46,0	30,5	23,5	38
Gros fumeur	21,4	71,9	6,7	15
Total	41,8	42,3	15,9	266

(\*) N = Nombre total de contacts avec le praticien

**alternatif au cours de la dernière année**