

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$01)
Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC UN KINESITHERAPEUTE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|---|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 11,5 | 88,5 | 4944 |
| Femme | 17,5 | 82,5 | 5180 |
| Total | 14,5 | 85,5 | 10124 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 5,7 | 94,3 | 1618 |
| 15-24 | 11,9 | 88,1 | 1142 |
| 25-34 | 16,3 | 83,7 | 1635 |
| 35-44 | 16,3 | 83,7 | 1601 |
| 45-54 | 13,6 | 86,4 | 1287 |
| 55-64 | 16,9 | 83,1 | 1091 |
| 65-74 | 19,4 | 80,6 | 1074 |
| 75 + | 31,1 | 68,9 | 676 |
| Total | 14,5 | 85,5 | 10124 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 15,9 | 84,1 | 349 |
| Ecole primaire | 15,4 | 84,6 | 1281 |
| Secondaire inférieur | 14,4 | 85,6 | 1657 |
| Secondaire supérieur | 14,2 | 85,8 | 2926 |
| Supérieur | 14,4 | 85,6 | 3494 |
| Total | 14,5 | 85,5 | 9707 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 12,0 | 88,0 | 787 |
| 20.000-30.000 | 13,8 | 86,2 | 2024 |
| 30.000-40.000 | 15,3 | 84,7 | 2351 |
| 40.000-60.000 | 14,9 | 85,1 | 3222 |
| >60.000 | 15,3 | 84,7 | 1282 |
| Total | 14,6 | 85,4 | 9666 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 12,8 | 87,2 | 5883 |
| Très mauvaise à moyenne | 27,9 | 72,1 | 2019 |
| Total | 16,1 | 83,9 | 7902 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 16,3 | 83,7 | 3701 |
| Dans le passé | 17,7 | 82,3 | 1915 |
| Modéré (<20) | 13,4 | 86,6 | 1568 |
| Gros fumeur | 14,2 | 85,8 | 829 |
| Total | 15,8 | 84,2 | 8013 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région flamande | 15,5 | 84,5 | 3506 |
| Région bruxelloise | 14,9 | 85,1 | 3013 |
| Région wallonne | 12,5 | 87,5 | 3605 |
| Belgique | 14,5 | 85,5 | 10124 |

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC UN KINESITHERAPEUTE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|---|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 12,6 | 87,4 | 1745 |
| Femme | 18,5 | 81,5 | 1761 |
| Total | 15,5 | 84,5 | 3506 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 4,7 | 95,3 | 535 |
| 15-24 | 14,4 | 85,6 | 426 |
| 25-34 | 19,7 | 80,3 | 589 |
| 35-44 | 19,0 | 81,0 | 527 |
| 45-54 | 14,4 | 85,6 | 466 |
| 55-64 | 16,7 | 83,3 | 406 |
| 65-74 | 18,4 | 81,6 | 363 |
| 75 + | 25,6 | 74,4 | 194 |
| Total | 15,5 | 84,5 | 3506 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 25,3 | 74,7 | 65 |
| Ecole primaire | 16,5 | 83,5 | 420 |
| Secondaire inférieur | 15,2 | 84,8 | 604 |
| Secondaire supérieur | 14,9 | 85,1 | 1166 |
| Supérieur | 15,6 | 84,4 | 1129 |
| Total | 15,6 | 84,4 | 3384 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 22,9 | 77,1 | 119 |
| 20.000-30.000 | 15,5 | 84,5 | 601 |
| 30.000-40.000 | 15,6 | 84,4 | 856 |
| 40.000-60.000 | 15,2 | 84,8 | 1277 |
| >60.000 | 16,2 | 83,8 | 460 |
| Total | 15,8 | 84,2 | 3313 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 14,0 | 86,0 | 2266 |
| Très mauvaise à moyenne | 32,7 | 67,3 | 568 |
| Total | 17,4 | 82,6 | 2834 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 17,4 | 82,6 | 1369 |
| Dans le passé | 18,2 | 81,8 | 698 |
| Modéré (<20) | 14,5 | 85,5 | 558 |
| Gros fumeur | 17,1 | 82,9 | 241 |
| Total | 17,0 | 83,0 | 2866 |

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC UN KINESITHEPEUTE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|---|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 12,2 | 87,8 | 1458 |
| Femme | 17,5 | 82,5 | 1555 |
| Total | 14,9 | 85,1 | 3013 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 10,1 | 89,9 | 468 |
| 15-24 | 11,7 | 88,3 | 312 |
| 25-34 | 9,0 | 91,0 | 496 |
| 35-44 | 14,4 | 85,6 | 487 |
| 45-54 | 15,2 | 84,8 | 380 |
| 55-64 | 16,4 | 83,6 | 311 |
| 65-74 | 26,0 | 74,0 | 323 |
| 75 + | 33,3 | 66,7 | 236 |
| Total | 14,9 | 85,1 | 3013 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 13,0 | 87,0 | 165 |
| Ecole primaire | 9,9 | 90,1 | 364 |
| Secondaire inférieur | 13,9 | 86,1 | 422 |
| Secondaire supérieur | 17,3 | 82,7 | 701 |
| Supérieur | 16,1 | 83,9 | 1196 |
| Total | 15,1 | 84,9 | 2848 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 5,8 | 94,2 | 367 |
| 20.000-30.000 | 13,0 | 87,0 | 622 |
| 30.000-40.000 | 17,8 | 82,2 | 601 |
| 40.000-60.000 | 17,2 | 82,8 | 781 |
| >60.000 | 19,0 | 81,0 | 495 |
| Total | 15,0 | 85,0 | 2866 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 12,9 | 87,1 | 1670 |
| Très mauvaise à moyenne | 23,2 | 76,8 | 619 |
| Total | 15,5 | 84,5 | 2289 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 16,7 | 83,3 | 1010 |
| Dans le passé | 16,4 | 83,6 | 559 |
| Modéré (<20) | 15,1 | 84,9 | 459 |
| Gros fumeur | 12,5 | 87,5 | 274 |
| Total | 15,8 | 84,2 | 2302 |

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC UN KINESITHEPEUTE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|---|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 9,3 | 90,7 | 1741 |
| Femme | 15,8 | 84,2 | 1864 |
| Total | 12,5 | 87,5 | 3605 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 6,0 | 94,0 | 615 |
| 15-24 | 7,7 | 92,3 | 404 |
| 25-34 | 12,3 | 87,7 | 550 |
| 35-44 | 12,3 | 87,7 | 587 |
| 45-54 | 11,7 | 88,3 | 441 |
| 55-64 | 17,7 | 82,3 | 374 |
| 65-74 | 18,8 | 81,2 | 388 |
| 75 + | 38,0 | 62,0 | 246 |
| Total | 12,5 | 87,5 | 3605 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 9,1 | 90,9 | 119 |
| Ecole primaire | 15,4 | 84,6 | 497 |
| Secondaire inférieur | 13,2 | 86,8 | 631 |
| Secondaire supérieur | 11,8 | 88,2 | 1059 |
| Supérieur | 11,7 | 88,3 | 1169 |
| Total | 12,3 | 87,7 | 3475 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 8,2 | 91,8 | 301 |
| 20.000-30.000 | 11,5 | 88,5 | 801 |
| 30.000-40.000 | 14,2 | 85,8 | 894 |
| 40.000-60.000 | 13,6 | 86,4 | 1164 |
| >60.000 | 10,5 | 89,5 | 327 |
| Total | 12,6 | 87,4 | 3487 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 10,5 | 89,5 | 1947 |
| Très mauvaise à moyenne | 23,4 | 76,6 | 832 |
| Total | 14,0 | 86,0 | 2779 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 14,0 | 86,0 | 1322 |
| Dans le passé | 17,1 | 82,9 | 658 |
| Modéré (<20) | 11,1 | 88,9 | 551 |
| Gros fumeur | 10,6 | 89,4 | 314 |
| Total | 13,7 | 86,3 | 2845 |

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$02)
Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC UN DIETETICIEN(NE) AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | ,8 | 99,2 | 4941 |
| Femme | 2,6 | 97,4 | 5177 |
| Total | 1,7 | 98,3 | 10118 |
| GROUPE AGE | | | |
| 0-14 | ,6 | 99,4 | 1618 |
| 15-24 | 1,8 | 98,2 | 1141 |
| 25-34 | 1,8 | 98,2 | 1633 |
| 35-44 | 1,6 | 98,4 | 1599 |
| 45-54 | 2,5 | 97,5 | 1287 |
| 55-64 | 2,6 | 97,4 | 1091 |
| 65-74 | 1,5 | 98,5 | 1074 |
| 75 + | 1,5 | 98,5 | 675 |
| Total | 1,7 | 98,3 | 10118 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | ,4 | 99,6 | 349 |
| Ecole primaire | 1,6 | 98,4 | 1282 |
| Secondaire inférieur | 2,3 | 97,7 | 1654 |
| Secondaire supérieur | 1,8 | 98,2 | 2927 |
| Supérieur | 1,3 | 98,7 | 3489 |
| Total | 1,7 | 98,3 | 9701 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 1,3 | 98,7 | 787 |
| 20.000-30.000 | 2,4 | 97,6 | 2024 |
| 30.000-40.000 | 1,1 | 98,9 | 2350 |
| 40.000-60.000 | 1,8 | 98,2 | 3217 |
| >60.000 | 1,8 | 98,2 | 1281 |
| Total | 1,8 | 98,2 | 9659 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 1,7 | 98,3 | 5880 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,4 | 97,6 | 2017 |
| Total | 1,8 | 98,2 | 7897 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 2,0 | 98,0 | 3695 |
| Dans le passé | 2,6 | 97,4 | 1915 |
| Modéré (<20) | 1,1 | 98,9 | 1567 |
| Gros fumeur | ,6 | 99,4 | 829 |
| Total | 1,8 | 98,2 | 8006 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région flamande | 1,6 | 98,4 | 3498 |
| Région bruxelloise | 1,4 | 98,6 | 3017 |
| Région wallonne | 2,1 | 97,9 | 3603 |
| Belgique | 1,7 | 98,3 | 10118 |

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$02)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC UN DIETETICIEN(NE) AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | ,9 | 99,1 | 1742 |
| Femme | 2,2 | 97,8 | 1756 |
| Total | 1,6 | 98,4 | 3498 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | ,5 | 99,5 | 534 |
| 15-24 | 1,3 | 98,7 | 425 |
| 25-34 | 1,1 | 98,9 | 587 |
| 35-44 | 1,3 | 98,7 | 526 |
| 45-54 | 2,7 | 97,3 | 465 |
| 55-64 | 3,0 | 97,0 | 406 |
| 65-74 | 2,0 | 98,0 | 362 |
| 75 + | 1,1 | 98,9 | 193 |
| Total | 1,6 | 98,4 | 3498 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | ,9 | 99,1 | 65 |
| Ecole primaire | 2,0 | 98,0 | 421 |
| Secondaire inférieur | 2,7 | 97,3 | 601 |
| Secondaire supérieur | 1,3 | 98,7 | 1167 |
| Supérieur | 1,0 | 99,0 | 1123 |
| Total | 1,5 | 98,5 | 3377 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 3,8 | 96,2 | 119 |
| 20.000-30.000 | 2,7 | 97,3 | 599 |
| 30.000-40.000 | 1,1 | 98,9 | 856 |
| 40.000-60.000 | 1,1 | 98,9 | 1272 |
| >60.000 | 1,8 | 98,2 | 459 |
| Total | 1,6 | 98,4 | 3305 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 1,5 | 98,5 | 2263 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,5 | 97,5 | 566 |
| Total | 1,7 | 98,3 | 2829 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 1,6 | 98,4 | 1365 |
| Dans le passé | 2,6 | 97,4 | 697 |
| Modéré (<20) | ,9 | 99,1 | 557 |
| Gros fumeur | ,5 | 99,5 | 241 |
| Total | 1,6 | 98,4 | 2860 |

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$02)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC UN DIETETICIEN(NE) AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | ,8 | 99,2 | 1458 |
| Femme | 2,1 | 97,9 | 1559 |
| Total | 1,4 | 98,6 | 3017 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | ,3 | 99,7 | 469 |
| 15-24 | 1,0 | 99,0 | 312 |
| 25-34 | 1,7 | 98,3 | 497 |
| 35-44 | 1,3 | 98,7 | 487 |
| 45-54 | 2,7 | 97,3 | 381 |
| 55-64 | 1,9 | 98,1 | 311 |
| 65-74 | 2,0 | 98,0 | 324 |
| 75 + | ,4 | 99,6 | 236 |
| Total | 1,4 | 98,6 | 3017 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | ,4 | 99,6 | 165 |
| Ecole primaire | 1,5 | 98,5 | 364 |
| Secondaire inférieur | 1,3 | 98,7 | 422 |
| Secondaire supérieur | 1,1 | 98,9 | 703 |
| Supérieur | 1,5 | 98,5 | 1197 |
| Total | 1,3 | 98,7 | 2851 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | ,7 | 99,3 | 367 |
| 20.000-30.000 | 1,3 | 98,7 | 624 |
| 30.000-40.000 | 1,7 | 98,3 | 601 |
| 40.000-60.000 | 1,8 | 98,2 | 782 |
| >60.000 | 1,7 | 98,3 | 495 |
| Total | 1,5 | 98,5 | 2869 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 1,4 | 98,6 | 1671 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,4 | 97,6 | 620 |
| Total | 1,6 | 98,4 | 2291 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 1,6 | 98,4 | 1010 |
| Dans le passé | 2,2 | 97,8 | 560 |
| Modéré (<20) | ,7 | 99,3 | 459 |
| Gros fumeur | 1,1 | 98,9 | 274 |
| Total | 1,5 | 98,5 | 2303 |

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$02)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC UN DIETETICIEN(NE) AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|-------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | ,7 | 99,3 | 1741 |
| Femme | 3,5 | 96,5 | 1862 |
| Total | 2,1 | 97,9 | 3603 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | ,8 | 99,2 | 615 |
| 15-24 | 3,0 | 97,0 | 404 |
| 25-34 | 3,1 | 96,9 | 549 |
| 35-44 | 2,3 | 97,7 | 586 |
| 45-54 | 2,0 | 98,0 | 441 |
| 55-64 | 2,1 | 97,9 | 374 |
| 65-74 | ,5 | 99,5 | 388 |
| 75 + | 2,6 | 97,4 | 246 |
| Total | 2,1 | 97,9 | 3603 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | ,0 | 100,0 | 119 |
| Ecole primaire | 1,1 | 98,9 | 497 |
| Secondaire inférieur | 1,9 | 98,1 | 631 |
| Secondaire supérieur | 2,9 | 97,1 | 1057 |
| Supérieur | 1,7 | 98,3 | 1169 |
| Total | 2,0 | 98,0 | 3473 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | ,0 | 100,0 | 301 |
| 20.000-30.000 | 2,5 | 97,5 | 801 |
| 30.000-40.000 | 1,0 | 99,0 | 893 |
| 40.000-60.000 | 3,1 | 96,9 | 1163 |
| >60.000 | 1,9 | 98,1 | 327 |
| Total | 2,1 | 97,9 | 3485 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 2,1 | 97,9 | 1946 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,3 | 97,7 | 831 |
| Total | 2,1 | 97,9 | 2777 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 3,0 | 97,0 | 1320 |
| Dans le passé | 2,7 | 97,3 | 658 |
| Modéré (<20) | 1,6 | 98,4 | 551 |
| Gros fumeur | ,6 | 99,4 | 314 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 2843 |

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$07)
Enquête de santé, Belgique, 1997

| | SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 2,6 | 97,4 | 4938 |
| Femme | 3,7 | 96,3 | 5177 |
| Total | 3,2 | 96,8 | 10115 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | ,6 | 99,4 | 1616 |
| 15-24 | 1,3 | 98,7 | 1141 |
| 25-34 | 1,5 | 98,5 | 1634 |
| 35-44 | 2,9 | 97,1 | 1598 |
| 45-54 | 2,3 | 97,7 | 1287 |
| 55-64 | 4,2 | 95,8 | 1091 |
| 65-74 | 9,5 | 90,5 | 1074 |
| 75 + | 17,1 | 82,9 | 674 |
| Total | 3,2 | 96,8 | 10115 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 8,9 | 91,1 | 349 |
| Ecole primaire | 6,7 | 93,3 | 1280 |
| Secondaire inférieur | 4,0 | 96,0 | 1654 |
| Secondaire supérieur | 2,6 | 97,4 | 2928 |
| Supérieur | 1,7 | 98,3 | 3487 |
| Total | 3,2 | 96,8 | 9698 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 5,0 | 95,0 | 787 |
| 20.000-30.000 | 4,3 | 95,7 | 2023 |
| 30.000-40.000 | 4,3 | 95,7 | 2348 |
| 40.000-60.000 | 2,2 | 97,8 | 3218 |
| >60.000 | 1,3 | 98,7 | 1280 |
| Total | 3,2 | 96,8 | 9656 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 1,7 | 98,3 | 5879 |
| Très mauvaise à moyenne | 9,4 | 90,6 | 2017 |
| Total | 3,4 | 96,6 | 7896 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 3,3 | 96,7 | 3696 |
| Dans le passé | 3,9 | 96,1 | 1915 |
| Modéré (<20) | 2,7 | 97,3 | 1566 |
| Gros fumeur | 3,7 | 96,3 | 829 |
| Total | 3,4 | 96,6 | 8006 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région flamande | 2,6 | 97,4 | 3494 |
| Région bruxelloise | 2,4 | 97,6 | 3017 |
| Région wallonne | 4,3 | 95,7 | 3604 |
| Belgique | 3,2 | 96,8 | 10115 |

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 2,1 | 97,9 | 1739 |
| Femme | 3,2 | 96,8 | 1755 |
| Total | 2,6 | 97,4 | 3494 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | ,3 | 99,7 | 532 |
| 15-24 | 1,7 | 98,3 | 425 |
| 25-34 | 1,2 | 98,8 | 587 |
| 35-44 | 2,5 | 97,5 | 525 |
| 45-54 | 1,7 | 98,3 | 465 |
| 55-64 | 2,9 | 97,1 | 406 |
| 65-74 | 9,4 | 90,6 | 362 |
| 75 + | 15,0 | 85,0 | 192 |
| Total | 2,6 | 97,4 | 3494 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 15,2 | 84,8 | 65 |
| Ecole primaire | 4,7 | 95,3 | 419 |
| Secondaire inférieur | 3,2 | 96,8 | 601 |
| Secondaire supérieur | 2,1 | 97,9 | 1167 |
| Supérieur | 1,7 | 98,3 | 1121 |
| Total | 2,7 | 97,3 | 3373 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 6,1 | 93,9 | 119 |
| 20.000-30.000 | 3,5 | 96,5 | 598 |
| 30.000-40.000 | 4,3 | 95,7 | 854 |
| 40.000-60.000 | 1,9 | 98,1 | 1272 |
| >60.000 | ,9 | 99,1 | 458 |
| Total | 2,7 | 97,3 | 3301 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 1,4 | 98,6 | 2262 |
| Très mauvaise à moyenne | 8,9 | 91,1 | 565 |
| Total | 2,8 | 97,2 | 2827 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 2,6 | 97,4 | 1365 |
| Dans le passé | 3,0 | 97,0 | 697 |
| Modéré (<20) | 2,7 | 97,3 | 556 |
| Gros fumeur | 2,9 | 97,1 | 241 |
| Total | 2,8 | 97,2 | 2859 |

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 2,1 | 97,9 | 1458 |
| Femme | 2,6 | 97,4 | 1559 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 3017 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | ,1 | 99,9 | 469 |
| 15-24 | ,5 | 99,5 | 312 |
| 25-34 | 1,7 | 98,3 | 497 |
| 35-44 | 2,1 | 97,9 | 487 |
| 45-54 | 1,2 | 98,8 | 381 |
| 55-64 | 2,9 | 97,1 | 311 |
| 65-74 | 5,0 | 95,0 | 324 |
| 75 + | 11,5 | 88,5 | 236 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 3017 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 1,2 | 98,8 | 165 |
| Ecole primaire | 5,5 | 94,5 | 364 |
| Secondaire inférieur | 4,8 | 95,2 | 422 |
| Secondaire supérieur | 1,7 | 98,3 | 703 |
| Supérieur | 1,2 | 98,8 | 1197 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 2851 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 1,8 | 98,2 | 367 |
| 20.000-30.000 | 2,2 | 97,8 | 624 |
| 30.000-40.000 | 4,2 | 95,8 | 601 |
| 40.000-60.000 | 1,3 | 98,7 | 782 |
| >60.000 | 2,0 | 98,0 | 495 |
| Total | 2,3 | 97,7 | 2869 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 1,0 | 99,0 | 1671 |
| Très mauvaise à moyenne | 6,6 | 93,4 | 620 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 2291 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 1,9 | 98,1 | 1010 |
| Dans le passé | 2,6 | 97,4 | 560 |
| Modéré (<20) | 3,7 | 96,3 | 459 |
| Gros fumeur | 2,0 | 98,0 | 274 |
| Total | 2,4 | 97,6 | 2303 |

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 3,6 | 96,4 | 1741 |
| Femme | 5,1 | 94,9 | 1863 |
| Total | 4,3 | 95,7 | 3604 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 1,3 | 98,7 | 615 |
| 15-24 | 1,0 | 99,0 | 404 |
| 25-34 | 2,2 | 97,8 | 550 |
| 35-44 | 3,7 | 96,3 | 586 |
| 45-54 | 3,6 | 96,4 | 441 |
| 55-64 | 7,5 | 92,5 | 374 |
| 65-74 | 11,1 | 88,9 | 388 |
| 75 + | 23,1 | 76,9 | 246 |
| Total | 4,3 | 95,7 | 3604 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 8,3 | 91,7 | 119 |
| Ecole primaire | 10,4 | 89,6 | 497 |
| Secondaire inférieur | 5,0 | 95,0 | 631 |
| Secondaire supérieur | 4,1 | 95,9 | 1058 |
| Supérieur | 1,9 | 98,1 | 1169 |
| Total | 4,3 | 95,7 | 3474 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 6,0 | 94,0 | 301 |
| 20.000-30.000 | 6,1 | 93,9 | 801 |
| 30.000-40.000 | 4,5 | 95,5 | 893 |
| 40.000-60.000 | 3,0 | 97,0 | 1164 |
| >60.000 | 2,1 | 97,9 | 327 |
| Total | 4,2 | 95,8 | 3486 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 2,6 | 97,4 | 1946 |
| Très mauvaise à moyenne | 11,0 | 89,0 | 832 |
| Total | 4,9 | 95,1 | 2778 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 5,0 | 95,0 | 1321 |
| Dans le passé | 6,1 | 93,9 | 658 |
| Modéré (<20) | 2,3 | 97,7 | 551 |
| Gros fumeur | 5,3 | 94,7 | 314 |
| Total | 4,8 | 95,2 | 2844 |

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$09)
Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|-------|-------|
| | Oui | Non | N(*) |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 18,4 | 81,6 | 1796 |
| Femme | 15,5 | 84,5 | 1363 |
| Total | 17,2 | 82,8 | 3159 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 13,2 | 86,8 | 253 |
| 25-34 | 15,9 | 84,1 | 1053 |
| 35-44 | 21,6 | 78,4 | 984 |
| 45-54 | 16,4 | 83,6 | 685 |
| 55-64 | 9,1 | 90,9 | 174 |
| 65-74 | 16,4 | 83,6 | 9 |
| 75 + | ,0 | 100,0 | 1 |
| Total | 17,2 | 82,8 | 3159 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 29,0 | 71,0 | 56 |
| Ecole primaire | 18,8 | 81,2 | 184 |
| Secondaire inférieur | 29,2 | 70,8 | 407 |
| Secondaire supérieur | 17,4 | 82,6 | 993 |
| Supérieur | 12,1 | 87,9 | 1407 |
| Total | 16,9 | 83,1 | 3047 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 29,8 | 70,2 | 102 |
| 20.000-30.000 | 16,0 | 84,0 | 317 |
| 30.000-40.000 | 22,8 | 77,2 | 569 |
| 40.000-60.000 | 16,7 | 83,3 | 1426 |
| >60.000 | 11,6 | 88,4 | 626 |
| Total | 17,1 | 82,9 | 3040 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 17,5 | 82,5 | 2579 |
| Très mauvaise à moyenne | 18,2 | 81,8 | 412 |
| Total | 17,6 | 82,4 | 2991 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 17,6 | 82,4 | 1298 |
| Dans le passé | 14,4 | 85,6 | 702 |
| Modéré (<20) | 20,3 | 79,7 | 667 |
| Gros fumeur | 17,9 | 82,1 | 373 |
| Total | 17,5 | 82,5 | 3040 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région flamande | 16,4 | 83,6 | 1220 |
| Région bruxelloise | 12,0 | 88,0 | 889 |
| Région wallonne | 20,6 | 79,4 | 1050 |
| Belgique | 17,2 | 82,8 | 3159 |

(*) N = nombre total d'employés, salariés et fonctionnaires interrogés

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$09)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 17,9 | 82,1 | 703 |
| Femme | 14,2 | 85,8 | 517 |
| Total | 16,4 | 83,6 | 1220 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 12,9 | 87,1 | 123 |
| 25-34 | 15,9 | 84,1 | 437 |
| 35-44 | 20,9 | 79,1 | 357 |
| 45-54 | 13,9 | 86,1 | 255 |
| 55-64 | 5,8 | 94,2 | 46 |
| 65-74 | 58,3 | 41,7 | 2 |
| Total | 16,4 | 83,6 | 1220 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 23,4 | 76,6 | 16 |
| Ecole primaire | 14,2 | 85,8 | 69 |
| Secondaire inférieur | 28,5 | 71,5 | 167 |
| Secondaire supérieur | 17,9 | 82,1 | 429 |
| Supérieur | 10,3 | 89,7 | 497 |
| Total | 16,0 | 84,0 | 1178 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 12,7 | 87,3 | 9 |
| 20.000-30.000 | 16,3 | 83,7 | 107 |
| 30.000-40.000 | 21,4 | 78,6 | 221 |
| 40.000-60.000 | 16,5 | 83,5 | 592 |
| >60.000 | 10,9 | 89,1 | 233 |
| Total | 16,2 | 83,8 | 1162 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 16,9 | 83,1 | 1063 |
| Très mauvaise à moyenne | 15,1 | 84,9 | 123 |
| Total | 16,7 | 83,3 | 1186 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 17,5 | 82,5 | 545 |
| Dans le passé | 11,2 | 88,8 | 279 |
| Modéré (<20) | 20,0 | 80,0 | 265 |
| Gros fumeur | 17,7 | 82,3 | 110 |
| Total | 16,6 | 83,4 | 1199 |

(*) N = nombre total d'employés, salariés et fonctionnaires interrogés

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$09)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|---|-------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 13,0 | 87,0 | 478 |
| Femme | 10,8 | 89,2 | 411 |
| Total | 12,0 | 88,0 | 889 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 9,9 | 90,1 | 47 |
| 25-34 | 12,4 | 87,6 | 269 |
| 35-44 | 11,9 | 88,1 | 283 |
| 45-54 | 13,1 | 86,9 | 217 |
| 55-64 | 9,0 | 91,0 | 68 |
| 65-74 | ,0 | 100,0 | 4 |
| 75 + | ,0 | 100,0 | 1 |
| Total | 12,0 | 88,0 | 889 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 23,5 | 76,5 | 27 |
| Ecole primaire | 17,6 | 82,4 | 66 |
| Secondaire inférieur | 19,8 | 80,2 | 90 |
| Secondaire supérieur | 9,5 | 90,5 | 211 |
| Supérieur | 10,7 | 89,3 | 462 |
| Total | 12,3 | 87,7 | 856 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 23,1 | 76,9 | 58 |
| 20.000-30.000 | 8,3 | 91,7 | 92 |
| 30.000-40.000 | 15,4 | 84,6 | 135 |
| 40.000-60.000 | 10,1 | 89,9 | 336 |
| >60.000 | 12,8 | 87,2 | 232 |
| Total | 12,4 | 87,6 | 853 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 12,6 | 87,4 | 681 |
| Très mauvaise à moyenne | 11,3 | 88,7 | 130 |
| Total | 12,4 | 87,6 | 811 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 12,5 | 87,5 | 317 |
| Dans le passé | 8,0 | 92,0 | 191 |
| Modéré (<20) | 10,5 | 89,5 | 191 |
| Gros fumeur | 20,4 | 79,6 | 123 |
| Total | 12,3 | 87,7 | 822 |

(*) N = nombre total d'employés, salariés et fonctionnaires interrogés

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$09)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|-------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 20,9 | 79,1 | 615 |
| Femme | 20,3 | 79,7 | 435 |
| Total | 20,6 | 79,4 | 1050 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 14,8 | 85,2 | 83 |
| 25-34 | 17,0 | 83,0 | 347 |
| 35-44 | 26,1 | 73,9 | 344 |
| 45-54 | 22,4 | 77,6 | 213 |
| 55-64 | 14,0 | 86,0 | 60 |
| 65-74 | ,0 | 100,0 | 3 |
| Total | 20,6 | 79,4 | 1050 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 48,0 | 52,0 | 13 |
| Ecole primaire | 35,7 | 64,3 | 49 |
| Secondaire inférieur | 32,7 | 67,3 | 150 |
| Secondaire supérieur | 18,0 | 82,0 | 353 |
| Supérieur | 16,0 | 84,0 | 448 |
| Total | 20,2 | 79,8 | 1013 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 42,8 | 57,2 | 35 |
| 20.000-30.000 | 18,1 | 81,9 | 118 |
| 30.000-40.000 | 27,1 | 72,9 | 213 |
| 40.000-60.000 | 18,9 | 81,1 | 498 |
| >60.000 | 13,1 | 86,9 | 161 |
| Total | 20,4 | 79,6 | 1025 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 20,4 | 79,6 | 835 |
| Très mauvaise à moyenne | 24,7 | 75,3 | 159 |
| Total | 21,1 | 78,9 | 994 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 19,2 | 80,8 | 436 |
| Dans le passé | 23,0 | 77,0 | 232 |
| Modéré (<20) | 24,2 | 75,8 | 211 |
| Gros fumeur | 17,4 | 82,6 | 140 |
| Total | 20,9 | 79,1 | 1019 |

(*) N = nombre total d'employés, salariés et fonctionnaires interrogés

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : \$PC_OLD)
Enquête de santé, Belgique, 1997

| Total | UTILISATIONS DE SERVICES POUR | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Femme de ménage privée | Service de nettoyage (personnes âgées) | Aide familiale ou aide senior | Repas chauds à domicile | Aide d'un centr pe |
| N | % | % | % | % | % |
| SEXE | | | | | |
| Homme 993 | 11,7 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | , |
| Femme 1253 | 14,8 | 7,7 | 5,8 | 3,6 | , |
| Total 2246 | 13,4 | 5,6 | 4,3 | 3,2 | , |
| GROUPE AGE | | | | | |
| 60-64 521 | 7,8 | 1,2 | 1,7 | ,2 | , |
| 65-69 561 | 12,2 | 2,2 | 3,3 | 2,6 | , |
| 70-74 497 | 15,0 | 4,9 | 3,9 | 3,5 | , |
| 75-79 330 | 19,7 | 8,4 | 2,6 | 4,6 | , |
| 80-84 189 | 12,9 | 21,0 | 13,1 | 9,2 | , |
| 85 + 148 | 26,5 | 19,2 | 17,3 | 8,9 | 1, |
| Total 2246 | 13,4 | 5,6 | 4,3 | 3,2 | , |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme 109 | 3,4 | 8,0 | 5,9 | 5,2 | ,1 |
| Ecole primaire 646 | 6,7 | 7,2 | 5,3 | 5,0 | ,, |
| Secondaire inférieur 482 | 10,0 | 5,6 | 7,4 | 3,8 | ,4 |
| Secondaire supérieur 475 | 12,0 | 5,1 | 2,2 | 2,7 | ,6 |
| Supérieur 429 | 34,6 | 3,3 | 1,9 | ,3 | ,1 |
| Total 2141 | 13,6 | 5,7 | 4,4 | 3,3 | , |

| N | Femme de ménage privée | Service de nettoyage (personnes âgées) | Aide familiale ou aide senior | Repas chauds à domicile | Aide d'un centr jour | pe |
|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----|
| | % | % | % | % | % | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme 347 | 8,0 | 3,9 | 1,9 | 3,4 | | , |
| Femme 412 | 13,0 | 8,7 | 5,3 | 2,4 | | , |
| Total 759 | 10,8 | 6,5 | 3,8 | 2,9 | | , |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 60-64 208 | 4,5 | 1,1 | ,9 | ,0 | | , |
| 65-69 188 | 9,4 | 1,4 | ,9 | ,4 | | , |
| 70-74 170 | 14,8 | 6,0 | 4,4 | 5,5 | | , |
| 75-79 93 | 11,6 | 8,9 | 1,6 | 2,1 | | , |
| 80-84 59 | 11,9 | 29,1 | 14,8 | 13,6 | | ,1 |
| 85 + 41 | 32,4 | 28,3 | 21,6 | 6,3 | | , |
| Total 759 | 10,8 | 6,5 | 3,8 | 2,9 | | , |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme 26 | 5,8 | 19,4 | 17,6 | 15,8 | | ,0 |
| Ecole primaire 244 | 7,7 | 7,4 | 5,5 | 5,9 | | ,: |
| Secondaire inférieur 168 | 3,9 | 8,1 | 2,5 | 1,0 | | ,0 |
| Secondaire supérieur 190 | 12,6 | 4,3 | 2,0 | 1,1 | | ,5 |
| Supérieur 104 | 28,2 | 4,5 | 2,2 | ,2 | | , |
| Total 732 | 10,9 | 6,7 | 3,7 | 3,0 | | , |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 44 | 5,6 | 8,5 | 8,1 | 6,6 | | 2,: |
| 20.000-30.000 193 | 2,3 | 12,8 | 6,0 | 1,5 | | ,1 |
| 30.000-40.000 263 | 7,7 | 5,8 | 2,5 | 1,8 | | ,1 |
| 40.000-60.000 172 | 17,3 | 3,0 | 3,0 | 5,3 | | ,: |

| | | | | | |
|--------------------------------|------|------|-----|------|----|
| >60.000 51 | 41,1 | ,0 | 1,5 | ,0 | , |
| Total 723 | 10,6 | 7,0 | 4,0 | 2,9 | , |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne 432 | 11,2 | 2,6 | 1,6 | ,4 | ,4 |
| Très mauvaise à moyenne 279 | 8,5 | 11,6 | 6,8 | 4,3 | ,5 |
| Total 711 | 10,2 | 6,1 | 3,6 | 1,9 | , |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais 373 | 10,6 | 8,0 | 4,4 | 2,0 | , |
| Dans le passé 242 | 12,2 | 4,9 | 3,7 | 2,6 | ,1 |
| Modéré (<20) 81 | 3,0 | 2,2 | ,5 | ,0 | , |
| Gros fumeur 28 | 9,2 | 1,3 | ,0 | 21,2 | ,1 |
| Total 724 | 10,2 | 5,9 | 3,5 | 3,1 | , |

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : \$PC_OLD)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| Total N | UTILISATIONS DE SERVICES POUR | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Femme de ménage privée | Service de nettoyage (personnes âgées) | Aide familiale ou aide senior | Repas chauds à domicile | Aide d'un centr jour |
| | % | % | % | % | % |
| SEXE | | | | | |
| Homme 300 | 11,9 | 1,3 | 4,7 | 3,8 | 1, |
| Femme 388 | 17,5 | 8,3 | 4,7 | 7,4 | 1, |
| Total 688 | 15,3 | 5,6 | 4,7 | 6,0 | 1, |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 60-64 140 | 12,1 | ,0 | 2,4 | 1,7 | 3, |
| 65-69 169 | 7,4 | 7,3 | 1,3 | 6,1 | , |
| 70-74 148 | 17,5 | 2,9 | 8,5 | 2,5 | , |
| 75-79 111 | 21,7 | 10,6 | 1,6 | 11,6 | ,' |
| 80-84 60 | 14,7 | 3,7 | 13,3 | 5,3 | 3, |
| 85 + 60 | 31,4 | 9,7 | 13,0 | 11,5 | 7, |
| Total 688 | 15,3 | 5,6 | 4,7 | 6,0 | 1, |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme 31 | 3,6 | ,0 | 1,6 | 1,7 | ,' |
| Ecole primaire 123 | 6,4 | 4,5 | 7,1 | 5,8 | 4,: |
| Secondaire inférieur 140 | 10,8 | 4,9 | 10,6 | 8,1 | 3,4 |
| Secondaire supérieur 156 | 9,7 | 12,8 | 2,4 | 12,4 | ,7 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|-----|
| Supérieur 182 | 36,1 | 1,6 | 4,1 | 1,1 | ,1 |
| Total 632 | 15,4 | 5,7 | 4,9 | 6,4 | 1, |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 39 | 6,1 | 6,3 | 2,7 | 3,9 | 1, |
| 20.000-30.000 147 | 10,8 | 2,3 | 4,6 | 2,6 | 1,0 |
| 30.000-40.000 185 | 12,0 | 4,4 | 10,2 | 3,2 | 1,4 |
| 40.000-60.000 165 | 13,8 | 1,6 | 3,6 | 6,0 | 2,4 |
| >60.000 100 | 29,3 | 18,9 | ,8 | 18,3 | ,1 |
| Total 636 | 14,9 | 6,0 | 4,9 | 6,5 | 1, |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne 339 | 15,5 | 5,1 | 2,5 | 4,3 | ,4 |
| Très mauvaise à moyenne 268 | 15,6 | 7,2 | 7,5 | 8,1 | 2,5 |
| Total 607 | 15,6 | 6,1 | 4,8 | 6,0 | 1, |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais 296 | 11,2 | 8,6 | 4,6 | 7,9 | ,1 |
| Dans le passé 217 | 16,2 | 2,3 | 5,1 | 3,3 | 1,0 |
| Modéré (<20) 73 | 26,9 | 3,3 | 4,3 | 10,5 | 5,4 |
| Gros fumeur 25 | 16,7 | 7,5 | 7,9 | ,0 | 7,4 |
| Total 611 | 14,7 | 6,1 | 4,8 | 6,4 | 1, |

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : \$PC_OLD)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| Total N | UTILISATIONS DE SERVICES POUR | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Femme de ménage privée | Service de nettoyage (personnes âgées) | Aide familiale ou aide senior | Repas chauds à domicile | Aide d'un centr jour |
| | % | % | % | % | % |
| SEXE | | | | | |
| Homme 346 | 17,8 | 1,7 | 2,4 | 1,2 | , |
| Femme 453 | 16,5 | 5,9 | 7,2 | 4,0 | , |
| Total 799 | 17,1 | 4,1 | 5,1 | 2,8 | , |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 60-64 173 | 13,1 | 1,7 | 3,0 | ,0 | , |
| 65-69 204 | 17,7 | 1,8 | 7,5 | 4,4 | , |
| 70-74 179 | 14,6 | 3,7 | 1,6 | ,7 | , |
| 75-79 126 | 28,9 | 6,5 | 4,4 | 4,0 | , |
| 80-84 70 | 13,6 | 15,1 | 10,0 | 3,6 | , |
| 85 + 47 | 12,1 | 7,8 | 11,8 | 12,1 | , |
| Total 799 | 17,1 | 4,1 | 5,1 | 2,8 | , |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme 52 | 1,7 | 4,5 | ,5 | ,2 | ,1 |
| Ecole primaire 279 | 5,1 | 7,4 | 4,7 | 3,2 | ,1 |
| Secondaire inférieur 174 | 20,5 | 1,5 | 15,1 | 7,5 | ,3 |
| Secondaire supérieur 129 | 11,9 | 2,4 | 2,7 | 1,3 | 1,1 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|----|
| Supérieur 143 | 39,6 | 2,9 | ,7 | ,0 | ,1 |
| Total 777 | 17,2 | 4,1 | 5,2 | 2,8 | , |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 56 | 16,8 | 4,1 | 8,8 | ,1 | 1, |
| 20.000-30.000 189 | 3,1 | 8,1 | 6,3 | 2,8 | ,0 |
| 30.000-40.000 244 | 7,0 | 3,8 | 2,1 | 1,3 | ,: |
| 40.000-60.000 221 | 33,3 | 2,5 | 8,8 | 5,8 | ,1 |
| >60.000 48 | 47,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 2, |
| Total 758 | 17,4 | 4,1 | 5,3 | 2,9 | , |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne 342 | 16,9 | 1,2 | 4,5 | 3,5 | ,0 |
| Très mauvaise à moyenne 391 | 17,9 | 6,1 | 5,8 | 1,7 | ,2 |
| Total 733 | 17,4 | 3,8 | 5,2 | 2,6 | , |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais 393 | 18,1 | 4,6 | 8,4 | 4,2 | , |
| Dans le passé 235 | 18,6 | 3,7 | 3,7 | 1,7 | ,: |
| Modéré (<20) 93 | 12,9 | ,6 | 1,4 | ,0 | ,1 |
| Gros fumeur 24 | 30,1 | 5,2 | ,0 | ,0 | ,1 |
| Total 745 | 18,0 | 3,8 | 5,5 | 2,6 | , |

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : PC02\$99)
Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC UN PRATICIEN ALTERNATIF AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|----------|-------|
| | Oui % | Non % | N |
| SEXE | | | |
| Homme | 6,5 | 93,5 | 4941 |
| Femme | 8,5 | 91,5 | 5178 |
| Total | 7,5 | 92,5 | 10119 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 5,2 | 94,8 | 1617 |
| 15-24 | 4,5 | 95,5 | 1141 |
| 25-34 | 8,4 | 91,6 | 1632 |
| 35-44 | 9,8 | 90,2 | 1600 |
| 45-54 | 10,1 | 89,9 | 1288 |
| 55-64 | 6,8 | 93,2 | 1091 |
| 65-74 | 8,0 | 92,0 | 1075 |
| 75 + | 3,9 | 96,1 | 675 |
| Total | 7,5 | 92,5 | 10119 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 2,9 | 97,1 | 349 |
| Ecole primaire | 4,7 | 95,3 | 1281 |
| Secondaire inférieur | 5,2 | 94,8 | 1655 |
| Secondaire supérieur | 6,1 | 93,9 | 2927 |
| Supérieur | 11,2 | 88,8 | 3490 |
| Total | 7,5 | 92,5 | 9702 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 3,8 | 96,2 | 787 |
| 20.000-30.000 | 5,7 | 94,3 | 2025 |
| 30.000-40.000 | 6,4 | 93,6 | 2351 |
| 40.000-60.000 | 8,7 | 91,3 | 3216 |
| >60.000 | 10,0 | 90,0 | 1281 |
| Total | 7,4 | 92,6 | 9660 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 7,4 | 92,6 | 5881 |
| Très mauvaise à moyenne | 11,4 | 88,6 | 2018 |
| Total | 8,3 | 91,7 | 7899 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 8,1 | 91,9 | 3697 |
| Dans le passé | 11,5 | 88,5 | 1917 |
| Modéré (<20) | 6,8 | 93,2 | 1566 |
| Gros fumeur | 3,6 | 96,4 | 828 |
| Total | 8,1 | 91,9 | 8008 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région flamande | 7,3 | 92,7 | 3499 |
| Région bruxelloise | 8,3 | 91,7 | 3016 |
| Région wallonne | 7,6 | 92,4 | 3604 |

| | | | |
|----------|-----|------|-------|
| Belgique | 7,5 | 92,5 | 10119 |
|----------|-----|------|-------|

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : PC02\$99)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC UN PRATICIEN ALTERNATIF AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 6,1 | 93,9 | 1742 |
| Femme | 8,5 | 91,5 | 1757 |
| Total | 7,3 | 92,7 | 3499 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 5,1 | 94,9 | 533 |
| 15-24 | 3,7 | 96,3 | 425 |
| 25-34 | 8,6 | 91,4 | 587 |
| 35-44 | 8,9 | 91,1 | 526 |
| 45-54 | 10,4 | 89,6 | 466 |
| 55-64 | 6,5 | 93,5 | 406 |
| 65-74 | 8,7 | 91,3 | 363 |
| 75 + | 1,7 | 98,3 | 193 |
| Total | 7,3 | 92,7 | 3499 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 2,3 | 97,7 | 65 |
| Ecole primaire | 6,4 | 93,6 | 420 |
| Secondaire inférieur | 5,1 | 94,9 | 602 |
| Secondaire supérieur | 5,2 | 94,8 | 1167 |
| Supérieur | 11,4 | 88,6 | 1124 |
| Total | 7,4 | 92,6 | 3378 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 3,8 | 96,2 | 119 |
| 20.000-30.000 | 5,1 | 94,9 | 599 |
| 30.000-40.000 | 6,9 | 93,1 | 857 |
| 40.000-60.000 | 8,5 | 91,5 | 1272 |
| >60.000 | 8,0 | 92,0 | 459 |
| Total | 7,2 | 92,8 | 3306 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 7,0 | 93,0 | 2264 |
| Très mauvaise à moyenne | 12,4 | 87,6 | 567 |
| Total | 8,0 | 92,0 | 2831 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 7,6 | 92,4 | 1367 |
| Dans le passé | 10,9 | 89,1 | 698 |
| Modéré (<20) | 6,9 | 93,1 | 556 |
| Gros fumeur | 3,1 | 96,9 | 241 |
| Total | 7,8 | 92,2 | 2862 |

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : PC02\$99)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC UN PRATICIEN ALTERNATIF AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 7,0 | 93,0 | 1457 |
| Femme | 9,5 | 90,5 | 1559 |
| Total | 8,3 | 91,7 | 3016 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 5,7 | 94,3 | 469 |
| 15-24 | 7,3 | 92,7 | 312 |
| 25-34 | 6,2 | 93,8 | 496 |
| 35-44 | 10,3 | 89,7 | 487 |
| 45-54 | 13,8 | 86,2 | 381 |
| 55-64 | 8,9 | 91,1 | 311 |
| 65-74 | 9,8 | 90,2 | 324 |
| 75 + | 3,5 | 96,5 | 236 |
| Total | 8,3 | 91,7 | 3016 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 6,8 | 93,2 | 165 |
| Ecole primaire | 2,6 | 97,4 | 364 |
| Secondaire inférieur | 6,0 | 94,0 | 422 |
| Secondaire supérieur | 5,5 | 94,5 | 702 |
| Supérieur | 12,8 | 87,2 | 1197 |
| Total | 8,2 | 91,8 | 2850 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 3,9 | 96,1 | 367 |
| 20.000-30.000 | 5,3 | 94,7 | 624 |
| 30.000-40.000 | 6,4 | 93,6 | 601 |
| 40.000-60.000 | 10,8 | 89,2 | 781 |
| >60.000 | 11,4 | 88,6 | 495 |
| Total | 7,7 | 92,3 | 2868 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 8,1 | 91,9 | 1670 |
| Très mauvaise à moyenne | 11,9 | 88,1 | 620 |
| Total | 9,0 | 91,0 | 2290 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 9,3 | 90,7 | 1010 |
| Dans le passé | 10,9 | 89,1 | 560 |
| Modéré (<20) | 9,2 | 90,8 | 459 |
| Gros fumeur | 3,7 | 96,3 | 273 |
| Total | 9,0 | 91,0 | 2302 |

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : PC02\$99)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | CONTACT AVEC UN PRATICIEN ALTERNATIF AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE | | Total |
|-------------------------------|--|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 6,9 | 93,1 | 1742 |
| Femme | 8,3 | 91,7 | 1862 |
| Total | 7,6 | 92,4 | 3604 |
| GROUPES AGE | | | |
| 0-14 | 5,2 | 94,8 | 615 |
| 15-24 | 5,1 | 94,9 | 404 |
| 25-34 | 8,9 | 91,1 | 549 |
| 35-44 | 11,2 | 88,8 | 587 |
| 45-54 | 8,5 | 91,5 | 441 |
| 55-64 | 6,9 | 93,1 | 374 |
| 65-74 | 6,2 | 93,8 | 388 |
| 75 + | 7,3 | 92,7 | 246 |
| Total | 7,6 | 92,4 | 3604 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | ,8 | 99,2 | 119 |
| Ecole primaire | 2,6 | 97,4 | 497 |
| Secondaire inférieur | 5,2 | 94,8 | 631 |
| Secondaire supérieur | 8,1 | 91,9 | 1058 |
| Supérieur | 10,3 | 89,7 | 1169 |
| Total | 7,5 | 92,5 | 3474 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 3,7 | 96,3 | 301 |
| 20.000-30.000 | 6,8 | 93,2 | 802 |
| 30.000-40.000 | 5,7 | 94,3 | 893 |
| 40.000-60.000 | 8,7 | 91,3 | 1163 |
| >60.000 | 15,1 | 84,9 | 327 |
| Total | 7,7 | 92,3 | 3486 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 8,1 | 91,9 | 1947 |
| Très mauvaise à moyenne | 10,0 | 90,0 | 831 |
| Total | 8,6 | 91,4 | 2778 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 8,5 | 91,5 | 1320 |
| Dans le passé | 12,8 | 87,2 | 659 |
| Modéré (<20) | 5,7 | 94,3 | 551 |
| Gros fumeur | 4,2 | 95,8 | 314 |
| Total | 8,3 | 91,7 | 2844 |

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : \$PC_ALT)
Enquête de santé, Belgique, 1997

| | TYPE DE PRATICIEN ALTERNATIF QUI A ETE CONTACTE | | | Total N(*) |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------|---------------|
| | Homeop. | Chiropr. ou osteop. | Acupunct. | |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 45,2 | 42,7 | 12,2 | 352 |
| Femme | 45,0 | 39,2 | 15,9 | 560 |
| Total | 45,1 | 40,6 | 14,3 | 912 |
| GROUPE AGE | | | | |
| 0-14 | 84,4 | 14,1 | 1,5 | 109 |
| 15-24 | 52,0 | 28,2 | 19,8 | 74 |
| 25-34 | 37,4 | 48,7 | 13,9 | 157 |
| 35-44 | 38,9 | 50,6 | 10,5 | 199 |
| 45-54 | 44,3 | 42,7 | 13,0 | 154 |
| 55-64 | 39,1 | 42,6 | 18,3 | 98 |
| 65-74 | 35,7 | 30,3 | 33,9 | 88 |
| 75 + | 33,2 | 43,0 | 23,8 | 33 |
| Total | 45,1 | 40,6 | 14,3 | 912 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 12,9 | 60,6 | 26,6 | 10 |
| Ecole primaire | 46,2 | 36,0 | 17,9 | 53 |
| Secondaire inférieur | 42,9 | 47,8 | 9,3 | 111 |
| Secondaire supérieur | 41,3 | 46,9 | 11,8 | 217 |
| Supérieur | 48,2 | 36,2 | 15,5 | 482 |
| Total | 45,3 | 40,7 | 14,1 | 873 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 50,0 | 36,5 | 13,4 | 39 |
| 20.000-30.000 | 42,0 | 50,8 | 7,2 | 131 |
| 30.000-40.000 | 48,1 | 30,9 | 20,9 | 168 |
| 40.000-60.000 | 46,1 | 38,3 | 15,6 | 340 |
| >60.000 | 35,8 | 51,8 | 12,4 | 178 |
| Total | 44,1 | 41,1 | 14,7 | 856 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 39,1 | 46,7 | 14,2 | 519 |
| Très mauvaise à moyenne | 43,9 | 39,7 | 16,4 | 248 |
| Total | 40,6 | 44,5 | 14,9 | 767 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 44,0 | 44,1 | 12,0 | 358 |
| Dans le passé | 36,2 | 43,5 | 20,3 | 234 |
| Modéré (<20) | 41,3 | 43,8 | 14,9 | 139 |
| Gros fumeur | 38,9 | 50,8 | 10,3 | 36 |
| Total | 40,8 | 44,1 | 15,1 | 767 |
| RÉGION DE RESIDENCE | | | | |
| Région flamande | 45,4 | 40,6 | 14,0 | 266 |
| Région bruxelloise | 41,3 | 43,5 | 15,2 | 324 |
| Région wallonne | 45,9 | 39,5 | 14,5 | 322 |
| Belgique | 45,1 | 40,6 | 14,3 | 912 |

(*) N = Nombre total de contacts avec le praticien
alternatif au cours de la dernière année

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : \$PC_ALT)
Enquête de santé, Belgique, 1997

| | TYPE DE PRATICIEN ALTERNATIF QUI A ETE CONTACTE | | | Total |
|-------------------------------|--|------------------------|-----------|-------|
| | Homeop. | Chiropr. ou osteop. | Acupunct. | N(*) |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 49,0 | 40,2 | 10,8 | 100 |
| Femme | 42,9 | 41,0 | 16,1 | 166 |
| Total | 45,4 | 40,6 | 14,0 | 266 |
| GROUPES AGE | | | | |
| 0-14 | 88,3 | 9,3 | 2,5 | 27 |
| 15-24 | 42,0 | 30,7 | 27,3 | 21 |
| 25-34 | 34,1 | 53,2 | 12,7 | 56 |
| 35-44 | 38,8 | 50,1 | 11,1 | 55 |
| 45-54 | 47,7 | 39,6 | 12,6 | 48 |
| 55-64 | 40,3 | 51,3 | 8,4 | 32 |
| 65-74 | 46,3 | 21,1 | 32,6 | 22 |
| 75 + | 27,3 | 21,3 | 51,4 | 5 |
| Total | 45,4 | 40,6 | 14,0 | 266 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | ,0 | 18,3 | 81,7 | 4 |
| Ecole primaire | 47,6 | 33,7 | 18,7 | 18 |
| Secondaire inférieur | 43,2 | 50,7 | 6,1 | 33 |
| Secondaire supérieur | 36,1 | 51,1 | 12,8 | 68 |
| Supérieur | 50,9 | 36,2 | 12,8 | 138 |
| Total | 45,8 | 41,2 | 13,0 | 261 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 32,8 | 46,0 | 21,2 | 7 |
| 20.000-30.000 | 44,1 | 52,2 | 3,8 | 32 |
| 30.000-40.000 | 51,6 | 24,6 | 23,8 | 56 |
| 40.000-60.000 | 43,5 | 42,0 | 14,5 | 115 |
| >60.000 | 33,3 | 57,7 | 9,0 | 38 |
| Total | 43,6 | 41,9 | 14,5 | 248 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 36,4 | 48,3 | 15,2 | 165 |
| Très mauvaise à moyenne | 51,6 | 37,2 | 11,2 | 68 |
| Total | 41,0 | 45,0 | 14,0 | 233 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 43,9 | 44,7 | 11,4 | 105 |
| Dans le passé | 35,1 | 44,6 | 20,3 | 76 |
| Modéré (<20) | 40,0 | 48,5 | 11,5 | 43 |
| Gros fumeur | 58,5 | 31,6 | 9,8 | 8 |
| Total | 40,7 | 44,9 | 14,3 | 232 |

(*) N = Nombre total de contacts avec le praticien

alternatif au cours de la dernière année

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : \$PC_ALT)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | TYPE DE PRATICIEN ALTERNATIF QUI A ETE CONTACTE | | | Total |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------|-------|
| | Homeop. | Chiropr. ou osteop. | Acupunct. | N(*) |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 42,0 | 44,1 | 13,9 | 113 |
| Femme | 40,9 | 43,1 | 16,1 | 211 |
| Total | 41,3 | 43,5 | 15,2 | 324 |
| GROUPES AGE | | | | |
| 0-14 | 83,7 | 16,3 | ,0 | 34 |
| 15-24 | 54,9 | 29,6 | 15,5 | 30 |
| 25-34 | 27,7 | 45,9 | 26,5 | 46 |
| 35-44 | 37,3 | 51,3 | 11,3 | 69 |
| 45-54 | 37,9 | 44,8 | 17,3 | 63 |
| 55-64 | 47,9 | 35,7 | 16,4 | 37 |
| 65-74 | 18,4 | 66,5 | 15,1 | 35 |
| 75 + | 29,2 | 65,7 | 5,0 | 10 |
| Total | 41,3 | 43,5 | 15,2 | 324 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 5,8 | 94,2 | ,0 | 5 |
| Ecole primaire | 35,1 | 55,5 | 9,4 | 14 |
| Secondaire inférieur | 38,9 | 39,1 | 22,0 | 34 |
| Secondaire supérieur | 38,0 | 36,9 | 25,2 | 53 |
| Supérieur | 46,1 | 39,6 | 14,3 | 197 |
| Total | 41,5 | 42,4 | 16,1 | 303 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 40,7 | 35,5 | 23,8 | 21 |
| 20.000-30.000 | 46,1 | 41,2 | 12,7 | 41 |
| 30.000-40.000 | 47,2 | 44,4 | 8,4 | 53 |
| 40.000-60.000 | 42,7 | 37,1 | 20,2 | 107 |
| >60.000 | 40,5 | 44,3 | 15,2 | 76 |
| Total | 43,2 | 40,5 | 16,3 | 298 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 41,7 | 44,7 | 13,6 | 181 |
| Très mauvaise à moyenne | 29,1 | 50,4 | 20,5 | 87 |
| Total | 37,4 | 46,6 | 15,9 | 268 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 35,4 | 50,1 | 14,5 | 128 |
| Dans le passé | 44,1 | 34,8 | 21,0 | 70 |
| Modéré (<20) | 38,2 | 49,1 | 12,7 | 58 |
| Gros fumeur | 32,7 | 44,0 | 23,3 | 13 |
| Total | 37,9 | 46,0 | 16,1 | 269 |

(*) N = Nombre total de contacts avec le praticien
alternatif au cours de la dernière année

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : \$PC_ALT)

Enquête de santé, Belgique, 1997

| | TYPE DE PRATICIEN ALTERNATIF QUI A ETE CONTACTE | | | Total |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------|-------|
| | Homeop. | Chiropr. ou osteop. | Acupunct. | N(*) |
| | % | % | % | |
| SEXE | | | | |
| Homme | 40,7 | 45,8 | 13,5 | 139 |
| Femme | 49,9 | 34,8 | 15,3 | 183 |
| Total | 45,9 | 39,5 | 14,5 | 322 |
| GROUPES AGE | | | | |
| 0-14 | 79,4 | 20,1 | ,5 | 48 |
| 15-24 | 65,5 | 23,7 | 10,8 | 23 |
| 25-34 | 45,3 | 42,4 | 12,3 | 55 |
| 35-44 | 39,7 | 51,0 | 9,3 | 75 |
| 45-54 | 40,7 | 47,5 | 11,8 | 43 |
| 55-64 | 31,7 | 27,8 | 40,4 | 29 |
| 65-74 | 23,6 | 30,2 | 46,2 | 31 |
| 75 + | 35,1 | 43,6 | 21,3 | 18 |
| Total | 45,9 | 39,5 | 14,5 | 322 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 100,0 | ,0 | ,0 | 1 |
| Ecole primaire | 44,7 | 37,7 | 17,6 | 21 |
| Secondaire inférieur | 43,7 | 46,6 | 9,7 | 44 |
| Secondaire supérieur | 48,1 | 43,6 | 8,3 | 96 |
| Supérieur | 44,5 | 34,8 | 20,6 | 147 |
| Total | 45,8 | 39,2 | 15,0 | 309 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | |
| < 20.000 | 69,3 | 30,7 | ,0 | 11 |
| 20.000-30.000 | 39,0 | 51,9 | 9,1 | 58 |
| 30.000-40.000 | 42,5 | 38,1 | 19,4 | 59 |
| 40.000-60.000 | 51,9 | 31,8 | 16,2 | 118 |
| >60.000 | 36,7 | 48,3 | 15,0 | 64 |
| Total | 45,2 | 40,2 | 14,6 | 310 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | |
| Bonne à très bonne | 42,6 | 44,6 | 12,8 | 173 |
| Très mauvaise à moyenne | 38,1 | 39,4 | 22,5 | 93 |
| Total | 41,2 | 42,9 | 15,9 | 266 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | |
| Jamais | 47,0 | 41,0 | 12,0 | 125 |
| Dans le passé | 36,1 | 43,8 | 20,2 | 88 |
| Modéré (<20) | 46,0 | 30,5 | 23,5 | 38 |
| Gros fumeur | 21,4 | 71,9 | 6,7 | 15 |
| Total | 41,8 | 42,3 | 15,9 | 266 |

(*) N = Nombre total de contacts avec le praticien
alternatif au cours de la dernière année