

5.3. Style de Vie et Prévention

5.3.7. Santé maternelle et infantile

5.3.7.3. Suivi du nourrisson

5.3.7.3.1 Résumé

La période de 0 à 5 ans est considérée comme une période à risque qui justifie un suivi actif des enfants. Les contacts seront particulièrement concentrés sur la première année de vie pendant laquelle ont lieu les vaccinations de base et les dépistages les plus importants.

Rappelons que les effectifs étant très réduits (500 enfants), il convient d'être prudent dans l'interprétation des résultats

- En Belgique, 84% des femmes interrogées qui ont accouché dans les cinq dernières années ont répondu avoir reçu une visite à domicile de l'ONE ou de Kind en Gezin. Elles sont significativement plus nombreuses en Flandre (91%) qu'à Bruxelles (59%). En Wallonie, elles sont 81% à avoir reçu une visite de l'ONE. Ces taux pourraient être liés à la présence ou non de personnel de l'ONE/K&G au sein des maternités. Les différences observées entre différents sous-groupes ne sont généralement pas significatives, sauf en ce qui concerne les régions puisque le taux de visite à domicile à la sortie de la maternité est de loin inférieur à celui des deux autres régions.
- La fréquence de la visite à domicile après l'accouchement ne semble en rien présager de l'utilisation des services préventifs pour le suivi des enfants ou leur vaccination. En effet, le taux d'utilisation de ces structures pour le suivi des nourrissons semble plus élevée à Bruxelles (44% de mères, contre 38 ailleurs). Pour les vaccinations, 48% des mères flamandes disent vacciner leur enfant dans une structure préventive contre 40% à Bruxelles et 36% en Wallonie.
- En Belgique, les enfants sont suivis par différents services ou personnes dans un grand nombre de cas (30 à 40%).
- 6% des mères, la plupart en Flandre, rapportent que leur enfant (âgé de trois mois au moins et de moins de cinq ans) n'est pas vacciné. Cinquante pour-cent des enfants sont vaccinés dans des structures préventives (consultation ONE/K&G ou crèche). Seuls 5% des enfants sont vaccinés à la crèche. 28% sont vaccinés par le pédiatre et 14% par le généraliste. L'évaluation de la couverture vaccinale est assez compliquée car il n'y a pas d'enregistrement systématique des vaccinations effectuées par les pédiatres ou les généralistes dans leur cabinet ou à l'hôpital.
- La consommation de soins pour le suivi des enfants ressemble par ailleurs à ce qu'on observe pour les autres aspects de la santé : on consulte beaucoup plus le généraliste en Flandre, et beaucoup plus le spécialiste à Bruxelles et en Wallonie. On a très peu recours au généraliste à Bruxelles.
- Le cas des mères qui fument est à prendre en considération pour une analyse plus fine : elles reçoivent apparemment moins de visites à domicile, consultent moins l'ONE et plus les pédiatres ou les structures privées. Elles consultent également plus fréquemment au cours de la première année de vie de leur enfant.