

## SUIVI DU NOURRISSON (MCH25\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VISITE DE L'ONE APRES SORTIE DE LA MATERNITE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	90,7	9,3	185
Région Bruxelloise	58,8	41,2	154
Région Wallonne	80,8	19,2	187
Belgique	84,5	15,5	526
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>			
Garçon	83,7	16,3	269
Fille	83,8	16,2	214
Total	83,7	16,3	483
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>			
15-24 ans	73,3	26,7	60
25-34 ans	87,8	12,2	398
35-44 ans	68,4	31,6	68
Total	84,5	15,5	526
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	65,4	34,6	18
Primaire	91,8	8,2	15
Secondaire inférieur	88,9	11,1	55
Secondaire supérieur	81,2	18,8	190
Supérieur	87,6	12,4	225
Total	84,7	15,3	503
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	64,6	35,4	48
20.000-30.000	75,4	24,6	105
30.000-40.000	86,6	13,4	111
40.000-60.000	89,2	10,8	192
>60.000	89,0	11,0	55
Total	84,5	15,5	511
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	85,1	14,9	433
Très mauvaise à moyenne	87,1	12,9	71
Total	85,4	14,6	504
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>			
Non	86,7	13,3	388
Oui	74,1	25,9	110
Total	84,0	16,0	498

REGIO: 1 Région Flamande

## SUIVI DU NOURRISSON(mch25\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VISITE DE L'ONE APRES SORTIE DE LA MATERNITE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>			
Garçon	90,8	9,2	99
Fille	89,6	10,4	70
Total	90,3	9,7	169
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>			
15-24 ans	81,1	18,9	11
25-34 ans	92,2	7,8	161
35-44 ans	80,3	19,7	13
Total	90,7	9,3	185
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	100,0	,0	1
Primaire	100,0	,0	3
Secondaire inférieur	93,1	6,9	16
Secondaire supérieur	85,1	14,9	70
Supérieur	94,0	6,0	90
Total	90,5	9,5	180
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	,0	100,0	1
20.000-30.000	84,4	15,6	17
30.000-40.000	95,0	5,0	38
40.000-60.000	90,9	9,1	94
>60.000	90,6	9,4	26
Total	90,3	9,7	176
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	91,1	8,9	161
Très mauvaise à moyenne	95,9	4,1	19
Total	91,6	8,4	180
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>			
Non	93,5	6,5	144
Oui	76,5	23,5	31
Total	90,7	9,3	175

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SUIVI DU NOURRISSON( mch25\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VISITE DE L'ONE APRES SORTIE DE LA MATERNITE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>			
Garçon	54,6	45,4	75
Fille	57,8	42,2	65
Total	56,3	43,7	140
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>			
15-24 ans	54,5	45,5	24
25-34 ans	62,3	37,7	97
35-44 ans	49,2	50,8	33
Total	58,8	41,2	154
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	49,7	50,3	14
Primaire	70,4	29,6	9
Secondaire inférieur	46,9	53,1	17
Secondaire supérieur	57,7	42,3	45
Supérieur	62,2	37,8	62
Total	58,2	41,8	147
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	74,1	25,9	27
20.000-30.000	43,6	56,4	38
30.000-40.000	55,9	44,1	29
40.000-60.000	67,4	32,6	38
>60.000	63,0	37,0	20
Total	59,4	40,6	152
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	58,9	41,1	117
Très mauvaise à moyenne	60,9	39,1	26
Total	59,2	40,8	143
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>			
Non	55,5	44,5	116
Oui	64,3	35,7	31
Total	57,3	42,7	147

REGIO: 3 Région Wallonne

## SUIVI DU NOURRISSON(mch25\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VISITE DE L'ONE APRES SORTIE DE LA MATERNITE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>			
Garçon	77,7	22,3	95
Fille	83,2	16,8	79
Total	80,2	19,8	174
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>			
15-24 ans	74,5	25,5	25
25-34 ans	85,2	14,8	140
35-44 ans	65,7	34,3	22
Total	80,8	19,2	187
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	67,8	32,2	3
Primaire	100,0	,0	3
Secondaire inférieur	94,7	5,3	22
Secondaire supérieur	79,4	20,6	75
Supérieur	80,0	20,0	73
Total	81,8	18,2	176
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	67,1	32,9	20
20.000-30.000	79,1	20,9	50
30.000-40.000	81,4	18,6	44
40.000-60.000	88,8	11,2	60
>60.000	100,0	,0	9
Total	81,8	18,2	183
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	81,1	18,9	155
Très mauvaise à moyenne	84,9	15,1	26
Total	81,6	18,4	181
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>			
Non	82,9	17,1	128
Oui	73,8	26,2	48
Total	80,2	19,8	176

SUIVI DU NOURRISSON (MCH260, MCH2\$47-MCH2\$53)  
Enquête de santé, Belgique, 1997.

SUIVI DU NOURRISSON								
	1	2	3	5	4	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
<b>REGION DE RESIDENCE</b>								
Région Flamande	2,1	45,6	27,9	38,5	17,3	2,7	1,7	185
Région Bruxelloise	,4	12,2	44,4	43,9	20,3	4,8	1,8	135
Région Wallonne	,0	34,4	38,6	37,4	26,9	3,4	3,0	183
Total	1,3	39,1	32,8	38,6	20,6	3,1	2,2	503
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>								
Garçon	,7	44,3	30,0	38,7	20,8	1,7	2,4	256
Fille	1,7	31,7	37,1	39,8	20,8	5,1	1,8	206
Total	1,1	38,7	33,1	39,2	20,8	3,2	2,1	462
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>								
15-24 ans	,0	26,7	25,8	39,9	31,6	,0	1,7	57
25-34 ans	1,6	41,2	33,1	40,2	19,5	3,6	2,4	384
35-44 ans	,0	34,8	38,3	23,5	17,9	2,6	,8	62
Total	1,3	39,1	32,8	38,6	20,6	3,1	2,2	503
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>								
Pas de diplôme	,0	44,0	5,6	33,7	22,3	,0	,0	15
Primaire	,0	49,1	13,3	14,8	37,9	,0	,0	13
Secondaire inférieur	,0	43,2	25,6	35,5	17,0	,7	4,7	54
Secondaire supérieur	,6	42,5	35,1	37,0	16,8	3,5	1,2	183
Supérieur	2,4	36,2	34,0	43,0	22,2	3,9	2,7	217
Total	1,3	39,9	32,5	39,0	19,8	3,2	2,2	482
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>								
< 20.000	,0	44,1	15,4	35,3	27,4	4,6	,0	45
20.000-30.000	,0	30,3	23,0	43,4	24,0	4,8	3,4	99
30.000-40.000	,0	40,0	38,7	36,1	15,1	2,7	2,5	107
40.000-60.000	2,7	39,4	34,3	38,8	22,5	2,3	1,4	184
>60.000	,0	46,7	38,7	42,3	17,2	3,9	2,3	53
Total	1,1	39,1	32,7	39,2	20,7	3,2	2,0	488
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>								
Bonne à très bonne	1,5	37,8	33,2	39,0	19,8	3,1	2,5	419
Très mauvaise à moyenne	,0	42,0	29,8	32,4	29,0	4,6	,0	65
Total	1,3	38,3	32,8	38,2	20,9	3,2	2,2	484
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>								
Non	1,7	40,2	31,4	41,2	21,0	3,5	2,3	369
Oui	,0	34,7	36,1	33,5	22,3	1,6	1,1	106
Total	1,3	39,0	32,4	39,6	21,3	3,1	2,1	475

## Légende:

1= Pas de suivi médical  
3= Pédiatre privé

2= Généraliste  
4= Pédiatre hospitalier

5= ONE - K&G  
7= Autre

6= Crèche

REGIO: 1 Région Flamande

SUIVI DU NOURRISSON (MCH260, MCH2\$47-MCH2\$53)  
Enquête de santé, Belgique, 1997.

SUIVI DU NOURRISSON								
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>								
Garçon	1,0	53,3	21,3	20,4	40,1	2,6	,9	99
Fille	3,1	34,5	35,9	15,4	38,9	3,5	2,4	70
Total	1,9	45,4	27,4	18,3	39,6	3,0	1,5	169
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>								
15-24 ans	,0	21,7	33,8	23,9	45,0	,0	,0	11
25-34 ans	2,4	48,7	26,7	17,1	39,2	3,1	2,0	161
35-44 ans	,0	26,0	40,6	12,9	20,5	,0	,0	13
Total	2,1	45,6	27,9	17,3	38,5	2,7	1,7	185
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>								
Pas de diplôme	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	1
Primaire	,0	69,7	30,3	,0	,0	,0	,0	3
Secondaire inférieur	,0	61,9	18,9	6,5	34,6	,0	,0	16
Secondaire supérieur	,8	47,6	33,9	12,8	37,7	4,4	1,2	70
Supérieur	3,7	40,6	24,6	22,4	41,9	2,1	2,7	90
Total	2,1	46,2	27,7	16,6	38,6	2,8	1,8	180
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>								
< 20.000	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	1
20.000-30.000	,0	39,5	6,5	25,5	60,9	13,7	,0	17
30.000-40.000	,0	48,6	30,5	8,6	30,8	5,0	4,6	38
40.000-60.000	3,5	43,9	28,6	19,5	38,0	,8	,9	94
>60.000	,0	52,4	34,9	18,0	44,2	,0	2,1	26
Total	1,8	46,3	27,6	17,4	39,5	2,8	1,8	176
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>								
Bonne à très bonne	2,4	43,5	28,8	17,7	38,9	3,1	2,0	161
Très mauvaise à moyenne	,0	50,3	21,0	18,7	29,7	,0	,0	19
Total	2,1	44,2	28,0	17,8	37,9	2,8	1,8	180
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>								
Non	2,6	46,5	26,7	17,8	41,6	2,9	1,8	144
Oui	,0	37,3	33,6	20,6	30,1	2,8	,0	31
Total	2,2	45,0	27,9	18,3	39,7	2,9	1,5	175

Légende:

1= Pas de suivi médical 2= Généraliste  
3= Pédiatre privé 4= Pédiatre hospitalier  
5= ONE - K&G 6= Crèche  
7= Autre

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SUIVI DU NOURRISSON (MCH260, MCH2\$47-MCH2\$53)  
Enquête de santé, Belgique, 1997.

SUIVI DU NOURRISSON								
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>								
Garçon	,8	16,6	50,7	12,7	38,2	1,7	4,1	65
Fille	,0	6,2	43,6	24,9	50,2	7,0	,0	58
Total	,4	11,1	47,0	19,1	44,5	4,5	1,9	123
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>								
15-24 ans	,0	12,0	24,1	8,7	70,7	,0	,0	21
25-34 ans	,6	10,3	50,1	25,5	35,4	6,2	2,7	86
35-44 ans	,0	20,9	46,7	13,1	45,3	5,1	,0	28
Total	,4	12,2	44,4	20,3	43,9	4,8	1,8	135
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>								
Pas de diplôme	,0	30,9	13,3	23,4	45,5	,0	,0	11
Primaire	,0	13,6	,0	26,7	59,7	,0	,0	7
Secondaire inférieur	,0	8,0	69,9	12,7	15,7	6,3	6,8	17
Secondaire supérieur	1,2	13,7	32,4	21,2	64,9	2,3	1,2	40
Supérieur	,0	6,9	61,5	22,4	29,5	8,9	1,4	54
Total	,4	12,0	44,8	21,1	42,5	5,0	1,8	129
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>								
< 20.000	,0	13,2	8,2	10,9	75,0	,0	,0	24
20.000-30.000	,0	14,4	47,7	18,0	54,7	2,0	,0	34
30.000-40.000	,0	14,8	38,4	24,6	41,6	,0	,0	25
40.000-60.000	1,7	1,7	69,1	27,7	18,6	5,3	4,3	32
>60.000	,0	20,7	55,3	22,2	21,2	23,1	,0	18
Total	,4	12,4	44,1	20,5	44,1	4,5	,9	133
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>								
Bonne à très bonne	,5	9,2	52,0	19,6	41,6	5,7	2,3	106
Très mauvaise à moyenne	,0	26,0	11,8	31,8	45,5	2,3	,0	21
Total	,4	12,0	45,3	21,7	42,3	5,1	1,9	127
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>								
Non	,5	11,1	40,3	21,0	47,3	3,8	1,6	100
Oui	,0	16,0	56,7	16,7	36,2	3,6	2,7	28
Total	,4	12,2	43,8	20,1	44,9	3,8	1,9	128

Légende:

1= Pas de suivi médical 2= Généraliste  
3= Pédiatre privé 4= Pédiatre hospitalier  
5= ONE - K&G 6= Crèche  
7= Autre



REGIO: 3 Région Wallonne

SUIVI DU NOURRISSON (MCH260, MCH2\$47-MCH2\$53)  
Enquête de santé, Belgique, 1997.

SUIVI DU NOURRISSON								
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>								
Garçon	,0	33,5	41,9	23,3	36,2	,0	4,8	92
Fille	,0	34,6	37,1	28,2	38,2	7,1	1,4	78
Total	,0	34,0	39,7	25,5	37,1	3,2	3,2	170
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>								
15-24 ans	,0	36,0	20,0	45,9	24,8	,0	3,6	25
25-34 ans	,0	31,9	43,5	23,6	43,7	4,0	3,2	137
35-44 ans	,0	45,4	34,2	23,2	19,5	3,8	1,7	21
Total	,0	34,4	38,6	26,9	37,4	3,4	3,0	183
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>								
Pas de diplôme	,0	30,3	,0	32,2	37,5	,0	,0	3
Primaire	,0	48,4	,0	100,0	,0	,0	,0	3
Secondaire inférieur	,0	27,9	22,3	32,2	42,2	,0	10,3	21
Secondaire supérieur	,0	39,5	37,7	22,8	29,9	2,0	1,3	73
Supérieur	,0	33,8	48,7	21,7	49,3	6,9	3,3	73
Total	,0	35,7	38,2	25,5	38,6	3,6	3,2	173
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>								
< 20.000	,0	50,4	20,2	37,3	23,0	7,1	,0	20
20.000-30.000	,0	28,9	26,6	24,6	29,6	,0	6,3	48
30.000-40.000	,0	33,1	50,1	22,3	42,4	,0	,0	44
40.000-60.000	,0	31,7	46,6	31,5	45,8	7,1	2,3	58
>60.000	,0	28,2	51,3	8,2	46,0	15,5	5,5	9
Total	,0	33,4	38,7	26,6	37,3	3,4	2,7	179
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>								
Bonne à très bonne	,0	33,9	36,9	23,8	38,6	2,2	3,7	152
Très mauvaise à moyenne	,0	35,4	47,8	42,6	31,9	11,8	,0	25
Total	,0	34,1	38,4	26,5	37,7	3,5	3,2	177
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>								
Non	,0	35,2	38,8	27,9	38,6	4,6	3,7	125
Oui	,0	35,5	34,9	25,1	36,5	,0	1,9	47
Total	,0	35,3	37,6	27,1	38,0	3,2	3,2	172

Légende:

1= Pas de suivi médical 2= Généraliste  
 3= Pédiatre privé 4= Pédiatre hospitalier  
 5= ONE - K&G 6= Crèche  
 7= Autre

## SUIVI DU NOURRISSON(MCH27\_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

NOMBRE CONSULTATIONS DURANT LA PREMIERE ANNEE						
	Moyenne	25 <sup>e</sup> Perce	Mediane ntile	75 <sup>e</sup> Percentile	90 <sup>e</sup> Percentile	N
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>						
Garçon	9,9	5,0	10,0	12,0	18,0	228
Fille	9,2	5,0	10,0	12,0	15,0	187
Total	9,6	5,0	10,0	12,0	17,0	415
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>						
15-24 ans	10,8	5,0	10,0	17,0	20,0	48
25-34 ans	9,5	5,0	10,0	12,0	16,0	341
35-44 ans	9,6	4,0	10,0	12,0	19,0	59
Total	9,6	5,0	10,0	12,0	17,0	448
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	9,2	2,0	7,0	15,0	20,0	11
Primaire	7,9	4,0	8,0	10,0	12,0	13
Secondaire inférieur	11,5	5,0	12,0	16,0	20,0	42
Secondaire supérieur	9,4	5,0	10,0	12,0	17,0	164
Supérieur	9,5	6,0	10,0	12,0	15,0	198
Total	9,6	5,0	10,0	12,0	16,0	428
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	8,3	4,0	6,0	12,0	16,0	43
20.000-30.000	10,7	6,0	11,0	12,0	20,0	80
30.000-40.000	10,1	6,0	10,0	12,0	16,0	94
40.000-60.000	9,6	6,0	10,0	12,0	16,0	168
>60.000	8,5	4,0	7,0	12,0	18,0	49
Total	9,7	5,0	10,0	12,0	17,0	434
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	9,6	5,0	10,0	12,0	17,0	372
Très mauvaise à moyenne	9,5	4,0	10,0	12,0	16,0	57
Total	9,6	5,0	10,0	12,0	17,0	429
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>						
Non	9,5	5,0	10,0	12,0	16,0	338
Oui	10,5	6,0	11,0	12,0	20,0	90
Total	9,7	5,0	10,0	12,0	17,0	428
<b>REGION DE RESIDENCE</b>						
Région Flamande	9,0	5,0	9,0	12,0	15,0	155
Région Bruxelloise	11,0	7,0	12,0	15,0	20,0	132
Région Wallonne	10,4	6,0	10,0	12,0	20,0	161
Belgique	9,6	5,0	10,0	12,0	17,0	448

REGIO: 1 Région Flamande

## SUIVI DU NOURRISSON(MCH27\_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE CONSULTATIONS DURANT LA PREMIERE ANNEE					N
	Moyenne	25 <sup>e</sup> Perce ntile	Mediane	75 <sup>e</sup> Percentile	90 <sup>e</sup> Percentile	
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>						
Garçon	9,5	5,0	10,0	12,0	18,0	82
Fille	8,2	4,0	8,0	12,0	15,0	60
Total	8,9	4,0	10,0	12,0	16,0	142
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>						
15-24 ans	10,4	5,0	10,0	17,0	17,0	6
25-34 ans	9,1	5,0	9,0	12,0	15,0	137
35-44 ans	6,7	4,0	4,0	12,0	12,0	12
Total	9,0	5,0	9,0	12,0	15,0	155
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Primaire	8,4	7,0	8,0	10,0	10,0	3
Secondaire inférieur	11,0	5,0	12,0	15,0	19,0	11
Secondaire supérieur	9,0	5,0	9,0	12,0	17,0	57
Supérieur	8,9	5,0	10,0	12,0	15,0	80
Total	9,1	5,0	10,0	12,0	16,0	151
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	1
20.000-30.000	9,1	5,0	12,0	12,0	12,0	11
30.000-40.000	9,7	5,0	10,0	12,0	16,0	29
40.000-60.000	9,1	5,0	9,0	12,0	16,0	81
>60.000	7,8	3,0	5,0	12,0	16,0	24
Total	9,0	4,0	10,0	12,0	16,0	146
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	9,1	5,0	9,0	12,0	16,0	137
Très mauvaise à moyenne	7,8	4,0	6,0	12,0	12,0	14
Total	8,9	5,0	9,0	12,0	16,0	151
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>						
Non	8,7	4,0	9,0	12,0	15,0	126
Oui	10,8	6,0	12,0	12,0	20,0	24
Total	9,0	5,0	10,0	12,0	16,0	150

REGIO: 2 Région Bruxelloise

## SUIVI DU NOURRISSON(MCH27\_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE CONSULTATIONS DURANT LA PREMIERE ANNEE					N
	Moyenne	25 <sup>e</sup> Perce ntile	Mediane	75 <sup>e</sup> Percentile	90 <sup>e</sup> Percentile	
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>						
Garçon	11,0	7,0	12,0	12,0	20,0	62
Fille	10,6	7,0	11,0	15,0	16,0	58
Total	10,8	7,0	12,0	14,0	17,0	120
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>						
15-24 ans	13,6	12,0	12,0	15,0	20,0	20
25-34 ans	9,8	6,0	10,0	12,0	16,0	83
35-44 ans	13,1	8,0	12,0	20,0	24,0	29
Total	11,0	7,0	12,0	15,0	20,0	132
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	11,8	7,0	12,0	15,0	20,0	10
Primaire	11,4	5,0	12,0	15,0	24,0	7
Secondaire inférieur	7,7	5,0	8,0	12,0	12,0	13
Secondaire supérieur	12,2	10,0	12,0	15,0	20,0	43
Supérieur	10,3	7,0	10,0	12,0	17,0	53
Total	10,9	7,0	11,0	15,0	20,0	126
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	11,1	7,0	12,0	15,0	16,0	25
20.000-30.000	11,9	8,0	12,0	16,0	20,0	29
30.000-40.000	10,1	6,0	12,0	12,0	15,0	26
40.000-60.000	11,5	8,0	12,0	14,0	20,0	34
>60.000	9,3	3,0	9,0	13,0	20,0	17
Total	11,0	7,0	12,0	15,0	20,0	131
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	10,6	7,0	11,0	14,0	16,0	102
Très mauvaise à moyenne	12,9	9,0	12,0	16,0	20,0	21
Total	11,0	7,0	12,0	15,0	20,0	123
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>						
Non	10,9	7,0	12,0	15,0	17,0	103
Oui	10,9	6,0	11,0	15,0	20,0	23
Total	10,9	7,0	12,0	15,0	20,0	126

REGIO: 3 Région Wallonne

## SUIVI DU NOURRISSON (MCH27\_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

-----						
NOMBRE CONSULTATIONS DURANT LA PREMIERE ANNEE						
	Moyenne	25è Perce ntile	Mediane	75è Percentile	90è Percentile	N
-----						
SEXE DE L'ENFANT						
Garçon	10,3	6,0	10,0	13,0	20,0	84
Fille	10,2	6,0	10,0	12,0	20,0	69
Total	10,3	6,0	10,0	12,0	20,0	153
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE						
15-24 ans	10,1	5,0	8,0	20,0	20,0	22
25-34 ans	10,3	7,0	10,0	12,0	16,0	121
35-44 ans	10,9	8,0	10,0	12,0	19,0	18
Total	10,4	6,0	10,0	12,0	20,0	161
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
Primaire	4,5	2,0	4,0	4,0	12,0	3
Secondaire inférieur	13,0	6,0	16,0	20,0	20,0	18
Secondaire supérieur	9,4	4,0	10,0	12,0	17,0	64
Supérieur	10,6	8,0	11,0	12,0	15,0	65
Total	10,2	6,0	10,0	12,0	20,0	151
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	6,4	3,0	4,0	7,0	17,0	17
20.000-30.000	11,1	7,0	10,0	16,0	20,0	40
30.000-40.000	10,6	7,0	10,0	12,0	16,0	39
40.000-60.000	11,0	10,0	11,0	12,0	15,0	53
>60.000	12,0	7,0	12,0	20,0	20,0	8
Total	10,4	6,0	10,0	12,0	20,0	157
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	10,4	7,0	10,0	12,0	20,0	133
Très mauvaise à moyenne	10,4	6,0	10,0	12,0	20,0	22
Total	10,4	6,0	10,0	12,0	20,0	155
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT						
Non	10,6	7,0	10,0	13,0	16,0	109
Oui	10,2	4,0	10,0	12,0	20,0	43
Total	10,5	6,0	10,0	12,0	20,0	152
-----						

SUIVI DU NOURRISSON( mch28\_1)  
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	QUI A VACCINE L'ENFANT						Total
	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>REGION DE RESIDENCE</b>							
Région Flamande	7,2	16,4	20,1	48,7	4,6	3,0	185
Région Bruxelloise	4,2	4,9	40,4	40,3	4,3	6,0	155
Région Wallonne	4,1	13,4	40,4	35,5	5,1	1,5	187
Belgique	5,9	14,3	28,6	43,6	4,7	2,8	527
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>							
Garçon	6,3	15,3	26,1	44,5	4,4	3,4	269
Fille	6,0	11,5	29,3	44,6	6,0	2,5	215
Total	6,1	13,7	27,5	44,6	5,1	3,0	484
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>							
15-24 ans	3,4	18,0	46,2	29,5	,5	2,4	60
25-34 ans	6,4	13,3	24,9	46,8	5,5	3,1	399
35-44 ans	4,6	18,5	39,6	32,8	3,2	1,2	68
Total	5,9	14,3	28,6	43,6	4,7	2,8	527
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	,0	5,7	11,9	82,4	,0	,0	18
Primaire	,0	30,8	24,2	30,1	12,8	2,2	15
Secondaire inférieur	12,2	13,6	26,2	42,6	5,4	,0	55
Secondaire supérieur	1,5	16,2	30,1	44,0	3,8	4,3	191
Supérieur	8,8	13,6	27,2	42,1	5,6	2,7	225
Total	5,8	14,9	27,9	43,5	4,9	3,0	504
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	4,0	26,1	19,8	46,5	2,8	,8	48
20.000-30.000	7,3	6,9	27,7	49,8	6,9	1,3	105
30.000-40.000	5,5	16,2	35,2	34,9	4,1	4,0	112
40.000-60.000	5,2	14,2	27,0	46,2	3,7	3,7	192
>60.000	7,7	14,7	21,9	45,9	8,3	1,5	55
Total	5,9	14,1	27,9	44,3	4,9	2,9	512
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	5,7	14,4	27,7	45,1	4,4	2,7	434
Très mauvaise à moyenne	6,3	8,8	40,1	36,1	5,4	3,2	71
Total	5,8	13,7	29,2	44,0	4,5	2,7	505
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>							
Non	6,3	11,8	26,5	47,5	5,3	2,6	389
Oui	4,4	20,5	33,9	35,4	3,7	2,0	110
Total	5,9	13,7	28,0	44,9	5,0	2,5	499

## légende

1= pas de vaccination  
2= Médecin généraliste  
3= Pédiatre  
4= ONE/K&G  
5= Crèche

6= Autre

REGIO: 1 Région Flamande

SUIVI DU NOURRISSON ( mch28\_1)  
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	QUI A VACCINE L'ENFANT						Total
	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>							
Garçon	8,6	14,6	14,2	51,2	6,1	5,3	99
Fille	6,9	16,4	25,0	47,6	3,5	,6	70
Total	7,9	15,4	18,7	49,7	5,0	3,3	169
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>							
15-24 ans	,0	31,2	46,3	22,4	,0	,0	11
25-34 ans	7,6	14,7	17,0	52,0	5,2	3,5	161
35-44 ans	8,6	26,0	36,3	29,1	,0	,0	13
Total	7,2	16,4	20,1	48,7	4,6	3,0	185
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	,0	,0	,0	100,0	,0	,0	1
Primaire	,0	69,7	,0	,0	30,3	,0	3
Secondaire inférieur	15,8	22,3	16,3	39,0	6,6	,0	16
Secondaire supérieur	,0	16,2	28,0	46,9	3,8	5,0	70
Supérieur	11,1	14,7	15,6	52,0	4,3	2,3	90
Total	6,9	16,8	20,3	48,2	4,7	3,1	180
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	1
20.000-30.000	5,9	4,3	12,1	57,8	19,9	,0	17
30.000-40.000	8,3	18,8	27,5	36,5	3,9	5,0	38
40.000-60.000	6,9	15,7	17,6	54,0	1,7	4,1	94
>60.000	7,6	18,1	16,6	51,2	6,5	,0	26
Total	7,2	16,2	18,8	49,9	4,8	3,2	176
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	7,0	16,3	19,5	49,6	4,6	3,1	161
Très mauvaise à moyenne	11,1	15,3	31,0	42,5	,0	,0	19
Total	7,4	16,2	20,7	48,8	4,1	2,8	180
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>							
Non	8,5	13,6	16,8	53,1	4,8	3,3	144
Oui	,0	23,9	32,5	35,6	5,2	2,8	31
Total	7,1	15,3	19,4	50,1	4,8	3,2	175

## légende

- 1= pas de vaccination  
2= Médecin généraliste  
3= Pédiatre  
4= ONE/K&G  
5= Crèche  
6= Autre

REGIO: 2 Région Bruxelloise

## SUIVI DU NOURRISSON( mch28\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	QUI A VACCINE L'ENFANT						Total
	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>							
Garçon	1,3	5,0	43,2	41,4	6,7	2,4	75
Fille	5,7	3,8	38,8	39,9	3,0	8,8	66
Total	3,6	4,3	40,9	40,6	4,7	5,8	141
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>							
15-24 ans	,0	9,5	29,9	51,5	2,6	6,5	24
25-34 ans	6,3	2,0	42,7	38,2	5,3	5,4	98
35-44 ans	,0	11,4	43,7	35,2	2,1	7,5	33
Total	4,2	4,9	40,4	40,3	4,3	6,0	155
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	,0	12,5	26,2	61,3	,0	,0	14
Primaire	,0	4,8	18,4	68,8	,0	8,1	9
Secondaire inférieur	15,7	,0	55,0	18,5	10,7	,0	17
Secondaire supérieur	,0	5,4	36,1	53,4	,0	5,1	46
Supérieur	6,6	4,8	50,6	18,6	8,5	10,8	62
Total	4,5	5,2	41,9	37,5	4,6	6,4	148
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	,0	5,1	12,8	79,6	,0	2,4	27
20.000-30.000	9,9	4,1	39,8	46,2	,0	,0	38
30.000-40.000	4,6	5,9	51,9	28,2	,0	9,3	30
40.000-60.000	,0	5,2	56,4	18,4	12,3	7,6	38
>60.000	4,9	4,3	38,3	22,1	15,0	15,4	20
Total	4,2	4,9	40,1	40,7	4,3	5,7	153
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	3,3	4,2	46,0	37,6	4,5	4,4	118
Très mauvaise à moyenne	5,5	5,8	17,7	55,5	,0	15,6	26
Total	3,7	4,5	41,1	40,7	3,7	6,4	144
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>							
Non	4,3	5,0	38,0	45,1	3,3	4,3	117
Oui	4,7	5,8	52,2	19,6	9,6	8,2	31
Total	4,4	5,1	40,8	40,0	4,5	5,1	148

## légende

1= pas de vaccination  
 2= Médecin généraliste  
 3= Pédiatre

4= ONE/K&G  
 5= Crèche  
 6= Autre



REGIO: 3 Région Wallonne

SUIVI DU NOURRISSON( mch28\_1)  
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	QUI A VACCINE L'ENFANT						Total
	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE DE L'ENFANT</b>							
Garçon	3,1	19,3	44,1	32,8	,6	,0	95
Fille	4,7	6,4	32,9	41,3	11,2	3,5	79
Total	3,8	13,4	39,0	36,7	5,4	1,6	174
<b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE</b>							
15-24 ans	7,4	10,9	52,6	26,5	,0	2,7	25
25-34 ans	3,5	13,5	37,8	37,5	6,1	1,6	140
35-44 ans	3,1	15,2	40,8	34,9	5,9	,0	22
Total	4,1	13,4	40,4	35,5	5,1	1,5	187
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	,0	,0	,0	100,0	,0	,0	3
Primaire	,0	,0	63,3	36,7	,0	,0	3
Secondaire inférieur	6,6	5,7	31,5	53,8	2,4	,0	22
Secondaire supérieur	4,5	18,7	32,5	36,8	4,7	2,8	75
Supérieur	3,8	13,7	47,5	26,0	8,0	1,1	73
Total	4,3	14,2	38,0	36,4	5,5	1,6	176
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	6,5	28,5	25,7	34,8	4,5	,0	20
20.000-30.000	7,4	9,3	33,8	46,0	1,0	2,5	50
30.000-40.000	2,0	14,9	42,2	34,3	5,3	1,4	44
40.000-60.000	,7	11,4	52,0	26,0	8,5	1,5	60
>60.000	10,4	,0	44,1	30,0	15,5	,0	9
Total	4,1	13,2	40,5	35,4	5,2	1,5	183
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	4,0	13,8	38,2	38,8	3,9	1,4	155
Très mauvaise à moyenne	,0	1,1	61,0	20,2	14,7	3,0	26
Total	3,4	12,0	41,4	36,2	5,4	1,6	181
<b>TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT</b>							
Non	2,3	10,3	43,1	36,5	7,2	,6	128
Oui	8,8	20,1	31,7	38,4	1,1	,0	48
Total	4,2	13,3	39,7	37,1	5,4	,4	176

## légende

1= pas de vaccination  
2= Médecin généraliste  
3= Pédiatre  
4= ONE/K&G

5= Crèche  
6= Autre