

SUIVI DU NOURRISSON (MCH25_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VISITE DE L'ONE APRES SORTIE DE LA MATERNITE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	90,7	9,3	185
Région Bruxelloise	58,8	41,2	154
Région Wallonne	80,8	19,2	187
Belgique	84,5	15,5	526
SEXE DE L'ENFANT			
Garçon	83,7	16,3	269
Fille	83,8	16,2	214
Total	83,7	16,3	483
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE			
15-24 ans	73,3	26,7	60
25-34 ans	87,8	12,2	398
35-44 ans	68,4	31,6	68
Total	84,5	15,5	526
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	65,4	34,6	18
Primaire	91,8	8,2	15
Secondaire inférieur	88,9	11,1	55
Secondaire supérieur	81,2	18,8	190
Supérieur	87,6	12,4	225
Total	84,7	15,3	503
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	64,6	35,4	48
20.000-30.000	75,4	24,6	105
30.000-40.000	86,6	13,4	111
40.000-60.000	89,2	10,8	192
>60.000	89,0	11,0	55
Total	84,5	15,5	511
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	85,1	14,9	433
Très mauvaise à moyenne	87,1	12,9	71
Total	85,4	14,6	504
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	86,7	13,3	388
Oui	74,1	25,9	110
Total	84,0	16,0	498

REGIO: 1 Région Flamande

SUIVI DU NOURRISSON(mch25_1)

Enquête de Sa nté, Belgique, 1997

	VISITE DE L'ONE APRES SORTIE DE LA MATERNITE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
Garçon	90,8	9,2	99
Fille	89,6	10,4	70
Total	90,3	9,7	169
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE			
15-24 ans	81,1	18,9	11
25-34 ans	92,2	7,8	161
35-44 ans	80,3	19,7	13
Total	90,7	9,3	185
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	100,0	,0	1
Primaire	100,0	,0	3
Secondaire inférieur	93,1	6,9	16
Secondaire supérieur	85,1	14,9	70
Supérieur	94,0	6,0	90
Total	90,5	9,5	180
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	,0	100,0	1
20.000-30.000	84,4	15,6	17
30.000-40.000	95,0	5,0	38
40.000-60.000	90,9	9,1	94
>60.000	90,6	9,4	26
Total	90,3	9,7	176
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	91,1	8,9	161
Très mauvaise à moyenne	95,9	4,1	19
Total	91,6	8,4	180
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	93,5	6,5	144
Oui	76,5	23,5	31
Total	90,7	9,3	175

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SUIVI DU NOURRISSON(mch25_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VISITE DE L'ONE APRES SORTIE DE LA MATERNITE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
Garçon	54,6	45,4	75
Fille	57,8	42,2	65
Total	56,3	43,7	140
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE			
15-24 ans	54,5	45,5	24
25-34 ans	62,3	37,7	97
35-44 ans	49,2	50,8	33
Total	58,8	41,2	154
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	49,7	50,3	14
Primaire	70,4	29,6	9
Secondaire inférieur	46,9	53,1	17
Secondaire supérieur	57,7	42,3	45
Supérieur	62,2	37,8	62
Total	58,2	41,8	147
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	74,1	25,9	27
20.000-30.000	43,6	56,4	38
30.000-40.000	55,9	44,1	29
40.000-60.000	67,4	32,6	38
>60.000	63,0	37,0	20
Total	59,4	40,6	152
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	58,9	41,1	117
Très mauvaise à moyenne	60,9	39,1	26
Total	59,2	40,8	143
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	55,5	44,5	116
Oui	64,3	35,7	31
Total	57,3	42,7	147

REGIO: 3 Région Wallonne

SUIVI DU NOURRISSON(mch25_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VISITE DE L'ONE APRES SORTIE DE LA MATERNITE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
Garçon	77,7	22,3	95
Fille	83,2	16,8	79
Total	80,2	19,8	174
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE			
15-24 ans	74,5	25,5	25
25-34 ans	85,2	14,8	140
35-44 ans	65,7	34,3	22
Total	80,8	19,2	187
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	67,8	32,2	3
Primaire	100,0	,0	3
Secondaire inférieur	94,7	5,3	22
Secondaire supérieur	79,4	20,6	75
Supérieur	80,0	20,0	73
Total	81,8	18,2	176
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	67,1	32,9	20
20.000-30.000	79,1	20,9	50
30.000-40.000	81,4	18,6	44
40.000-60.000	88,8	11,2	60
>60.000	100,0	,0	9
Total	81,8	18,2	183
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	81,1	18,9	155
Très mauvaise à moyenne	84,9	15,1	26
Total	81,6	18,4	181
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	82,9	17,1	128
Oui	73,8	26,2	48
Total	80,2	19,8	176

SUIVI DU NOURRISSON (MCH260, MCH2\$47-MCH2\$53)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

SUIVI DU NOURRISSON								
	1	2	3	5	4	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
REGION DE RESIDENCE								
Région Flamande	2,1	45,6	27,9	38,5	17,3	2,7	1,7	185
Région Bruxelloise	,4	12,2	44,4	43,9	20,3	4,8	1,8	135
Région Wallonne	,0	34,4	38,6	37,4	26,9	3,4	3,0	183
Total	1,3	39,1	32,8	38,6	20,6	3,1	2,2	503
SEXE DE L'ENFANT								
Garçon	,7	44,3	30,0	38,7	20,8	1,7	2,4	256
Fille	1,7	31,7	37,1	39,8	20,8	5,1	1,8	206
Total	1,1	38,7	33,1	39,2	20,8	3,2	2,1	462
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE								
15-24 ans	,0	26,7	25,8	39,9	31,6	,0	1,7	57
25-34 ans	1,6	41,2	33,1	40,2	19,5	3,6	2,4	384
35-44 ans	,0	34,8	38,3	23,5	17,9	2,6	,8	62
Total	1,3	39,1	32,8	38,6	20,6	3,1	2,2	503
NIVEAU INSTRUCTION								
Pas de diplôme	,0	44,0	5,6	33,7	22,3	,0	,0	15
Primaire	,0	49,1	13,3	14,8	37,9	,0	,0	13
Secondaire inférieur	,0	43,2	25,6	35,5	17,0	,7	4,7	54
Secondaire supérieur	,6	42,5	35,1	37,0	16,8	3,5	1,2	183
Supérieur	2,4	36,2	34,0	43,0	22,2	3,9	2,7	217
Total	1,3	39,9	32,5	39,0	19,8	3,2	2,2	482
REVENU EQUIVALENT (FB)								
< 20.000	,0	44,1	15,4	35,3	27,4	4,6	,0	45
20.000-30.000	,0	30,3	23,0	43,4	24,0	4,8	3,4	99
30.000-40.000	,0	40,0	38,7	36,1	15,1	2,7	2,5	107
40.000-60.000	2,7	39,4	34,3	38,8	22,5	2,3	1,4	184
>60.000	,0	46,7	38,7	42,3	17,2	3,9	2,3	53
Total	1,1	39,1	32,7	39,2	20,7	3,2	2,0	488
SANTE SUBJECTIVE								
Bonne à très bonne	1,5	37,8	33,2	39,0	19,8	3,1	2,5	419
Très mauvaise à moyenne	,0	42,0	29,8	32,4	29,0	4,6	,0	65
Total	1,3	38,3	32,8	38,2	20,9	3,2	2,2	484
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT								
Non	1,7	40,2	31,4	41,2	21,0	3,5	2,3	369
Oui	,0	34,7	36,1	33,5	22,3	1,6	1,1	106
Total	1,3	39,0	32,4	39,6	21,3	3,1	2,1	475

Légende:

1= Pas de suivi médical
3= Pédiatre privé
5= ONE - K&G
7= Autre

2= Gén éraliste
4= Pédi atre hospitalier
6= Crèche

REGIO: 1 Région Flamande

SUIVI DU NOURRISSON (MCH260, MCH2\$47-MCH2\$53)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

SUIVI DU NOURRISSON								
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE DE L'ENFANT								
Garçon	1,0	53,3	21,3	20,4	40,1	2,6	,9	99
Fille	3,1	34,5	35,9	15,4	38,9	3,5	2,4	70
Total	1,9	45,4	27,4	18,3	39,6	3,0	1,5	169
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE								
15-24 ans	,0	21,7	33,8	23,9	45,0	,0	,0	11
25-34 ans	2,4	48,7	26,7	17,1	39,2	3,1	2,0	161
35-44 ans	,0	26,0	40,6	12,9	20,5	,0	,0	13
Total	2,1	45,6	27,9	17,3	38,5	2,7	1,7	185
NIVEAU INSTRUCTION								
Pas de diplôme	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	1
Primaire	,0	69,7	30,3	,0	,0	,0	,0	3
Secondaire inférieur	,0	61,9	18,9	6,5	34,6	,0	,0	16
Secondaire supérieur	,8	47,6	33,9	12,8	37,7	4,4	1,2	70
Supérieur	3,7	40,6	24,6	22,4	41,9	2,1	2,7	90
Total	2,1	46,2	27,7	16,6	38,6	2,8	1,8	180
REVENU EQUIVALENT (FB)								
< 20.000	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	1
20.000-30.000	,0	39,5	6,5	25,5	60,9	13,7	,0	17
30.000-40.000	,0	48,6	30,5	8,6	30,8	5,0	4,6	38
40.000-60.000	3,5	43,9	28,6	19,5	38,0	,8	,9	94
>60.000	,0	52,4	34,9	18,0	44,2	,0	2,1	26
Total	1,8	46,3	27,6	17,4	39,5	2,8	1,8	176
SANTE SUBJECTIVE								
Bonne à très bonne	2,4	43,5	28,8	17,7	38,9	3,1	2,0	161
Très mauvaise à moyenne	,0	50,3	21,0	18,7	29,7	,0	,0	19
Total	2,1	44,2	28,0	17,8	37,9	2,8	1,8	180
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT								
Non	2,6	46,5	26,7	17,8	41,6	2,9	1,8	144
Oui	,0	37,3	33,6	20,6	30,1	2,8	,0	31
Total	2,2	45,0	27,9	18,3	39,7	2,9	1,5	175

Légende:

1= Pas de suivi médical 2= Généraliste
 3= Pédiatre privé 4= Pédiatre hospitalier
 5= ONE - K&G 6= Crèche
 7= Autre

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SUIVI DU NOURRISSON (MCH260, MCH2\$47-MCH2\$53)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

SUIVI DU NOURRISSON								
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE DE L'ENFANT								
Garçon	,8	16,6	50,7	12,7	38,2	1,7	4,1	65
Fille	,0	6,2	43,6	24,9	50,2	7,0	,0	58
Total	,4	11,1	47,0	19,1	44,5	4,5	1,9	123
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE								
15-24 ans	,0	12,0	24,1	8,7	70,7	,0	,0	21
25-34 ans	,6	10,3	50,1	25,5	35,4	6,2	2,7	86
35-44 ans	,0	20,9	46,7	13,1	45,3	5,1	,0	28
Total	,4	12,2	44,4	20,3	43,9	4,8	1,8	135
NIVEAU INSTRUCTION								
Pas de diplôme	,0	30,9	13,3	23,4	45,5	,0	,0	11
Primaire	,0	13,6	,0	26,7	59,7	,0	,0	7
Secondaire inférieur	,0	8,0	69,9	12,7	15,7	6,3	6,8	17
Secondaire supérieur	1,2	13,7	32,4	21,2	64,9	2,3	1,2	40
Supérieur	,0	6,9	61,5	22,4	29,5	8,9	1,4	54
Total	,4	12,0	44,8	21,1	42,5	5,0	1,8	129
REVENU EQUIVALENT (FB)								
< 20.000	,0	13,2	8,2	10,9	75,0	,0	,0	24
20.000-30.000	,0	14,4	47,7	18,0	54,7	2,0	,0	34
30.000-40.000	,0	14,8	38,4	24,6	41,6	,0	,0	25
40.000-60.000	1,7	1,7	69,1	27,7	18,6	5,3	4,3	32
>60.000	,0	20,7	55,3	22,2	21,2	23,1	,0	18
Total	,4	12,4	44,1	20,5	44,1	4,5	,9	133
SANTE SUBJECTIVE								
Bonne à très bonne	,5	9,2	52,0	19,6	41,6	5,7	2,3	106
Très mauvaise à moyenne	,0	26,0	11,8	31,8	45,5	2,3	,0	21
Total	,4	12,0	45,3	21,7	42,3	5,1	1,9	127
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT								
Non	,5	11,1	40,3	21,0	47,3	3,8	1,6	100
Oui	,0	16,0	56,7	16,7	36,2	3,6	2,7	28
Total	,4	12,2	43,8	20,1	44,9	3,8	1,9	128

Légende:

1= Pas de suivi médical 2= Généraliste
 3= Pédiatre privé 4= Pédiatre hospitalier
 5= ONE - K&G 6= Crèche
 7= Autre

REGIO: 3 Région Wallonne

SUIVI DU NOURRISSON (MCH260, MCH2\$47-MCH2\$53)
Enquête de santé, Belgique, 1997.

SUIVI DU NOURRISSON								
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE DE L'ENFANT								
Garçon	,0	33,5	41,9	23,3	36,2	,0	4,8	92
Fille	,0	34,6	37,1	28,2	38,2	7,1	1,4	78
Total	,0	34,0	39,7	25,5	37,1	3,2	3,2	170
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE								
15-24 ans	,0	36,0	20,0	45,9	24,8	,0	3,6	25
25-34 ans	,0	31,9	43,5	23,6	43,7	4,0	3,2	137
35-44 ans	,0	45,4	34,2	23,2	19,5	3,8	1,7	21
Total	,0	34,4	38,6	26,9	37,4	3,4	3,0	183
NIVEAU INSTRUCTION								
Pas de diplôme	,0	30,3	,0	32,2	37,5	,0	,0	3
Primaire	,0	48,4	,0	100,0	,0	,0	,0	3
Secondaire inférieur	,0	27,9	22,3	32,2	42,2	,0	10,3	21
Secondaire supérieur	,0	39,5	37,7	22,8	29,9	2,0	1,3	73
Supérieur	,0	33,8	48,7	21,7	49,3	6,9	3,3	73
Total	,0	35,7	38,2	25,5	38,6	3,6	3,2	173
REVENU EQUIVALENT (FB)								
< 20.000	,0	50,4	20,2	37,3	23,0	7,1	,0	20
20.000-30.000	,0	28,9	26,6	24,6	29,6	,0	6,3	48
30.000-40.000	,0	33,1	50,1	22,3	42,4	,0	,0	44
40.000-60.000	,0	31,7	46,6	31,5	45,8	7,1	2,3	58
>60.000	,0	28,2	51,3	8,2	46,0	15,5	5,5	9
Total	,0	33,4	38,7	26,6	37,3	3,4	2,7	179
SANTE SUBJECTIVE								
Bonne à très bonne	,0	33,9	36,9	23,8	38,6	2,2	3,7	152
Très mauvaise à moyenne	,0	35,4	47,8	42,6	31,9	11,8	,0	25
Total	,0	34,1	38,4	26,5	37,7	3,5	3,2	177
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT								
Non	,0	35,2	38,8	27,9	38,6	4,6	3,7	125
Oui	,0	35,5	34,9	25,1	36,5	,0	1,9	47
Total	,0	35,3	37,6	27,1	38,0	3,2	3,2	172

Légende:

1= Pas de suivi médical 2= Généraliste
3= Pédiatre privé 4= Pédiatre hospitalier
5= ONE - K&G 6= Crèche
7= Autre

SUIVI DU NOURRISSON(MCH27_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

NOMBRE CONSULTATIONS DURANT LA PREMIERE ANNEE						
	Moyenne	25è Perce ntile	Mediane	75è Percentile	90è Percentile	N

SEXE DE L'ENFANT						
Garçon	9,9	5,0	10,0	12,0	18,0	228
Fille	9,2	5,0	10,0	12,0	15,0	187
Total	9,6	5,0	10,0	12,0	17,0	415
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE						
15-24 ans	10,8	5,0	10,0	17,0	20,0	48
25-34 ans	9,5	5,0	10,0	12,0	16,0	341
35-44 ans	9,6	4,0	10,0	12,0	19,0	59
Total	9,6	5,0	10,0	12,0	17,0	448
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	9,2	2,0	7,0	15,0	20,0	11
Primaire	7,9	4,0	8,0	10,0	12,0	13
Secondaire inférieur	11,5	5,0	12,0	16,0	20,0	42
Secondaire supérieur	9,4	5,0	10,0	12,0	17,0	164
Supérieur	9,5	6,0	10,0	12,0	15,0	198
Total	9,6	5,0	10,0	12,0	16,0	428
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	8,3	4,0	6,0	12,0	16,0	43
20.000-30.000	10,7	6,0	11,0	12,0	20,0	80
30.000-40.000	10,1	6,0	10,0	12,0	16,0	94
40.000-60.000	9,6	6,0	10,0	12,0	16,0	168
>60.000	8,5	4,0	7,0	12,0	18,0	49
Total	9,7	5,0	10,0	12,0	17,0	434
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	9,6	5,0	10,0	12,0	17,0	372
Très mauvaise à moyenne	9,5	4,0	10,0	12,0	16,0	57
Total	9,6	5,0	10,0	12,0	17,0	429
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT						
Non	9,5	5,0	10,0	12,0	16,0	338
Oui	10,5	6,0	11,0	12,0	20,0	90
Total	9,7	5,0	10,0	12,0	17,0	428
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	9,0	5,0	9,0	12,0	15,0	155
Région Bruxelloise	11,0	7,0	12,0	15,0	20,0	132
Région Wallonne	10,4	6,0	10,0	12,0	20,0	161
Belgique	9,6	5,0	10,0	12,0	17,0	448

REGIO: 1 Région Flamande

SUIVI DU NOURRISSON(MCH27_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

NOMBRE CONSULTATIONS DURANT LA PREMIERE ANNEE						
	Moyenne	25 ^e Perce ntile	Mediane	75 ^e Percentile	90 ^e Percentile	N

SEXE DE L'ENFANT						
Garçon	9,5	5,0	10,0	12,0	18,0	82
Fille	8,2	4,0	8,0	12,0	15,0	60
Total	8,9	4,0	10,0	12,0	16,0	142
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE						
15-24 ans	10,4	5,0	10,0	17,0	17,0	6
25-34 ans	9,1	5,0	9,0	12,0	15,0	137
35-44 ans	6,7	4,0	4,0	12,0	12,0	12
Total	9,0	5,0	9,0	12,0	15,0	155
NIVEAU INSTRUCTION						
Primaire	8,4	7,0	8,0	10,0	10,0	3
Secondaire inférieur	11,0	5,0	12,0	15,0	19,0	11
Secondaire supérieur	9,0	5,0	9,0	12,0	17,0	57
Supérieur	8,9	5,0	10,0	12,0	15,0	80
Total	9,1	5,0	10,0	12,0	16,0	151
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	1
20.000-30.000	9,1	5,0	12,0	12,0	12,0	11
30.000-40.000	9,7	5,0	10,0	12,0	16,0	29
40.000-60.000	9,1	5,0	9,0	12,0	16,0	81
>60.000	7,8	3,0	5,0	12,0	16,0	24
Total	9,0	4,0	10,0	12,0	16,0	146
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	9,1	5,0	9,0	12,0	16,0	137
Très mauvaise à moyenne	7,8	4,0	6,0	12,0	12,0	14
Total	8,9	5,0	9,0	12,0	16,0	151
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT						
Non	8,7	4,0	9,0	12,0	15,0	126
Oui	10,8	6,0	12,0	12,0	20,0	24
Total	9,0	5,0	10,0	12,0	16,0	150

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SUIVI DU NOURRISSON(MCH27_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

NOMBRE CONSULTATIONS DURANT LA PREMIERE ANNEE						
	Moyenne	25 ^e Perce ntile	Mediane	75 ^e Percentile	90 ^e Percentile	N

SEXE DE L'ENFANT						
Garçon	11,0	7,0	12,0	12,0	20,0	62
Fille	10,6	7,0	11,0	15,0	16,0	58
Total	10,8	7,0	12,0	14,0	17,0	120
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE						
15-24 ans	13,6	12,0	12,0	15,0	20,0	20
25-34 ans	9,8	6,0	10,0	12,0	16,0	83
35-44 ans	13,1	8,0	12,0	20,0	24,0	29
Total	11,0	7,0	12,0	15,0	20,0	132
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	11,8	7,0	12,0	15,0	20,0	10
Primaire	11,4	5,0	12,0	15,0	24,0	7
Secondaire inférieur	7,7	5,0	8,0	12,0	12,0	13
Secondaire supérieur	12,2	10,0	12,0	15,0	20,0	43
Supérieur	10,3	7,0	10,0	12,0	17,0	53
Total	10,9	7,0	11,0	15,0	20,0	126
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	11,1	7,0	12,0	15,0	16,0	25
20.000-30.000	11,9	8,0	12,0	16,0	20,0	29
30.000-40.000	10,1	6,0	12,0	12,0	15,0	26
40.000-60.000	11,5	8,0	12,0	14,0	20,0	34
>60.000	9,3	3,0	9,0	13,0	20,0	17
Total	11,0	7,0	12,0	15,0	20,0	131
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	10,6	7,0	11,0	14,0	16,0	102
Très mauvaise à moyenne	12,9	9,0	12,0	16,0	20,0	21
Total	11,0	7,0	12,0	15,0	20,0	123
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT						
Non	10,9	7,0	12,0	15,0	17,0	103
Oui	10,9	6,0	11,0	15,0	20,0	23
Total	10,9	7,0	12,0	15,0	20,0	126

REGIO: 3 Région Wallonne

SUIVI DU NOURRISSON (MCH27_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE CONSULTATIONS DURANT LA PREMIERE ANNEE					N
	Moyenne	25 ^e Perce ntile	Mediane	75 ^e Percentile	90 ^e Percentile	
SEXE DE L'ENFANT						
Garçon	10,3	6,0	10,0	13,0	20,0	84
Fille	10,2	6,0	10,0	12,0	20,0	69
Total	10,3	6,0	10,0	12,0	20,0	153
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE						
15-24 ans	10,1	5,0	8,0	20,0	20,0	22
25-34 ans	10,3	7,0	10,0	12,0	16,0	121
35-44 ans	10,9	8,0	10,0	12,0	19,0	18
Total	10,4	6,0	10,0	12,0	20,0	161
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1
Primaire	4,5	2,0	4,0	4,0	12,0	3
Secondaire inférieur	13,0	6,0	16,0	20,0	20,0	18
Secondaire supérieur	9,4	4,0	10,0	12,0	17,0	64
Supérieur	10,6	8,0	11,0	12,0	15,0	65
Total	10,2	6,0	10,0	12,0	20,0	151
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	6,4	3,0	4,0	7,0	17,0	17
20.000-30.000	11,1	7,0	10,0	16,0	20,0	40
30.000-40.000	10,6	7,0	10,0	12,0	16,0	39
40.000-60.000	11,0	10,0	11,0	12,0	15,0	53
>60.000	12,0	7,0	12,0	20,0	20,0	8
Total	10,4	6,0	10,0	12,0	20,0	157
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	10,4	7,0	10,0	12,0	20,0	133
Très mauvaise à moyenne	10,4	6,0	10,0	12,0	20,0	22
Total	10,4	6,0	10,0	12,0	20,0	155
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT						
Non	10,6	7,0	10,0	13,0	16,0	109
Oui	10,2	4,0	10,0	12,0	20,0	43
Total	10,5	6,0	10,0	12,0	20,0	152

SUIVI DU NOURRISSON(mch28_1)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	QUI A VACCINE L'ENFANT						Total
	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
REGION DE RESIDENCE							
Région Flamande	7,2	16,4	20,1	48,7	4,6	3,0	185
Région Bruxelloise	4,2	4,9	40,4	40,3	4,3	6,0	155
Région Wallonne	4,1	13,4	40,4	35,5	5,1	1,5	187
Belgique	5,9	14,3	28,6	43,6	4,7	2,8	527
SEXE DE L'ENFANT							
Garçon	6,3	15,3	26,1	44,5	4,4	3,4	269
Fille	6,0	11,5	29,3	44,6	6,0	2,5	215
Total	6,1	13,7	27,5	44,6	5,1	3,0	484
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE							
15-24 ans	3,4	18,0	46,2	29,5	,5	2,4	60
25-34 ans	6,4	13,3	24,9	46,8	5,5	3,1	399
35-44 ans	4,6	18,5	39,6	32,8	3,2	1,2	68
Total	5,9	14,3	28,6	43,6	4,7	2,8	527
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	,0	5,7	11,9	82,4	,0	,0	18
Primaire	,0	30,8	24,2	30,1	12,8	2,2	15
Secondaire inférieur	12,2	13,6	26,2	42,6	5,4	,0	55
Secondaire supérieur	1,5	16,2	30,1	44,0	3,8	4,3	191
Supérieur	8,8	13,6	27,2	42,1	5,6	2,7	225
Total	5,8	14,9	27,9	43,5	4,9	3,0	504
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	4,0	26,1	19,8	46,5	2,8	,8	48
20.000-30.000	7,3	6,9	27,7	49,8	6,9	1,3	105
30.000-40.000	5,5	16,2	35,2	34,9	4,1	4,0	112
40.000-60.000	5,2	14,2	27,0	46,2	3,7	3,7	192
>60.000	7,7	14,7	21,9	45,9	8,3	1,5	55
Total	5,9	14,1	27,9	44,3	4,9	2,9	512
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	5,7	14,4	27,7	45,1	4,4	2,7	434
Très mauvaise à moyenne	6,3	8,8	40,1	36,1	5,4	3,2	71
Total	5,8	13,7	29,2	44,0	4,5	2,7	505
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT							
Non	6,3	11,8	26,5	47,5	5,3	2,6	389
Oui	4,4	20,5	33,9	35,4	3,7	2,0	110
Total	5,9	13,7	28,0	44,9	5,0	2,5	499

légende

1= pas de vaccination
2= Médecin généraliste
3= Pédiatre
4= ONE/K&G
5= Crèche

6= Autre

REGIO: 1 Région Flamande

SUIVI DU NOURRISSON (mch28_1)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	QUI A VACCINE L'ENFANT						Total
	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE DE L'ENFANT							
Garçon	8,6	14,6	14,2	51,2	6,1	5,3	99
Fille	6,9	16,4	25,0	47,6	3,5	,6	70
Total	7,9	15,4	18,7	49,7	5,0	3,3	169
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE							
15-24 ans	,0	31,2	46,3	22,4	,0	,0	11
25-34 ans	7,6	14,7	17,0	52,0	5,2	3,5	161
35-44 ans	8,6	26,0	36,3	29,1	,0	,0	13
Total	7,2	16,4	20,1	48,7	4,6	3,0	185
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	,0	,0	,0	100,0	,0	,0	1
Primaire	,0	69,7	,0	,0	30,3	,0	3
Secondaire inférieur	15,8	22,3	16,3	39,0	6,6	,0	16
Secondaire supérieur	,0	16,2	28,0	46,9	3,8	5,0	70
Supérieur	11,1	14,7	15,6	52,0	4,3	2,3	90
Total	6,9	16,8	20,3	48,2	4,7	3,1	180
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	1
20.000-30.000	5,9	4,3	12,1	57,8	19,9	,0	17
30.000-40.000	8,3	18,8	27,5	36,5	3,9	5,0	38
40.000-60.000	6,9	15,7	17,6	54,0	1,7	4,1	94
>60.000	7,6	18,1	16,6	51,2	6,5	,0	26
Total	7,2	16,2	18,8	49,9	4,8	3,2	176
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	7,0	16,3	19,5	49,6	4,6	3,1	161
Très mauvaise à moyenne	11,1	15,3	31,0	42,5	,0	,0	19
Total	7,4	16,2	20,7	48,8	4,1	2,8	180
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT							
Non	8,5	13,6	16,8	53,1	4,8	3,3	144
Oui	,0	23,9	32,5	35,6	5,2	2,8	31
Total	7,1	15,3	19,4	50,1	4,8	3,2	175

légende

- 1= pas de vaccination
2= Médecin généraliste
3= Pédiatre
4= ONE/K&G
5= Crèche
6= Autre

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SUIVI DU NOURRISSON(mch28_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	QUI A VACCINE L'ENFANT						Total
	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE DE L'ENFANT							
Garçon	1,3	5,0	43,2	41,4	6,7	2,4	75
Fille	5,7	3,8	38,8	39,9	3,0	8,8	66
Total	3,6	4,3	40,9	40,6	4,7	5,8	141
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE							
15-24 ans	,0	9,5	29,9	51,5	2,6	6,5	24
25-34 ans	6,3	2,0	42,7	38,2	5,3	5,4	98
35-44 ans	,0	11,4	43,7	35,2	2,1	7,5	33
Total	4,2	4,9	40,4	40,3	4,3	6,0	155
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	,0	12,5	26,2	61,3	,0	,0	14
Primaire	,0	4,8	18,4	68,8	,0	8,1	9
Secondaire inférieur	15,7	,0	55,0	18,5	10,7	,0	17
Secondaire supérieur	,0	5,4	36,1	53,4	,0	5,1	46
Supérieur	6,6	4,8	50,6	18,6	8,5	10,8	62
Total	4,5	5,2	41,9	37,5	4,6	6,4	148
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	,0	5,1	12,8	79,6	,0	2,4	27
20.000-30.000	9,9	4,1	39,8	46,2	,0	,0	38
30.000-40.000	4,6	5,9	51,9	28,2	,0	9,3	30
40.000-60.000	,0	5,2	56,4	18,4	12,3	7,6	38
>60.000	4,9	4,3	38,3	22,1	15,0	15,4	20
Total	4,2	4,9	40,1	40,7	4,3	5,7	153
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	3,3	4,2	46,0	37,6	4,5	4,4	118
Très mauvaise à moyenne	5,5	5,8	17,7	55,5	,0	15,6	26
Total	3,7	4,5	41,1	40,7	3,7	6,4	144
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT							
Non	4,3	5,0	38,0	45,1	3,3	4,3	117
Oui	4,7	5,8	52,2	19,6	9,6	8,2	31
Total	4,4	5,1	40,8	40,0	4,5	5,1	148

légende

1= pas de vaccination
 2= Médecin généraliste
 3= Pédiatre

4= ONE/K&G
 5= Crèche
 6= Autre

REGIO: 3 Région Wallonne

SUIVI DU NOURRISSON(mch28_1)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	QUI A VACCINE L'ENFANT						Total
	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE DE L'ENFANT							
Garçon	3,1	19,3	44,1	32,8	,6	,0	95
Fille	4,7	6,4	32,9	41,3	11,2	3,5	79
Total	3,8	13,4	39,0	36,7	5,4	1,6	174
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE LA NAISSANCE							
15-24 ans	7,4	10,9	52,6	26,5	,0	2,7	25
25-34 ans	3,5	13,5	37,8	37,5	6,1	1,6	140
35-44 ans	3,1	15,2	40,8	34,9	5,9	,0	22
Total	4,1	13,4	40,4	35,5	5,1	1,5	187
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	,0	,0	,0	100,0	,0	,0	3
Primaire	,0	,0	63,3	36,7	,0	,0	3
Secondaire inférieur	6,6	5,7	31,5	53,8	2,4	,0	22
Secondaire supérieur	4,5	18,7	32,5	36,8	4,7	2,8	75
Supérieur	3,8	13,7	47,5	26,0	8,0	1,1	73
Total	4,3	14,2	38,0	36,4	5,5	1,6	176
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	6,5	28,5	25,7	34,8	4,5	,0	20
20.000-30.000	7,4	9,3	33,8	46,0	1,0	2,5	50
30.000-40.000	2,0	14,9	42,2	34,3	5,3	1,4	44
40.000-60.000	,7	11,4	52,0	26,0	8,5	1,5	60
>60.000	10,4	,0	44,1	30,0	15,5	,0	9
Total	4,1	13,2	40,5	35,4	5,2	1,5	183
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	4,0	13,8	38,2	38,8	3,9	1,4	155
Très mauvaise à moyenne	,0	1,1	61,0	20,2	14,7	3,0	26
Total	3,4	12,0	41,4	36,2	5,4	1,6	181
TABAGISME APRES L'ACCOUCHEMENT							
Non	2,3	10,3	43,1	36,5	7,2	,6	128
Oui	8,8	20,1	31,7	38,4	1,1	,0	48
Total	4,2	13,3	39,7	37,1	5,4	,4	176

légende

1= pas de vaccination
2= Médecin généraliste
3= Pédiatre
4= ONE/K&G

5= Crèche
6= Autre