

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : HYPERTENSION ARTERIELLE (INDICATEUR : SC02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONTRÔLE TENSION ARTERIELLE AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	88.1	11.9	3818
Femme	93.7	6.3	4123
Total	90.9	9.1	7941
GROUPE AGE			
15-24	79.7	20.3	986
25-34	88.9	11.1	1515
35-44	92.5	7.5	1528
45-54	93.1	6.9	1230
55-64	96.2	3.8	1035
65-74	95.6	4.4	1029
75 +	97.7	2.3	618
Total	90.9	9.1	7941
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	89.5	10.5	254
Primaire	88.9	11.1	1118
Secondaire inférieur	91.9	8.1	1357
Secondaire supérieur	91.4	8.6	2270
Supérieur	90.7	9.3	2622
Total	90.9	9.1	7621
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	83.7	16.3	548
20.000-30.000	89.8	10.2	1560
30.000-40.000	92.8	7.2	1870
40.000-60.000	91.4	8.6	2533
>60.000	91.2	8.8	1069
Total	91.0	9.0	7580
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	89.3	10.7	5674
Très mauvaise à moyenne	97.0	3.0	1978
Total	91.0	9.0	7652
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	90.4	9.6	3576
Dans le passé	94.3	5.7	1881
Modéré (< 20)	88.6	11.4	1496
Gros fumeur	89.3	10.7	803
Total	90.8	9.2	7756
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	92.5	7.5	2838
Région Bruxelloise	86.6	13.4	2294
Région Wallonne	89.2	10.8	2809
Belgique	90.9	9.1	7941

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : HYPERTENSION ARTERIELLE (INDICATEUR : SC02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONTRÔLE TENSION ARTERIELLE AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	89.8	10.2	1400
Femme	95.3	4.7	1438
Total	92.5	7.5	2838
GROUPES AGE			
15-24	84.7	15.3	382
25-34	90.9	9.1	565
35-44	94.2	5.8	516
45-54	93.2	6.8	449
55-64	96.7	3.3	395
65-74	96.1	3.9	349
75 +	98.5	1.5	182
Total	92.5	7.5	2838
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	98.0	2.0	53
Primaire	92.0	8.0	381
Secondaire inférieur	94.5	5.5	521
Secondaire supérieur	92.7	7.3	938
Supérieur	91.4	8.6	838
Total	92.6	7.4	2731
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	86.1	13.9	89
20.000-30.000	93.7	6.3	511
30.000-40.000	93.7	6.3	699
40.000-60.000	92.3	7.7	994
>60.000	92.4	7.6	383
Total	92.7	7.3	2676
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	91.4	8.6	2208
Très mauvaise à moyenne	98.2	1.8	563
Total	92.7	7.3	2771
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	93.0	7.0	1338
Dans le passé	94.5	5.5	690
Modéré (< 20)	89.5	10.5	537
Gros fumeur	91.1	8.9	235
Total	92.5	7.5	2800

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : HYPERTENSION ARTERIELLE (INDICATEUR : SC02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONTRÔLE TENSION ARTERIELLE AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	82.4	17.6	1092
Femme	90.4	9.6	1202
Total	86.6	13.4	2294
GROUPE AGE			
15-24	73.0	27.0	256
25-34	83.3	16.7	435
35-44	86.8	13.2	452
45-54	94.0	6.0	357
55-64	93.1	6.9	283
65-74	90.2	9.8	303
75 +	93.1	6.9	208
Total	86.6	13.4	2294
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	76.9	23.1	106
Primaire	79.9	20.1	290
Secondaire inférieur	87.1	12.9	328
Secondaire supérieur	84.7	15.3	536
Supérieur	91.3	8.7	918
Total	86.7	13.3	2178
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	80.6	19.4	239
20.000-30.000	85.8	14.2	447
30.000-40.000	84.4	15.6	476
40.000-60.000	89.7	10.3	617
>60.000	92.5	7.5	408
Total	87.2	12.8	2187
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	84.9	15.1	1590
Très mauvaise à moyenne	93.0	7.0	606
Total	87.0	13.0	2196
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	85.2	14.8	963
Dans le passé	92.6	7.4	548
Modéré (< 20)	84.9	15.1	434
Gros fumeur	85.3	14.7	262
Total	86.7	13.3	2207

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : HYPERTENSION ARTERIELLE (INDICATEUR : SC02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONTRÔLE TENSION ARTERIELLE AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	86.4	13.6	1326
Femme	92.0	8.0	1483
Total	89.2	10.8	2809
GROUPE AGE			
15-24	72.6	27.4	348
25-34	87.0	13.0	515
35-44	91.0	9.0	560
45-54	92.5	7.5	424
55-64	96.3	3.7	357
65-74	96.6	3.4	377
75 +	98.7	1.3	228
Total	89.2	10.8	2809
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	89.7	10.3	95
Primaire	86.6	13.4	447
Secondaire inférieur	88.3	11.7	508
Secondaire supérieur	90.3	9.7	796
Supérieur	89.4	10.6	866
Total	89.1	10.9	2712
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	83.6	16.4	220
20.000-30.000	85.1	14.9	602
30.000-40.000	93.5	6.5	695
40.000-60.000	89.9	10.1	922
>60.000	87.0	13.0	278
Total	89.0	11.0	2717
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	86.3	13.7	1876
Très mauvaise à moyenne	96.5	3.5	809
Total	89.1	10.9	2685
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	86.9	13.1	1275
Dans le passé	94.5	5.5	643
Modéré (< 20)	88.2	11.8	525
Gros fumeur	87.9	12.1	306
Total	89.0	11.0	2749

Personnes âgées de 15 ans et plus

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : HYPERTENSION ARTERIELLE (INDICATEUR : SC02_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DELAI DEPUIS LE DERNIER CONTROLE DE LA TENSION ARTERIELLE (en %)					Total N
	< 1 an	1-2 ans	2-5 ans	> 5 ans	jamais	
SEXE						
Homme	68.9	14.4	4.7	1.2	10.7	3818
Femme	80.8	9.8	3.1	.9	5.4	4123
Total	74.9	12.1	3.9	1.1	8.0	7941
GROUPES AGE						
15-24	59.8	15.1	4.8	.5	19.8	986
25-34	68.2	15.7	5.1	1.3	9.8	1515
35-44	74.0	13.6	4.9	.8	6.7	1528
45-54	77.2	11.8	4.1	1.8	5.1	1230
55-64	85.2	9.3	1.8	1.1	2.6	1035
65-74	90.8	3.9	.9	.8	3.6	1029
75 +	93.2	3.4	1.1	1.1	1.2	618
Total	74.9	12.1	3.9	1.1	8.0	7941
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	82.2	4.6	2.7	.2	10.2	254
Primaire	80.5	6.6	1.9	1.0	10.1	1118
Secondaire inférieur	76.1	12.4	3.4	.9	7.2	1357
Secondaire supérieur	74.2	13.4	3.9	1.0	7.5	2270
Supérieur	73.4	12.6	4.8	1.2	8.1	2622
Total	75.2	11.9	3.8	1.0	8.1	7621
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	67.5	11.0	5.2	.4	15.9	548
20.000-30.000	73.8	11.8	4.3	1.2	8.9	1560
30.000-40.000	78.8	11.0	3.1	.9	6.3	1870
40.000-60.000	75.0	12.9	3.5	1.1	7.5	2533
>60.000	73.5	12.0	5.7	1.7	7.1	1069
Total	75.0	12.0	4.0	1.1	7.9	7580
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	71.0	13.9	4.5	1.2	9.4	5674
Très mauvaise à moyenne	89.9	5.7	1.3	.5	2.5	1978
Total	75.1	12.1	3.8	1.1	7.9	7652
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	75.1	12.0	3.3	.9	8.7	3576
Dans le passé	79.9	11.1	3.3	.6	5.0	1881
Modéré (< 20)	70.1	13.2	5.2	1.7	9.8	1496
Gros fumeur	70.4	13.3	5.6	1.5	9.2	803
Total	74.7	12.2	3.9	1.1	8.1	7756
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	76.1	13.1	3.3	1.1	6.4	2838
Région Bruxelloise	71.8	10.5	4.4	1.7	11.7	2294
Région Wallonne	73.7	10.7	4.8	.9	9.9	2809
Belgique	74.9	12.1	3.9	1.1	8.0	7941

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : HYPERTENSION ARTERIELLE (INDICATEUR : SC02_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DELAI DEPUIS LE DERNIER CONTROLE DE LA TENSION ARTERIELLE					Total N
	< 1 an	1-2 ans	2-5 ans	> 5 ans	jamais	
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	69.5	16.3	4.0	1.2	9.0	1400
Femme	82.8	9.9	2.5	1.0	3.7	1438
Total	76.1	13.1	3.3	1.1	6.4	2838
GROUPES AGE						
15-24	64.2	16.4	4.1	.3	15.0	382
25-34	69.3	17.1	4.5	1.4	7.8	565
35-44	76.6	13.9	3.7	.5	5.3	516
45-54	76.8	12.6	3.9	2.3	4.4	449
55-64	85.1	10.3	1.2	.7	2.7	395
65-74	92.2	3.6	.3	1.3	2.5	349
75 +	92.4	5.1	1.0	1.5	.0	182
Total	76.1	13.1	3.3	1.1	6.4	2838
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	89.4	5.5	3.2	.0	2.0	53
Primaire	83.6	6.3	2.0	1.2	6.9	381
Secondaire inférieur	77.4	14.4	2.6	.3	5.3	521
Secondaire supérieur	75.9	13.9	2.9	1.2	6.1	938
Supérieur	73.5	13.7	4.1	1.3	7.3	838
Total	76.5	12.9	3.1	1.0	6.4	2731
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	68.1	13.5	4.5	.0	13.9	89
20.000-30.000	77.5	13.1	3.0	1.5	4.8	511
30.000-40.000	79.9	10.8	2.9	1.1	5.2	699
40.000-60.000	75.7	14.1	2.5	.9	6.7	994
>60.000	73.7	12.6	6.1	1.7	6.0	383
Total	76.5	12.9	3.3	1.2	6.1	2676
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	72.9	14.9	3.6	1.2	7.4	2208
Très mauvaise à moyenne	91.2	6.1	1.0	.8	.9	563
Total	76.3	13.3	3.1	1.1	6.2	2771
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	77.3	13.4	2.3	.9	6.1	1338
Dans le passé	79.7	11.8	3.0	.9	4.6	690
Modéré (< 20)	71.4	13.3	4.8	1.4	9.1	537
Gros fumeur	69.8	15.2	6.2	1.7	7.2	235
Total	76.0	13.2	3.3	1.1	6.4	2800

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : HYPERTENSION ARTERIELLE (INDICATEUR : SC02_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DELAI DEPUIS LE DERNIER CONTROLE DE LA TENSION ARTERIELLE					Total N
	< 1 an	1-2 ans	2-5 ans	> 5 ans	jamais	
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	66.1	11.3	5.0	1.9	15.7	1092
Femme	76.8	9.7	3.9	1.5	8.1	1202
Total	71.8	10.5	4.4	1.7	11.7	2294
GROUPES AGE						
15-24	56.2	11.6	5.1	.9	26.2	256
25-34	66.3	12.0	5.0	2.0	14.7	435
35-44	62.8	16.5	7.6	2.3	11.0	452
45-54	80.1	9.2	4.6	1.3	4.7	357
55-64	84.3	7.5	1.3	2.6	4.4	283
65-74	84.1	5.1	1.1	.8	9.0	303
75 +	89.3	2.5	1.4	1.8	5.0	208
Total	71.8	10.5	4.4	1.7	11.7	2294
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	71.3	3.9	1.6	.0	23.1	106
Primaire	69.8	7.9	2.1	2.3	17.8	290
Secondaire inférieur	76.0	8.9	2.2	2.3	10.6	328
Secondaire supérieur	70.2	9.3	5.1	1.2	14.1	536
Supérieur	72.2	13.4	5.7	1.9	6.8	918
Total	71.8	10.5	4.4	1.7	11.6	2178
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	59.7	12.9	8.0	.2	19.2	239
20.000-30.000	72.8	8.4	4.6	1.1	13.1	447
30.000-40.000	74.5	8.6	1.3	1.5	14.1	476
40.000-60.000	71.9	13.0	4.7	2.4	7.9	617
>60.000	76.7	10.5	5.4	2.7	4.8	408
Total	72.0	10.6	4.6	1.7	11.1	2187
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	67.3	12.5	5.1	2.0	13.1	1590
Très mauvaise à moyenne	85.4	5.0	2.5	.7	6.3	606
Total	72.0	10.5	4.5	1.6	11.4	2196
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	69.6	11.7	3.9	1.9	12.9	963
Dans le passé	79.5	9.5	3.5	.6	6.8	548
Modéré (< 20)	68.6	10.4	5.8	2.0	13.1	434
Gros fumeur	70.4	8.9	6.0	2.6	12.1	262
Total	71.6	10.6	4.5	1.7	11.5	2207

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : HYPERTENSION ARTERIELLE (INDICATEUR : SC02_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DELAI DEPUIS LE DERNIER CONTROLE DE LA TENSION ARTERIELLE					Total N
	< 1 an	1-2 ans	2-5 ans	> 5 ans	jamais	
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	68.7	11.9	5.9	1.1	12.4	1326
Femme	78.5	9.6	3.8	.6	7.5	1483
Total	73.7	10.7	4.8	.9	9.9	2809
GROUPES AGE						
15-24	52.9	13.6	6.0	.7	26.7	348
25-34	66.7	14.0	6.2	.8	12.2	515
35-44	72.4	12.3	6.3	1.1	7.9	560
45-54	77.2	11.1	4.3	1.0	6.5	424
55-64	85.8	7.5	3.1	1.6	2.1	357
65-74	90.9	3.9	1.8	.0	3.4	377
75 +	96.1	1.6	1.0	.1	1.2	228
Total	73.7	10.7	4.8	.9	9.9	2809
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	82.5	4.4	2.8	.5	9.8	95
Primaire	78.5	6.6	1.6	.4	13.1	447
Secondaire inférieur	73.7	9.6	5.0	1.9	9.8	508
Secondaire supérieur	71.3	13.3	5.8	.7	9.0	796
Supérieur	73.6	10.3	5.5	.7	9.9	866
Total	73.8	10.4	4.9	.9	10.0	2712
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	70.9	8.4	4.3	.7	15.7	220
20.000-30.000	68.1	10.7	6.3	.9	14.0	602
30.000-40.000	78.0	11.7	3.8	.4	6.1	695
40.000-60.000	74.5	10.4	5.0	1.2	8.9	922
>60.000	71.2	11.2	4.6	1.0	12.0	278
Total	73.4	10.7	4.9	.9	10.1	2717
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	68.1	12.2	6.0	1.1	12.5	1876
Très mauvaise à moyenne	89.6	5.6	1.4	.1	3.4	809
Total	74.0	10.4	4.7	.9	10.0	2685
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	72.5	9.5	5.0	.7	12.4	1275
Dans le passé	80.5	10.1	4.0	.2	5.3	643
Modéré (< 20)	68.4	13.9	5.8	2.1	9.8	525
Gros fumeur	71.2	12.1	4.6	.9	11.2	306
Total	73.3	10.8	4.9	.9	10.1	2749

Personnes âgées de 15 ans et plus

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : HYPERTENSION ARTERIELLE (INDICATEUR : SC03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997			
	PERSONNES AYANT EU AU MOINS UNE FOIS UNE TENSION ARTERIELLE TROP ELEVEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	25.6	74.4	3424
Femme	28.1	71.9	3883
Total	26.9	73.1	7307
GROUPE AGE			
15-24	13.1	86.9	770
25-34	16.7	83.3	1348
35-44	21.5	78.5	1419
45-54	29.7	70.3	1163
55-64	38.2	61.8	1007
65-74	48.6	51.4	1002
75 +	49.4	50.6	598
Total	26.9	73.1	7307
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	32.1	67.9	224
Primaire	37.0	63.0	1009
Secondaire inférieur	31.5	68.5	1263
Secondaire supérieur	25.8	74.2	2095
Supérieur	22.1	77.9	2422
Total	27.0	73.0	7013
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	27.9	72.1	472
20.000-30.000	31.3	68.7	1396
30.000-40.000	28.9	71.1	1755
40.000-60.000	25.2	74.8	2354
>60.000	21.8	78.2	1003
Total	26.9	73.1	6980
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	21.3	78.7	5155
Très mauvaise à moyenne	44.7	55.3	1892
Total	26.7	73.3	7047
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	27.6	72.4	3267
Dans le passé	29.3	70.7	1795
Modéré (< 20)	20.8	79.2	1360
Gros fumeur	26.9	73.1	711
Total	26.6	73.4	7133
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	25.5	74.5	2668
Région Bruxelloise	26.8	73.2	2062
Région Wallonne	29.6	70.4	2577
Belgique	26.9	73.1	7307

Personnes testées âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : HYPERTENSION ARTERIELLE (INDICATEUR : SC03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERSONNES AYANT EU AU MOINS UNE FOIS UNE TENSION ARTERIELLE TROP ELEVÉE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	24.9	75.1	1284
Femme	26.2	73.8	1384
Total	25.5	74.5	2668
GROUPE AGE			
15-24	11.1	88.9	320
25-34	14.6	85.4	513
35-44	21.2	78.8	495
45-54	27.5	72.5	430
55-64	39.1	60.9	386
65-74	50.1	49.9	342
75 +	48.4	51.6	182
Total	25.5	74.5	2668
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	30.2	69.8	51
Primaire	35.8	64.2	362
Secondaire inférieur	31.6	68.4	496
Secondaire supérieur	26.1	73.9	881
Supérieur	18.0	82.0	778
Total	25.7	74.3	2568
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	37.8	62.2	80
20.000-30.000	35.0	65.0	482
30.000-40.000	26.1	73.9	668
40.000-60.000	21.7	78.3	930
>60.000	19.7	80.3	364
Total	25.4	74.6	2524
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	20.3	79.7	2056
Très mauvaise à moyenne	47.2	52.8	549
Total	25.5	74.5	2605
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	25.5	74.5	1257
Dans le passé	29.0	71.0	669
Modéré (< 20)	18.9	81.1	495
Gros fumeur	27.0	73.0	210
Total	25.3	74.7	2631

Personnes testées âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : HYPERTENSION ARTERIELLE (INDICATEUR : SC03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERSONNES AYANT EU AU MOINS UNE FOIS UNE TENSION ARTERIELLE TROP ELEVEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	23.3	76.7	952
Femme	29.6	70.4	1110
Total	26.8	73.2	2062
GROUPE AGE			
15-24	15.6	84.4	182
25-34	17.3	82.7	372
35-44	19.6	80.4	410
45-54	31.0	69.0	337
55-64	33.4	66.6	269
65-74	45.4	54.6	293
75 +	43.7	56.3	199
Total	26.8	73.2	2062
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	35.3	64.7	86
Primaire	29.9	70.1	238
Secondaire inférieur	30.6	69.4	300
Secondaire supérieur	27.6	72.4	484
Supérieur	22.2	77.8	851
Total	26.3	73.7	1959
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	20.2	79.8	202
20.000-30.000	27.6	72.4	387
30.000-40.000	33.4	66.6	425
40.000-60.000	26.2	73.8	566
>60.000	26.2	73.8	385
Total	27.2	72.8	1965
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	21.1	78.9	1409
Très mauvaise à moyenne	39.0	61.0	571
Total	25.9	74.1	1980
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	26.9	73.1	853
Dans le passé	30.0	70.0	517
Modéré (< 20)	21.2	78.8	383
Gros fumeur	26.9	73.1	230
Total	26.4	73.6	1983

Personnes testées âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : HYPERTENSION ARTERIELLE (INDICATEUR : SC03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERSONNES AYANT EU AU MOINS UNE FOIS UNE TENSION ARTERIELLE TROP ELEVÉE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	27.9	72.1	1188
Femme	31.2	68.8	1389
Total	29.6	70.4	2577
GROUPE AGE			
15-24	16.6	83.4	268
25-34	21.0	79.0	463
35-44	22.8	77.2	514
45-54	33.4	66.6	396
55-64	37.7	62.3	352
65-74	47.4	52.6	367
75 +	53.5	46.5	217
Total	29.6	70.4	2577
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	32.2	67.8	87
Primaire	41.4	58.6	409
Secondaire inférieur	31.5	68.5	467
Secondaire supérieur	24.6	75.4	730
Supérieur	28.8	71.2	793
Total	29.7	70.3	2486
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	24.7	75.3	190
20.000-30.000	25.7	74.3	527
30.000-40.000	32.5	67.5	662
40.000-60.000	31.8	68.2	858
>60.000	25.3	74.7	254
Total	29.6	70.4	2491
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	23.6	76.4	1690
Très mauvaise à moyenne	43.0	57.0	772
Total	29.2	70.8	2462
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	32.4	67.6	1157
Dans le passé	29.6	70.4	609
Modéré (< 20)	24.1	75.9	482
Gros fumeur	26.8	73.2	271
Total	29.4	70.6	2519

Personnes testées âgées de 15 ans et plus

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERSONNES AYANT EU AU MOINS UNE FOIS UN CONTROLE DU TAUX DE CHOLESTEROL		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	56.9	43.1	2745
Femme	60.5	39.5	2841
Total	58.7	41.3	5586
GROUPES AGE			
20-24	29.7	70.3	490
25-34	41.4	58.6	1403
35-44	59.7	40.3	1464
45-54	73.9	26.1	1208
55-64	81.8	18.2	1021
Total	58.7	41.3	5586
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	46.0	54.0	156
Primaire	60.1	39.9	532
Secondaire inférieur	58.3	41.7	905
Secondaire supérieur	57.6	42.4	1707
Supérieur	60.5	39.5	2062
Total	58.8	41.2	5362
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	45.2	54.8	392
20.000-30.000	55.3	44.7	988
30.000-40.000	61.2	38.8	1193
40.000-60.000	58.5	41.5	1956
>60.000	64.2	35.8	824
Total	58.7	41.3	5353
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	54.8	45.2	4268
Très mauvaise à moyenne	75.9	24.1	1124
Total	58.8	41.2	5392
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	55.2	44.8	2375
Dans le passé	68.0	32.0	1249
Modéré (< 20)	56.0	44.0	1150
Gros fumeur	57.0	43.0	697
Total	58.5	41.5	5471
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	57.0	43.0	2004
Région Bruxelloise	55.1	44.9	1599
Région Wallonne	62.9	37.1	1983
Belgique	58.7	41.3	5586

Personnes testées âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERSONNES AYANT EU AU MOINS UNE FOIS UN CONTROLE DU TAUX DE CHOLESTEROL		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	57.2	42.8	993
Femme	56.9	43.1	1011
Total	57.0	43.0	2004
GROUPE AGE			
20-24	21.9	78.1	172
25-34	39.0	61.0	507
35-44	59.1	40.9	494
45-54	71.7	28.3	440
55-64	80.3	19.7	391
Total	57.0	43.0	2004
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	50.7	49.3	29
Primaire	62.8	37.2	170
Secondaire inférieur	58.1	41.9	366
Secondaire supérieur	54.9	45.1	691
Supérieur	57.3	42.7	671
Total	56.9	43.1	1927
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	47.2	52.8	51
20.000-30.000	56.5	43.5	306
30.000-40.000	55.8	44.2	452
40.000-60.000	54.6	45.4	774
>60.000	65.3	34.7	307
Total	56.9	43.1	1890
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	53.5	46.5	1649
Très mauvaise à moyenne	77.9	22.1	312
Total	57.4	42.6	1961
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	53.8	46.2	906
Dans le passé	65.1	34.9	468
Modéré (< 20)	53.6	46.4	407
Gros fumeur	57.2	42.8	196
Total	56.8	43.2	1977

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERSONNES AYANT EU AU MOINS UNE FOIS UN CONTROLE DU TAUX DE CHOLESTEROL		Total N
	Oui	Non	
	%	%	
SEXE			
Homme	52.8	47.2	774
Femme	57.4	42.6	825
Total	55.1	44.9	1599
GROUPE AGE			
20-24	22.6	77.4	139
25-34	39.2	60.8	409
35-44	54.2	45.8	420
45-54	75.6	24.4	347
55-64	82.2	17.8	284
Total	55.1	44.9	1599
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	23.1	76.9	78
Primaire	53.0	47.0	157
Secondaire inférieur	53.4	46.6	205
Secondaire supérieur	55.2	44.8	378
Supérieur	60.5	39.5	708
Total	55.4	44.6	1526
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	35.8	64.2	194
20.000-30.000	47.9	52.1	281
30.000-40.000	58.1	41.9	281
40.000-60.000	60.4	39.6	475
>60.000	66.8	33.2	302
Total	55.2	44.8	1533
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	51.9	48.1	1184
Très mauvaise à moyenne	64.7	35.3	352
Total	54.7	45.3	1536
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	52.3	47.7	643
Dans le passé	65.3	34.7	342
Modéré (< 20)	52.3	47.7	329
Gros fumeur	53.2	46.8	231
Total	55.1	44.9	1545

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERSONNES AYANT EU AU MOINS UNE FOIS UN CONTROLE DU TAUX DE CHOLESTEROL		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	57.7	42.3	978
Femme	68.3	31.7	1005
Total	62.9	37.1	1983
GROUPE AGE			
20-24	43.7	56.3	179
25-34	46.7	53.3	487
35-44	62.3	37.7	550
45-54	77.6	22.4	421
55-64	85.0	15.0	346
Total	62.9	37.1	1983
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	57.6	42.4	49
Primaire	58.0	42.0	205
Secondaire inférieur	59.7	40.3	334
Secondaire supérieur	63.8	36.2	638
Supérieur	65.7	34.3	683
Total	63.1	36.9	1909
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	49.6	50.4	147
20.000-30.000	55.5	44.5	401
30.000-40.000	70.8	29.2	460
40.000-60.000	65.7	34.3	707
>60.000	59.5	40.5	215
Total	62.9	37.1	1930
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	58.3	41.7	1435
Très mauvaise à moyenne	76.5	23.5	460
Total	62.7	37.3	1895
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	58.8	41.2	826
Dans le passé	74.3	25.7	439
Modéré (< 20)	61.5	38.5	414
Gros fumeur	57.7	42.3	270
Total	62.7	37.3	1949

Personnes âgées de 15 ans et plus

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONTRÔLE DU TAUX CHOLESTEROL LES 5 DERNIERES ANNEES		Total
	Oui %	Non %	N
SEXE			
Homme	53.3	46.7	2699
Femme	57.4	42.6	2793
Total	55.3	44.7	5492
GROUPES AGE			
20-24	29.0	71.0	486
25-34	38.3	61.7	1382
35-44	56.4	43.6	1445
45-54	70.3	29.7	1181
55-64	77.5	22.5	998
Total	55.3	44.7	5492
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	44.1	55.9	155
Primaire	54.6	45.4	515
Secondaire inférieur	55.6	44.4	896
Secondaire supérieur	55.1	44.9	1680
Supérieur	56.3	43.7	2030
Total	55.4	44.6	5276
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	43.1	56.9	387
20.000-30.000	52.0	48.0	966
30.000-40.000	58.8	41.2	1172
40.000-60.000	54.4	45.6	1927
>60.000	61.7	38.3	811
Total	55.5	44.5	5263
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	51.4	48.6	4201
Très mauvaise à moyenne	73.3	26.7	1101
Total	55.5	44.5	5302
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	51.7	48.3	2333
Dans le passé	64.4	35.6	1230
Modéré (< 20)	53.6	46.4	1128
Gros fumeur	52.9	47.1	688
Total	55.2	44.8	5379
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	54.2	45.8	1979
Région Bruxelloise	51.5	48.5	1571
Région Wallonne	58.6	41.4	1942
Belgique	55.3	44.7	5492

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONTRÔLE DU TAUX CHOLESTEROL LES 5 DERNIERES ANNEES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	53.9	46.1	980
Femme	54.5	45.5	999
Total	54.2	45.8	1979
GROUPES AGE			
20-24	21.7	78.3	171
25-34	36.0	64.0	501
35-44	56.7	43.3	491
45-54	69.2	30.8	432
55-64	75.8	24.2	384
Total	54.2	45.8	1979
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	50.7	49.3	29
Primaire	55.4	44.6	164
Secondaire inférieur	56.4	43.6	364
Secondaire supérieur	53.1	46.9	684
Supérieur	53.6	46.4	661
Total	54.0	46.0	1902
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	47.2	52.8	51
20.000-30.000	53.5	46.5	301
30.000-40.000	53.7	46.3	447
40.000-60.000	51.4	48.6	765
>60.000	63.4	36.6	302
Total	54.2	45.8	1866
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	50.7	49.3	1629
Très mauvaise à moyenne	75.8	24.2	307
Total	54.7	45.3	1936
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	50.8	49.2	891
Dans le passé	61.6	38.4	462
Modéré (< 20)	52.4	47.6	405
Gros fumeur	53.5	46.5	194
Total	54.0	46.0	1952

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONTRÔLE DU TAUX CHOLESTEROL LES 5 DERNIERES ANNEES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	49.1	50.9	760
Femme	53.8	46.2	811
Total	51.5	48.5	1571
GROUPES AGE			
20-24	22.3	77.7	138
25-34	34.8	65.2	402
35-44	50.1	49.9	414
45-54	72.5	27.5	340
55-64	78.3	21.7	277
Total	51.5	48.5	1571
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	23.1	76.9	78
Primaire	49.6	50.4	152
Secondaire inférieur	51.1	48.9	204
Secondaire supérieur	51.1	48.9	371
Supérieur	56.2	43.8	697
Total	51.8	48.2	1502
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	34.0	66.0	192
20.000-30.000	45.6	54.4	278
30.000-40.000	54.7	45.3	274
40.000-60.000	56.0	44.0	464
>60.000	62.4	37.6	298
Total	51.7	48.3	1506
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	48.2	51.8	1166
Très mauvaise à moyenne	62.6	37.4	345
Total	51.3	48.7	1511
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	49.3	50.7	635
Dans le passé	61.8	38.2	338
Modéré (< 20)	47.3	52.7	318
Gros fumeur	49.3	50.7	227
Total	51.5	48.5	1518

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONTRÔLE DU TAUX CHOLESTEROL LES 5 DERNIERES ANNEES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	53.4	46.6	959
Femme	64.2	35.8	983
Total	58.6	41.4	1942
GROUPES AGE			
20-24	42.1	57.9	177
25-34	43.8	56.2	479
35-44	57.4	42.6	540
45-54	71.8	28.2	409
55-64	81.0	19.0	337
Total	58.6	41.4	1942
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	52.4	47.6	48
Primaire	55.1	44.9	199
Secondaire inférieur	55.0	45.0	328
Secondaire supérieur	60.3	39.7	625
Supérieur	60.7	39.3	672
Total	58.9	41.1	1872
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	46.2	53.8	144
20.000-30.000	51.7	48.3	387
30.000-40.000	68.4	31.6	451
40.000-60.000	60.1	39.9	698
>60.000	56.4	43.6	211
Total	58.8	41.2	1891
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	53.8	46.2	1406
Très mauvaise à moyenne	73.2	26.8	449
Total	58.4	41.6	1855
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	54.4	45.6	807
Dans le passé	70.3	29.7	430
Modéré (< 20)	57.6	42.4	405
Gros fumeur	53.1	46.9	267
Total	58.5	41.5	1909

Personnes âgées de 15 ans et plus

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DELAI DEPUIS LE DERNIER CONTRÔLE DU TAUX CHOLESTEROL					Total
	< 1 an	1-2 ans	2-5 ans	> 5 ans	jamais	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	32.4	13.5	7.4	2.8	43.9	2699
Femme	33.8	15.0	8.5	2.5	40.1	2793
Total	33.1	14.2	8.0	2.7	42.0	5492
GROUPES AGE						
20-24	15.8	8.4	4.7	.4	70.6	486
25-34	21.7	11.7	4.9	2.3	59.4	1382
35-44	29.3	15.7	11.3	3.0	40.7	1445
45-54	44.9	16.2	9.2	3.0	26.7	1181
55-64	53.1	16.7	7.7	3.7	18.8	998
Total	33.1	14.2	8.0	2.7	42.0	5492
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	28.0	12.7	3.4	1.6	54.4	155
Primaire	40.6	9.2	4.9	3.0	42.3	515
Secondaire inférieur	36.0	13.2	6.3	2.2	42.2	896
Secondaire supérieur	32.8	14.8	7.5	2.0	42.9	1680
Supérieur	30.4	15.4	10.5	3.6	40.2	2030
Total	33.0	14.2	8.1	2.7	42.0	5276
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	25.3	11.7	6.2	1.5	55.3	387
20.000-30.000	33.8	11.7	6.5	1.8	46.1	966
30.000-40.000	35.9	14.8	8.1	1.6	39.6	1172
40.000-60.000	31.8	14.5	8.1	3.6	42.0	1927
>60.000	34.1	16.2	11.5	1.8	36.4	811
Total	33.1	14.2	8.2	2.5	42.1	5263
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	28.6	14.6	8.2	2.7	45.9	4201
Très mauvaise à moyenne	52.7	13.5	7.1	1.8	24.8	1101
Total	33.1	14.4	8.0	2.6	41.9	5302
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	29.3	15.1	7.4	2.7	45.5	2333
Dans le passé	40.8	15.6	8.0	2.8	32.8	1230
Modéré (< 20)	32.4	12.9	8.2	1.8	44.6	1128
Gros fumeur	33.0	11.2	8.7	3.4	43.7	688
Total	33.0	14.3	7.9	2.6	42.2	5379
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	32.1	15.1	7.0	2.2	43.6	1979
Région Bruxelloise	32.2	11.7	7.6	2.7	45.8	1571
Région Wallonne	35.3	13.4	9.9	3.4	37.9	1942
Belgique	33.1	14.2	8.0	2.7	42.0	5492

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DELAI DEPUIS LE DERNIER CONTRÔLE DU TAUX CHOLESTEROL					Total N
	< 1 an	1-2 ans	2-5 ans	> 5 ans	jamais	
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	32.9	14.3	6.8	2.4	43.7	980
Femme	31.2	15.9	7.3	2.0	43.5	999
Total	32.1	15.1	7.0	2.2	43.6	1979
GROUPES AGE						
20-24	10.3	7.3	4.0	.0	78.3	171
25-34	19.0	13.2	3.8	2.2	61.8	501
35-44	29.3	16.1	11.3	2.2	41.0	491
45-54	44.9	16.2	8.1	2.0	28.8	432
55-64	51.4	19.0	5.4	3.9	20.4	384
Total	32.1	15.1	7.0	2.2	43.6	1979
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	33.0	13.8	3.9	.0	49.3	29
Primaire	42.5	10.2	2.6	4.8	39.8	164
Secondaire inférieur	37.3	13.5	5.6	1.4	42.2	364
Secondaire supérieur	30.5	15.7	6.9	1.4	45.5	684
Supérieur	27.7	16.2	9.7	3.1	43.2	661
Total	31.8	15.0	7.2	2.3	43.7	1902
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	31.9	12.3	3.0	.0	52.8	51
20.000-30.000	34.1	14.3	5.1	1.6	44.8	301
30.000-40.000	32.7	14.4	6.6	1.6	44.7	447
40.000-60.000	30.2	14.2	6.9	2.8	45.8	765
>60.000	32.7	18.4	12.3	1.2	35.4	302
Total	31.9	14.9	7.4	2.0	43.8	1866
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	28.2	15.6	7.0	2.2	47.1	1629
Très mauvaise à moyenne	53.2	14.1	8.5	1.6	22.6	307
Total	32.1	15.4	7.2	2.1	43.2	1936
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	28.4	16.2	6.2	2.5	46.7	891
Dans le passé	38.6	16.5	6.5	2.7	35.7	462
Modéré (< 20)	31.9	13.8	6.7	.8	46.8	405
Gros fumeur	33.6	10.1	9.9	2.9	43.6	194
Total	32.1	15.2	6.8	2.2	43.8	1952

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DELAI DEPUIS LE DERNIER CONTRÔLE DU TAUX CHOLESTEROL					Total N
	< 1 an	1-2 ans	2-5 ans	> 5 ans	jamais	
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	32.7	9.4	6.9	2.5	48.5	760
Femme	31.6	13.9	8.2	3.0	43.2	811
Total	32.2	11.7	7.6	2.7	45.8	1571
GROUPES AGE						
20-24	14.3	2.7	5.2	.0	77.7	138
25-34	19.2	7.7	7.9	3.2	61.9	402
35-44	25.8	14.3	10.0	3.3	46.6	414
45-54	48.9	17.7	5.9	2.6	24.9	340
55-64	57.0	13.8	7.5	3.1	18.6	277
Total	32.2	11.7	7.6	2.7	45.8	1571
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	13.1	7.3	2.7	.0	76.9	78
Primaire	35.4	8.2	6.1	.0	50.4	152
Secondaire inférieur	32.3	11.2	7.6	2.2	46.7	204
Secondaire supérieur	30.4	13.0	7.7	3.4	45.5	371
Supérieur	34.3	13.0	9.0	3.6	40.2	697
Total	32.0	12.0	7.8	2.8	45.4	1502
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	17.0	8.0	9.0	1.2	64.8	192
20.000-30.000	32.3	8.6	4.7	1.6	52.9	278
30.000-40.000	35.5	12.2	6.9	1.5	43.8	274
40.000-60.000	32.1	14.4	9.4	3.7	40.4	464
>60.000	41.3	13.6	7.5	3.9	33.6	298
Total	32.3	11.8	7.6	2.6	45.7	1506
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	27.5	11.9	8.8	2.9	49.0	1166
Très mauvaise à moyenne	46.9	11.4	4.3	1.4	36.0	345
Total	31.8	11.8	7.8	2.6	46.1	1511
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	29.8	11.0	8.5	2.5	48.2	635
Dans le passé	40.5	14.5	6.9	3.1	35.1	338
Modéré (< 20)	30.1	10.2	6.9	2.7	50.0	318
Gros fumeur	29.5	12.0	7.8	3.1	47.6	227
Total	32.0	11.7	7.7	2.7	45.8	1518

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DELAI DEPUIS LE DERNIER CONTRÔLE DU TAUX CHOLESTEROL					Total N
	< 1 an	1-2 ans	2-5 ans	> 5 ans	jamais	
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	31.3	13.2	8.9	3.6	43.0	959
Femme	39.5	13.7	10.9	3.3	32.6	983
Total	35.3	13.4	9.9	3.4	37.9	1942
GROUPES AGE						
20-24	24.5	12.0	5.6	1.2	56.7	177
25-34	27.6	10.3	5.9	2.2	54.0	479
35-44	30.2	15.3	11.8	4.2	38.4	540
45-54	43.8	15.8	12.2	4.9	23.3	409
55-64	55.5	12.5	13.0	3.6	15.4	337
Total	35.3	13.4	9.9	3.4	37.9	1942
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	33.7	15.3	3.4	4.4	43.3	48
Primaire	39.0	7.8	8.2	1.1	43.8	199
Secondaire inférieur	34.4	13.2	7.4	3.7	41.3	328
Secondaire supérieur	38.0	13.4	9.0	2.8	36.8	625
Supérieur	33.6	14.7	12.4	4.3	35.0	672
Total	35.7	13.4	9.8	3.4	37.7	1872
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	26.2	13.5	6.4	2.6	51.2	144
20.000-30.000	33.9	8.9	8.9	2.2	46.0	387
30.000-40.000	41.4	16.1	10.9	1.7	30.0	451
40.000-60.000	34.9	15.1	10.1	5.1	34.8	698
>60.000	33.9	11.1	11.3	2.6	41.0	211
Total	35.5	13.5	9.9	3.2	37.9	1891
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	29.7	13.4	10.7	3.8	42.4	1406
Très mauvaise à moyenne	53.8	13.3	6.2	2.3	24.5	449
Total	35.4	13.4	9.6	3.4	38.2	1855
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	31.0	13.9	9.5	3.3	42.3	807
Dans le passé	45.1	14.0	11.3	3.1	26.5	430
Modéré (< 20)	34.2	12.2	11.2	3.3	39.1	405
Gros fumeur	33.3	12.4	7.4	4.1	42.7	267
Total	35.2	13.4	9.9	3.4	38.1	1909

Personnes âgées de 15 ans et plus

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERSONNES AYANT EU AU MOINS UNE FOIS UN TAUX DE CHOLESTEROL TROP ELEVE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	37.2	62.8	1533
Femme	27.2	72.8	1711
Total	32.1	67.9	3244
GROUPES AGE			
20-24	21.1	78.9	139
25-34	24.2	75.8	565
35-44	30.6	69.4	825
45-54	34.2	65.8	882
55-64	40.3	59.7	833
Total	32.1	67.9	3244
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	36.6	63.4	62
Primaire	45.2	54.8	303
Secondaire inférieur	32.4	67.6	545
Secondaire supérieur	29.6	70.4	988
Supérieur	31.2	68.8	1227
Total	32.2	67.8	3125
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	32.5	67.5	175
20.000-30.000	29.2	70.8	517
30.000-40.000	34.9	65.1	746
40.000-60.000	32.6	67.4	1136
>60.000	31.4	68.6	535
Total	32.4	67.6	3109
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	29.2	70.8	2336
Très mauvaise à moyenne	40.2	59.8	799
Total	31.9	68.1	3135
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	31.3	68.7	1314
Dans le passé	35.3	64.7	851
Modéré (< 20)	26.4	73.6	626
Gros fumeur	35.9	64.1	378
Total	32.0	68.0	3169
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	32.6	67.4	1128
Région Bruxelloise	28.8	71.2	884
Région Wallonne	32.0	68.0	1232
Belgique	32.1	67.9	3244

Personnes testées âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERSONNES AYANT EU AU MOINS UNE FOIS UN TAUX DE CHOLESTEROL TROP ELEVE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	38.3	61.7	556
Femme	26.7	73.3	572
Total	32.6	67.4	1128
GROUPE AGE			
20-24	22.0	78.0	36
25-34	22.9	77.1	188
35-44	31.4	68.6	276
45-54	35.3	64.7	311
55-64	39.6	60.4	317
Total	32.6	67.4	1128
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	39.0	61.0	19
Primaire	47.7	52.3	99
Secondaire inférieur	32.8	67.2	220
Secondaire supérieur	29.8	70.2	375
Supérieur	32.0	68.0	372
Total	32.8	67.2	1085
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	51.4	48.6	26
20.000-30.000	29.1	70.9	164
30.000-40.000	38.3	61.7	264
40.000-60.000	31.7	68.3	412
>60.000	31.0	69.0	194
Total	32.9	67.1	1060
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	29.4	70.6	873
Très mauvaise à moyenne	42.9	57.1	238
Total	32.3	67.7	1111
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	31.6	68.4	478
Dans le passé	34.3	65.7	312
Modéré (< 20)	28.9	71.1	215
Gros fumeur	37.5	62.5	107
Total	32.5	67.5	1112

Personnes testées âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERSONNES AYANT EU AU MOINS UNE FOIS UN TAUX DE CHOLESTEROL TROP ELEVE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	28.8	71.2	407
Femme	28.8	71.2	477
Total	28.8	71.2	884
GROUPE AGE			
20-24	23.5	76.5	29
25-34	25.7	74.3	157
35-44	26.4	73.6	221
45-54	29.9	70.1	255
55-64	33.9	66.1	222
Total	28.8	71.2	884
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	40.3	59.7	17
Primaire	29.7	70.3	77
Secondaire inférieur	39.0	61.0	116
Secondaire supérieur	25.0	75.0	215
Supérieur	28.3	71.7	421
Total	29.3	70.7	846
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	25.7	74.3	79
20.000-30.000	29.2	70.8	130
30.000-40.000	29.5	70.5	163
40.000-60.000	28.6	71.4	271
>60.000	29.6	70.4	203
Total	28.8	71.2	846
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	27.8	72.2	625
Très mauvaise à moyenne	32.7	67.3	221
Total	29.1	70.9	846
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	22.9	77.1	334
Dans le passé	36.8	63.2	232
Modéré (< 20)	25.9	74.1	169
Gros fumeur	37.2	62.8	116
Total	28.9	71.1	851

Personnes testées âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE : CHOLESTEROL (INDICATEUR : SC06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERSONNES AYANT EU AU MOINS UNE FOIS UN TAUX DE CHOLESTEROL TROP ELEVE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	37.3	62.7	570
Femme	27.4	72.6	662
Total	32.0	68.0	1232
GROUPE AGE			
20-24	19.9	80.1	74
25-34	25.7	74.3	220
35-44	30.3	69.7	328
45-54	33.6	66.4	316
55-64	44.0	56.0	294
Total	32.0	68.0	1232
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	33.4	66.6	26
Primaire	45.4	54.6	127
Secondaire inférieur	30.3	69.7	209
Secondaire supérieur	30.0	70.0	398
Supérieur	31.2	68.8	434
Total	31.9	68.1	1194
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	24.9	75.1	70
20.000-30.000	29.4	70.6	223
30.000-40.000	31.4	68.6	319
40.000-60.000	35.1	64.9	453
>60.000	34.0	66.0	138
Total	32.4	67.6	1203
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	29.3	70.7	838
Très mauvaise à moyenne	38.5	61.5	340
Total	32.0	68.0	1178
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	33.1	66.9	502
Dans le passé	36.6	63.4	307
Modéré (< 20)	22.9	77.1	242
Gros fumeur	33.3	66.7	155
Total	32.0	68.0	1206

Personnes testées âgées de 15 ans et plus