

## 5.1. SANTE SUBJECTIVE

### 5.1.1. Introduction

Pour l'évaluation des progrès en matière de santé, et pour une meilleure compréhension de la façon dont la population elle-même juge ces progrès, il est fondamental de mesurer la perception de la santé (subjective) de la population. Qui en effet est mieux placé que l'individu lui-même pour juger son propre état de santé?

Il a été clairement démontré que la perception subjective de l'état de santé reflète assez bien l'impact de certaines plaintes et maladies dont souffre éventuellement la personne interrogée (1). La santé subjective:

- a une relation étroite avec les chances de survie (3-5)
- constitue un prédicteur de la morbidité, du statut fonctionnel, de l'invalidité et de la consommation de soins (2).

Il s'agit d'une mesure fondamentale dans le cadre de l'évaluation de l'état de santé et de la qualité de vie d'une population (6). D'autre part, puisqu'il s'agit bien d'une évaluation subjective, cela permet dans une certaine mesure de procéder à un ajustement des diversités culturelles et de comparer au niveau international l'état de santé de populations très différentes.

A côté de la santé actuelle, les changements qui sont intervenus au cours de la dernière année ("Reported Health Transition") ont également été mesurés. Des études longitudinales ont permis de montrer que cette question était étroitement corrélée avec l'évolution réelle de l'état de santé physique et/ou mentale au cours de la période de référence (1).

La santé subjective est un des principaux indicateurs du monitoring de la santé et de la qualité de la vie, indicateur repris dans l'objectif 2 de la stratégie de l'OMS (2). La question n'a été posée ici qu'aux personnes âgées de 15 ans ou plus.

Les commentaires à propos des résultats tiennent compte, sauf mention particulière, des différences observées après standardisation pour le sexe et l'âge.

Outre les analyses classiques, bivariées et multivariées, que l'on peut faire dans le cadre de cette enquête, la question sur la santé subjective pourra également être couplée avec les tables de

mortalité pour construire l'indicateur "espérance de vie en santé".

### 5.1.2. Belgique.

#### 5.1.2.1. Perception subjective de la santé (PE01\_1)

En Belgique, 78% de la population de 15 ans et plus évalue leur propre état de santé comme bon à très bon et 22% des personnes interrogées estiment que leur état de santé n'est pas satisfaisant (moyen, mauvais ou très mauvais).

25% des femmes estiment que leur état de santé n'est pas satisfaisant contre 18% seulement des hommes. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.1.2.1).

Le pourcentage de personnes estimant que leur état de santé n'est pas satisfaisant évolue avec l'âge: 10% avant 35 ans et ensuite augmentation régulière pour arriver à 55% chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Les pourcentages sont plus élevés chez les femmes par rapport aux hommes pour toutes les tranches d'âge (Figure 5.1.2.1)

#### Différences en fonction des caractéristiques individuelles (Tableau 5.1.2.1)


Le pourcentage de personnes estimant que leur état de santé n'est pas satisfaisant semble plus élevé au sein du groupe des anciens fumeurs (24%) et chez les gros fumeurs (27%). Après standardisation pour le sexe et l'âge, on constate que seule la différence entre les gros fumeurs et les non-fumeurs est significative.

Le niveau d'instruction a une relation directe avec la santé subjective: entre 30 et 40% des personnes sans diplôme, avec un certificat d'étude primaire ou secondaire inférieure, déclarent être en mauvaise santé. Cette proportion baisse régulièrement: 18% pour ceux qui ont atteint le niveau secondaire supérieur et 13% pour ceux qui ont suivi des études supérieures. Cette relation persiste après standardisation pour l'âge et le sexe.

On observe la même tendance lorsque l'on étudie la relation entre le revenu équivalent du ménage et la santé subjective. 30% environ des gens à faible revenu se plaignent d'une mauvaise santé,

contre 17% seulement pour ceux qui gagnent entre 40 et 60.000 FB et 9% pour ceux qui gagnent plus de 60.000 FB. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

**Figure 5.1.2.1** Proportion de personnes déclarant avoir une mauvaise santé subjective (PE01\_1), par âge et par sexe, Enquête de santé, Belgique, 1997.



**Tableau 5.1.2.1** Proportion de personnes déclarant avoir une mauvaise santé subjective (PE01\_1), standardisé par âge et par sexe, Enquête de santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION (%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	21,4	(19,6-23,3)
	Femme	26,8	(24,8-28,8)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	39,0	(31,7-46,3)
	École primaire	34,8	(30,3-39,2)
	Secondaire inférieur	30,8	(27,5-34,1)
	Secondaire supérieur	21,7	(19,1-24,3)
	Supérieur	17,3	(14,8-19,9)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	33,1	(28,0-38,3)
	20.000-30.000	32,5	(29,3-35,8)
	30.000-40.000	26,9	(24,2-29,7)
	40.000-60.000	21,3	(18,8-23,8)
	>60.000	11,5	( 8,5-14,5)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	20,8	(18,8-22,9)
	Dans le passé	23,2	(20,2-26,2)
	Modéré (<20)	25,9	(22,5-29,2)
	Gros fumeur	33,0	(27,1-38,9)
REGION DE RESIDENCE	Région flamande	21,1	(19,2-22,9)
	Région bruxelloise	26,8	(24,3-29,3)
	Région wallonne	29,1	(26,8-31,4)
	Belgique	24,1	(22,8-25,5)

*Tableau 5.1.2.2 Distribution de la santé subjective (PE01\_1), par province de résidence, Enquête de santé, Belgique, 1997.*

PROVINCE DE RESIDENCE	SANTÉ SUBJECTIVE		Total
	Bonne à très bonne	Très mauvaise à moyenne	N
	%	%	
Anvers	82,9	17,1	755
Brabant Flamand	78,2	21,8	490
Flandre Occidentale	84,2	15,8	595
Flandre Orientale	82,7	17,3	641
Limbourg	78,3	21,7	368
Bruxelles	74,8	25,2	2312
Brabant Wallon	81,6	18,4	272
Hainaut	67,0	33,0	1004
Liège	75,8	24,2	933
Luxembourg	80,8	19,2	223
Namur	78,3	21,7	360
Belgique	78,3	21,7	7953

La santé subjective varie sensiblement d'une région à l'autre: 18% des résidants en Flandre estiment que leur état de santé n'est pas satisfaisant contre 25% à Bruxelles et 27% en Wallonie.

Les différences entre la Flandre d'une part, Bruxelles et la Wallonie d'autre part, persiste après standardisation pour l'âge et le sexe mais aussi lorsque l'on contrôle en outre d'autres paramètres tels que le niveau d'éducation, le revenu équivalent du ménage et la consommation de tabac par le biais d'une régression logistique.

**5.1.2.2. Évolution de l'état de santé ( PE02\_1)**

En Belgique, 15% de la population trouvent que leur santé s'est améliorée au cours de la dernière année, 74% qu'elle est pareille et 11% qu'elle s'est détériorée.

Les femmes estiment plus souvent que leur santé est moins bonne par rapport à l'année précédente: 13% au lieu de 9% chez les hommes. Cette différence ne persiste pas après standardisation par âge (Tableau 5.1.2.2).

L'aggravation de l'état de santé au cours de la dernière année est plus marquée à partir de 65 ans (17%) et au delà (31% chez les personnes âgées de 75 ans et plus) (Figure 5.1.2.2).


**Différences en fonction des caractéristiques individuelles (Tableau 5.1.2.3)**

Les gros fumeurs déclarent plus souvent avoir observé une dégradation de leur état de santé au cours de la dernière année que les non fumeurs. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

On n'observe pas de relation très nette entre le niveau d'instruction, ou les revenus, et l'évolution de l'état de santé au cours de la dernière année.

Le pourcentage de personnes qui déclarent que leur état de santé s'est détérioré au cours de la dernière année ne diffère pas de manière significative en Flandre (10%) par rapport aux deux autres régions (14% à Bruxelles et 12% en Wallonie).

*Figure 5.1.2.2 Proportion de personnes déclarant avoir constaté une aggravation de leur santé au cours de la dernière année (PE02\_1), par âge et par sexe, Enquête de santé, Belgique, 1997.*



**Tableau 5.1.2.3** Proportion de personnes déclarant avoir constaté une aggravation de leur santé au cours de la dernière année (PE02\_1), standardisation par âge et par sexe, Enquête de santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION (%)	I.C. 95%
SEXE	Homme	10,4	( 9,0-11,9)
	Femme	13,3	(11,7-14,9)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	12,9	( 7,7-18,2)
	École primaire	15,2	(11,8-18,6)
	Secondaire inférieur	13,7	(11,1-16,3)
	Secondaire supérieur	10,2	( 8,3-12,1)
	Supérieur	10,4	( 8,4-12,4)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	17,6	(13,2-22,0)
	20.000-30.000	14,1	(11,6-16,5)
	30.000-40.000	13,3	(11,2-15,5)
	40.000-60.000	9,4	( 7,6-11,2)
	>60.000	10,8	( 7,8-13,8)
SANTE SUBJECTIVE	Bonne à très bonne	5,3	( 4,4- 6,2)
	Très mauvaise à moyenne	32,1	(28,7-35,5)
CONSOMMATION DE TABAC	Jamais	9,6	( 8,1-11,1)
	Dans le passé	13,5	(10,8-16,2)
	Modéré (<20)	12,6	( 9,9-15,3)
	Gros fumeur	15,8	(11,3-20,3)
REGION DE RESIDENCE	Région flamande	10,6	( 9,2-12,1)
	Région bruxelloise	14,7	(12,6-16,8)
	Région wallonne	13,2	(11,3-15,0)
	Belgique	11,9	(10,8-12,9)

**Tableau 5.1.2.4** Proportion de personnes déclarant avoir constaté une aggravation de leur santé au cours de la dernière année (PE02\_1), par province de résidence, Enquête de santé, Belgique, 1997.

PROVINCE DE RESIDENCE	EVOLUTION DE LA SANTE			Total
	Plutôt à bien meilleure	Plutôt pareille	Plutôt à beaucoup moins bonne	N
	%	%	%	
Anvers	16,9	74,5	8,6	752
Brabant Flamand	10,9	78,9	10,2	488
Flandre Occidentale	13,7	79,2	7,1	594
Flandre Orientale	16,1	73,0	10,8	641
Limbourg	13,7	74,3	12,0	369
Bruxelles	16,0	70,4	13,6	2307
Brabant Wallon	13,3	77,7	9,0	270
Hainaut	15,2	69,5	15,3	1004
Liège	18,2	72,1	9,7	931
Luxembourg	9,8	74,1	16,1	222
Namur	15,6	75,5	8,9	360
Belgique	15,2	74,0	10,8	7938

## Bibliographie

1. Ware Jr, J.E. SF-36 Health Survey: manual and interpretation guide. Boston. The Health Institute, New England Medical Center, 1993;

2. de Bruin, A., Picavet, H., Nossikov, A. Health interview surveys. Towards international harmonization of methods. Copenhagen. WHO-Europe, CBS-Netherlands, 1996; 1-161.

3. Idler E.L., Kasl S.V., Lemke J.H. - Self-evaluated health and mortality among the elderly in New Haven, Connecticut, and Iowa and Washington counties, Iowa, 1982-1986. Am J Epidemiol 1990; 131: 91-103.

4. Idler E.L., Angel R.J. - Self-rated health and mortality in the NHANES-I Epidemiologic Follow-up Study. Am J Public Health 1990; 80: 446-452.

5. McCallum J., Shadbolt B., Wang D. - Self-rated health and survival: A 7-year follow-up study of Australian elderly. Am J Public Health 1994; 84: 1100-1105.

6. Factors associated with self-perceived excellent and very good health among blacks -Kansas, 1995. MMWR 1996; 45: 906-911.

## PERCEPTION SUBJECTIVE DE LA SANTE (INDICATEUR : PE01\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

SEXE	SANTE SUBJECTIVE		Total
	Bonne à très bonne	Très mauvaise à moyenne	N
	%	%	
Homme	81,6	18,4	3840
Femme	74,9	25,1	4113
Total	78,3	21,7	7953
GROUPES AGE			
15-24	91,1	8,9	1060
25-34	90,0	10,0	1533
35-44	79,6	20,4	1514
45-54	77,0	23,0	1234
55-64	67,5	32,5	1021
65-74	56,3	43,7	993
75 +	45,3	54,7	598
Total	78,3	21,7	7953
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	58,3	41,7	256
Primaire	61,1	38,9	1113
Secondaire inférieur	69,2	30,8	1342
Secondaire supérieur	81,8	18,2	2274
Supérieur	86,5	13,5	2643
Total	78,1	21,9	7628
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	70,0	30,0	550
20.000-30.000	68,9	31,1	1564
30.000-40.000	73,4	26,6	1856
40.000-60.000	82,8	17,2	2541
>60.000	90,7	9,3	1070
Total	78,2	21,8	7581
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	80,6	19,4	3580
Dans le passé	76,2	23,8	1860
Modéré (< 20)	79,1	20,9	1515
Gros fumeur	73,4	26,6	807
Total	78,6	21,4	7762
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	81,7	18,3	2849
Région Bruxelloise	74,8	25,2	2312
Région Wallonne	73,0	27,0	2792
Belgique	78,3	21,7	7953
-----			
Personnes âgées de 15 ans ou plus			

REGIO: 1 Région Flamande

PERCEPTION SUBJECTIVE DE LA SANTE (INDICATEUR : PE01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	SANTE SUBJECTIVE		Total
	Bonne à très bonne	Très mauvaise à moyenne	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	84,5	15,5	1412
Femme	78,9	21,1	1437
Total	81,7	18,3	2849
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	93,2	6,8	403
25-34	92,0	8,0	566
35-44	81,9	18,1	517
45-54	81,9	18,1	458
55-64	71,8	28,2	387
65-74	61,8	38,2	343
75 +	45,9	54,1	175
Total	81,7	18,3	2849
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	68,1	31,9	53
Primaire	66,8	33,2	379
Secondaire inférieur	72,9	27,1	520
Secondaire supérieur	84,5	15,5	941
Supérieur	89,1	10,9	849
Total	81,6	18,4	2742
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	66,1	33,9	91
20.000-30.000	70,8	29,2	507
30.000-40.000	76,3	23,7	695
40.000-60.000	86,9	13,1	1008
>60.000	92,9	7,1	385
Total	81,7	18,3	2686
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	84,1	15,9	1345
Dans le passé	79,1	20,9	690
Modéré (< 20)	83,1	16,9	546
Gros fumeur	76,1	23,9	230
Total	82,0	18,0	2811

Personnes âgées de 15 ans ou plus



REGIO: 2 Région Bruxelloise

PERCEPTION SUBJECTIVE DE LA SANTE (INDICATEUR : PE01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	SANTE SUBJECTIVE		Total
	Bonne à très bonne	Très mauvaise à moyenne	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	77,2	22,8	1107
Femme	72,6	27,4	1205
Total	74,8	25,2	2312
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	87,2	12,8	281
25-34	85,8	14,2	452
35-44	78,6	21,4	443
45-54	70,6	29,4	358
55-64	63,9	36,1	284
65-74	51,7	48,3	294
75 +	59,1	40,9	200
Total	74,8	25,2	2312
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	61,7	38,3	110
Primaire	49,5	50,5	296
Secondaire inférieur	67,6	32,4	326
Secondaire supérieur	79,5	20,5	534
Supérieur	85,1	14,9	926
Total	75,3	24,7	2192
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	79,0	21,0	242
20.000-30.000	61,2	38,8	451
30.000-40.000	68,6	31,4	475
40.000-60.000	82,3	17,7	621
>60.000	85,6	14,4	409
Total	74,9	25,1	2198
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	77,5	22,5	962
Dans le passé	73,9	26,1	546
Modéré (< 20)	75,7	24,3	442
Gros fumeur	67,7	32,3	270
Total	75,1	24,9	2220

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

PERCEPTION SUBJECTIVE DE LA SANTE (INDICATEUR : PE01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	SANTE SUBJECTIVE		Total
	Bonne à très bonne	Très mauvaise à moyenne	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	77,5	22,5	1321
Femme	68,6	31,4	1471
Total	73,0	27,0	2792
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	88,6	11,4	376
25-34	87,5	12,5	515
35-44	75,6	24,4	554
45-54	69,4	30,6	418
55-64	59,1	40,9	350
65-74	49,5	50,5	356
75 +	38,1	61,9	223
Total	73,0	27,0	2792
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	48,4	51,6	93
Primaire	55,2	44,8	438
Secondaire inférieur	62,6	37,4	496
Secondaire supérieur	76,5	23,5	799
Supérieur	82,8	17,2	868
Total	72,7	27,3	2694
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	68,4	31,6	217
20.000-30.000	68,3	31,7	606
30.000-40.000	69,9	30,1	686
40.000-60.000	75,1	24,9	912
>60.000	87,7	12,3	276
Total	73,0	27,0	2697
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	74,9	25,1	1273
Dans le passé	71,2	28,8	624
Modéré (< 20)	73,1	26,9	527
Gros fumeur	71,2	28,8	307
Total	73,3	26,7	2731

Personnes âgées de 15 ans ou plus

EVOLUTION ETAT DE SANTE DEPUIS 1 AN(INDICATEUR : PE02\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	EVOLUTION DE LA SANTE			Total
	Plutôt à bien meilleure	Plutôt pareille	Plutôt à beaucoup moins bonne	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	14,7	76,2	9,1	3833
Femme	15,6	71,8	12,6	4105
Total	15,2	74,0	10,8	7938
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	18,7	71,9	9,4	1057
25-34	14,9	77,9	7,2	1533
35-44	16,5	74,3	9,2	1512
45-54	15,1	74,1	10,8	1230
55-64	14,0	75,5	10,5	1017
65-74	12,1	71,2	16,8	991
75 +	6,7	62,4	30,9	598
Total	15,2	74,0	10,8	7938
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	8,3	79,1	12,6	253
Primaire	12,4	70,0	17,5	1106
Secondaire inférieur	15,7	71,0	13,2	1338
Secondaire supérieur	14,8	76,0	9,1	2271
Supérieur	16,3	74,8	8,9	2643
Total	15,0	74,1	10,8	7611
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	13,1	69,9	17,0	547
20.000-30.000	18,3	68,8	13,0	1556
30.000-40.000	13,2	73,6	13,2	1852
40.000-60.000	15,0	76,6	8,4	2541
>60.000	14,9	76,1	9,0	1070
Total	15,1	73,9	11,0	7566
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	15,7	79,3	5,1	5911
Très mauvaise à moyenne	13,3	54,9	31,8	2021
Total	15,2	74,0	10,8	7932
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	13,8	76,7	9,6	3574
Dans le passé	15,9	71,9	12,2	1857
Modéré (< 20)	16,2	73,1	10,6	1511
Gros fumeur	17,5	68,9	13,6	805
Total	15,2	74,0	10,8	7747
<b>REGION DE RESIDENCE</b>				
Région Flamande	14,7	75,7	9,5	2844
Région Bruxelloise	16,0	70,4	13,6	2307
Région Wallonne	15,7	71,9	12,4	2787
Belgique	15,2	74,0	10,8	7938

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

EVOLUTION ETAT DE SANTE DEPUIS 1 AN(INDICATEUR : PE02\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	EVOLUTION DE LA SANTE			Total
	Plutôt à bien meilleure	Plutôt pareille	Plutôt à beaucoup moins bonne	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	15,1	77,4	7,5	1408
Femme	14,3	74,0	11,6	1436
<b>Total</b>	<b>14,7</b>	<b>75,7</b>	<b>9,5</b>	<b>2844</b>
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	15,8	73,8	10,4	403
25-34	13,5	80,4	6,1	565
35-44	17,1	74,3	8,6	517
45-54	16,3	75,1	8,5	457
55-64	14,3	76,7	9,0	386
65-74	11,1	75,0	13,9	341
75 +	4,6	65,7	29,7	175
<b>Total</b>	<b>14,7</b>	<b>75,7</b>	<b>9,5</b>	<b>2844</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	6,8	79,0	14,2	52
Primaire	11,4	75,4	13,2	378
Secondaire inférieur	14,4	72,3	13,3	517
Secondaire supérieur	14,5	77,6	7,9	939
Supérieur	16,1	76,3	7,7	850
<b>Total</b>	<b>14,5</b>	<b>76,0</b>	<b>9,5</b>	<b>2736</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	10,8	74,0	15,2	91
20.000-30.000	18,5	68,7	12,8	505
30.000-40.000	11,2	76,9	11,9	693
40.000-60.000	15,2	77,5	7,3	1007
>60.000	14,4	77,3	8,3	385
<b>Total</b>	<b>14,7</b>	<b>75,5</b>	<b>9,8</b>	<b>2681</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	14,5	81,0	4,4	2274
Très mauvaise à moyenne	15,5	52,1	32,5	568
<b>Total</b>	<b>14,7</b>	<b>75,7</b>	<b>9,6</b>	<b>2842</b>
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	12,8	78,8	8,4	1343
Dans le passé	15,2	73,8	11,0	688
Modéré (< 20)	16,0	74,7	9,3	546
Gros fumeur	20,5	67,9	11,5	229
<b>Total</b>	<b>14,7</b>	<b>75,8</b>	<b>9,5</b>	<b>2806</b>

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

EVOLUTION ETAT DE SANTE DEPUIS 1 AN(INDICATEUR : PE02\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	EVOLUTION DE LA SANTE			Total
	Plutôt à bien meilleure	Plutôt pareille	Plutôt à beaucoup moins bonne	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	15,5	72,0	12,5	1106
Femme	16,5	69,0	14,5	1201
Total	16,0	70,4	13,6	2307
<b>GROUPE AGE</b>				
15-24	28,0	64,1	7,9	280
25-34	17,2	74,7	8,1	453
35-44	15,6	74,8	9,6	441
45-54	13,6	71,9	14,5	356
55-64	13,3	69,7	17,0	283
65-74	9,6	67,2	23,1	294
75 +	5,4	60,8	33,9	200
Total	16,0	70,4	13,6	2307
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	20,7	61,0	18,3	109
Primaire	15,9	58,0	26,1	294
Secondaire inférieur	19,4	61,0	19,6	326
Secondaire supérieur	14,8	74,5	10,7	533
Supérieur	14,7	76,7	8,6	924
Total	15,9	70,7	13,4	2186
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	15,2	76,9	7,9	241
20.000-30.000	17,9	61,6	20,5	449
30.000-40.000	20,5	62,8	16,7	473
40.000-60.000	14,4	75,0	10,5	622
>60.000	12,6	80,3	7,2	408
Total	16,2	70,8	13,1	2193
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	18,3	76,1	5,6	1683
Très mauvaise à moyenne	9,3	53,3	37,4	621
Total	16,0	70,4	13,6	2304
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	15,6	72,5	11,9	959
Dans le passé	14,7	68,1	17,1	546
Modéré (< 20)	21,6	66,0	12,5	441
Gros fumeur	13,2	69,8	17,0	270
Total	16,4	69,8	13,8	2216
Personnes âgées de 15 ans ou plus				

REGIO: 3 Région Wallonne

EVOLUTION ETAT DE SANTE DEPUIS 1 AN(INDICATEUR : PE02\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	EVOLUTION DE LA SANTE			Total
	Plutôt à bien meilleure	Plutôt pareille	Plutôt à beaucoup moins bonne	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	13,9	75,1	11,0	1319
Femme	17,5	68,8	13,7	1468
Total	15,7	71,9	12,4	2787
<b>GROUPE AGE</b>				
15-24	21,0	70,9	8,1	374
25-34	16,8	74,0	9,2	515
35-44	15,7	74,1	10,2	554
45-54	13,0	72,8	14,2	417
55-64	13,6	74,9	11,6	348
65-74	14,3	66,7	19,1	356
75 +	10,3	58,4	31,3	223
Total	15,7	71,9	12,4	2787
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	2,7	89,1	8,2	92
Primaire	13,2	64,5	22,3	434
Secondaire inférieur	17,4	71,0	11,6	495
Secondaire supérieur	15,5	73,1	11,4	799
Supérieur	17,2	71,8	11,0	869
Total	15,7	71,8	12,5	2689
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	13,6	63,8	22,5	215
20.000-30.000	17,9	71,4	10,7	602
30.000-40.000	14,6	71,0	14,4	686
40.000-60.000	14,8	75,2	10,0	912
>60.000	17,7	70,0	12,3	277
Total	15,6	71,9	12,5	2692
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	17,1	76,7	6,1	1954
Très mauvaise à moyenne	11,8	58,9	29,3	832
Total	15,7	71,9	12,4	2786
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	15,1	73,9	11,1	1272
Dans le passé	17,9	69,2	12,9	623
Modéré (< 20)	14,9	72,7	12,4	524
Gros fumeur	14,7	69,8	15,5	306
Total	15,6	72,1	12,3	2725
Personnes âgées de 15 ans ou plus				