

RISQUE DE MORT SUBITE DU NOURRISSON (INDICATEUR : MCH29\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ENVIRONNEMENT DU SOMMEIL DE BONNE QUALITE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE (NOUVEAU-NE)</b>			
Garçon	23,6	76,4	266
Fille	27,3	72,7	211
Total	25,2	74,8	477
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	28,8	71,2	35
25-34	26,1	73,9	371
35-44	21,6	78,4	113
Total	25,5	74,5	519
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	11,3	88,7	18
Primaire	36,3	63,7	15
Secondaire inférieur	27,2	72,8	53
Secondaire supérieur	17,6	82,4	187
Supérieur	32,9	67,1	224
Total	25,8	74,2	497
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	12,9	87,1	45
20.000-30.000	24,1	75,9	103
30.000-40.000	21,6	78,4	110
40.000-60.000	26,5	73,5	191
>60.000	33,7	66,3	55
Total	25,0	75,0	504
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	26,2	73,8	428
Très mauvaise à moyenne	24,9	75,1	70
Total	26,0	74,0	498
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	29,8	70,2	270
Dans le passé	23,4	76,6	97
Modéré (< 20)	19,3	80,7	98
Gros fumeur	10,3	89,7	40
Total	25,3	74,7	505
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	26,7	73,3	185
Région Bruxelloise	24,8	75,2	150
Région Wallonne	23,4	76,6	184
Belgique	25,5	74,5	519
-----			
Enfants âgés de moins de 5 ans			
Suivant les caractéristiques de la mère (sauf sexe nouveau-né)			

REGIO: 1 Région Flamande

RISQUE DE MORT SUBITE DU NOURRISSON (INDICATEUR : MCH29\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ENVIRONNEMENT DU SOMMEIL DE BONNE QUALITE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE (NOUVEAU-NE)</b>			
Garçon	21,4	78,6	99
Fille	32,1	67,9	70
Total	25,9	74,1	169
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	,0	100,0	4
25-34	28,7	71,3	145
35-44	21,1	78,9	36
Total	26,7	73,3	185
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	,0	100,0	1
Primaire	32,8	67,2	3
Secondaire inférieur	39,0	61,0	16
Secondaire supérieur	17,8	82,2	70
Supérieur	32,6	67,4	90
Total	27,1	72,9	180
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	,0	100,0	1
20.000-30.000	20,0	80,0	17
30.000-40.000	21,7	78,3	38
40.000-60.000	26,3	73,7	94
>60.000	35,3	64,7	26
Total	26,0	74,0	176
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	26,8	73,2	161
Très mauvaise à moyenne	33,2	66,8	19
Total	27,5	72,5	180
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	30,9	69,1	111
Dans le passé	22,9	77,1	40
Modéré (< 20)	20,0	80,0	20
Gros fumeur	5,3	94,7	12
Total	26,5	73,5	183
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	26,7	73,3	185
Belgique	26,7	73,3	185

Enfants âgés de moins de 5 ans

Suivant les caractéristiques de la mère (sauf sexe nouveau-né)

REGIO: 2 Région Bruxelloise

RISQUE DE MORT SUBITE DU NOURRISSON (INDICATEUR : MCH29\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ENVIRONNEMENT DU SOMMEIL DE BONNE QUALITE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE (NOUVEAU-NE)</b>			
Garçon	20,1	79,9	73
Fille	30,6	69,4	63
Total	25,6	74,4	136
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	38,9	61,1	13
25-34	26,8	73,2	92
35-44	13,8	86,2	45
Total	24,8	75,2	150
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	24,7	75,3	14
Primaire	28,4	71,6	9
Secondaire inférieur	25,0	75,0	16
Secondaire supérieur	15,6	84,4	43
Supérieur	35,9	64,1	61
Total	26,6	73,4	143
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	10,4	89,6	25
20.000-30.000	21,6	78,4	37
30.000-40.000	35,2	64,8	29
40.000-60.000	26,9	73,1	37
>60.000	35,8	64,2	20
Total	25,1	74,9	148
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	27,0	73,0	115
Très mauvaise à moyenne	15,9	84,1	25
Total	25,1	74,9	140
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	27,1	72,9	79
Dans le passé	37,6	62,4	17
Modéré (< 20)	14,2	85,8	33
Gros fumeur	18,9	81,1	11
Total	24,9	75,1	140
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Bruxelloise	24,8	75,2	150
Belgique	24,8	75,2	150
-----			
Enfants âgés de moins de 5 ans			
Suivant les caractéristiques de la mère (sauf sexe nouveau-né)			

REGIO: 3 Région Wallonne

RISQUE DE MORT SUBITE DU NOURRISSON (INDICATEUR : MCH29\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ENVIRONNEMENT DU SOMMEIL DE BONNE QUALITE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE (NOUVEAU-NE)</b>			
Garçon	28,6	71,4	94
Fille	18,4	81,6	78
Total	23,9	76,1	172
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	36,9	63,1	18
25-34	20,3	79,7	134
35-44	26,2	73,8	32
Total	23,4	76,6	184
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	,0	100,0	3
Primaire	48,4	51,6	3
Secondaire inférieur	11,4	88,6	21
Secondaire supérieur	17,8	82,2	74
Supérieur	32,8	67,2	73
Total	23,2	76,8	174
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	15,7	84,3	19
20.000-30.000	27,5	72,5	49
30.000-40.000	18,3	81,7	43
40.000-60.000	27,0	73,0	60
>60.000	21,3	78,7	9
Total	23,2	76,8	180
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	24,8	75,2	152
Très mauvaise à moyenne	16,7	83,3	26
Total	23,6	76,4	178
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	27,8	72,2	80
Dans le passé	21,9	78,1	40
Modéré (< 20)	20,0	80,0	45
Gros fumeur	14,3	85,7	17
Total	23,3	76,7	182
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Wallonne	23,4	76,6	184
Belgique	23,4	76,6	184
-----			
Enfants âgés de moins de 5 ans			
Suivant les caractéristiques de la mère (sauf sexe nouveau-né)			

RISQUE DE MORT SUBITE DU NOURRISSON (INDICATEUR : MCH29\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	NOMBRE DE FACTEURS DE RISQUE				N
	Moyenne	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	
<b>SEXE (NOUVEAU-NE)</b>					
Garçon	4,6	3,0	5,0	6,0	265
Fille	4,4	3,0	4,0	5,0	210
Total	4,5	3,0	5,0	5,0	475
<b>GROUPES AGE</b>					
15-24	4,3	3,0	4,0	6,0	35
25-34	4,4	3,0	5,0	5,0	370
35-44	4,7	3,0	5,0	6,0	112
Total	4,5	3,0	5,0	5,0	517
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	5,5	4,0	6,0	7,0	18
Primaire	4,0	3,0	4,0	5,0	15
Secondaire inférieur	4,5	3,0	4,0	6,0	53
Secondaire supérieur	4,8	4,0	5,0	6,0	185
Supérieur	4,2	3,0	4,0	5,0	224
Total	4,5	3,0	5,0	5,0	495
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	5,0	4,0	5,0	6,0	45
20.000-30.000	4,6	3,0	4,0	5,0	103
30.000-40.000	4,7	4,0	5,0	6,0	109
40.000-60.000	4,4	3,0	5,0	5,0	190
>60.000	4,0	3,0	4,0	5,0	55
Total	4,5	3,0	5,0	5,0	502
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	4,4	3,0	5,0	5,0	426
Très mauvaise à moyenne	4,7	3,0	5,0	6,0	70
Total	4,5	3,0	5,0	5,0	496
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	4,1	3,0	4,0	5,0	269
Dans le passé	4,4	3,0	5,0	5,0	96
Modéré (< 20)	5,1	4,0	5,0	6,0	98
Gros fumeur	6,0	4,0	6,0	8,0	40
Total	4,5	3,0	5,0	5,0	503
<b>REGION DE RESIDENCE</b>					
Région Flamande	4,4	3,0	5,0	5,0	185
Région Bruxelloise	4,6	3,0	5,0	6,0	149
Région Wallonne	4,7	3,0	5,0	6,0	183
Belgique	4,5	3,0	5,0	5,0	517

Enfants âgés de moins de 5 ans

Suivant les caractéristiques de la mère (sauf sexe nouveau-né)

REGIO: 1 Région Flamande

RISQUE DE MORT SUBITE DU NOURRISSON (INDICATEUR : MCH29\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	NOMBRE DE FACTEURS DE RISQUE				N
	Moyenne	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	
<b>SEXE (NOUVEAU-NE)</b>					
Garçon	4,6	3,0	5,0	5,0	99
Fille	4,1	3,0	4,0	5,0	70
Total	4,4	3,0	5,0	5,0	169
<b>GROUPES AGE</b>					
15-24	4,6	3,0	5,0	6,0	4
25-34	4,3	3,0	4,0	5,0	145
35-44	4,7	4,0	5,0	6,0	36
Total	4,4	3,0	5,0	5,0	185
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	7,0	7,0	7,0	7,0	1
Primaire	4,3	3,0	5,0	5,0	3
Secondaire inférieur	4,1	3,0	4,0	5,0	16
Secondaire supérieur	4,7	4,0	5,0	5,0	70
Supérieur	4,1	3,0	4,0	5,0	90
Total	4,4	3,0	5,0	5,0	180
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	4,0	4,0	4,0	4,0	1
20.000-30.000	4,7	4,0	5,0	6,0	17
30.000-40.000	4,8	4,0	5,0	5,0	38
40.000-60.000	4,3	3,0	4,0	5,0	94
>60.000	3,9	3,0	4,0	5,0	26
Total	4,4	3,0	5,0	5,0	176
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	4,3	3,0	4,0	5,0	161
Très mauvaise à moyenne	4,6	3,0	5,0	6,0	19
Total	4,3	3,0	5,0	5,0	180
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	4,0	3,0	4,0	5,0	111
Dans le passé	4,4	3,0	5,0	5,0	40
Modéré (< 20)	4,9	4,0	5,0	7,0	20
Gros fumeur	6,8	5,0	7,0	9,0	12
Total	4,4	3,0	5,0	5,0	183
<b>REGION DE RESIDENCE</b>					
Région Flamande	4,4	3,0	5,0	5,0	185
Belgique	4,4	3,0	5,0	5,0	185

Enfants âgés de moins de 5 ans

Suivant les caractéristiques de la mère (sauf sexe nouveau-né)

REGIO: 2 Région Bruxelloise

RISQUE DE MORT SUBITE DU NOURRISSON (INDICATEUR : MCH29\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	NOMBRE DE FACTEURS DE RISQUE				N
	Moyenne	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	
<b>SEXE (NOUVEAU-NE)</b>					
Garçon	4,9	4,0	5,0	6,0	72
Fille	4,2	3,0	4,0	5,0	63
Total	4,6	3,0	5,0	6,0	135
<b>GROUPES AGE</b>					
15-24	4,6	3,0	4,0	6,0	13
25-34	4,4	3,0	4,0	6,0	92
35-44	5,0	4,0	5,0	6,0	44
Total	4,6	3,0	5,0	6,0	149
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	4,2	3,0	4,0	5,0	14
Primaire	4,4	3,0	4,0	7,0	9
Secondaire inférieur	5,0	3,0	6,0	6,0	16
Secondaire supérieur	4,7	4,0	5,0	6,0	42
Supérieur	4,2	3,0	4,0	6,0	61
Total	4,5	3,0	4,0	6,0	142
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	5,2	4,0	5,0	6,0	25
20.000-30.000	4,5	3,0	5,0	5,0	37
30.000-40.000	4,3	3,0	4,0	5,0	29
40.000-60.000	4,4	3,0	4,0	6,0	36
>60.000	4,4	2,0	5,0	6,0	20
Total	4,6	3,0	5,0	6,0	147
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	4,5	3,0	5,0	6,0	114
Très mauvaise à moyenne	5,0	4,0	5,0	6,0	25
Total	4,6	3,0	5,0	6,0	139
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	4,2	3,0	4,0	5,0	78
Dans le passé	4,2	3,0	4,0	5,0	17
Modéré (< 20)	5,4	5,0	5,0	7,0	33
Gros fumeur	5,4	4,0	6,0	6,0	11
Total	4,6	3,0	5,0	6,0	139
<b>REGION DE RESIDENCE</b>					
Région Bruxelloise	4,6	3,0	5,0	6,0	149
Belgique	4,6	3,0	5,0	6,0	149

Enfants âgés de moins de 5 ans

Suivant les caractéristiques de la mère (sauf sexe nouveau-né)

REGIO: 3 Région Wallonne

RISQUE DE MORT SUBITE DU NOURRISSON (INDICATEUR : MCH29\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	NOMBRE DE FACTEURS DE RISQUE				N
	Moyenne	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	
<b>SEXE (NOUVEAU-NE)</b>					
Garçon	4,5	3,0	4,0	6,0	94
Fille	4,8	4,0	5,0	6,0	77
Total	4,6	3,0	5,0	6,0	171
<b>GROUPES AGE</b>					
15-24	4,2	3,0	4,0	6,0	18
25-34	4,8	4,0	5,0	6,0	133
35-44	4,4	3,0	4,0	6,0	32
Total	4,7	3,0	5,0	6,0	183
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	6,3	5,0	6,0	8,0	3
Primaire	3,0	2,0	4,0	4,0	3
Secondaire inférieur	5,0	4,0	5,0	7,0	21
Secondaire supérieur	4,9	4,0	5,0	6,0	73
Supérieur	4,3	3,0	4,0	5,0	73
Total	4,7	3,0	5,0	6,0	173
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	5,1	4,0	6,0	6,0	19
20.000-30.000	4,6	3,0	4,0	5,0	49
30.000-40.000	4,7	4,0	5,0	6,0	42
40.000-60.000	4,6	3,0	5,0	6,0	60
>60.000	4,4	3,0	5,0	6,0	9
Total	4,7	3,0	5,0	6,0	179
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	4,7	3,0	5,0	6,0	151
Très mauvaise à moyenne	4,6	4,0	5,0	5,0	26
Total	4,6	3,0	5,0	6,0	177
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	4,4	3,0	4,0	6,0	80
Dans le passé	4,5	3,0	5,0	5,0	39
Modéré (< 20)	5,1	4,0	5,0	6,0	45
Gros fumeur	5,2	4,0	5,0	7,0	17
Total	4,7	3,0	5,0	6,0	181
<b>REGION DE RESIDENCE</b>					
Région Wallonne	4,7	3,0	5,0	6,0	183
Belgique	4,7	3,0	5,0	6,0	183

Enfants âgés de moins de 5 ans

Suivant les caractéristiques de la mère (sauf sexe nouveau-né)



RISQUE DE MORT SUBITE DU NOURRISSON (INDICATEUR : MCH31\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	POSITION POUR COUCHER LE NOUVEAU-NE			Total
	Toujours sur le dos	Sur le dos ou sur le côté	Parfois sur le ventre	N
	%	%	%	
<b>SEXE (NOUVEAU-NE)</b>				
Garçon	26,2	42,0	31,8	265
Fille	31,6	40,7	27,8	215
Total	28,6	41,4	30,0	480
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	44,3	31,4	24,4	34
25-34	30,6	41,5	27,9	371
35-44	17,7	50,0	32,4	115
Total	29,1	42,4	28,5	520
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	9,3	12,0	78,7	17
Primaire	30,7	31,9	37,4	15
Secondaire inférieur	27,8	42,4	29,8	54
Secondaire supérieur	20,1	46,2	33,7	187
Supérieur	36,7	43,4	19,9	224
Total	28,4	43,5	28,0	497
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	19,0	54,0	26,9	47
20.000-30.000	28,3	44,6	27,1	100
30.000-40.000	27,3	41,5	31,2	112
40.000-60.000	30,2	41,3	28,5	191
>60.000	36,8	35,3	27,9	55
Total	29,3	42,0	28,7	505
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	30,7	40,6	28,6	430
Très mauvaise à moyenne	23,4	45,7	30,9	70
Total	29,8	41,2	28,9	500
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	32,1	38,6	29,3	269
Dans le passé	26,4	45,6	28,0	99
Modéré (< 20)	29,2	45,5	25,3	97
Gros fumeur	11,7	59,2	29,0	41
Total	28,9	42,7	28,4	506
<b>REGION DE RESIDENCE</b>				
Région Flamande	29,6	41,6	28,8	185
Région Bruxelloise	25,3	40,7	34,0	152
Région Wallonne	29,5	44,3	26,2	183
Belgique	29,1	42,4	28,5	520

-----  
Enfants âgés de moins de 5 ans

Suivant les caractéristiques de la mère (sauf sexe nouveau-né)

REGIO: 1 Région Flamande

RISQUE DE MORT SUBITE DU NOURRISSON (INDICATEUR : MCH31\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	POSITION POUR COUCHER LE NOUVEAU-NE			Total
	Toujours sur le dos	Sur le dos ou sur le côté	Parfois sur le ventre	N
	%	%	%	
<b>SEXE (NOUVEAU-NE)</b>				
Garçon	21,6	46,0	32,4	99
Fille	38,4	33,3	28,3	70
Total	28,7	40,7	30,7	169
<b>GROUPE AGE</b>				
15-24	,0	51,6	48,4	4
25-34	32,8	39,5	27,7	145
35-44	18,7	50,3	30,9	36
Total	29,6	41,6	28,8	185
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	,0	,0	100,0	1
Primaire	,0	32,8	67,2	3
Secondaire inférieur	43,7	25,2	31,0	16
Secondaire supérieur	21,1	43,6	35,3	70
Supérieur	35,3	46,1	18,6	90
Total	29,6	42,6	27,7	180
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	,0	100,0	,0	1
20.000-30.000	22,8	52,4	24,7	17
30.000-40.000	26,9	41,2	31,9	38
40.000-60.000	31,3	38,9	29,8	94
>60.000	35,3	37,8	26,9	26
Total	29,9	41,0	29,0	176
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	31,9	40,0	28,1	161
Très mauvaise à moyenne	18,3	43,6	38,0	19
Total	30,5	40,4	29,1	180
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	32,9	38,2	28,9	111
Dans le passé	25,4	46,8	27,8	40
Modéré (< 20)	29,7	39,8	30,5	20
Gros fumeur	7,6	68,7	23,7	12
Total	29,4	42,1	28,5	183
<b>REGION DE RESIDENCE</b>				
Région Flamande	29,6	41,6	28,8	185
Belgique	29,6	41,6	28,8	185

-----  
Enfants âgés de moins de 5 ans

Suivant les caractéristiques de la mère (sauf sexe nouveau-né)

REGIO: 2 Région Bruxelloise

RISQUE DE MORT SUBITE DU NOURRISSON (INDICATEUR : MCH31\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	POSITION POUR COUCHER LE NOUVEAU-NE			Total
	Toujours sur le dos	Sur le dos ou sur le côté	Parfois sur le ventre	N
	%	%	%	
<b>SEXE (NOUVEAU-NE)</b>				
Garçon	21,3	42,1	36,7	74
Fille	26,2	37,9	35,8	66
Total	23,9	39,9	36,2	140
<b>GROUPE AGE</b>				
15-24	44,7	25,9	29,4	12
25-34	26,3	39,5	34,2	93
35-44	15,9	48,8	35,4	47
Total	25,3	40,7	34,0	152
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	21,6	27,8	50,6	13
Primaire	42,1	25,4	32,5	9
Secondaire inférieur	10,9	60,2	28,9	16
Secondaire supérieur	18,9	43,3	37,8	45
Supérieur	35,7	32,4	31,8	62
Total	26,5	38,3	35,3	145
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	18,4	49,8	31,7	27
20.000-30.000	18,9	46,4	34,7	35
30.000-40.000	20,3	45,4	34,3	30
40.000-60.000	32,4	30,5	37,0	38
>60.000	49,0	19,9	31,1	20
Total	25,6	40,3	34,1	150
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	24,4	41,3	34,3	118
Très mauvaise à moyenne	30,8	32,7	36,5	25
Total	25,5	39,8	34,7	143
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	26,6	39,1	34,3	79
Dans le passé	40,9	37,2	22,0	18
Modéré (< 20)	14,0	47,7	38,3	33
Gros fumeur	9,3	46,5	44,3	12
Total	24,2	41,3	34,4	142
<b>REGION DE RESIDENCE</b>				
Région Bruxelloise	25,3	40,7	34,0	152
Belgique	25,3	40,7	34,0	152

-----  
Enfants âgés de moins de 5 ans

Suivant les caractéristiques de la mère (sauf sexe nouveau-né)

REGIO: 3 Région Wallonne

RISQUE DE MORT SUBITE DU NOURRISSON (INDICATEUR : MCH31\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	POSITION POUR COUCHER LE NOUVEAU-NE			Total
	Toujours sur le dos	Sur le dos ou sur le côté	Parfois sur le ventre	N
	%	%	%	
<b>SEXE (NOUVEAU-NE)</b>				
Garçon	36,7	34,0	29,3	92
Fille	22,4	53,4	24,2	79
Total	30,0	43,1	26,9	171
<b>GROUPE AGE</b>				
15-24	60,1	25,3	14,6	18
25-34	27,0	46,4	26,5	133
35-44	16,5	49,8	33,7	32
Total	29,5	44,3	26,2	183
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	,0	,0	100,0	3
Primaire	63,3	36,7	,0	3
Secondaire inférieur	11,2	60,5	28,4	22
Secondaire supérieur	18,7	51,7	29,6	72
Supérieur	40,3	40,4	19,3	72
Total	26,7	46,8	26,5	172
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	21,6	50,8	27,6	19
20.000-30.000	34,6	39,0	26,4	48
30.000-40.000	29,4	41,2	29,4	44
40.000-60.000	26,0	52,2	21,7	59
>60.000	36,7	31,2	32,1	9
Total	29,3	44,3	26,3	179
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	30,3	41,6	28,1	151
Très mauvaise à moyenne	27,9	53,1	19,1	26
Total	29,9	43,3	26,8	177
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	31,9	39,4	28,7	79
Dans le passé	25,7	44,8	29,5	41
Modéré (< 20)	32,8	49,5	17,7	44
Gros fumeur	17,1	51,1	31,8	17
Total	29,4	44,2	26,4	181
<b>REGION DE RESIDENCE</b>				
Région Wallonne	29,5	44,3	26,2	183
Belgique	29,5	44,3	26,2	183

-----  
Enfants âgés de moins de 5 ans

Suivant les caractéristiques de la mère (sauf sexe nouveau-né)