

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP01_1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIER CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	38,8	47,5	13,7	4548
Femme	57,0	34,8	8,2	4835
Total	48,0	41,1	10,9	9383
GROUPE AGE				
0-14	47,7	34,1	18,2	1554
15-24	42,2	39,4	18,3	1004
25-34	46,9	41,1	11,9	1486
35-44	44,8	47,5	7,7	1492
45-54	47,9	44,7	7,5	1196
55-64	49,4	44,2	6,5	1023
65-74	59,3	37,0	3,7	1005
75 +	60,7	35,0	4,3	623
Total	48,0	41,1	10,9	9383
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	45,6	32,5	21,8	315
Ecole primaire	45,2	45,6	9,2	1149
Secondaire inférieur	45,1	41,3	13,6	1530
Secondaire supérieur	45,3	42,3	12,4	2709
Supérieur	52,3	39,2	8,5	3290
Total	47,8	41,1	11,1	8993
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	46,4	38,2	15,4	692
20.000-30.000	47,5	40,1	12,4	1859
30.000-40.000	48,8	41,3	10,0	2210
40.000-60.000	47,5	42,3	10,2	2991
>60.000	50,1	41,0	8,9	1214
Total	48,1	41,2	10,7	8966
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	41,3	47,4	11,3	5413
Très mauvaise à moyenne	68,4	28,5	3,1	1909
Total	47,4	43,1	9,4	7322
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	48,3	42,1	9,6	3412
Dans le passé	52,2	40,7	7,1	1796
Modéré (<20)	43,2	45,0	11,8	1420
Gros fumeur	44,9	44,9	10,3	769
Total	47,8	42,7	9,5	7397
REGION DE RESIDENCE				
Région flamande	45,0	43,9	11,1	3264
Région bruxelloise	55,1	32,6	12,3	2806
Région wallonne	51,0	38,8	10,2	3313
Belgique	48,0	41,1	10,9	9383

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP01_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIER CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	35,3	50,5	14,2	1620
Femme	54,7	37,3	8,0	1644
Total	45,0	43,9	11,1	3264
GROUPES AGE				
0-14	44,0	36,5	19,5	519
15-24	40,6	39,8	19,7	382
25-34	43,8	43,8	12,4	534
35-44	41,3	52,2	6,5	489
45-54	44,6	47,8	7,6	426
55-64	44,0	50,1	5,9	385
65-74	62,0	34,7	3,3	348
75 +	59,5	37,6	2,9	181
Total	45,0	43,9	11,1	3264
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	43,6	25,6	30,8	57
Ecole primaire	44,0	48,2	7,8	386
Secondaire inférieur	43,4	45,4	11,2	566
Secondaire supérieur	42,9	44,2	12,9	1073
Supérieur	47,5	42,7	9,9	1068
Total	44,7	44,0	11,3	3150
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	44,8	48,5	6,7	102
20.000-30.000	46,1	43,5	10,4	558
30.000-40.000	45,7	43,2	11,1	804
40.000-60.000	44,2	44,2	11,6	1193
>60.000	45,0	45,3	9,7	437
Total	45,1	44,1	10,8	3094
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	38,9	50,1	11,0	2083
Très mauvaise à moyenne	69,0	28,4	2,6	548
Total	44,6	46,0	9,4	2631
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	44,3	46,4	9,3	1264
Dans le passé	49,4	43,2	7,5	665
Modéré (<20)	40,2	47,8	12,0	507
Gros fumeur	45,0	43,5	11,4	218
Total	44,8	45,6	9,6	2654

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP01_1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIER CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	45,9	40,1	14,0	1348
Femme	63,5	25,8	10,8	1458
Total	55,1	32,6	12,3	2806
GROUPES AGE				
0-14	52,7	27,2	20,1	451
15-24	43,7	33,4	23,0	276
25-34	54,0	33,2	12,7	453
35-44	49,5	40,9	9,5	465
45-54	60,2	32,6	7,1	352
55-64	61,1	34,3	4,5	292
65-74	63,6	27,0	9,4	298
75 +	69,0	26,3	4,7	219
Total	55,1	32,6	12,3	2806
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	52,3	27,0	20,7	153
Ecole primaire	53,0	29,3	17,7	327
Secondaire inférieur	47,1	36,1	16,8	389
Secondaire supérieur	54,0	33,5	12,4	650
Supérieur	60,8	32,0	7,2	1133
Total	55,6	32,3	12,2	2652
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	41,1	30,7	28,2	336
20.000-30.000	57,4	29,2	13,4	563
30.000-40.000	54,6	34,6	10,9	563
40.000-60.000	57,5	35,2	7,3	736
>60.000	61,7	31,2	7,0	471
Total	55,3	32,3	12,4	2669
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	49,2	38,1	12,7	1554
Très mauvaise à moyenne	72,4	23,5	4,0	575
Total	55,2	34,3	10,5	2129
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	56,1	32,3	11,6	937
Dans le passé	58,8	36,2	5,0	528
Modéré (<20)	52,8	36,9	10,3	415
Gros fumeur	50,3	36,8	12,9	256
Total	55,3	34,7	10,1	2136

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP01_1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIER CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	43,0	44,5	12,6	1580
Femme	58,7	33,4	7,9	1733
Total	51,0	38,8	10,2	3313
GROUPES AGE				
0-14	52,4	32,0	15,6	584
15-24	44,7	40,9	14,4	346
25-34	50,5	38,9	10,7	499
35-44	49,6	41,1	9,3	538
45-54	50,3	42,4	7,3	418
55-64	56,4	35,2	8,4	346
65-74	53,5	44,1	2,4	359
75 +	57,9	36,0	6,1	223
Total	51,0	38,8	10,2	3313
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	42,4	42,9	14,7	105
Ecole primaire	44,4	47,2	8,4	436
Secondaire inférieur	47,6	35,4	17,0	575
Secondaire supérieur	47,8	40,9	11,3	986
Supérieur	57,4	36,0	6,6	1089
Total	50,8	38,8	10,4	3191
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	50,5	36,0	13,5	254
20.000-30.000	46,1	38,9	15,0	738
30.000-40.000	52,0	40,0	8,0	843
40.000-60.000	51,5	40,3	8,2	1062
>60.000	58,6	33,9	7,6	306
Total	50,9	39,0	10,1	3203
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	43,9	44,7	11,4	1776
Très mauvaise à moyenne	66,5	30,1	3,5	786
Total	50,1	40,7	9,2	2562
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	53,5	37,1	9,4	1211
Dans le passé	56,0	37,1	6,9	603
Modéré (<20)	45,2	42,9	12,0	498
Gros fumeur	42,9	49,2	7,9	295
Total	51,1	39,8	9,2	2607

CONSUMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SPCOUNT1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE PAR AN PAR PERSONNE DANS LA POPULATION	N
SEXE		
Homme	1,8	4550
Femme	3,2	4836
Total	2,5	9386
GROUPES AGE		
0-14	2,2	1554
15-24	2,0	1004
25-34	2,9	1486
35-44	2,3	1493
45-54	2,9	1197
55-64	2,6	1024
65-74	3,2	1005
75 +	2,1	623
Total	2,5	9386
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	3,2	316
Ecole primaire	2,7	1149
Secondaire inférieur	2,6	1531
Secondaire supérieur	2,3	2709
Supérieur	2,6	3291
Total	2,5	8996
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	2,6	692
20.000-30.000	2,4	1861
30.000-40.000	2,8	2210
40.000-60.000	2,4	2992
>60.000	2,5	1214
Total	2,5	8969
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	2,1	5416
Très mauvaise à moyenne	4,1	1909
Total	2,5	7325
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	2,7	3412
Dans le passé	2,8	1798
Modéré (<20)	2,1	1420
Gros fumeur	2,4	770
Total	2,6	7400
REGION DE RESIDENCE		
Région flamande	2,3	3266
Région bruxelloise	3,4	2807
Région wallonne	2,7	3313
Belgique	2,5	9386

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SPCOUNT1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE PAR AN PAR PERSONNE DANS LA POPULATION	N
SEXE		
Homme	1,5	1621
Femme	3,0	1645
Total	2,3	3266
GROUPES AGE		
0-14	1,4	519
15-24	1,7	382
25-34	2,6	534
35-44	2,2	489
45-54	2,9	427
55-64	2,5	386
65-74	3,0	348
75 +	2,2	181
Total	2,3	3266
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	2,5	58
Ecole primaire	2,4	386
Secondaire inférieur	2,8	567
Secondaire supérieur	1,9	1073
Supérieur	2,2	1068
Total	2,2	3152
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	2,4	102
20.000-30.000	2,0	559
30.000-40.000	3,0	804
40.000-60.000	2,2	1194
>60.000	2,0	437
Total	2,3	3096
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	2,0	2085
Très mauvaise à moyenne	3,9	548
Total	2,4	2633
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	2,5	1264
Dans le passé	2,6	667
Modéré (<20)	2,1	507
Gros fumeur	1,7	218
Total	2,4	2656

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SPCOUNT1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE PAR AN PAR PERSONNE DANS LA POPULATION	N
SEXE		
Homme	3,2	1349
Femme	3,7	1458
Total	3,4	2807
GROUPES AGE		
0-14	2,7	451
15-24	2,3	276
25-34	4,0	453
35-44	2,2	466
45-54	4,0	352
55-64	4,1	292
65-74	5,1	298
75 +	4,1	219
Total	3,4	2807
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	4,9	153
Ecole primaire	4,4	327
Secondaire inférieur	3,2	389
Secondaire supérieur	2,6	650
Supérieur	3,5	1134
Total	3,5	2653
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	2,8	336
20.000-30.000	4,0	564
30.000-40.000	2,9	563
40.000-60.000	3,4	736
>60.000	3,6	471
Total	3,4	2670
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	2,7	1555
Très mauvaise à moyenne	5,7	575
Total	3,5	2130
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	3,3	937
Dans le passé	5,2	528
Modéré (<20)	2,8	415
Gros fumeur	2,6	257
Total	3,5	2137

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SPCOUNT1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE PAR AN PAR PERSONNE DANS LA POPULATION	N
SEXE		
Homme	2,0	1580
Femme	3,2	1733
Total	2,7	3313
GROUPES AGE		
0-14	3,3	584
15-24	2,5	346
25-34	2,9	499
35-44	2,3	538
45-54	2,6	418
55-64	2,2	346
65-74	3,0	359
75 +	1,1	223
Total	2,7	3313
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	2,6	105
Ecole primaire	2,5	436
Secondaire inférieur	2,3	575
Secondaire supérieur	2,8	986
Supérieur	2,8	1089
Total	2,7	3191
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	2,5	254
20.000-30.000	2,5	738
30.000-40.000	2,5	843
40.000-60.000	2,6	1062
>60.000	3,3	306
Total	2,6	3203
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	1,9	1776
Très mauvaise à moyenne	3,8	786
Total	2,5	2562
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	2,7	1211
Dans le passé	2,4	603
Modéré (<20)	1,9	498
Gros fumeur	3,3	295
Total	2,6	2607

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP05R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	DISTRIBUTION DES CONTACTS AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE SUIVANT LE TYPE DE SPECIALISTE											Total N (*)
	Gynéco/ obstétricien	Interniste(+)	Orthopédiste	Neurologue/ psychiatre	Dermatologue	Chirurgien(+)	Autre spécialiste	Ophthalmologue	Pédiatre	ORL	Rhumatologue	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE												
Homme	,0	16,6	15,3	8,1	11,4	12,4	7,2	8,7	12,4	4,8	3,1	1400
Femme	26,5	14,3	8,5	9,7	7,5	5,1	8,8	6,0	5,3	4,8	3,5	2055
Total	15,7	15,2	11,2	9,0	9,1	8,1	8,1	7,1	8,2	4,8	3,4	3455
GROUPES AGE												
0-14	2,2	3,2	7,8	1,3	7,3	6,1	4,3	7,5	51,9	8,4	,0	591
15-24	18,2	4,5	12,4	10,3	21,2	8,4	8,2	7,9	,0	2,5	6,3	265
25-34	38,6	7,7	14,2	10,0	6,0	6,3	7,8	3,9	,0	4,9	,7	522
35-44	24,0	14,4	10,2	10,0	8,6	8,4	9,6	6,3	,0	3,9	4,6	503
45-54	9,9	15,6	18,5	13,4	7,7	8,2	12,2	5,8	,0	3,4	5,4	483
55-64	6,2	31,7	6,0	13,6	8,0	10,5	7,3	7,7	,0	5,9	3,1	385
65-74	5,8	33,5	6,6	7,3	11,3	11,1	6,0	10,5	,0	2,3	5,6	486
75 +	2,0	38,8	7,1	3,2	3,0	6,7	9,1	17,2	,0	11,2	1,8	220
Total	15,7	15,2	11,2	9,0	9,1	8,1	8,1	7,1	8,2	4,8	3,4	3455
NIVEAU INSTRUCTION												
Pas de diplôme	3,4	25,5	7,3	6,6	7,3	24,5	3,9	10,0	3,3	4,9	3,4	128
Ecole primaire	8,0	22,8	14,7	16,3	9,7	7,3	6,7	5,7	3,8	2,7	2,3	407
Secondaire inférieur	14,0	21,1	13,8	9,6	5,8	10,9	7,4	4,6	6,1	4,1	2,7	542
Secondaire supérieur	17,0	13,1	10,6	10,2	9,0	6,5	8,7	5,7	9,2	5,6	4,4	944
Supérieur	17,6	12,2	9,7	6,5	10,5	6,8	7,9	9,8	10,4	5,3	3,4	1321
Total	15,4	15,4	11,2	9,2	9,1	7,9	7,8	7,2	8,4	4,9	3,5	3342
REVENU EQUIVALENT (FB)												
< 20.000	13,6	19,0	15,1	16,2	6,6	7,4	4,5	3,6	7,8	3,6	2,6	243
20.000-30.000	13,5	17,7	11,5	14,4	5,9	10,7	8,0	6,2	7,1	3,7	1,3	681
30.000-40.000	13,6	16,2	14,4	8,5	6,6	5,8	10,2	7,8	9,5	4,5	2,8	774
40.000-60.000	15,5	15,0	10,9	7,0	11,8	8,2	6,2	6,9	9,4	4,6	4,4	1109
>60.000	22,6	9,5	7,2	7,1	10,6	8,9	9,8	6,7	5,2	7,2	5,3	501
Total	15,7	15,2	11,4	9,3	9,0	8,3	7,9	6,8	8,3	4,8	3,4	3308
SANTE SUBJECTIVE												
Bonne à très bonne	25,9	9,4	12,4	6,5	11,5	8,8	8,1	8,2	,0	5,0	4,3	1529
Très mauvaise à moyenne	6,9	29,1	12,6	16,6	3,7	8,8	9,5	5,3	,0	3,6	3,9	1106
Total	18,6	16,9	12,5	10,4	8,5	8,8	8,6	7,1	,0	4,4	4,2	2635
CONSOMMATION DE TABAC												
Jamais	19,9	16,5	12,5	9,1	9,7	8,6	9,2	6,6	,0	3,2	4,7	1186
Dans le passé	21,1	20,2	7,5	10,1	7,4	8,1	8,7	7,4	,0	5,3	4,1	803
Modéré (<20)	20,5	12,0	14,1	11,5	8,0	8,9	11,4	7,7	,0	2,5	3,2	410
Gros fumeur	5,8	15,3	18,1	17,5	15,1	9,3	1,7	6,3	,0	7,7	3,1	289
Total	18,6	16,6	12,1	10,8	9,5	8,6	8,5	7,0	,0	4,2	4,1	2688
REGION DE RESIDENCE												
Région flamande	17,9	14,9	14,4	7,9	9,8	7,9	7,4	6,4	6,5	3,2	3,8	1028
Région bruxelloise	15,5	17,7	5,8	10,6	7,1	9,3	9,3	6,8	10,5	4,4	3,0	1226
Région wallonne	12,3	14,8	8,1	10,4	8,6	7,8	9,0	8,3	10,1	7,7	2,8	1201
Belgique	15,7	15,2	11,2	9,0	9,1	8,1	8,1	7,1	8,2	4,8	3,4	3455

(+) Interniste général, cardiologue, gastroentérologue, pneumologue, néphrologue, oncologue, endocrinologue, gériatre

(*) Chirurgien général, chirurgien plastique, neurochirurgien, urologue

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP05R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	DISTRIBUTION DES CONTACTS AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE SUIVANT LE TYPE DE SPECIALISTE											Total N (**)
	Gynéco/ obstétricien	Interniste(†)	Orthopédiste	Dermatologue	Neurologue/ psychiatre	Chirurgien(‡)	Autre spécialiste	Ophthalmologue	Pédiatre	Rhumatologue	ORL	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE												
Homme	,0	17,8	21,5	12,0	4,5	13,7	6,9	7,9	9,2	4,4	2,2	406
Femme	28,8	13,1	10,0	8,5	9,9	4,4	7,7	5,5	4,9	3,5	3,8	622
Total	17,9	14,9	14,4	9,8	7,9	7,9	7,4	6,4	6,5	3,8	3,2	1028
GROUPES AGE												
0-14	3,6	1,8	9,1	9,6	1,7	5,1	2,0	11,0	46,8	,0	9,3	162
15-24	16,0	3,8	16,8	14,8	15,4	6,7	8,3	7,3	,0	9,7	1,2	86
25-34	43,4	8,1	16,5	4,3	8,3	7,0	7,5	2,4	,0	,3	2,3	174
35-44	26,3	12,8	13,4	9,9	6,3	9,4	9,6	6,2	,0	5,3	,7	123
45-54	11,2	12,2	24,6	7,9	6,5	9,5	13,6	3,1	,0	8,3	3,1	131
55-64	6,4	35,5	7,7	12,2	12,4	11,0	4,9	4,9	,0	2,0	3,0	140
65-74	6,4	33,9	9,3	17,1	9,1	7,2	2,3	10,5	,0	3,4	,7	153
75 +	3,2	35,5	11,2	1,8	3,5	6,5	11,0	15,8	,0	,0	11,4	59
Total	17,9	14,9	14,4	9,8	7,9	7,9	7,4	6,4	6,5	3,8	3,2	1028
NIVEAU INSTRUCTION												
Pas de diplôme	,0	33,4	9,1	14,3	7,8	10,2	,0	19,4	,0	5,8	,0	17
Ecole primaire	7,6	28,4	21,9	14,8	3,5	8,5	2,6	3,6	5,1	2,1	1,7	118
Secondaire inférieur	13,7	17,6	14,6	8,5	9,7	10,4	9,4	4,8	6,4	1,5	3,3	187
Secondaire supérieur	17,9	14,6	11,5	10,5	12,5	5,9	7,3	4,3	6,9	6,1	2,6	295
Supérieur	21,2	10,1	14,9	9,2	4,5	7,4	7,3	10,1	7,4	3,9	4,0	367
Total	17,0	15,2	14,5	10,2	8,0	7,6	7,1	6,6	6,7	4,0	3,1	984
REVENU EQUIVALENT (FB)												
< 20.000	15,0	28,9	20,1	,0	18,1	8,7	,0	1,7	3,3	4,1	,0	29
20.000-30.000	14,8	25,3	15,4	4,1	15,4	9,6	6,3	4,4	2,0	,4	2,4	170
30.000-40.000	14,1	15,4	17,6	8,5	5,9	5,4	10,7	8,0	8,0	2,5	3,8	263
40.000-60.000	18,0	13,7	14,5	12,6	5,7	9,4	4,2	5,0	8,3	5,0	3,5	366
>60.000	26,0	4,7	9,3	11,3	7,1	8,0	11,2	5,9	5,8	6,8	3,9	154
Total	17,9	14,9	14,6	9,6	8,0	8,2	7,3	5,7	6,5	3,9	3,3	982
SANTE SUBJECTIVE												
Bonne à très bonne	27,9	8,6	15,2	9,6	7,5	9,4	7,1	6,7	,0	6,1	2,1	528
Très mauvaise à moyenne	6,1	32,5	17,5	4,8	13,5	7,7	9,7	3,6	,0	2,0	2,7	291
Total	20,7	16,5	15,9	8,0	9,5	8,8	7,9	5,6	,0	4,7	2,3	819
CONSOMMATION DE TABAC												
Jamais	20,2	14,6	17,9	8,2	9,7	8,2	8,7	5,2	,0	5,4	2,0	391
Dans le passé	28,3	21,4	7,3	7,4	5,5	8,2	6,9	6,6	,0	5,2	3,2	256
Moderé (<20)	18,9	11,8	14,4	11,3	10,6	7,2	14,5	6,0	,0	3,8	1,5	117
Gros fumeur	4,5	15,5	25,6	21,9	12,1	11,3	,4	5,5	,0	,6	2,6	67
Total	20,3	16,2	15,4	10,0	9,0	8,4	8,0	5,7	,0	4,6	2,3	831

(†) Interniste général, cardiologue, gastroentérologue, pneumologue, nephrologue, oncologue, endocrinologue, gériatre

(‡) Chirurgien général, chirurgien plastique, neurochirurgien, urologue

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP05R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	DISTRIBUTION DES CONTACTS AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE SUIVANT LE TYPE DE SPECIALISTE											Total N (**)
	Interniste(†)	Gynéco/ obstétricien	Neurologue/ psychiatre	Chirurgien(‡)	Autre spécialiste	Pédiatre	Dermatologue	Ophthalmologue	Orthopédiste	ORL	Rhumatologue	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
SEXE												
Homme	18,1	,0	15,0	14,3	5,5	17,9	9,2	8,9	5,8	4,0	1,3	498
Femme	17,4	26,6	7,4	5,7	12,0	5,3	5,6	5,2	5,9	4,7	4,2	728
Total	17,7	15,5	10,6	9,3	9,3	10,5	7,1	6,8	5,8	4,4	3,0	1226
GROUPES AGE												
0-14	,7	1,1	2,3	5,6	,9	70,8	5,2	2,4	7,2	4,0	,0	198
15-24	13,0	21,0	2,9	21,5	8,6	,0	10,7	8,2	4,9	1,3	8,0	78
25-34	7,2	34,3	17,0	2,6	10,6	,0	10,6	7,0	5,3	4,3	1,1	194
35-44	11,0	23,5	13,0	14,6	9,6	,0	8,7	4,5	4,1	6,7	4,2	174
45-54	24,8	12,4	18,5	7,9	13,8	,0	7,8	3,7	8,5	1,3	1,3	187
55-64	26,0	10,2	10,2	7,7	18,8	,0	3,3	8,2	5,7	4,1	5,7	134
65-74	44,2	4,9	4,0	14,4	3,7	,0	4,7	10,1	5,5	5,4	3,1	165
75 +	37,9	,0	5,9	7,9	6,0	,0	,0	20,3	2,7	13,0	6,4	96
Total	17,7	15,5	10,6	9,3	9,3	10,5	7,1	6,8	5,8	4,4	3,0	1226
NIVEAU INSTRUCTION												
Pas de diplôme	30,2	6,1	5,2	21,5	3,6	8,3	10,4	8,5	5,4	,8	,0	71
Ecole primaire	18,8	6,9	24,4	14,8	14,0	2,2	8,3	3,1	3,8	1,8	1,9	129
Secondaire inférieur	26,6	13,1	16,2	10,8	3,8	5,9	1,4	2,0	9,6	2,6	8,1	160
Secondaire supérieur	14,5	18,7	3,3	6,4	11,7	13,9	9,3	6,5	7,0	6,8	2,0	279
Supérieur	13,0	19,3	9,9	6,4	9,2	13,5	8,1	7,7	4,8	5,4	2,6	548
Total	17,2	15,8	10,8	9,2	9,2	10,8	7,0	6,9	5,8	4,5	2,9	1187
REVENU EQUIVALENT (FB)												
< 20.000	8,4	16,3	18,8	12,6	7,2	9,5	9,7	4,2	10,8	,4	2,1	135
20.000-30.000	18,3	11,9	11,7	13,4	10,1	19,3	4,8	6,6	1,2	2,7	,1	263
30.000-40.000	26,4	12,1	10,1	4,3	8,9	8,6	4,3	7,1	7,3	2,5	8,7	220
40.000-60.000	17,2	18,6	8,8	8,6	8,5	8,0	7,2	7,3	7,9	5,2	2,7	341
>60.000	13,9	16,8	8,9	4,3	10,9	5,2	10,9	8,7	5,5	11,7	3,1	208
Total	17,4	15,1	11,0	8,9	9,3	10,9	7,0	7,0	5,9	4,6	3,0	1167
SANTE SUBJECTIVE												
Bonne à très bonne	13,6	27,4	5,1	9,8	10,0	,0	12,6	7,0	5,8	6,1	2,7	528
Très mauvaise à moyenne	30,7	6,2	20,6	12,4	8,7	,0	2,3	5,9	5,6	3,0	4,8	389
Total	21,1	18,1	11,9	10,9	9,4	,0	8,1	6,5	5,7	4,7	3,6	917
CONSOMMATION DE TABAC												
Jamais	24,4	18,4	9,3	5,9	11,2	,0	10,8	5,6	5,4	4,4	4,6	368
Dans le passé	20,8	15,7	16,6	11,5	7,2	,0	3,4	9,3	6,6	6,1	2,9	295
Modéré (<20)	14,3	26,6	11,2	14,1	8,8	,0	4,9	6,1	4,7	4,1	5,2	150
Gros fumeur	18,5	10,3	15,0	17,1	5,6	,0	15,1	5,8	6,6	4,0	2,0	113
Total	20,7	18,1	12,5	10,4	8,9	,0	8,1	6,8	5,8	4,8	3,9	926

(†) Interniste général, cardiologue, gastroentérologue, pneumologue, néphrologue, oncologue, endocrinologue, gériatre

(‡) Chirurgien général, chirurgien plastique, neurochirurgien, urologue

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP05R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	DISTRIBUTION DES CONTACTS AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE SUIVANT LE TYPE DE SPECIALISTE											Total N (**)
	Interniste(†)	Gynéco/ obstétricien	Neurologue/ psychiatre	Autre spécialiste	Dermatologue	Ophtalmologue	Orthopédiste	Chirurgien(‡)	ORL	Pédiatre	Rhumatologue	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE												
Homme	14,4	,0	10,8	8,3	11,4	9,6	10,0	9,7	8,8	15,0	2,0	496
Femme	15,2	22,3	10,1	9,5	6,4	7,3	6,6	6,3	6,8	6,2	3,3	705
Total	14,8	12,3	10,4	9,0	8,6	8,3	8,1	7,8	7,7	10,1	2,8	1201
GROUPES AGE												
0-14	5,6	,9	,5	8,1	5,2	4,9	6,4	7,5	8,6	52,4	,0	231
15-24	2,8	20,7	4,6	7,9	35,5	8,8	7,9	6,4	5,2	,0	,1	101
25-34	7,0	30,5	10,1	7,1	7,2	5,5	13,9	6,8	10,5	,0	1,3	154
35-44	17,9	20,4	15,0	9,7	6,5	6,8	7,1	4,8	8,1	,0	3,7	206
45-54	17,1	7,0	21,8	9,6	7,3	10,5	13,1	6,2	4,5	,0	2,7	165
55-64	26,5	3,9	17,7	6,5	1,5	13,3	2,8	11,0	12,7	,0	4,2	111
65-74	28,2	4,9	4,9	14,6	2,1	10,5	1,6	17,8	4,3	,0	11,1	168
75 +	45,0	1,6	,5	8,4	7,1	17,3	3,7	6,0	9,5	,0	1,0	65
Total	14,8	12,3	10,4	9,0	8,6	8,3	8,1	7,8	7,7	10,1	2,8	1201
NIVEAU INSTRUCTION												
Pas de diplôme	16,1	2,5	7,4	6,6	,0	6,1	8,1	35,8	12,1	,0	5,4	40
Ecole primaire	15,0	9,0	34,2	10,4	4,2	7,9	7,4	1,9	4,9	2,3	2,7	160
Secondaire inférieur	26,1	14,9	7,0	4,8	1,7	5,1	13,7	11,8	6,0	5,6	3,3	195
Secondaire supérieur	9,8	15,1	8,1	10,3	6,4	8,0	10,2	7,5	10,6	12,0	2,1	370
Supérieur	14,8	11,5	7,9	8,0	13,5	10,2	4,3	6,2	7,0	13,4	3,0	406
Total	15,1	12,5	10,7	8,4	8,3	8,4	7,9	7,9	7,9	10,2	2,8	1171
REVENU EQUIVALENT (FB)												
< 20.000	20,4	10,3	12,7	5,6	8,9	4,5	14,8	2,2	8,9	9,8	1,9	79
20.000-30.000	7,1	12,6	14,6	9,3	8,9	8,3	11,5	10,8	6,0	7,9	3,0	248
30.000-40.000	14,8	13,3	12,3	9,8	4,1	7,6	10,9	7,1	6,3	12,3	1,6	291
40.000-60.000	16,6	10,4	8,6	8,8	11,9	9,9	5,9	6,1	6,3	11,8	3,7	402
>60.000	19,4	17,3	6,0	5,4	8,4	7,6	2,6	14,1	12,9	3,8	2,6	139
Total	14,7	12,3	10,7	8,5	8,9	8,4	8,4	8,0	7,2	10,1	2,8	1159
SANTE SUBJECTIVE												
Bonne à très bonne	9,3	20,8	4,9	9,6	15,3	12,1	8,9	7,0	10,9	,0	1,1	473
Très mauvaise à moyenne	23,9	8,2	19,1	9,5	2,8	7,2	9,0	8,9	5,2	,0	6,0	426
Total	16,0	15,0	11,4	9,6	9,6	9,9	9,0	7,9	8,3	,0	3,4	899
CONSOMMATION DE TABAC												
Jamais	17,1	19,8	7,9	9,4	12,2	9,6	5,1	10,2	5,1	,0	3,6	427
Dans le passé	17,7	10,1	16,0	12,7	9,3	8,2	8,2	6,5	8,8	,0	2,6	252
Modéré (<20)	11,4	20,3	13,1	7,8	4,3	11,1	17,8	9,4	3,4	,0	1,4	143
Gros fumeur	13,9	6,4	26,9	2,3	4,5	7,9	10,4	3,5	16,9	,0	7,4	109
Total	15,9	15,6	13,3	9,0	9,1	9,3	8,7	8,2	7,3	,0	3,5	931

(†) Interniste général, cardiologue, gastroentérologue, pneumologue, neurologue, oncologue, endocrinologue, gériatre

(‡) Chirurgien général, chirurgien plastique, neurochirurgien, urologue

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

CONSUMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP06)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	RAISON DU CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE						Total N (*)
	1	2	3	4	5	6	
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	41,2	25,2	22,3	5,5	1,0	4,8	1391
Femme	35,7	33,8	21,2	4,5	,6	4,2	2063
Total	37,9	30,4	21,7	4,9	,8	4,4	3454
GROUPES AGE							
0-14	38,4	30,5	18,0	4,8	1,1	7,2	577
15-24	44,3	24,8	20,1	4,4	,3	6,0	266
25-34	31,3	36,4	23,4	4,3	1,1	3,5	529
35-44	31,2	30,7	26,3	5,2	1,0	5,6	504
45-54	45,0	24,9	21,2	4,5	,9	3,4	468
55-64	44,8	23,8	23,6	4,5	,0	3,3	399
65-74	33,3	36,4	21,1	7,4	,0	1,8	490
75 +	41,7	40,3	10,5	3,1	2,4	2,2	221
Total	37,9	30,4	21,7	4,9	,8	4,4	3454
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	38,1	20,9	27,4	1,2	3,0	9,3	128
Ecole primaire	46,1	20,3	27,1	4,1	,0	2,5	415
Secondaire inférieur	46,7	27,1	21,4	1,7	,3	2,8	550
Secondaire supérieur	37,5	33,3	18,6	6,4	,8	3,5	937
Supérieur	33,5	33,3	20,9	6,0	,8	5,5	1307
Total	38,5	30,4	21,2	5,0	,7	4,2	3337
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	30,1	42,1	23,5	2,4	,1	1,7	246
20.000-30.000	36,5	25,2	27,6	4,4	,8	5,5	687
30.000-40.000	41,8	27,6	19,5	3,6	1,6	5,9	773
40.000-60.000	39,1	31,5	20,8	4,8	,8	3,1	1099
>60.000	32,2	35,2	19,2	8,4	,0	4,9	509
Total	37,6	30,5	21,8	4,9	,8	4,4	3314
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	36,5	31,1	21,9	5,8	,6	4,2	1518
Très mauvaise à moyenne	41,5	27,8	23,5	2,9	,4	4,0	1135
Total	38,4	29,8	22,5	4,7	,5	4,1	2653
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	37,1	30,6	24,7	4,6	,4	2,6	1203
Dans le passé	40,2	33,0	14,2	6,8	1,0	4,8	799
Modéré (<20)	34,8	29,9	24,3	4,9	,3	5,7	413
Gros fumeur	40,6	19,4	30,5	3,6	1,0	5,0	289
Total	38,0	29,7	22,6	5,1	,6	4,0	2704
REGION DE RESIDENCE							
Région flamande	42,7	28,2	17,9	5,7	,5	5,0	1032
Région bruxelloise	34,0	31,1	26,1	2,9	1,5	4,5	1242
Région wallonne	31,5	33,7	26,2	4,2	1,0	3,3	1180
Belgique	37,9	30,4	21,7	4,9	,8	4,4	3454

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

1 Plainte ou maladie

2 Examen diagnostique ou préventif

3 Traitement ou prescription

4 Résultat d'un examen

5 Raison administrative

6 Référé ou pour une autre raison

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP06)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	RAISON DU CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE						Total N (*)
	1	2	3	4	5	6	
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	51,0	21,1	16,2	6,7	,4	4,5	407
Femme	37,6	32,6	18,9	5,1	,5	5,3	625
Total	42,7	28,2	17,9	5,7	,5	5,0	1032
GROUPES AGE							
0-14	43,7	28,1	11,3	5,9	1,1	9,8	159
15-24	49,7	24,7	14,6	5,0	,0	6,1	88
25-34	32,0	35,9	24,1	4,1	,7	3,2	175
35-44	33,3	33,3	21,0	5,7	,0	6,6	124
45-54	55,6	14,8	17,7	5,4	1,3	5,3	129
55-64	53,9	22,7	14,8	5,9	,0	2,8	140
65-74	36,2	33,0	19,0	9,8	,0	1,9	157
75 +	47,8	36,9	11,5	2,3	,0	1,5	60
Total	42,7	28,2	17,9	5,7	,5	5,0	1032
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	59,4	12,0	22,4	,0	,0	6,2	19
Ecole primaire	58,8	16,1	16,9	6,7	,0	1,4	118
Secondaire inférieur	57,1	18,6	19,2	1,5	,0	3,6	191
Secondaire supérieur	41,2	35,3	15,3	5,4	,5	2,4	289
Supérieur	33,6	30,8	18,5	8,7	,3	8,0	367
Total	43,5	28,0	17,5	6,0	,3	4,6	984
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	30,0	48,1	21,8	,0	,0	,0	31
20.000-30.000	48,8	21,4	19,6	5,0	,0	5,2	175
30.000-40.000	43,7	26,1	21,0	3,1	,9	5,2	257
40.000-60.000	43,6	29,7	15,8	5,7	,7	4,4	372
>60.000	34,3	32,2	16,1	10,8	,0	6,7	156
Total	42,5	28,4	17,9	5,8	,5	5,0	991
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	39,9	28,9	20,4	6,6	,0	4,2	527
Très mauvaise à moyenne	49,2	23,6	19,7	2,1	,5	5,1	298
Total	43,0	27,2	20,2	5,1	,2	4,5	825
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	18,7	14,0	10,0	2,7	,1	1,4	394
Dans le passé	11,8	8,0	3,6	2,1	,2	1,5	256
Modéré (<20)	6,0	3,4	3,4	,6	,0	,7	120
Gros fumeur	6,0	1,9	2,4	,6	,0	1,0	67
Total	42,5	27,2	19,4	6,0	,4	4,5	837

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

1 Plainte ou maladie

2 Examen diagnostique ou préventif

3 Traitement ou prescription

4 Résultat d'un examen

5 Raison administrative

6 Référé ou pour une autre raison

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP06)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	RAISON DU CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE						Total
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	30,7	25,7	31,8	3,0	2,1	6,7	508
Femme	36,4	34,9	22,0	2,8	1,1	2,9	734
Total	34,0	31,1	26,1	2,9	1,5	4,5	1242
GROUPES AGE							
0-14	34,6	22,2	35,2	2,0	2,9	3,2	197
15-24	36,8	18,8	25,3	1,4	,0	17,6	79
25-34	28,4	35,5	26,0	2,6	1,2	6,4	200
35-44	30,4	36,4	28,5	3,1	,0	1,6	173
45-54	35,9	31,1	29,4	1,5	1,1	1,0	184
55-64	40,0	31,8	18,7	4,6	,2	4,7	146
65-74	27,6	46,5	19,1	5,1	,0	1,7	164
75 +	48,1	19,5	15,8	5,0	10,1	1,6	99
Total	34,0	31,1	26,1	2,9	1,5	4,5	1242
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	25,3	17,7	26,6	3,1	7,9	19,3	69
Ecole primaire	44,6	25,2	28,6	1,2	,0	,3	139
Secondaire inférieur	38,1	26,6	31,0	1,3	1,2	1,7	167
Secondaire supérieur	31,5	35,2	23,2	5,2	2,3	2,6	288
Supérieur	32,7	34,4	24,5	2,9	,5	5,0	540
Total	34,2	31,1	25,8	3,0	1,5	4,5	1203
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	24,8	34,7	31,6	4,4	,5	4,0	135
20.000-30.000	31,3	22,1	36,1	1,9	1,2	7,4	267
30.000-40.000	40,1	32,7	15,9	4,1	2,3	4,8	230
40.000-60.000	37,3	32,3	22,4	1,8	2,7	3,6	339
>60.000	29,0	39,4	26,0	4,0	,2	1,5	214
Total	33,2	31,0	26,8	2,9	1,5	4,6	1185
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	31,2	38,0	21,6	3,8	,1	5,3	528
Très mauvaise à moyenne	37,8	28,0	26,1	2,5	1,1	4,5	408
Total	34,2	33,6	23,6	3,2	,5	5,0	936
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	15,4	12,0	11,0	1,0	,1	,6	378
Dans le passé	9,9	11,1	5,8	,8	,0	1,3	298
Modéré (<20)	4,8	6,5	3,7	,7	,4	2,8	155
Gros fumeur	4,0	4,0	3,4	,4	,0	,2	114
Total	34,1	33,7	23,9	2,9	,5	4,9	945

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

1 Plainte ou maladie

2 Examen diagnostique ou préventif

3 Traitement ou prescription

4 Résultat d'un examen

5 Raison administrative

6 Référé ou pour une autre raison

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP06)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	RAISON DU CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE						Total
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	31,1	31,0	27,4	4,6	1,5	4,4	476
Femme	31,9	35,7	25,3	4,0	,7	2,5	704
Total	31,5	33,7	26,2	4,2	1,0	3,3	1180
GROUPES AGE							
0-14	33,2	35,8	20,8	4,2	,7	5,3	221
15-24	37,9	27,3	27,7	4,5	,9	1,8	99
25-34	31,3	37,9	20,7	5,6	2,0	2,6	154
35-44	28,1	24,9	34,0	5,0	2,8	5,2	207
45-54	32,4	38,1	23,3	4,4	,2	1,6	155
55-64	29,7	22,0	43,1	1,6	,0	3,6	113
65-74	29,6	39,2	26,3	3,3	,0	1,7	169
75 +	26,8	62,2	4,6	2,7	,0	3,7	62
Total	31,5	33,7	26,2	4,2	1,0	3,3	1180
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	37,5	29,8	31,5	,0	,0	1,2	40
Ecole primaire	26,8	24,5	42,4	1,1	,0	5,2	158
Secondaire inférieur	28,3	44,7	22,5	2,3	,6	1,6	192
Secondaire supérieur	32,9	29,2	22,9	8,4	1,0	5,7	360
Supérieur	33,8	36,4	22,8	3,4	1,5	2,1	400
Total	32,0	33,9	25,3	4,3	1,0	3,4	1150
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	34,2	43,1	18,7	2,7	,0	1,3	80
20.000-30.000	23,1	31,8	33,6	4,8	1,8	4,8	245
30.000-40.000	39,3	28,5	18,2	4,3	2,5	7,2	286
40.000-60.000	31,9	34,3	28,8	4,0	,3	,7	388
>60.000	28,9	40,6	23,1	4,9	,0	2,4	139
Total	31,5	33,7	26,2	4,3	1,1	3,3	1138
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	31,0	32,9	25,3	4,8	2,3	3,6	463
Très mauvaise à moyenne	33,2	32,9	27,2	4,1	,1	2,5	429
Total	32,1	32,9	26,2	4,5	1,2	3,1	892
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	14,3	14,6	13,4	1,5	,4	1,1	431
Dans le passé	9,0	9,2	3,2	1,7	,4	,9	245
Modéré (<20)	4,3	6,0	4,4	1,1	,0	,4	138
Gros fumeur	4,0	2,7	6,6	,1	,4	,3	108
Total	31,7	32,5	27,6	4,4	1,2	2,7	922

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

1 Plainte ou maladie

2 Examen diagnostique ou préventif

3 Traitement ou prescription

4 Résultat d'un examen

5 Raison administrative

6 Référé ou pour une autre raison

CONSUMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP07R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	PLAINTES/MALADIES/INVESTIGATIONS PRINCIPALES POUR LAQUELLE LE SPECIALISTE A ETE CONSULTE										Total N (*)
	Genito-urinaire	Locomotion	Cardio-vasculaire	Dermatologique	Respiratoire	Digestif	Psychosociale	Neurologique	Endocrine/metabole	Autre ou général	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE											
Homme	7,6	23,7	10,1	13,9	8,6	7,2	7,3	2,6	2,4	16,7	982622
Femme	29,6	16,4	6,6	8,2	4,9	5,6	6,8	4,8	3,2	13,9	1497179
Total	20,9	19,3	8,0	10,5	6,4	6,2	7,0	3,9	2,9	15,0	2479801
GROUPES AGE											
0-14	6,7	13,1	2,0	12,0	21,9	10,4	3,3	2,2	,7	27,6	310013
15-24	18,1	25,3	1,2	24,8	1,6	4,7	3,5	8,4	1,6	10,8	257983
25-34	41,8	14,5	2,8	6,7	3,2	6,1	5,7	6,3	2,9	10,1	451467
35-44	27,7	20,3	5,3	9,8	4,1	4,8	10,1	3,1	3,3	11,5	412472
45-54	15,9	28,7	8,3	8,0	3,0	6,7	12,0	3,0	1,4	13,0	424693
55-64	11,4	15,3	17,0	7,2	5,4	5,6	10,2	3,0	9,8	15,2	258471
65-74	16,1	17,1	21,4	11,8	5,5	5,8	3,4	2,0	1,3	15,6	274093
75 +	7,0	16,3	18,0	3,4	14,3	5,0	1,0	1,0	3,8	30,2	90611
Total	20,9	19,3	8,0	10,5	6,4	6,2	7,0	3,9	2,9	15,0	2479801
NIVEAU INSTRUCTION											
Pas de diplôme	18,3	16,8	17,8	9,1	4,8	8,2	3,5	5,3	1,5	14,6	62818
Ecole primaire	16,8	19,1	9,9	10,1	6,3	6,7	11,6	4,4	3,5	11,7	292674
Secondaire inférieur	18,0	22,5	10,8	7,5	6,8	5,3	6,9	4,6	4,0	13,8	404929
Secondaire supérieur	21,3	20,3	7,1	10,1	5,3	5,9	7,9	4,0	2,1	16,0	715607
Supérieur	22,3	16,7	6,9	12,0	7,1	6,5	5,1	3,5	3,2	16,9	921525
Total	20,5	19,1	8,2	10,3	6,4	6,2	7,0	4,0	3,0	15,4	2397552
REVENU EQUIVALENT (FB)											
< 20.000	17,6	20,8	8,8	7,5	12,9	7,2	7,6	5,6	2,5	9,4	116641
20.000-30.000	19,6	15,9	5,0	8,6	4,2	5,6	13,2	5,0	5,3	17,6	491703
30.000-40.000	18,9	23,4	8,0	7,2	6,9	8,6	6,1	4,4	2,5	14,0	544080
40.000-60.000	20,5	18,9	9,2	13,3	7,2	5,8	6,1	2,2	2,2	14,5	860460
>60.000	28,2	18,1	7,8	13,5	4,3	3,6	3,2	4,9	2,6	13,9	375823
Total	21,0	19,3	7,8	10,7	6,3	6,1	7,2	3,9	3,0	14,7	2388707
SANTE SUBJECTIVE											
Bonne à très bonne	30,1	21,4	5,7	12,5	2,8	4,6	4,0	3,2	1,9	13,7	1215713
Très mauvaise à moyenne	12,0	21,2	12,7	4,2	6,5	7,0	12,2	6,1	5,2	12,9	763502
Total	23,1	21,3	8,4	9,3	4,2	5,5	7,2	4,3	3,2	13,4	1979215
CONSUMMATION DE TABAC											
Jamais	23,7	22,3	7,4	10,6	3,6	5,7	4,9	5,9	3,1	12,8	929746
Dans le passé	28,4	15,1	9,6	6,7	5,8	6,0	7,6	3,0	3,1	14,8	546041
Modéré (<20)	24,8	23,3	10,2	9,9	2,8	7,0	7,0	3,6	1,8	9,6	326808
Gros fumeur	8,1	22,8	6,3	17,2	4,4	3,0	18,3	2,5	6,0	11,3	264067
Total	23,1	20,6	8,3	10,3	4,2	5,6	7,7	4,3	3,3	12,6	2066662
REGION DE RESIDENCE											
Région flamande	23,0	23,2	6,8	11,4	4,7	6,6	5,1	4,2	2,7	12,3	1367453
Région bruxelloise	21,2	16,5	9,3	7,8	6,4	6,8	9,4	1,6	2,3	18,6	316138
Région wallonne	17,0	13,7	9,5	9,9	9,2	5,4	9,3	4,3	3,5	18,1	796209
Belgique	20,9	19,3	8,0	10,5	6,4	6,2	7,0	3,9	2,9	15,0	2479801

(*) Examen physique général ne pas inclus

(**) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP01_1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	PLAINTES/MALADIES/INVESTIGATION PRINCIPALE POUR LAQUELLE LE SPECIALISTE A ETE CONSULTE										Total
	Genito-urinaire	Locomotion	Cardio-vasculaire	Dermatologique	Respiratoire	Digestif	Psychosociale	Neurologique	Endocrine/metabole	Autre ou général	N (**)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE											
Homme	9,1	30,7	9,3	14,9	6,9	8,1	2,8	1,6	2,6	14,0	510213
Femme	31,4	18,7	5,3	9,4	3,4	5,7	6,4	5,8	2,7	11,3	857240
Total	23,0	23,2	6,8	11,4	4,7	6,6	5,1	4,2	2,7	12,3	1367453
GROUPES AGE											
0-14	7,2	13,1	1,7	13,3	18,8	10,0	2,9	2,6	1,3	29,2	158202
15-24	14,8	32,3	,0	19,5	,0	6,3	4,7	12,5	1,8	8,2	142759
25-34	48,3	16,8	,3	5,7	4,0	6,3	4,3	2,0	7,3	5,0	260010
35-44	32,3	24,7	3,5	11,8	1,7	5,0	7,9	1,2	3,5	8,5	227691
45-54	16,9	41,5	4,9	8,7	2,4	8,1	4,9	2,7	1,3	8,7	223246
55-64	12,6	15,9	21,8	10,9	2,0	6,3	7,9	2,2	7,6	12,9	146008
65-74	14,1	15,0	18,7	17,6	5,0	5,7	3,9	2,6	1,3	16,0	166753
75 +	9,1	21,5	18,1	1,9	7,8	3,3	,0	1,7	5,9	30,9	42784
Total	23,0	23,2	6,8	11,4	4,7	6,6	5,1	4,2	2,7	12,3	1367453
NIVEAU INSTRUCTION											
Pas de diplôme	11,2	6,4	14,6	15,7	,0	22,1	,0	8,6	,0	21,4	13181
Ecole primaire	19,2	24,8	11,9	14,7	4,8	6,3	1,2	3,4	2,8	10,9	153554
Secondaire inférieur	16,7	24,2	6,6	11,3	6,0	7,2	8,2	3,0	2,4	14,3	246228
Secondaire supérieur	22,5	24,1	7,7	11,6	4,5	5,4	7,6	5,4	2,0	9,2	420152
Supérieur	26,1	21,4	5,1	10,2	4,0	6,6	2,5	4,6	3,8	15,5	474378
Total	22,2	23,1	7,1	11,5	4,6	6,5	5,1	4,4	2,8	12,8	1307491
REVENU EQUIVALENT (FB)											
< 20.000	19,7	23,3	18,0	3,1	19,6	,0	,0	5,9	2,7	7,7	35851
20.000-30.000	18,7	18,8	4,8	7,0	3,5	8,0	15,3	3,2	5,1	15,6	235754
30.000-40.000	20,4	25,6	6,4	9,1	4,0	10,3	2,7	5,6	3,4	12,5	314600
40.000-60.000	23,3	24,3	7,9	13,9	5,8	6,0	3,6	2,7	1,3	11,2	490785
>60.000	32,2	23,8	4,0	16,4	2,9	1,2	2,0	5,8	2,7	9,0	233353
Total	23,3	23,5	6,6	11,6	4,8	6,4	5,1	4,1	2,8	11,8	1310343
SANTE SUBJECTIVE											
Bonne à très bonne	32,8	25,4	4,9	11,6	1,8	4,8	3,4	4,3	1,8	9,4	749514
Très mauvaise à moyenne	10,7	26,6	11,8	4,8	4,6	8,0	10,3	5,8	5,5	11,8	367069
Total	25,5	25,8	7,1	9,4	2,7	5,8	5,7	4,8	3,0	10,2	1116583
CONSOMMATION DE TABAC											
Jamais	24,6	27,5	6,4	10,0	2,4	5,4	4,6	6,8	2,5	9,9	543062
Dans le passé	35,8	16,9	9,1	5,9	4,4	7,4	3,2	2,3	2,6	12,3	306801
Modéré (<20)	21,5	28,9	7,2	13,2	2,3	9,6	3,4	4,6	2,6	6,8	170539
Gros fumeur	9,3	28,1	4,6	26,7	2,6	1,0	15,7	1,1	5,4	5,5	137549
Total	25,3	25,0	7,0	11,4	3,0	6,0	5,4	4,6	2,9	9,6	1157951

(*) Examen physique général ne pas inclus

(**) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP01_1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	PLAINTES/MALADIES/INVESTIGATION PRINCIPALE POUR LAQUELLE LE SPECIALISTE A ETE CONSULTE										Total
	Genito-urinaire	Locomotion	Cardio-vasculaire	Dermatologique	Respiratoire	Digestif	Psychosociale	Neurologique	Endocrine/metabole	Autre ou général	N (**)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE											
Homme	6,3	16,5	10,5	11,4	8,7	7,8	12,9	2,1	2,6	21,3	127934
Femme	31,4	16,5	8,5	5,4	4,8	6,1	7,1	1,2	2,1	16,8	188205
Total	21,2	16,5	9,3	7,8	6,4	6,8	9,4	1,6	2,3	18,6	316138
GROUPES AGE											
0-14	3,0	14,4	,0	11,2	15,4	10,7	3,1	,0	,6	41,6	36096
15-24	25,8	32,3	6,2	12,2	5,4	2,1	2,9	,0	1,2	12,0	30285
25-34	35,5	8,4	,8	10,2	2,4	6,6	14,6	2,8	2,2	16,4	64575
35-44	29,2	18,1	5,6	9,5	7,9	3,3	10,3	3,3	1,9	10,8	41724
45-54	22,9	13,4	8,0	8,3	5,3	10,2	16,6	2,3	3,2	9,8	54277
55-64	13,3	24,8	11,4	4,3	5,3	6,9	9,4	,5	3,6	20,3	36944
65-74	17,2	12,7	35,9	,9	7,7	6,5	1,9	,4	2,2	14,6	31417
75 +	1,8	18,0	23,7	,5	4,6	6,4	4,3	,9	2,8	36,9	20821
Total	21,2	16,5	9,3	7,8	6,4	6,8	9,4	1,6	2,3	18,6	316138
NIVEAU INSTRUCTION											
Pas de diplôme	5,3	24,3	22,2	10,9	5,8	7,5	4,5	2,0	3,9	13,6	24727
Ecole primaire	19,2	16,7	4,1	6,9	4,8	9,1	19,6	3,6	,0	16,1	43853
Secondaire inférieur	19,3	20,5	16,9	2,2	7,2	5,1	15,2	1,4	4,5	7,5	39906
Secondaire supérieur	24,6	16,4	6,8	8,8	6,8	6,7	2,9	,6	1,3	25,2	64537
Supérieur	23,7	13,8	7,5	8,7	6,1	6,2	8,9	1,3	2,6	21,2	135409
Total	21,2	16,5	9,2	7,8	6,2	6,7	9,6	1,6	2,3	18,9	308432
REVENU EQUIVALENT (FB)											
< 20.000	17,1	19,6	6,4	13,4	3,1	3,8	20,2	1,6	2,4	12,5	33626
20.000-30.000	24,0	13,5	8,3	7,1	5,6	5,7	8,4	3,1	1,8	22,4	83529
30.000-40.000	13,4	24,4	11,5	3,8	9,4	10,3	8,3	,2	3,4	15,1	51670
40.000-60.000	21,9	15,4	10,7	8,3	5,6	6,7	8,8	1,5	3,1	18,0	81273
>60.000	25,1	10,6	7,1	10,0	8,3	8,5	8,5	1,0	1,1	19,7	52347
Total	21,1	16,1	9,1	8,1	6,5	7,0	9,8	1,6	2,4	18,4	302444
SANTE SUBJECTIVE											
Bonne à très bonne	32,1	14,1	7,4	11,7	4,8	6,1	4,8	1,3	2,5	15,2	137372
Très mauvaise à moyenne	12,1	21,3	15,5	3,3	5,6	7,7	16,4	2,8	3,1	12,1	113414
Total	23,1	17,4	11,1	7,9	5,2	6,8	10,1	2,0	2,8	13,8	250786
CONSOMMATION DE TABAC											
Jamais	20,2	19,1	11,4	9,4	5,1	7,3	6,2	2,1	4,0	15,2	99105
Dans le passé	26,1	12,6	12,2	3,3	6,4	4,8	15,2	2,4	1,5	15,5	75389
Modéré (<20)	30,9	24,3	8,0	6,9	3,4	6,6	9,6	,9	,7	8,6	48230
Gros fumeur	11,6	16,5	11,0	14,9	5,4	10,0	13,1	,6	3,7	13,3	31675
Total	22,9	17,8	10,9	7,8	5,2	6,7	10,4	1,8	2,6	13,8	254399

(*) Examen physique général ne pas inclus

(**) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP01_1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	PLAINTES/MALADIES/INVESTIGATION PRINCIPALE POUR LAQUELLE LE SPECIALISTE A ETE CONSULTÉ										Total
	Genito-urinaire	Locomotion	Cardio-vasculaire	Dermatologique	Respiratoire	Digestif	Psychosociale	Neurologique	Endocrine/metabole	Autre ou général	N (**)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE											
Homme	5,8	16,1	11,0	13,3	11,0	5,7	12,0	4,1	2,0	18,9	344475
Femme	25,6	11,9	8,4	7,3	7,8	5,2	7,3	4,4	4,7	17,5	451734
Total	17,0	13,7	9,5	9,9	9,2	5,4	9,3	4,3	3,5	18,1	796209
GROUPES AGE											
0-14	7,3	12,8	3,0	10,5	28,1	11,0	3,8	2,4	,0	21,1	115714
15-24	20,9	10,9	1,5	38,2	2,9	2,9	1,7	4,6	1,6	14,9	84938
25-34	31,5	12,8	8,8	7,0	1,8	5,5	3,9	6,1	5,1	17,4	126882
35-44	19,9	14,0	8,3	6,5	6,8	4,9	13,4	6,1	3,5	16,6	143057
45-54	11,8	14,9	13,7	6,7	2,9	3,3	21,1	3,7	1,0	20,7	147170
55-64	8,0	9,5	10,6	1,4	12,1	3,4	14,9	5,8	17,1	17,1	75519
65-74	20,1	23,6	21,5	3,5	5,6	5,8	2,7	1,4	,8	15,0	75922
75 +	7,6	6,8	13,4	8,0	31,9	6,8	,0	,0	1,4	24,1	27006
Total	17,0	13,7	9,5	9,9	9,2	5,4	9,3	4,3	3,5	18,1	796209
NIVEAU INSTRUCTION											
Pas de diplôme	35,0	14,8	15,2	3,9	6,2	1,6	4,4	6,8	,0	12,1	24910
Ecole primaire	11,8	11,1	9,3	4,0	9,3	6,1	24,6	6,5	6,4	10,9	95267
Secondaire inférieur	20,0	19,6	17,4	1,3	8,4	1,2	1,4	8,9	7,0	14,7	118796
Secondaire supérieur	18,2	14,5	6,0	7,6	6,4	6,6	9,8	2,5	2,6	25,8	230918
Supérieur	15,9	10,7	9,2	16,0	12,2	6,3	7,2	2,9	2,5	17,0	311738
Total	17,3	13,4	9,7	9,4	9,3	5,4	9,1	4,3	3,6	18,4	781629
REVENU EQUIVALENT (FB)											
< 20.000	16,5	19,8	3,5	6,7	14,7	15,2	4,3	8,2	2,4	8,5	47163
20.000-30.000	18,6	13,0	3,8	11,5	4,6	2,3	12,6	8,4	7,2	18,1	172421
30.000-40.000	17,8	19,2	9,9	5,0	11,3	5,2	11,3	3,4	,6	16,3	177810
40.000-60.000	15,4	10,8	11,0	13,7	9,9	5,1	9,6	1,7	3,7	19,1	288403
>60.000	19,6	7,4	17,9	8,0	5,9	6,8	3,1	4,7	3,4	23,2	90123
Total	17,2	13,4	9,5	10,1	8,8	5,3	9,6	4,3	3,6	18,1	775920
SANTE SUBJECTIVE											
Bonne à très bonne	23,3	15,1	6,8	15,0	4,4	3,5	5,1	1,5	2,0	23,1	328827
Très mauvaise à moyenne	13,7	14,3	12,8	3,6	9,2	5,6	12,9	7,8	5,6	14,6	283019
Total	18,9	14,7	9,6	9,7	6,7	4,5	8,7	4,4	3,7	19,2	611846
CONSOMMATION DE TABAC											
Jamais	23,2	13,7	7,8	12,3	5,3	5,8	5,1	5,4	3,9	17,5	287579
Dans le passé	15,4	12,7	9,3	9,5	8,1	4,0	12,4	4,5	4,7	19,2	163851
Modéré (<20)	27,3	14,1	15,9	6,1	3,4	3,1	11,4	3,2	1,1	14,4	108039
Gros fumeur	5,2	17,2	7,2	4,2	6,8	3,6	24,0	5,1	7,8	19,0	94842
Total	19,3	14,0	9,4	9,4	5,9	4,6	10,7	4,8	4,2	17,6	654312

(*) Examen physique général ne pas inclus

(**) N = Nombre de contacts mentionnés

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP08R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	LIEU DU CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE			Total
	Hôpital	Cabinet privé	Autre endroit	N (*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	63,6	33,0	3,5	1396
Femme	56,1	40,7	3,2	2045
Total	59,1	37,6	3,3	3441
GROUPES AGE				
0-14	47,9	45,2	6,9	577
15-24	61,3	35,5	3,2	260
25-34	54,6	42,2	3,2	525
35-44	56,0	40,8	3,2	500
45-54	64,4	33,7	1,9	479
55-64	65,0	35,0	,0	397
65-74	71,0	27,3	1,7	479
75 +	62,4	28,9	8,7	224
Total	59,1	37,6	3,3	3441
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	76,3	23,7	,0	124
Ecole primaire	71,5	25,7	2,7	408
Secondaire inférieur	65,6	31,0	3,5	556
Secondaire supérieur	58,9	37,1	4,0	931
Supérieur	51,0	45,8	3,2	1308
Total	58,8	37,8	3,4	3327
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	66,6	27,3	6,1	244
20.000-30.000	67,9	28,9	3,2	670
30.000-40.000	56,4	40,0	3,5	769
40.000-60.000	57,3	39,5	3,2	1110
>60.000	56,6	40,7	2,7	509
Total	59,6	37,1	3,3	3302
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	54,7	43,1	2,2	1501
Très mauvaise à moyenne	67,5	29,7	2,9	1137
Total	59,7	37,9	2,5	2638
REGION DE RESIDENCE				
Région flamande	57,9	39,6	2,6	1047
Région bruxelloise	58,6	37,3	4,2	1223
Région wallonne	61,4	34,5	4,1	1171
Belgique	59,1	37,6	3,3	3441
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	58,7	38,4	2,9	1182
Dans le passé	62,4	36,1	1,5	798
Modéré (<20)	55,0	41,7	3,2	420
Gros fumeur	73,8	23,6	2,6	291
Total	61,0	36,5	2,5	2691

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP08R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	LIEU DU CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE			Total
	Hôpital	Cabinet privé	Autre endroit	N (*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	66,3	31,6	2,1	412
Femme	52,8	44,3	2,8	635
Total	57,9	39,6	2,6	1047
GROUPES AGE				
0-14	43,2	48,3	8,5	164
15-24	59,9	36,5	3,5	88
25-34	55,5	43,3	1,2	182
35-44	59,0	40,6	,5	129
45-54	62,6	35,9	1,5	129
55-64	58,0	42,0	,0	137
65-74	69,4	29,7	,9	155
75 +	58,3	30,7	11,0	63
Total	57,9	39,6	2,6	1047
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	49,4	50,6	,0	15
Ecole primaire	68,2	31,0	,9	117
Secondaire inférieur	60,3	36,6	3,1	194
Secondaire supérieur	60,4	36,7	2,9	297
Supérieur	49,9	47,1	2,9	375
Total	57,3	40,0	2,7	998
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	55,7	41,4	2,9	32
20.000-30.000	66,7	31,8	1,5	174
30.000-40.000	52,3	44,0	3,7	264
40.000-60.000	57,7	39,2	3,1	378
>60.000	61,8	36,7	1,5	156
Total	58,7	38,6	2,7	1004
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	56,4	42,0	1,6	536
Très mauvaise à moyenne	63,4	35,0	1,6	301
Total	58,7	39,7	1,6	837
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	59,3	38,8	1,9	402
Dans le passé	58,5	40,1	1,4	252
Modéré (<20)	54,4	43,6	2,0	128
Gros fumeur	77,2	21,7	1,1	67
Total	60,5	37,8	1,7	849

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP08R)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	LIEU DU CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE			Total
	Hôpital	Cabinet privé	Autre endroit	N (*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	57,4	37,2	5,4	500
Femme	59,4	37,3	3,3	723
Total	58,6	37,3	4,2	1223
GROUPES AGE				
0-14	35,8	56,7	7,4	191
15-24	70,4	25,6	3,9	75
25-34	53,8	38,1	8,1	193
35-44	53,1	44,6	2,3	170
45-54	67,5	30,9	1,5	188
55-64	62,5	37,2	,3	150
65-74	77,2	20,8	2,0	157
75 +	59,2	34,7	6,1	99
Total	58,6	37,3	4,2	1223
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	82,7	17,3	,0	70
Ecole primaire	69,2	21,6	9,2	139
Secondaire inférieur	75,4	21,7	2,8	166
Secondaire supérieur	57,8	36,0	6,3	273
Supérieur	45,4	51,7	2,9	540
Total	58,1	37,7	4,2	1188
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	64,1	21,9	14,0	131
20.000-30.000	61,7	36,0	2,3	257
30.000-40.000	68,0	29,1	2,8	227
40.000-60.000	55,6	41,2	3,2	339
>60.000	48,0	50,3	1,7	214
Total	59,0	37,2	3,9	1168
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	53,1	43,9	2,9	510
Très mauvaise à moyenne	69,5	26,5	3,9	412
Total	60,6	36,0	3,4	922
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	62,5	35,3	2,2	366
Dans le passé	56,4	42,8	,8	296
Modéré (<20)	50,9	41,1	8,0	152
Gros fumeur	81,6	15,1	3,3	116
Total	60,8	36,1	3,0	930

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP08R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	LIEU DU CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE			Total
	Hôpital	Cabinet privé	Autre endroit	N (*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	62,1	33,3	4,6	484
Femme	60,9	35,4	3,8	687
Total	61,4	34,5	4,1	1171
GROUPES AGE				
0-14	57,3	38,0	4,7	222
15-24	60,5	37,1	2,4	97
25-34	53,1	42,0	4,9	150
35-44	51,9	40,2	7,9	201
45-54	65,9	31,6	2,5	162
55-64	79,0	21,0	,0	110
65-74	72,1	24,8	3,1	167
75 +	71,9	21,3	6,9	62
Total	61,4	34,5	4,1	1171
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	84,1	15,9	,0	39
Ecole primaire	78,0	19,3	2,7	152
Secondaire inférieur	72,7	22,9	4,5	196
Secondaire supérieur	56,7	38,1	5,3	361
Supérieur	54,9	41,2	3,8	393
Total	61,7	34,2	4,1	1141
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	76,7	20,6	2,7	81
20.000-30.000	72,5	21,5	6,0	239
30.000-40.000	60,0	36,6	3,4	278
40.000-60.000	56,9	39,7	3,4	393
>60.000	48,3	45,3	6,4	139
Total	61,2	34,5	4,3	1130
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	51,5	45,1	3,4	455
Très mauvaise à moyenne	71,9	24,1	4,1	424
Total	61,0	35,3	3,7	879
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	56,3	38,7	5,0	414
Dans le passé	72,1	25,8	2,1	250
Modéré (<20)	57,9	39,0	3,1	140
Gros fumeur	66,2	29,3	4,5	108
Total	62,0	34,2	3,9	912

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP09)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE		Total
	Première consultation	Visite de contrôle	N(*)
	%	%	
SEXE			
Homme	34,4	65,6	1379
Femme	28,7	71,3	1985
Total	31,0	69,0	3364
GROUPES AGE			
0-14	36,6	63,4	568
15-24	46,9	53,1	249
25-34	30,2	69,8	515
35-44	28,8	71,2	491
45-54	28,8	71,2	469
55-64	27,4	72,6	390
65-74	19,2	80,8	461
75 +	31,0	69,0	221
Total	31,0	69,0	3364
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	30,4	69,6	122
Ecole primaire	23,7	76,3	398
Secondaire inférieur	35,6	64,4	535
Secondaire supérieur	30,8	69,2	914
Supérieur	31,4	68,6	1283
Total	31,0	69,0	3252
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	30,0	70,0	240
20.000-30.000	32,8	67,2	643
30.000-40.000	31,0	69,0	754
40.000-60.000	29,7	70,3	1095
>60.000	31,3	68,7	496
Total	30,9	69,1	3228
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	33,6	66,4	1476
Très mauvaise à moyenne	24,8	75,2	1100
Total	30,2	69,8	2576
REGION DE RESIDENCE			
Région flamande	29,8	70,2	1040
Région bruxelloise	27,0	73,0	1185
Région wallonne	34,8	65,2	1139
Belgique	31,0	69,0	3364
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	28,0	72,0	1156
Dans le passé	28,8	71,2	772
Modéré (<20)	31,9	68,1	413
Gros fumeur	35,6	64,4	285
Total	29,8	70,2	2626

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP09)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE		Total
	Première consultation	Visite de contrôle	N
	%	%	
SEXE			
Homme	33,5	66,5	411
Femme	27,5	72,5	629
Total	29,8	70,2	1040
GROUPES AGE			
0-14	34,9	65,1	164
15-24	51,1	48,9	88
25-34	28,1	71,9	179
35-44	29,8	70,2	127
45-54	28,0	72,0	129
55-64	23,7	76,3	136
65-74	17,3	82,7	154
75 +	21,6	78,4	63
Total	29,8	70,2	1040
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	23,6	76,4	15
Ecole primaire	21,7	78,3	117
Secondaire inférieur	40,4	59,6	193
Secondaire supérieur	25,4	74,6	295
Supérieur	30,5	69,5	371
Total	29,6	70,4	991
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	13,3	86,7	32
20.000-30.000	42,1	57,9	174
30.000-40.000	24,2	75,8	264
40.000-60.000	27,6	72,4	371
>60.000	32,2	67,8	156
Total	29,8	70,2	997
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	32,2	67,8	531
Très mauvaise à moyenne	21,9	78,1	299
Total	28,8	71,2	830
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	26,6	73,4	403
Dans le passé	27,0	73,0	247
Modéré (<20)	32,0	68,0	127
Gros fumeur	38,7	61,3	65
Total	28,9	71,1	842

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP09)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE		Total
	Première consultation	Visite de contrôle	N
	%	%	
SEXE			
Homme	28,8	71,2	491
Femme	25,7	74,3	694
Total	27,0	73,0	1185
GROUPES AGE			
0-14	33,1	66,9	185
15-24	35,0	65,0	74
25-34	21,2	78,8	189
35-44	24,3	75,7	165
45-54	24,5	75,5	183
55-64	38,5	61,5	146
65-74	17,3	82,7	146
75 +	25,1	74,9	97
Total	27,0	73,0	1185
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	28,1	71,9	68
Ecole primaire	24,0	76,0	129
Secondaire inférieur	25,2	74,8	159
Secondaire supérieur	29,2	70,8	267
Supérieur	26,8	73,2	529
Total	26,8	73,2	1152
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	25,3	74,7	127
20.000-30.000	19,2	80,8	243
30.000-40.000	31,8	68,2	219
40.000-60.000	31,9	68,1	333
>60.000	23,5	76,5	209
Total	26,2	73,8	1131
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	30,0	70,0	500
Très mauvaise à moyenne	22,4	77,6	391
Total	26,6	73,4	891
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	26,3	73,7	349
Dans le passé	26,1	73,9	287
Modéré (<20)	18,8	81,2	150
Gros fumeur	31,4	68,6	113
Total	25,4	74,6	899

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP09)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE		Total
	Première consultation	Visite de contrôle	N
	%	%	
SEXE			
Homme	37,8	62,2	477
Femme	32,3	67,7	662
Total	34,8	65,2	1139
GROUPES AGE			
0-14	39,7	60,3	219
15-24	43,6	56,4	87
25-34	39,7	60,3	147
35-44	28,5	71,5	199
45-54	31,9	68,1	157
55-64	28,8	71,2	108
65-74	24,3	75,7	161
75 +	51,8	48,2	61
Total	34,8	65,2	1139
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	36,4	63,6	39
Ecole primaire	26,8	73,2	152
Secondaire inférieur	29,2	70,8	183
Secondaire supérieur	41,2	58,8	352
Supérieur	34,7	65,3	383
Total	34,9	65,1	1109
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	45,9	54,1	81
20.000-30.000	26,5	73,5	226
30.000-40.000	42,3	57,7	271
40.000-60.000	32,8	67,2	391
>60.000	33,9	66,1	131
Total	34,6	65,4	1100
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	38,3	61,7	445
Très mauvaise à moyenne	29,7	70,3	410
Total	34,3	65,7	855
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	31,6	68,4	404
Dans le passé	33,2	66,8	238
Modéré (<20)	38,0	62,0	136
Gros fumeur	32,6	67,4	107
Total	33,2	66,8	885

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP10R)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	PERSONNE QUI A PRIS L'INITIATIVE DU CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE			Total
	Patient lui-même	Généraliste	Autre	N (*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	53,8	33,9	12,2	470
Femme	53,2	36,7	10,0	579
Total	53,5	35,5	11,0	1049
GROUPE AGE				
0-14	61,5	23,5	15,0	231
15-24	55,8	28,7	15,6	106
25-34	60,6	30,5	8,9	149
35-44	55,5	35,0	9,5	139
45-54	48,5	42,0	9,4	131
55-64	46,7	41,5	11,8	120
65-74	30,3	64,6	5,1	109
75 +	40,6	55,6	3,8	64
Total	53,5	35,5	11,0	1049
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	35,6	51,9	12,6	41
Ecole primaire	33,5	57,3	9,2	107
Secondaire inférieur	39,3	51,0	9,7	158
Secondaire supérieur	55,2	33,3	11,5	306
Supérieur	64,3	24,7	11,0	398
Total	53,4	35,9	10,8	1010
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	45,9	44,9	9,3	76
20.000-30.000	37,7	47,9	14,3	188
30.000-40.000	57,8	31,5	10,7	248
40.000-60.000	58,6	31,5	9,9	336
>60.000	61,3	28,6	10,1	145
Total	53,9	35,1	11,0	993
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	57,9	34,3	7,8	480
Très mauvaise à moyenne	38,6	45,2	16,3	278
Total	51,7	37,8	10,5	758
REGION DE RESIDENCE				
Région flamande	50,0	37,9	12,1	307
Région bruxelloise	56,4	30,2	13,4	331
Région wallonne	57,7	33,6	8,7	411
Belgique	53,5	35,5	11,0	1049
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	61,5	29,0	9,6	331
Dans le passé	42,0	48,7	9,3	217
Modéré (<20)	51,6	36,9	11,5	123
Gros fumeur	40,7	46,3	13,0	87
Total	51,9	37,8	10,3	758

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP10)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PERSONNE QUI A PRIS L'INITIATIVE DU CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE			Total
	Patient lui-même	Généraliste	Autre	N (*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	51,1	36,2	12,7	131
Femme	49,2	39,1	11,7	176
Total	50,0	37,9	12,1	307
GROUPES AGE				
0-14	62,0	21,1	16,9	62
15-24	47,0	35,3	17,7	39
25-34	59,4	31,6	9,0	48
35-44	51,2	34,3	14,5	37
45-54	39,7	53,4	7,0	39
55-64	55,0	33,9	11,1	34
65-74	26,5	68,0	5,5	32
75 +	25,7	74,3	,0	16
Total	50,0	37,9	12,1	307
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	66,8	13,6	19,6	3
Ecole primaire	20,0	76,1	3,9	25
Secondaire inférieur	32,3	55,4	12,4	60
Secondaire supérieur	58,7	30,4	10,9	85
Supérieur	59,9	25,5	14,6	118
Total	49,3	38,5	12,2	291
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	73,1	18,6	8,3	6
20.000-30.000	31,1	54,7	14,2	57
30.000-40.000	53,1	34,6	12,3	68
40.000-60.000	54,6	33,4	12,0	109
>60.000	63,0	26,6	10,4	54
Total	50,5	37,3	12,3	294
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	53,7	37,6	8,7	170
Très mauvaise à moyenne	30,8	48,5	20,7	60
Total	47,9	40,3	11,8	230
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	56,5	32,1	11,4	109
Dans le passé	34,9	58,9	6,2	63
Modéré (<20)	53,1	33,5	13,4	41
Gros fumeur	35,6	44,9	19,5	20
Total	47,6	40,7	11,7	233

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP10)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PERSONNE QUI A PRIS L'INITIATIVE DU CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE			Total
	Patient lui-même	Généraliste	Autre	N (*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	59,2	27,0	13,8	155
Femme	54,1	32,7	13,1	176
Total	56,4	30,2	13,4	331
GROUPE AGE				
0-14	80,0	5,4	14,6	70
15-24	44,2	44,3	11,5	25
25-34	62,3	30,5	7,2	42
35-44	65,6	27,3	7,1	44
45-54	48,9	38,3	12,8	44
55-64	43,9	31,9	24,2	50
65-74	47,9	33,8	18,3	31
75 +	42,8	47,2	10,0	25
Total	56,4	30,2	13,4	331
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	45,4	48,7	5,9	24
Ecole primaire	59,0	17,8	23,2	33
Secondaire inférieur	60,5	32,1	7,4	37
Secondaire supérieur	54,6	31,3	14,1	79
Supérieur	57,6	28,5	13,9	148
Total	56,4	30,0	13,6	321
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	46,2	43,7	10,1	31
20.000-30.000	58,8	20,4	20,8	56
30.000-40.000	68,0	26,8	5,2	71
40.000-60.000	54,6	31,5	13,9	100
>60.000	47,6	35,1	17,3	50
Total	56,0	30,3	13,6	308
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	55,1	35,4	9,5	144
Très mauvaise à moyenne	41,9	36,7	21,4	92
Total	50,1	35,9	14,0	236
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	64,4	21,4	14,2	90
Dans le passé	45,2	38,6	16,2	72
Modéré (<20)	34,6	46,9	18,4	34
Gros fumeur	50,3	46,3	3,5	32
Total	52,2	34,0	13,8	228

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP10)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PERSONNE QUI A PRIS L'INITIATIVE DU CONTACT AVEC LE MEDECIN SPECIALISTE			Total
	Patient lui-même	Généraliste	Autre	N (*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	55,9	33,0	11,2	184
Femme	59,6	34,2	6,2	227
Total	57,7	33,6	8,7	411
GROUPES AGE				
0-14	56,6	30,4	12,9	99
15-24	77,2	10,4	12,4	42
25-34	62,0	28,7	9,3	59
35-44	60,3	38,0	1,7	58
45-54	60,3	28,0	11,7	48
55-64	36,1	59,3	4,6	36
65-74	31,5	67,8	,7	46
75 +	50,6	45,3	4,1	23
Total	57,7	33,6	8,7	411
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	17,0	67,6	15,4	14
Ecole primaire	41,0	48,6	10,4	49
Secondaire inférieur	53,4	44,0	2,6	61
Secondaire supérieur	51,4	37,0	11,6	142
Supérieur	72,3	22,5	5,2	132
Total	58,2	33,9	7,9	398
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	39,7	51,2	9,1	39
20.000-30.000	44,6	42,9	12,5	75
30.000-40.000	60,2	29,5	10,2	109
40.000-60.000	65,4	28,7	5,9	127
>60.000	62,9	31,2	5,9	41
Total	58,2	33,4	8,4	391
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	66,8	27,8	5,5	166
Très mauvaise à moyenne	45,3	44,4	10,3	126
Total	58,3	34,4	7,4	292
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	68,8	26,0	5,2	132
Dans le passé	51,3	37,2	11,5	82
Modéré (<20)	53,6	39,2	7,2	48
Gros fumeur	46,2	48,9	4,9	35
Total	58,4	34,5	7,1	297

(*) N = Nombre de contacts mentionnés

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP11)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	DUREE (JOURS) ENTRE LE MOMENT DE LA REFERENCE OU LA CONVOCATION ET LE CONTACT AVEC LE SPECIALISTE(*)				
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
SEXE					
Homme	12,3	2	6	10	171
Femme	10,1	1	5	8	208
Total	11,0	2	5	8	379
GROUPE AGE					
0-14	13,1	1	7	10	46
15-24	13,5	1	5	10	28
25-34	6,7	2	4	7	52
35-44	11,0	2	5	14	48
45-54	17,0	1	5	15	60
55-64	6,2	2	7	7	55
65-74	6,9	2	4	7	56
75 +	7,9	2	5	9	34
Total	11,0	2	5	8	379
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	7,2	2	7	11	22
Ecole primaire	5,1	1	2	7	45
Secondaire inférieur	16,6	3	7	14	75
Secondaire supérieur	11,7	2	7	10	108
Supérieur	9,1	1	4	7	113
Total	11,2	1	5	8	363
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	7,4	1	6	8	34
20.000-30.000	12,9	2	7	14	77
30.000-40.000	13,9	2	6	9	82
40.000-60.000	6,5	1	4	7	112
>60.000	18,1	3	7	10	48
Total	11,3	2	5	8	353
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	11,5	1	5	8	171
Très mauvaise à moyenne	10,4	2	7	9	141
Total	11,1	1	5	8	312
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	7,4	1	4	7	113
Dans le passé	11,4	1	5	13	104
Modéré (<20)	6,2	2	6	7	53
Gros fumeur	21,7	2	6	30	37
Total	10,5	1	5	8	307
REGION DE RESIDENCE					
Région flamande	13,8	1	5	14	108
Région bruxelloise	11,3	2	7	8	113
Région wallonne	6,9	2	5	7	158
Belgique	11,0	2	5	8	379

(*) N = Nombre de contacts mentionnés où le patient a été référé ou appelé par le généraliste ou le spécialiste

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP11)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	DUREE (JOURS) ENTRE LE MOMENT DE LA REFERENCE OU LA CONVOCATION ET LE CONTACT AVEC LE SPECIALISTE(*)				
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
SEXE					
Homme	16,8	2	7	19	46
Femme	11,7	1	4	10	62
Total	13,8	1	5	14	108
GROUPES AGE					
0-14	18,2	4	14	14	12
15-24	15,2	1	5	30	9
25-34	7,7	2	4	10	17
35-44	14,0	2	4	14	14
45-54	23,2	1	7	30	18
55-64	6,3	4	7	7	12
65-74	5,8	1	3	7	18
75 +	3,8	1	2	7	8
Total	13,8	1	5	14	108
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	5,0	5	5	5	1
Ecole primaire	3,7	1	1	2	12
Secondaire inférieur	20,0	2	10	30	28
Secondaire supérieur	17,7	2	7	18	24
Supérieur	8,7	1	3	4	36
Total	14,2	1	5	14	101
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	2,5	0	3	5	2
20.000-30.000	15,7	1	10	30	25
30.000-40.000	23,8	2	9	21	22
40.000-60.000	5,9	1	4	7	36
>60.000	20,8	1	4	10	17
Total	14,3	1	6	14	102
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	14,3	1	4	14	59
Très mauvaise à moyenne	12,3	1	7	9	34
Total	13,6	1	4	14	93
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	5,3	1	4	7	37
Dans le passé	14,1	1	4	14	37
Modéré (<20)	5,6	1	3	7	14
Gros fumeur	43,4	30	30	30	6
Total	12,8	1	4	10	94

(*) N = Nombre de contacts mentionnés où le patient a été référé ou appelé par le généraliste ou le spécialiste

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP11)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	DUREE (JOURS) ENTRE LE MOMENT DE LA REFERENCE OU LA CONVOCATION ET LE CONTACT AVEC LE SPECIALISTE(*)				
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
SEXE					
Homme	11,3	2	7	8	52
Femme	11,3	2	7	8	61
Total	11,3	2	7	8	113
GROUPES AGE					
0-14	5,9	3	6	7	8
15-24	12,4	1	3	7	9
25-34	5,3	2	7	7	14
35-44	6,2	1	3	8	14
45-54	17,5	3	8	30	22
55-64	8,7	3	7	8	24
65-74	11,1	2	7	8	10
75 +	18,5	8	10	28	12
Total	11,3	2	7	8	113
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	4,2	1	2	8	11
Ecole primaire	9,0	7	8	8	10
Secondaire inférieur	5,1	1	1	4	14
Secondaire supérieur	7,2	2	3	8	26
Supérieur	17,4	5	7	14	47
Total	11,3	2	7	8	108
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	5,3	2	3	7	14
20.000-30.000	8,0	2	8	8	13
30.000-40.000	10,4	5	7	10	21
40.000-60.000	9,1	1	7	10	38
>60.000	25,2	3	8	14	19
Total	11,3	2	7	8	105
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	10,9	2	7	8	57
Très mauvaise à moyenne	13,0	1	7	10	39
Total	11,7	2	7	8	96
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	21,6	8	10	15	31
Dans le passé	10,2	3	5	15	28
Modéré (<20)	5,9	0	5	7	16
Gros fumeur	4,3	1	1	4	14
Total	12,0	2	7	10	89

(*) N = Nombre de contacts mentionnés où le patient a été référé ou appelé par le généraliste ou le spécialiste

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE SPECIALISTE (INDICATEUR : SP11)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	DUREE (JOURS) ENTRE LE MOMENT DE LA REFERENCE OU LA CONVOCATION ET LE CONTACT AVEC LE SPECIALISTE(*)				
	Moyenne	P 25	Médiane	P 75	N
SEXE					
Homme	6,9	2	4	7	73
Femme	6,9	3	5	7	85
Total	6,9	2	5	7	158
GROUPES AGE					
0-14	10,2	1	2	7	26
15-24	8,3	4	7	7	10
25-34	5,6	3	5	7	21
35-44	6,9	3	6	8	20
45-54	5,8	2	5	7	20
55-64	4,6	2	2	7	19
65-74	7,5	2	5	7	28
75 +	6,4	3	3	7	14
Total	6,9	2	5	7	158
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	8,8	5	7	15	10
Ecole primaire	5,7	2	3	7	23
Secondaire inférieur	8,1	3	7	10	33
Secondaire supérieur	7,8	2	6	7	58
Supérieur	5,4	2	4	5	30
Total	7,0	2	5	7	154
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	8,6	1	7	15	18
20.000-30.000	7,8	2	5	14	39
30.000-40.000	5,8	2	4	7	39
40.000-60.000	6,5	2	4	7	38
>60.000	7,9	4	7	8	12
Total	7,0	2	5	7	146
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	5,5	2	5	7	55
Très mauvaise à moyenne	7,5	3	7	8	68
Total	6,5	2	6	7	123
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	6,6	3	5	7	45
Dans le passé	6,2	2	5	7	39
Modéré (<20)	6,9	2	7	7	23
Gros fumeur	5,4	2	3	7	17
Total	6,3	2	5	7	124

(*) N = Nombre de contacts mentionnés où le patient a été référé ou appelé par le généraliste ou le spécialiste