

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : WB01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PROBLEMES DE SANTE PSYCHIQUE | | Total |
|-------------------------------|---------------------------------|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 26,3 | 73,7 | 3977 |
| Femme | 35,8 | 64,2 | 4235 |
| Total | 31,0 | 69,0 | 8212 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 32,8 | 67,2 | 1100 |
| 25-34 | 30,9 | 69,1 | 1585 |
| 35-44 | 34,3 | 65,7 | 1565 |
| 45-54 | 29,2 | 70,8 | 1258 |
| 55-64 | 26,7 | 73,3 | 1061 |
| 65-74 | 29,9 | 70,1 | 1030 |
| 75 + | 30,5 | 69,5 | 613 |
| Total | 31,0 | 69,0 | 8212 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 26,9 | 73,1 | 270 |
| Primaire | 36,3 | 63,7 | 1153 |
| Secondaire inférieur | 31,5 | 68,5 | 1395 |
| Secondaire supérieur | 28,9 | 71,1 | 2347 |
| Supérieur | 31,3 | 68,7 | 2714 |
| Total | 31,0 | 69,0 | 7879 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 33,3 | 66,7 | 584 |
| 20.000-30.000 | 35,3 | 64,7 | 1620 |
| 30.000-40.000 | 33,1 | 66,9 | 1923 |
| 40.000-60.000 | 28,2 | 71,8 | 2618 |
| >60.000 | 28,8 | 71,2 | 1096 |
| Total | 31,2 | 68,8 | 7841 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 25,4 | 74,6 | 5897 |
| Très mauvaise à moyenne | 52,2 | 47,8 | 2014 |
| Total | 31,2 | 68,8 | 7911 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 28,5 | 71,5 | 3711 |
| Dans le passé | 31,5 | 68,5 | 1916 |
| Modéré (< 20) | 32,0 | 68,0 | 1570 |
| Gros fumeur | 38,3 | 61,7 | 829 |
| Total | 30,9 | 69,1 | 8026 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 27,7 | 72,3 | 2914 |
| Région Bruxelloise | 36,8 | 63,2 | 2397 |
| Région Wallonne | 35,2 | 64,8 | 2901 |
| Belgique | 31,0 | 69,0 | 8212 |

Personnes de 15 ans et plus

* : seuil pour le score GHQ12 : [2-12] : oui; [0-1] : non

REGIO: 1 Région Flamande

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : WB01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PROBLEMES DE SANTE PSYCHIQUE | | Total |
|-------------------------------|---------------------------------|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 24,0 | 76,0 | 1448 |
| Femme | 31,5 | 68,5 | 1466 |
| Total | 27,7 | 72,3 | 2914 |
| GROUPES AGE | | | |
| 15-24 | 28,9 | 71,1 | 416 |
| 25-34 | 29,0 | 71,0 | 580 |
| 35-44 | 31,5 | 68,5 | 527 |
| 45-54 | 24,4 | 75,6 | 458 |
| 55-64 | 24,3 | 75,7 | 401 |
| 65-74 | 24,8 | 75,2 | 351 |
| 75 + | 28,7 | 71,3 | 181 |
| Total | 27,7 | 72,3 | 2914 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 16,0 | 84,0 | 55 |
| Primaire | 34,1 | 65,9 | 392 |
| Secondaire inférieur | 27,0 | 73,0 | 532 |
| Secondaire supérieur | 26,0 | 74,0 | 964 |
| Supérieur | 28,5 | 71,5 | 862 |
| Total | 27,8 | 72,2 | 2805 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 30,6 | 69,4 | 97 |
| 20.000-30.000 | 28,5 | 71,5 | 521 |
| 30.000-40.000 | 30,8 | 69,2 | 717 |
| 40.000-60.000 | 25,4 | 74,6 | 1023 |
| >60.000 | 27,4 | 72,6 | 391 |
| Total | 27,7 | 72,3 | 2749 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 22,8 | 77,2 | 2273 |
| Très mauvaise à moyenne | 51,2 | 48,8 | 569 |
| Total | 28,0 | 72,0 | 2842 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 25,0 | 75,0 | 1372 |
| Dans le passé | 30,0 | 70,0 | 702 |
| Modéré (< 20) | 28,7 | 71,3 | 559 |
| Gros fumeur | 34,3 | 65,7 | 241 |
| Total | 27,8 | 72,2 | 2874 |

Personnes de 15 ans et plus

* : seuil pour le score GHQ12 : [2-12] : oui; [0-1] : non

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : WB01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PROBLEMES DE SANTE PSYCHIQUE | | Total |
|-------------------------------|---------------------------------|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 30,8 | 69,2 | 1151 |
| Femme | 42,2 | 57,8 | 1246 |
| Total | 36,8 | 63,2 | 2397 |
| GROUPE AGE | | | |
| 15-24 | 39,7 | 60,3 | 291 |
| 25-34 | 34,8 | 65,2 | 469 |
| 35-44 | 38,2 | 61,8 | 462 |
| 45-54 | 37,6 | 62,4 | 367 |
| 55-64 | 35,5 | 64,5 | 294 |
| 65-74 | 33,7 | 66,3 | 305 |
| 75 + | 37,8 | 62,2 | 209 |
| Total | 36,8 | 63,2 | 2397 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 24,5 | 75,5 | 116 |
| Primaire | 44,1 | 55,9 | 307 |
| Secondaire inférieur | 40,2 | 59,8 | 338 |
| Secondaire supérieur | 35,8 | 64,2 | 554 |
| Supérieur | 35,0 | 65,0 | 959 |
| Total | 36,4 | 63,6 | 2274 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 32,0 | 68,0 | 259 |
| 20.000-30.000 | 50,3 | 49,7 | 467 |
| 30.000-40.000 | 36,2 | 63,8 | 493 |
| 40.000-60.000 | 31,1 | 68,9 | 646 |
| >60.000 | 33,5 | 66,5 | 420 |
| Total | 37,0 | 63,0 | 2285 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 29,1 | 70,9 | 1675 |
| Très mauvaise à moyenne | 61,5 | 38,5 | 619 |
| Total | 37,2 | 62,8 | 2294 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 33,6 | 66,4 | 1014 |
| Dans le passé | 32,9 | 67,1 | 558 |
| Modéré (< 20) | 41,9 | 58,1 | 460 |
| Gros fumeur | 44,8 | 55,2 | 276 |
| Total | 36,6 | 63,4 | 2308 |

Personnes de 15 ans et plus

* : seuil pour le score GHQ12 : [2-12] : oui; [0-1] : non

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : WB01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | PROBLEMES DE SANTE PSYCHIQUE | | Total |
|-------------------------------|---------------------------------|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 29,2 | 70,8 | 1378 |
| Femme | 41,1 | 58,9 | 1523 |
| Total | 35,2 | 64,8 | 2901 |
| GROUPE AGE | | | |
| 15-24 | 37,3 | 62,7 | 393 |
| 25-34 | 33,3 | 66,7 | 536 |
| 35-44 | 38,4 | 61,6 | 576 |
| 45-54 | 35,9 | 64,1 | 433 |
| 55-64 | 29,1 | 70,9 | 366 |
| 65-74 | 36,3 | 63,7 | 374 |
| 75 + | 29,7 | 70,3 | 223 |
| Total | 35,2 | 64,8 | 2901 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 37,0 | 63,0 | 99 |
| Primaire | 37,6 | 62,4 | 454 |
| Secondaire inférieur | 37,5 | 62,5 | 525 |
| Secondaire supérieur | 33,4 | 66,6 | 829 |
| Supérieur | 34,4 | 65,6 | 893 |
| Total | 35,1 | 64,9 | 2800 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 35,8 | 64,2 | 228 |
| 20.000-30.000 | 40,7 | 59,3 | 632 |
| 30.000-40.000 | 36,1 | 63,9 | 713 |
| 40.000-60.000 | 32,9 | 67,1 | 949 |
| >60.000 | 30,1 | 69,9 | 285 |
| Total | 35,4 | 64,6 | 2807 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 29,6 | 70,4 | 1949 |
| Très mauvaise à moyenne | 50,7 | 49,3 | 826 |
| Total | 35,3 | 64,7 | 2775 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 33,6 | 66,4 | 1325 |
| Dans le passé | 34,2 | 65,8 | 656 |
| Modéré (< 20) | 34,4 | 65,6 | 551 |
| Gros fumeur | 42,1 | 57,9 | 312 |
| Total | 34,9 | 65,1 | 2844 |

Personnes de 15 ans et plus

* : seuil pour le score GHQ12 : [2-12] : oui; [0-1] : non

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : WB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| SCORE GHQ12 | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|------|
| | Moyenne | 25ème Percentile | Médiane | 75ème Percentile | 95ème Percentile | N |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 1,3 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 3977 |
| Femme | 1,9 | ,0 | ,0 | 3,0 | 9,0 | 4235 |
| Total | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 8212 |
| GROUPE AGE | | | | | | |
| 15-24 | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 1100 |
| 25-34 | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 1585 |
| 35-44 | 1,9 | ,0 | ,0 | 3,0 | 9,0 | 1565 |
| 45-54 | 1,7 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 1258 |
| 55-64 | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 9,0 | 1061 |
| 65-74 | 1,7 | ,0 | ,0 | 3,0 | 8,0 | 1030 |
| 75 + | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 613 |
| Total | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 8212 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 270 |
| Primaire | 1,9 | ,0 | ,0 | 3,0 | 9,0 | 1153 |
| Secondaire inférieur | 1,7 | ,0 | ,0 | 2,0 | 9,0 | 1395 |
| Secondaire supérieur | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 2347 |
| Supérieur | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 2714 |
| Total | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 7879 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 1,8 | ,0 | ,0 | 2,0 | 10,0 | 584 |
| 20.000-30.000 | 2,0 | ,0 | ,0 | 3,0 | 9,0 | 1620 |
| 30.000-40.000 | 1,8 | ,0 | ,0 | 3,0 | 8,0 | 1923 |
| 40.000-60.000 | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 2618 |
| >60.000 | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 1096 |
| Total | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 7841 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,2 | ,0 | ,0 | 2,0 | 6,0 | 5897 |
| Très mauvaise à moyenne | 3,1 | ,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 | 2014 |
| Total | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 7911 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 3711 |
| Dans le passé | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 1916 |
| Modéré (< 20) | 1,7 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 1570 |
| Gros fumeur | 2,2 | ,0 | 1,0 | 4,0 | 10,0 | 829 |
| Total | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 8026 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | | |
| Région Flamande | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 2914 |
| Région Bruxelloise | 1,9 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 2397 |
| Région Wallonne | 1,9 | ,0 | ,0 | 3,0 | 9,0 | 2901 |
| Belgique | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 8212 |

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

SANTE MENTALE (INDICATEUR : WB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | SCORE GHQ12 | | | | | N |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|------|
| | Moyenne | 25ème Percentile | Médiane | 75ème Percentile | 95ème Percentile | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 1,2 | ,0 | ,0 | 1,0 | 6,0 | 1448 |
| Femme | 1,7 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 1466 |
| Total | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 2914 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 15-24 | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 416 |
| 25-34 | 1,3 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 580 |
| 35-44 | 1,8 | ,0 | ,0 | 2,0 | 9,0 | 527 |
| 45-54 | 1,4 | ,0 | ,0 | 1,0 | 7,0 | 458 |
| 55-64 | 1,2 | ,0 | ,0 | 1,0 | 8,0 | 401 |
| 65-74 | 1,5 | ,0 | ,0 | 1,0 | 8,0 | 351 |
| 75 + | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 181 |
| Total | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 2914 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 1,1 | ,0 | ,0 | ,0 | 10,0 | 55 |
| Primaire | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 9,0 | 392 |
| Secondaire inférieur | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 9,0 | 532 |
| Secondaire supérieur | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 964 |
| Supérieur | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 862 |
| Total | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 2805 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 10,0 | 97 |
| 20.000-30.000 | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 521 |
| 30.000-40.000 | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 717 |
| 40.000-60.000 | 1,3 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 1023 |
| >60.000 | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 391 |
| Total | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 2749 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,1 | ,0 | ,0 | 1,0 | 6,0 | 2273 |
| Très mauvaise à moyenne | 3,2 | ,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 | 569 |
| Total | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 2842 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 1,3 | ,0 | ,0 | 1,0 | 7,0 | 1372 |
| Dans le passé | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 702 |
| Modéré (< 20) | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 559 |
| Gros fumeur | 2,0 | ,0 | ,0 | 3,0 | 9,0 | 241 |
| Total | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 2874 |

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTE MENTALE (INDICATEUR : WB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | SCORE GHQ12 | | | | | N |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|------|
| | Moyenne | 25ème Percentile | Médiane | 75ème Percentile | 95ème Percentile | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 1151 |
| Femme | 2,2 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 1246 |
| Total | 1,9 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 2397 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 15-24 | 2,0 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 291 |
| 25-34 | 1,7 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 8,0 | 469 |
| 35-44 | 1,9 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 8,0 | 462 |
| 45-54 | 2,2 | ,0 | ,0 | 3,0 | 10,0 | 367 |
| 55-64 | 2,0 | ,0 | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 294 |
| 65-74 | 1,7 | ,0 | ,0 | 3,0 | 8,0 | 305 |
| 75 + | 1,9 | ,0 | ,0 | 3,0 | 8,0 | 209 |
| Total | 1,9 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 2397 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 1,7 | ,0 | ,0 | 1,0 | 9,0 | 116 |
| Primaire | 2,3 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 307 |
| Secondaire inférieur | 2,3 | ,0 | 1,0 | 4,0 | 10,0 | 338 |
| Secondaire supérieur | 1,8 | ,0 | ,0 | 3,0 | 8,0 | 554 |
| Supérieur | 1,8 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 8,0 | 959 |
| Total | 1,9 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 2274 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 1,7 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 259 |
| 20.000-30.000 | 2,6 | ,0 | 2,0 | 4,0 | 10,0 | 467 |
| 30.000-40.000 | 2,1 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 493 |
| 40.000-60.000 | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 646 |
| >60.000 | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 420 |
| Total | 1,9 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 2285 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,4 | ,0 | ,0 | 2,0 | 6,0 | 1675 |
| Très mauvaise à moyenne | 3,6 | ,0 | 3,0 | 6,0 | 11,0 | 619 |
| Total | 1,9 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 2294 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 1,7 | ,0 | ,0 | 3,0 | 8,0 | 1014 |
| Dans le passé | 1,7 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 558 |
| Modéré (< 20) | 2,2 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 460 |
| Gros fumeur | 2,6 | ,0 | 1,0 | 4,0 | 11,0 | 276 |
| Total | 1,9 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 2308 |

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTE MENTALE (INDICATEUR : WB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | SCORE GHQ12 | | | | | N |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|------|
| | Moyenne | 25ème Percentile | Médiane | 75ème Percentile | 95ème Percentile | |
| SEXE | | | | | | |
| Homme | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 1378 |
| Femme | 2,2 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 1523 |
| Total | 1,9 | ,0 | ,0 | 3,0 | 9,0 | 2901 |
| GROUPES AGE | | | | | | |
| 15-24 | 1,7 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 8,0 | 393 |
| 25-34 | 1,7 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 536 |
| 35-44 | 2,2 | ,0 | ,0 | 3,0 | 10,0 | 576 |
| 45-54 | 2,0 | ,0 | ,0 | 3,0 | 10,0 | 433 |
| 55-64 | 1,7 | ,0 | ,0 | 2,0 | 9,0 | 366 |
| 65-74 | 1,9 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 374 |
| 75 + | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 8,0 | 223 |
| Total | 1,9 | ,0 | ,0 | 3,0 | 9,0 | 2901 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | | |
| Pas de diplôme | 1,7 | ,0 | ,0 | 3,0 | 6,0 | 99 |
| Primaire | 2,2 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 11,0 | 454 |
| Secondaire inférieur | 2,0 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 525 |
| Secondaire supérieur | 1,8 | ,0 | ,0 | 3,0 | 8,0 | 829 |
| Supérieur | 1,7 | ,0 | ,0 | 2,0 | 9,0 | 893 |
| Total | 1,9 | ,0 | ,0 | 3,0 | 9,0 | 2800 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | | |
| < 20.000 | 2,1 | ,0 | ,0 | 3,0 | 10,0 | 228 |
| 20.000-30.000 | 2,3 | ,0 | 1,0 | 4,0 | 10,0 | 632 |
| 30.000-40.000 | 2,0 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 713 |
| 40.000-60.000 | 1,6 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 949 |
| >60.000 | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 285 |
| Total | 1,9 | ,0 | ,0 | 3,0 | 9,0 | 2807 |
| SANTE SUBJECTIVE | | | | | | |
| Bonne à très bonne | 1,5 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 1949 |
| Très mauvaise à moyenne | 2,9 | ,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 826 |
| Total | 1,8 | ,0 | ,0 | 3,0 | 8,0 | 2775 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | | |
| Jamais | 1,7 | ,0 | ,0 | 2,0 | 7,0 | 1325 |
| Dans le passé | 1,9 | ,0 | ,0 | 3,0 | 9,0 | 656 |
| Modéré (< 20) | 1,9 | ,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 551 |
| Gros fumeur | 2,4 | ,0 | 1,0 | 4,0 | 12,0 | 312 |
| Total | 1,8 | ,0 | ,0 | 3,0 | 9,0 | 2844 |

Personnes de 15 ans et plus

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : MA0116)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | DEPRESSION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS | | Total |
|-------------------------------|---|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 4,7 | 95,3 | 3989 |
| Femme | 8,1 | 91,9 | 4255 |
| Total | 6,4 | 93,6 | 8244 |
| GROUPE AGE | | | |
| 15-24 | 3,8 | 96,2 | 1102 |
| 25-34 | 4,2 | 95,8 | 1582 |
| 35-44 | 8,5 | 91,5 | 1567 |
| 45-54 | 7,1 | 92,9 | 1258 |
| 55-64 | 7,1 | 92,9 | 1064 |
| 65-74 | 10,0 | 90,0 | 1045 |
| 75 + | 5,3 | 94,7 | 626 |
| Total | 6,4 | 93,6 | 8244 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 8,8 | 91,2 | 271 |
| Primaire | 9,9 | 90,1 | 1163 |
| Secondaire inférieur | 9,6 | 90,4 | 1404 |
| Secondaire supérieur | 5,5 | 94,5 | 2354 |
| Supérieur | 4,3 | 95,7 | 2719 |
| Total | 6,4 | 93,6 | 7911 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 8,1 | 91,9 | 589 |
| 20.000-30.000 | 10,2 | 89,8 | 1633 |
| 30.000-40.000 | 8,1 | 91,9 | 1933 |
| 40.000-60.000 | 4,7 | 95,3 | 2622 |
| >60.000 | 2,2 | 97,8 | 1094 |
| Total | 6,5 | 93,5 | 7871 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 2,9 | 97,1 | 5910 |
| Très mauvaise à moyenne | 18,6 | 81,4 | 2026 |
| Total | 6,3 | 93,7 | 7936 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 4,8 | 95,2 | 3717 |
| Dans le passé | 6,8 | 93,2 | 1925 |
| Modéré (< 20) | 6,6 | 93,4 | 1567 |
| Gros fumeur | 13,1 | 86,9 | 835 |
| Total | 6,5 | 93,5 | 8044 |
| REGION DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 5,1 | 94,9 | 2917 |
| Région Bruxelloise | 8,4 | 91,6 | 2409 |
| Région Wallonne | 8,2 | 91,8 | 2918 |
| Belgique | 6,4 | 93,6 | 8244 |

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : MA0116)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | DEPRESSION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS | | Total |
|-------------------------------|---|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 4,0 | 96,0 | 1448 |
| Femme | 6,2 | 93,8 | 1469 |
| Total | 5,1 | 94,9 | 2917 |
| GROUPE AGE | | | |
| 15-24 | 3,7 | 96,3 | 417 |
| 25-34 | 3,4 | 96,6 | 580 |
| 35-44 | 7,0 | 93,0 | 527 |
| 45-54 | 4,8 | 95,2 | 459 |
| 55-64 | 5,1 | 94,9 | 399 |
| 65-74 | 9,2 | 90,8 | 353 |
| 75 + | 2,7 | 97,3 | 182 |
| Total | 5,1 | 94,9 | 2917 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 8,0 | 92,0 | 55 |
| Primaire | 7,1 | 92,9 | 392 |
| Secondaire inférieur | 8,0 | 92,0 | 533 |
| Secondaire supérieur | 4,9 | 95,1 | 966 |
| Supérieur | 3,0 | 97,0 | 862 |
| Total | 5,1 | 94,9 | 2808 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 6,2 | 93,8 | 97 |
| 20.000-30.000 | 9,9 | 90,1 | 524 |
| 30.000-40.000 | 5,9 | 94,1 | 718 |
| 40.000-60.000 | 3,6 | 96,4 | 1024 |
| >60.000 | ,8 | 99,2 | 391 |
| Total | 5,0 | 95,0 | 2754 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 2,4 | 97,6 | 2278 |
| Très mauvaise à moyenne | 17,4 | 82,6 | 568 |
| Total | 5,2 | 94,8 | 2846 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 3,7 | 96,3 | 1374 |
| Dans le passé | 5,1 | 94,9 | 703 |
| Modéré (< 20) | 4,9 | 95,1 | 559 |
| Gros fumeur | 12,6 | 87,4 | 241 |
| Total | 5,1 | 94,9 | 2877 |

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : MA0116)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | DEPRESSION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS | | Total |
|-------------------------------|---|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 6,3 | 93,7 | 1154 |
| Femme | 10,3 | 89,7 | 1255 |
| Total | 8,4 | 91,6 | 2409 |
| GROUPE AGE | | | |
| 15-24 | 6,9 | 93,1 | 291 |
| 25-34 | 6,3 | 93,7 | 469 |
| 35-44 | 11,9 | 88,1 | 463 |
| 45-54 | 11,1 | 88,9 | 366 |
| 55-64 | 7,5 | 92,5 | 297 |
| 65-74 | 5,7 | 94,3 | 309 |
| 75 + | 8,5 | 91,5 | 214 |
| Total | 8,4 | 91,6 | 2409 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 5,6 | 94,4 | 116 |
| Primaire | 14,2 | 85,8 | 310 |
| Secondaire inférieur | 14,9 | 85,1 | 341 |
| Secondaire supérieur | 7,8 | 92,2 | 557 |
| Supérieur | 5,4 | 94,6 | 962 |
| Total | 8,4 | 91,6 | 2286 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 10,5 | 89,5 | 261 |
| 20.000-30.000 | 9,6 | 90,4 | 473 |
| 30.000-40.000 | 11,2 | 88,8 | 496 |
| 40.000-60.000 | 6,3 | 93,7 | 647 |
| >60.000 | 6,9 | 93,1 | 418 |
| Total | 8,7 | 91,3 | 2295 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 4,1 | 95,9 | 1679 |
| Très mauvaise à moyenne | 20,9 | 79,1 | 625 |
| Total | 8,4 | 91,6 | 2304 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 5,8 | 94,2 | 1016 |
| Dans le passé | 8,4 | 91,6 | 563 |
| Modéré (< 20) | 11,7 | 88,3 | 458 |
| Gros fumeur | 13,8 | 86,2 | 278 |
| Total | 8,6 | 91,4 | 2315 |

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : MA0116)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

| | DEPRESSION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS | | Total |
|-------------------------------|---|------|-------|
| | Oui | Non | N |
| | % | % | |
| SEXE | | | |
| Homme | 5,6 | 94,4 | 1387 |
| Femme | 10,8 | 89,2 | 1531 |
| Total | 8,2 | 91,8 | 2918 |
| GROUPE AGE | | | |
| 15-24 | 3,2 | 96,8 | 394 |
| 25-34 | 4,9 | 95,1 | 533 |
| 35-44 | 10,3 | 89,7 | 577 |
| 45-54 | 10,2 | 89,8 | 433 |
| 55-64 | 11,3 | 88,7 | 368 |
| 65-74 | 12,7 | 87,3 | 383 |
| 75 + | 7,4 | 92,6 | 230 |
| Total | 8,2 | 91,8 | 2918 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 11,3 | 88,7 | 100 |
| Primaire | 13,2 | 86,8 | 461 |
| Secondaire inférieur | 11,2 | 88,8 | 530 |
| Secondaire supérieur | 6,3 | 93,7 | 831 |
| Supérieur | 6,0 | 94,0 | 895 |
| Total | 8,1 | 91,9 | 2817 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | |
| < 20.000 | 8,2 | 91,8 | 231 |
| 20.000-30.000 | 10,8 | 89,2 | 636 |
| 30.000-40.000 | 10,9 | 89,1 | 719 |
| 40.000-60.000 | 6,4 | 93,6 | 951 |
| >60.000 | 3,4 | 96,6 | 285 |
| Total | 8,4 | 91,6 | 2822 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | |
| Bonne à très bonne | 3,6 | 96,4 | 1953 |
| Très mauvaise à moyenne | 19,3 | 80,7 | 833 |
| Total | 7,8 | 92,2 | 2786 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | |
| Jamais | 6,5 | 93,5 | 1327 |
| Dans le passé | 9,7 | 90,3 | 659 |
| Modéré (< 20) | 7,8 | 92,2 | 550 |
| Gros fumeur | 13,5 | 86,5 | 316 |
| Total | 8,3 | 91,7 | 2852 |

Personnes de 15 ans et plus

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : DR03_PS)
Enquête de Santé, Belgique, 1997
CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES* PRESCRITS
AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES

| | Psychotrope | Anti- dépresseur | Tranquil- lisant | Somnifère | N |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|------|
| SEXE | | | | | |
| Homme | 6,4 | 2,5 | 3 | 3,3 | 3976 |
| Femme | 11,9 | 5,2 | 4,7 | 6,6 | 4238 |
| Total | 9,2 | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 8214 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 1,3 | 1 | 0,6 | 0,4 | 1095 |
| 25-34 | 2,8 | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 1579 |
| 35-44 | 7,8 | 4,7 | 3,9 | 2,8 | 1560 |
| 45-54 | 9,6 | 5,5 | 4,5 | 4,1 | 1255 |
| 55-64 | 13,5 | 3,8 | 6,1 | 8,7 | 1058 |
| 65-74 | 24,2 | 7,4 | 9,3 | 14,9 | 1043 |
| 75 + | 32,1 | 5,6 | 9,2 | 24,7 | 624 |
| Total | 9,2 | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 8214 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 15,4 | 2,8 | 8,3 | 12,4 | 271 |
| Primaire | 15,9 | 6,2 | 8,7 | 8,7 | 1156 |
| Secondaire inférieur | 13,5 | 5,6 | 5,4 | 7,8 | 1403 |
| Secondaire supérieur | 7 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2349 |
| Supérieur | 6,2 | 2,3 | 1,9 | 3,6 | 2702 |
| Total | 9,2 | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 7881 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 11,8 | 3 | 5,6 | 6,4 | 586 |
| 20.000-30.000 | 12,8 | 6,7 | 5,5 | 7,2 | 1622 |
| 30.000-40.000 | 10,3 | 4,1 | 4,1 | 5,6 | 1931 |
| 40.000-60.000 | 7,3 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 2615 |
| >60.000 | 6 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 1085 |
| Total | 9,2 | 3,9 | 4 | 4,9 | 7839 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 4,1 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 5892 |
| Très mauvaise à moyenne | 26,8 | 11,9 | 11,9 | 14,9 | 2014 |
| Total | 9 | 3,7 | 3,8 | 4,9 | 7906 |
| CONSOMMATION DE TABACN | | | | | |
| Jamais | 8,9 | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 3706 |
| Dans le passé | 10,4 | 3,7 | 3,3 | 6,9 | 1912 |
| Matige roker (<20) | 6,9 | 2,9 | 3,9 | 3,1 | 1563 |
| Gros fumeur | 11,6 | 7,7 | 6,7 | 5,4 | 835 |
| Total | 9,2 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 8016 |
| REGION DE RESIDENCE | | | | | |
| Région Flamande | 6,8 | 2,7 | 2,4 | 3,5 | 2912 |
| Région Bruxelloise | 11 | 4,8 | 5 | 6,8 | 2389 |
| Région Wallonne | 13 | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 2913 |
| Belgique | 9,2 | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 8214 |
| Personnes de 15 ans et plus | | | | | |

* : Médicament psychotrope : antidépresseur, tranquillisant, somnifère

REGIO: 1 Région Flamande

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : DR03_PS)
Enquête de Santé, Belgique, 1997
CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES* PRESCRITS
AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES

| | Psychotrope | Anti- dépresseur | Tranquil- lisant | Somnifère | N |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|------|
| SEXE | | | | | |
| Homme | 4 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1446 |
| Femme | 9,6 | 3,8 | 3,2 | 5,2 | 1466 |
| Total | 6,8 | 2,7 | 2,4 | 3,5 | 2912 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 415 |
| 25-34 | 2,3 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 579 |
| 35-44 | 6,4 | 3,8 | 2,3 | 2,1 | 527 |
| 45-54 | 5,6 | 3,1 | 2 | 2,1 | 460 |
| 55-64 | 8,2 | 2,3 | 2,5 | 4,9 | 397 |
| 65-74 | 21,7 | 6,1 | 8,9 | 11,8 | 352 |
| 75 + | 26,6 | 2,7 | 5,2 | 23 | 182 |
| Total | 6,8 | 2,7 | 2,4 | 3,5 | 2912 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 12,8 | 1,9 | 2,4 | 12,8 | 55 |
| Primaire | 11,6 | 3,6 | 4,9 | 6,7 | 391 |
| Secondaire inférieur | 11,9 | 4,7 | 4,1 | 6,2 | 533 |
| Secondaire supérieur | 5,4 | 3 | 2,4 | 1,6 | 965 |
| Supérieur | 3,6 | 1 | 0,6 | 2,2 | 859 |
| Total | 6,8 | 2,7 | 2,4 | 3,4 | 2803 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 14,8 | 0,8 | 5,6 | 9,5 | 97 |
| 20.000-30.000 | 11,2 | 6,2 | 3,6 | 5,8 | 520 |
| 30.000-40.000 | 7,6 | 2,9 | 2,1 | 4,4 | 718 |
| 40.000-60.000 | 4,5 | 2 | 2,4 | 1,4 | 1023 |
| >60.000 | 3,6 | 0,5 | 0,9 | 2,4 | 390 |
| Total | 6,7 | 2,7 | 2,4 | 3,3 | 2748 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 2,8 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 2272 |
| Très mauvaise à moyenne | 24,7 | 10,5 | 7,5 | 13,8 | 568 |
| Total | 6,8 | 2,8 | 2,4 | 3,4 | 2840 |
| CONSOMMATION DE TABACN | | | | | |
| Jamais | 7,1 | 3 | 2,4 | 3,5 | 1373 |
| Dans le passé | 7,8 | 2,3 | 1,8 | 5,2 | 699 |
| Matige roker (<20) | 4,3 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 561 |
| Gros fumeur | 7,6 | 5 | 3,6 | 2,7 | 241 |
| Total | 6,7 | 2,8 | 2,4 | 3,4 | 2874 |

Personnes de 15 ans et plus

* : Médicament psychotrope : antidépresseur, tranquillisant, somnifère

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : DR03_PS)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES* PRESCRITS
AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES

| | Psychotrope | Anti- dépresseur | Tranquil- lisant | Somnifère | N |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|------|
| SEXE | | | | | |
| Homme | 8,4 | 3 | 4,5 | 4,7 | 1146 |
| Femme | 13,3 | 6,4 | 5,5 | 8,7 | 1243 |
| Total | 11 | 4,8 | 5 | 6,8 | 2389 |
| GROUPES AGE | | | | | |
| 15-24 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 290 |
| 25-34 | 4,1 | 3,1 | 2,2 | 2 | 467 |
| 35-44 | 8,3 | 5,1 | 4,7 | 3,5 | 456 |
| 45-54 | 16 | 8,6 | 9,7 | 7,2 | 362 |
| 55-64 | 14,5 | 4,2 | 6,4 | 10 | 293 |
| 65-74 | 19,1 | 3,4 | 6,9 | 13,7 | 308 |
| 75 + | 33,2 | 13,3 | 8,8 | 29 | 213 |
| Total | 11 | 4,8 | 5 | 6,8 | 2389 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 8,8 | 2,6 | 2,7 | 5,6 | 116 |
| Primaire | 15,4 | 6,9 | 7,5 | 9,8 | 306 |
| Secondaire inférieur | 16,7 | 10,1 | 9,5 | 10,4 | 341 |
| Secondaire supérieur | 11,3 | 4,8 | 5,2 | 7 | 552 |
| Supérieur | 7,1 | 2,8 | 2,4 | 4,1 | 951 |
| Total | 10,6 | 4,8 | 4,7 | 6,5 | 2266 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 8 | 4,2 | 4 | 5,1 | 259 |
| 20.000-30.000 | 13 | 5,3 | 6,1 | 8,5 | 468 |
| 30.000-40.000 | 13,9 | 5,7 | 6,2 | 8,9 | 493 |
| 40.000-60.000 | 10 | 4,4 | 5,4 | 5,9 | 642 |
| >60.000 | 9,6 | 4,8 | 3,4 | 4,7 | 412 |
| Total | 11,1 | 4,9 | 5,2 | 6,8 | 2274 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 5,1 | 2,2 | 1,8 | 3,1 | 1670 |
| Très mauvaise à moyenne | 28,3 | 13,1 | 14,7 | 17,3 | 615 |
| Total | 10,9 | 5 | 5,1 | 6,7 | 2285 |
| CONSOMMATION DE TABACN | | | | | |
| Jamais | 8,6 | 3 | 2,6 | 6,2 | 1009 |
| Dans le passé | 13,7 | 5,4 | 6,5 | 9,1 | 556 |
| Matige roker (<20) | 10,1 | 4,9 | 5,7 | 4 | 452 |
| Gros fumeur | 15,9 | 10,3 | 9,8 | 8,6 | 278 |
| Total | 10,9 | 4,8 | 5 | 6,6 | 2295 |

Personnes de 15 ans et plus

* : Médicament psychotrope : antidépresseur, tranquillisant, somnifère

REGIO: 3 Région Wallone

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : DR03_PS)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES* PRESCRITS
AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES

| | Psychotrope | Anti- dépresseur | Tranquil- lisant | Somnifère | N |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|------|
| SEXE | | | | | |
| Homme | 10,3 | 3,7 | 5,4 | 5,6 | 1384 |
| Femme | 15,6 | 7,2 | 7,2 | 8,5 | 1529 |
| Total | 13 | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 2913 |
| GROUPE AGE | | | | | |
| 15-24 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 390 |
| 25-34 | 3,4 | 2,3 | 1,4 | 0,6 | 533 |
| 35-44 | 10 | 6,2 | 6,6 | 3,8 | 577 |
| 45-54 | 15,3 | 9,2 | 7,7 | 7,1 | 433 |
| 55-64 | 24,3 | 6,9 | 13,7 | 16,5 | 368 |
| 65-74 | 29,6 | 10,4 | 10,6 | 19,8 | 383 |
| 75 + | 39,5 | 5,9 | 15 | 25 | 229 |
| Total | 13 | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 2913 |
| NIVEAU INSTRUCTION | | | | | |
| Pas de diplôme | 21,2 | 3,6 | 16,2 | 15,9 | 100 |
| Primaire | 23,5 | 10,5 | 15,6 | 11,7 | 459 |
| Secondaire inférieur | 15,7 | 6,2 | 6,8 | 9,9 | 529 |
| Secondaire supérieur | 9,4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 832 |
| Supérieur | 10,1 | 4,3 | 3,9 | 5,6 | 892 |
| Total | 13 | 5,4 | 6,4 | 7,1 | 2812 |
| REVENU EQUIVALENT (FB) | | | | | |
| < 20.000 | 11,5 | 3,9 | 6,4 | 4,8 | 230 |
| 20.000-30.000 | 15,3 | 8 | 8,3 | 8,8 | 634 |
| 30.000-40.000 | 13,7 | 5,5 | 6,8 | 6,7 | 720 |
| 40.000-60.000 | 12 | 5 | 5 | 7,4 | 950 |
| >60.000 | 10,8 | 3,1 | 6 | 4,8 | 283 |
| Total | 13 | 5,5 | 6,4 | 7,1 | 2817 |
| SANTÉ SUBJECTIVE | | | | | |
| Bonne à très bonne | 6,4 | 2 | 2 | 3,7 | 1950 |
| Très mauvaise à moyenne | 29,1 | 13,3 | 16,4 | 15,5 | 831 |
| Total | 12,5 | 5,1 | 5,9 | 6,9 | 2781 |
| CONSOMMATION DE TABAC | | | | | |
| Jamais | 12,5 | 4,3 | 6,1 | 6,2 | 1324 |
| Dans le passé | 14,7 | 6 | 5,1 | 9,5 | 657 |
| Matige roker (<20) | 10,5 | 4,6 | 6,2 | 5,9 | 550 |
| Gros fumeur | 16 | 10,9 | 10,1 | 8,1 | 316 |
| Total | 13 | 5,6 | 6,4 | 7,1 | 2847 |

Personnes de 15 ans et plus

* : Médicament psychotrope : antidépresseur, tranquillisant, somnifère