



Het gebruik van alcohol

Lydia Gisle

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance
J. Wytsmanstraat, 14
B - 1050 Brussel
02 / 642 57 53
E-mail : lydia.gisle@iph.fgov.be





Inhoudstafel

Inhoudstafel	387
Samenvatting	389
1. Inleiding	391
2. Vragen	393
3. Indicatoren	394
4. Resultaten	395
4.1. Alcoholgebruik (AL01_1)	395
4.2. Frequentie van alcoholgebruik (AL01_2) en dagelijks gebruik (AL01_3)	399
4.3. Hoeveelheid alcohol geconsumeerd en overconsumptie van alcohol (AL02_4 tot AL02_6)	403
4.4. Piekdrinken (AL03_1 - AL03_2)	408
4.5. Beginleeftijd van regelmatig alcoholgebruik (AL04_1)	411
4.6. Problematisch alcoholgebruik (AL_1)	414
5. Bepreking	420
6. Bibliografie	423
Tabellen	424





Samenvatting

Hoewel het gebruik van alcohol in onze Westerse samenleving als heel gewoon wordt ervaren, heeft het een negatief effect op de gezondheid en het sociaal functioneren van de gebruikers, zelfs indien men slechts een matig gebruiker is. Natuurlijk nemen de gezondheidsproblemen toe naarmate het alcoholgebruik toeneemt en aanhoudt, en heeft het een negatieve invloed op chronische ziekten en traumatismen, op de mentale gezondheid en het sociale, het professionele en het familiale leven. De indicatoren die in dit hoofdstuk worden voorgesteld laten toe om het profiel van het alcoholgebruik in België af te lijnen.

Uit de resultaten blijkt dat 81% van de bevolking van 15 jaar en ouder aangeeft alcohol te hebben geconsumeerd in 12 maanden voorafgaand aan de enquête. Dit cijfer is lichtjes gedaald in vergelijking met 2004 (84%). De globale trend wijst echter op een stabilisatie wanneer er rekening wordt gehouden met gegevens op lange termijn, namelijk sinds de eerste enquête in 1997.

De Belg consumeert gemiddeld 11 glazen alcohol per week wat, met een vergelijkbare populatie, een vermindering is ten opzichte van 2001 en 2004. Een andere indicator die afneemt is die van overconsumptie, namelijk die de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), welke een maximum consumptie van 14 glazen voor vrouwen en 21 glazen voor mannen per week aanbeveelt, overschrijdt. Op basis van de definitie van deze grenswaarden, blijkt dat 8% van de bevolking een overconsumptie van alcohol in 2008 aangeeft, dit is 1% minder dan in 2001-2004 (9%).

Daartegenover volgen twee indicatoren een opwaartse trend in de tijd: het betreft het percentage dagelijkse alcoholgebruikers, dat 9% was in 2001-2004 en stijgt tot 12% in 2008, evenals het aantal individuen dat een problematisch alcoholgebruik (neiging tot afhankelijkheid) vertoont, dat constant

toeneemt in de loop van de jaren: 7% in 2001, 8% in 2004 en 10% in 2008.

Ten slotte werden er in 2008 voor het eerst twee andere componenten van het consumptieprofiel gemeten. Deze kunnen dus niet vergeleken worden met voorgaande jaren. Het betreft de beginleeftijd van alcoholgebruik, die geschat wordt op 18 jaar en twee maand bij de algemene bevolking van 15 jaar en ouder, alsook het fenomeen van wekelijks piekdrinken (of "binge drinking"), hier gedefinieerd als de consumptie van 6 glazen alcohol of meer tijdens eenzelfde gelegenheid en dit minstens één keer per week, wat door 8% van de bevolking wordt vermeldt.

Sociodemografische kenmerken

De aangehaalde indicatoren van alcoholgebruik komen allen meer voor bij mannen. Zo drinken meer mannen dan vrouwen alcohol (84% tegen 77%), zijn er meer mannen die dagelijks drinken (16% tegen 9%), drinken ze grotere hoeveelheden (13 glazen per week tegen 8) en zijn er meer mannen die overconsumeren (10% tegen 6%). Ook komt wekelijks piekdrinken (13% tegen 4%) en problematisch alcoholgebruik (13% tegen 7%) meer voor bij mannen dan bij vrouwen.

Het profiel van alcoholgebruik varieert tevens met de leeftijd. Voor bepaalde indicatoren neemt de distributie van het percentage in functie van de leeftijdsgroepen een parapluvorm aan, met lagere cijfers in de uiterste leeftijdsgroepen. Dit is het geval voor het percentage alcoholgebruikers, de wekelijkse overconsumptie en het problematisch alcoholgebruik. Het dagelijks alcoholgebruik komt meer voor naarmate de leeftijd toeneemt (3% bij de jongsten, 21% vanaf 55 jaar). Voor de andere indicatoren, misschien de meest verontrustende, is de kritieke leeftijdsgroep vooral de jongeren (15-24 jaar), zoals voor wekelijks piekdrinken (12% van de jongeren, maar ook 9% à 10% van de 45-64 jarigen).



De studie van alcoholgebruik in functie van het hoogste opleidingsniveau binnen het huishouden brengt een aantal interessante zaken aan het licht. De prevalentie van alcoholgebruik en de dagelijkse consumptie van alcohol neemt toe met het opleidingsniveau. De wekelijkse overconsumptie, de beginleeftijd van alcoholgebruik en het problematisch alcoholgebruik zijn dan weer niet gerelateerd met het opleidingsniveau van het huishouden. Het piekdrinken wordt doorgaans meer gerapporteerd bij de laagst opgeleiden (maar dit is alleen zo op nationaal niveau, niet op niveau van de gewesten).

De consumptie-indicatoren variëren niet systematisch in functie van de urbanisatiegraad van de woonplaats: het percentage alcoholgebruikers is hoger in landelijke gebieden, dat van dagelijkse gebruikers komt meer voor in stedelijke gebieden, en de gemiddelde hoeveel geconsumeerd per week is hoger in halfstedelijke gebieden, maar het problematisch gebruik komt hier dan weer minder voor!

Regionale variaties

De consumptie van alcohol is gebruikelijker in het Vlaams Gewest (83% van de inwoners) dan in het Waals (78%) of Brussels Gewest (70%). Het verschil met de

andere gewesten is vooral uitgesproken bij de jongen van 15-24 jaar: 82% in Vlaanderen heeft al alcohol gedronken tegen 72% in Wallonië en 58% in Brussel. Het wekelijks piekdrinken is ook een veelvoorkomende gewoonte bij de Vlaamse jongeren, aangezien 14% van de 15-24 jarigen zich hieraan overgeeft, tegen niettemin 9% in het Waals en 10% in het Brussels Gewest. Het percentage problematisch alcoholgebruik is minder frequent in de andere gewesten, maar hier is er jammer genoeg een toename sinds 2004, gaande van 6% in dat jaar tot 10% in 2008, wat niet te verwaarlozen is.

Bijna een derde van de Brusselse bevolking drinkt geen alcohol, en dit is waarschijnlijk te wijten aan de grotere populatie immigranten. In het Brussels Gewest is de dagelijkse consumptie van alcohol meer gebruikelijk dan in het Vlaams Gewest (maar komt overeen met de resultaten van Wallonië) en komt het problematisch alcoholgebruik hier meer voor dan elders (14%, tegen 10-11% in de andere gewesten en tegen 11% in de andere grote steden in het noorden en het zuiden van het land).

Het Waals Gewest onderscheidt zich van de andere gewesten door een hogere gemiddelde consumptie zijnde 12 glazen alcohol per week tegen 10 elders; het percentage overconsumptie is er evenwel niet hoger dan in de andere gewesten.



1. Inleiding

Het gebruik van alcohol is één van de risicogedragingen die beleidsverantwoordelijken in de volksgezondheid steeds heeft beziggehouden. Alcoholgerelateerde problemen, of ze nu lichamelijk, sociaal of psychisch zijn, zijn vooral het gevolg van overmatig of aanhoudend alcoholgebruik. Twee gedragingen gerelateerd aan het gebruik van alcohol houden ons momenteel bezig: 1. het probleem van chronische overconsumptie van alcohol en het ervan afhankelijk worden, en 2. alcoholintoxicatie (dronkenschap) en, bij jongeren, "binge drinking" wat als « piekdrinken » kan worden vertaald. Welke term ook gebruikt wordt, we verwijzen in dat geval naar de consumptie van een grote hoeveelheid alcohol op korte tijd. Hoewel er hierover geen internationale consensus bestaat, is de aanbeveling dat de toestand van piekdrinken overeenkomt met 8g zuivere alcohol (ethanol) per liter bloed, hetzij de consumptie van 5 glazen alcohol of meer bij mannen en 4 glazen of meer bij vrouwen, over een tijdsperiode van 2 uur.

Zo is het mogelijk om een gezondheidsrisico te lopen als gevolg van alcoholintoxicatie of piekdrinken, hetzij onrechtstreeks door een verkeers- of werkongeval, agressie (zowel als slachtoffer als aanrander), seksueel risicogedrag (nalaten om een condoom te gebruiken, meerdere partners...), zelfmoordneigingen, hetzij rechtstreeks door een acute pancreatitis, ethylcoma... Op lange termijn heeft een aanzienlijke en chronische consumptie van alcohol ernstige en onomkeerbare gevolgen voor heel het lichaam: de interne organen (lever, pancreas, slokdarm, maag en darm), de bloedsomloop (slagaders, hart en cerebrovasculair systeem), het neurologisch systeem, het beenderstelsel en de mentale gezondheid. Zo is alcohol o.a. verantwoordelijk voor levercirrose, chronische pancreatitis, verschillende kankers, onomkeerbare neurologische stoornissen, cardiovasculaire aandoeningen, neuropsychiatrische aandoeningen alsook het verergeren van reeds bestaande problemen zoals alcoholafhankelijkheid, depressie, familiale problemen, werkverlies... (1). De gezondheidsrisico's en sociale risico's gerelateerd aan alcoholgebruik hebben dus zowel betrekking op de jongeren (acute intoxicatie) als op de oudere generatie (gevolgen op lange termijn).

Deze rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen op de gezondheid zorgen ervoor dat alcoholgebruik op de derde plaats staat van de vermijdbare sterfte op wereldschaal¹. De Europese landen zijn trouwens wereldrecordhouders zowel inzake alcoholgebruik als het aantal ziekten gerelateerd aan alcoholgebruik. Het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) over de ziektelast in de wereld¹ schat dat in 2004 2,5 miljoen mensen in de wereld sterven aan alcohol, waarvan 320.000 jongeren van 15 tot 29 jaar. Het schadelijk gebruik van alcohol ligt aan de basis van 3,8% van de doden geregistreerd over heel de wereld en draagt bij tot 4,5% van de wereldwijde ziektelast berekend in verloren levensjaren (gecorrigeerd voor beperkingen), zelfs wanneer er rekening wordt gehouden met het bescheiden beschermend effect, meer bepaald tegen coronaire hartziekten, van een gering alcoholgebruik bij bepaalde personen van 40 jaar en ouder.

De WGO heeft grenswaarden aanbevolen voor alcoholgebruik die overeenkomen met een *minimaal gezondheidsrisico* (wat niet betekent dat er helemaal geen risico is!). Bij volwassenen die regelmatig alcohol consumeren gaat het om 14 glazen per week voor vrouwen en 21 glazen per week voor mannen, met minstens één alcoholvrije dag per week. Dit komt overeen met maximum 2 glazen per dag voor vrouwen en 3 glazen per dag voor mannen. Bij occasioneel gebruik mag men niet meer dan 4 glazen alcohol drinken bij één gelegenheid. Er dient evenwel benadrukt te worden dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor een grenswaarde voor het gebruik van alcohol. Dit is ook zo voor jongeren, die nochtans een zeer kwetsbare groep vormen.

¹ http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf



De voorgestelde grenswaarden zijn trouwens niet voor jongeren, waarvoor geldt dat elk alcoholgebruik de gezondheid in belangrijke mate kan schade (*Declaration on alcohol and Young People*, aangenomen door de Europese ministeriële conferentie van 2001).

Het directief van de WGO voegt ook een belangrijke waarschuwing toe: de tolerantie en de kwetsbaarheid bij alcoholgebruik verschillen van individu tot individu. Sommigen kunnen ziekten ontwikkelen door hoeveelheden te gebruiken die lager liggen dan deze die hierboven beschreven worden. Bovendien mag alcohol zeker niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap, door kinderen, bij het besturen van een wagen of het bedienen van een gevaarlijke machine, bij het uitvoeren van taken die de aandacht vergen, bij het gebruik van geneesmiddelen, bij acute of chronische ziekten (epilepsie, pancreatitis, hepatitis, cirrose...) of wanneer men vroeger een alcoholprobleem heeft gehad.

De vragen over alcoholgebruik in de Gezondheidsenquête zijn een belangrijk instrument om profielen van alcoholgebruik in de algemene bevolking in te schatten. In vergelijking met andere informatie (verkoopcijfers, productiecijfers) bieden deze gegevens de mogelijkheid om groepen met een risicogedrag te identificeren in functie van kenmerken zoals de leeftijd, het geslacht, de socio-economische status... Doelstelling van de enquête is om informatie te bekomen over het aantal gebruikers en geheelonthouders in de bevolking, de frequentie en de hoeveelheid alcohol gewoonlijk per week geconsumeerd, de frequentie van piekdrinken (in de Europese vragenlijst gedefinieerd als de consumptie van 6 glazen alcohol of meer op één gelegenheid), alsook inzicht te krijgen in de problemen die eventueel optreden bij een frequent en/of afhankelijk gebruik (problematisch gebruik). Opgemerkt moet worden dat de gegevens die bekomen worden via een vragenlijst, zelfs als het niet mondeling is, vaak een onderschatting zijn van het werkelijke gebruik en dit a fortiori voor de personen die veel alcohol gebruiken, en dit omwille van het sociale stigma dat hiermee is geassocieerd, maar ook door het feit dat velen ontkennen dat ze afhankelijk zijn.



2. Vragen

Vergeleken met de Gezondheidsenquêtes van de voorgaande jaren (1997, 2001, 2004), heeft de enquête 2008 een verandering van de vragen ondergaan door de Europese vragen (EHIS) te integreren. Deze vragen zijn geïnspireerd op de AUDIT-3 en gaan over de frequentie van het gebruik, de hoeveelheid geconsumeerd per type drank en per dag van de week, en de frequentie van piekdrinken ("binge drinking"). Daarnaast werd er voor het eerst een vraag toegevoegd over de leeftijd waarop men begonnen is met regelmatig alcohol te drinken, terwijl de CAGE-vragen aangaande het problematisch alcoholgebruik werden behouden. Het merendeel van de vragen en de antwoordcategorieën, alsook de filters die worden toegepast voor de sprongen in de vragenlijst, werden aangepast ten opzichte van de vorige enquêtes, waardoor er minder mogelijkheden zijn om vergelijkingen in de tijd te maken of op zijn minst voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van de tijdstrend.

Al de vragen staan in de schriftelijke vragenlijst, die enkel door respondenten van 15 jaar en ouder moest worden ingevuld. De drie eerste vragen (AL.01 – AL.03) zijn afkomstig uit de Europese EHIS vragenlijst. De vraag AL.01 laat toe de proportie geheelonthouders en de alcoholgebruikers in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête te bepalen, alsook de frequentie van het gebruik bij deze laatsten. De geheelonthouders beantwoorden geen enkele vraag daarna, terwijl de gelegheidsdrinkers (een keer per maand of minder) de vragen vanaf AL.04, gaande over de beginleeftijd van gebruik, beantwoorden. De personen die minstens twee keer per maand alcoholische dranken consumeren gaan verder met vraag AL.02.

- AL01. Hoe vaak hebt u de afgelopen 12 maanden eender welke alcoholische dranken (zoals bier, wijn, likeuren, sterkedrank of andere) gedronken?
- AL02. Hoeveel glazen alcohol drinkt u per dag in een doorsnee week? (aan te duiden in een tabel die de dagen van de week kruist met het soort alcoholische drank)
- AL03. Hoe vaak hebt u de afgelopen 12 maanden 6 of meer glazen alcohol gedronken bij eenzelfde gelegenheid?
- AL04. De kleine slokjes niet meegerekend, hoe oud was u toen u alcoholische dranken begon te drinken?

De volgende vier vragen, afkomstig van de « CAGE » vragenlijst, dienen om een schatting te maken van het problematisch alcoholgebruik. Opgelet, de vragen worden gesteld aan de personen die aangegeven hebben dat ze in de afgelopen 12 maanden alcohol hebben geconsumeerd, de huidige drinkers dus. De personen die gestopt zijn met drinken omwille van een alcoholprobleem of om gezondheidsredenen die te maken hebben met een overmatig alcoholgebruik dienen deze vragen niet te beantwoorden.

- AL05. Hebt u ooit het gevoel gehad te moeten minderen met drinken?
- AL06. Hebt u zich ooit geïrriteerd gevoeld door kritiek op uw drinken?
- AL07. Hebt u zich ooit schuldig gevoeld over uw drinken?
- AL08. Hebt u ooit direct na het opstaan alcohol gedronken om echt wakker te worden (of van een kater af te komen)?



3. Indicatoren

In dit hoofdstuk is het de bedoeling om een algemeen beeld te schetsen van het gebruik van alcohol bij de bevolking in België. Vanuit het standpunt van de volksgezondheid is het nuttig om over informatie te beschikken betreffende de prevalentie van het alcoholgebruik, de hoeveel alcohol dat wordt geconsumeerd, maar ook over het profiel van de alcoholgebruikers en de problemen dat alcoholgebruik met zich meebrengt, en dit alles in relatie tot verschillende sociodemografische kenmerken van de bevolking. Al deze aspecten komen aan bod in de Gezondheidsenquête 2008.

Verschiedende indicatoren zijn afgeleid van de vragen over het gebruik van alcohol in de afgelopen 12 maanden. De volgende indicatoren worden in het rapport behandeld:

- **AL01_1** identificeert de personen die alcohol hebben gedronken in het jaar voorafgaand aan de verzameling van de gegevens – versus – de "geheelonthouders", dit wil zeggen diegenen die tijdens deze periode geen alcohol hebben geconsumeerd (maar dit misschien ooit in hun leven wel hebben gedaan).
- **AL01_2** toont de verdeling van de bevolking (in %) volgens de frequentie van alcoholgebruik in de afgelopen 12 maanden (gaande van « nooit » tot « alle dagen »).
- **AL01_3** geeft de prevalentie van de dagelijkse alcoholgebruikers bij de bevolking weer.
- **AL02_4** geeft het gemiddeld aantal glazen alcohol aan geconsumeerd in een typische week bij de personen die minstens twee keer per maand alcohol hebben geconsumeerd (de geheelonthouders en de personen die maximum één keer per maand alcohol hebben geconsumeerd zijn niet in de schatting opgenomen).
- **AL02_5** herverdeelt de totale bevolking (in %) in klassen volgens de hoeveelheid (in aantal glazen) alcohol geconsumeerd in een typische week, bestaande uit de geheelonthouders of gelegheidsdrinkers en verschillende klassen die een veelvoud zijn van 7 (1-7 glazen/week; 8-14 glazen/week...).
- **AL02_6** is een indicator van overmatig alcoholgebruik of "overconsumptie". Dit verwijst naar een consumptie die de grens van 21 glazen alcohol per week voor mannen en 14 glazen per week voor vrouwen overschrijdt.
- **AL03_1** brengt rapport uit over de distributie van de totale bevolking (in %) volgens de frequentie van piekdrinken ("binge drinking"), hier omschreven als de consumptie van 6 glazen of meer tijdens eenzelfde gelegenheid.
- **AL03_2** geeft de proportie weer van de personen die zich minstens eenmaal per week overgeven aan piekdrinken ("binge drinking").
- **AL04_1** schat de gemiddelde leeftijd waarop men begonnen is met regelmatig alcohol te drinken (niet het moment van de eerste ervaring of simpele slokjes).
- **AL_1** betreft het problematisch alcoholgebruik bij de recente gebruikers (afgelopen 12 maanden) en is gebaseerd op de CAGE-vragen. Men gaat uit van een problematisch alcoholgebruik als de persoon minstens 2 van de 4 vragen positief beantwoordt (AL.05-AL.08).



4. Resultaten

4.1. Alcoholgebruik (AL01_1)

4.1.1. België


81% van de bevolking in België van 15 jaar en ouder heeft alcoholische drank geconsumeerd in de afgelopen 12 maanden. Eén op vijf (19%) was dus geheelonthouder in dezelfde periode.

Analyse volgens geslacht en leeftijd

Meer mannen dan vrouwen hebben alcohol geconsumeerd (respectievelijk 84% tegen 77%) en dit verschil is significant na correctie voor leeftijd.

Het feit alcohol geconsumeerd te hebben in het afgelopen jaar evolueert met de leeftijd. Het percentage gebruikers volgens leeftijdsgroep vormt een paraplu-vormige curve, ondanks de zwakke amplitude: gaande van 78% bij de jongeren van 15-24 jaar tot 83-85% bij de volwassenen van 35 tot 64 jaar, om vervolgens af te nemen bij de personen van 65 jaar en ouder (<77%), en dit vooral bij de vrouwen (Figuur 1). Bijgevolg drinken 62% van de vrouwen na de leeftijd van 75 jaar nog alcohol, tegen 82% van de mannen. Dit wil zeggen dat alcohol ruim aanwezig is in onze maatschappij, en dit in alle leeftijdsgroepen.

Figuur 1 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol geconsumeerd heeft in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008



Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken

Het percentage alcoholgebruikers stijgt op een progressieve manier met het opleidingsniveau. Zo consumeert 64% van de laagst opgeleiden alcohol en dit cijfer stijgt tot 88% bij de hoogst opgeleiden. Dit verband tussen het alcoholgebruik en het opleidingsniveau is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.




We observeren een hoger percentage alcoholgebruikers in de landelijke en de halfstedelijke gebieden (82-83%) dan in de stedelijke gebieden (78%), en het verschil blijft significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Evolutie doorheen de tijd

Het percentage alcoholgebruikers in de afgelopen 12 maanden is in 1997 gelijk aan dat van 2004 (84%), terwijl het cijfer van 2008 gelijk is aan dat van 2001 (80,5%). Dit cijfer, dat lager is in 2001 en 2008 in vergelijking met de twee andere jaren, zou echter het resultaat kunnen zijn van een methodologisch artefact: vraag AL.01 over het alcoholgebruik werd niet op dezelfde manier gesteld in 2001 en 2008 als in 1997 en 2004, waardoor de indicator op een andere manier werd aangemaakt. We kunnen dus niet met zekerheid besluiten dat het percentage alcoholgebruik in 2008 is afgenomen ten opzichte van de enquête van 2004. Bovendien toont het statistisch model, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, aan dat de cijfers constant zijn gebleven in de loop van de tijd (van 1997 tot 2008).

Figuur 2 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol geconsumeerd heeft in de afgelopen 12 maanden, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, 2008



4.1.2. Regio's


Het percentage huidige drinkers verschilt van het ene gewest van het land tot het andere, de verkregen verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht. De consumptie van alcoholische drank is populairder in het Vlaams Gewest (83%) dan in het Waals Gewest (78%) en vooral dan in het Brussels Gewest (70%).

Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest consumeert 83% van de inwoners van 15 jaar en ouder alcohol, en er zijn meer mannelijke drinkers (86%) dan vrouwelijke drinkers (80%). Bij de jongeren van 15-24 jaar is dit percentage al 82%, wat hoger is dan bij de jongeren in de twee andere gewesten, en zelfs hoger dan het nationaal gemiddelde. Voor de rest is de verdeling volgens leeftijd en geslacht in Vlaanderen hetzelfde als in België.



Figuur 3 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol geconsumeerd heeft in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest



De prevalentie van alcoholgebruikers varieert in functie van het opleidingsniveau: dit is 69% bij de laagst opgeleiden en bereikt 89% bij diegenen met een diploma hoger onderwijs (het verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht). In tegenstelling tot het nationaal niveau, is er hier geen verband met de urbanisatiegraad.

Zoals voor de resultaten van België, schommelt het percentage gebruikers sinds 1997. Na correctie voor leeftijd en geslacht, is de algemene trend een constante in de tijd. Het verschil waargenomen tussen 2004 en 2008 zou verklaard kunnen worden door een verandering in de vraagstelling die gerelateerd is met deze indicator.

Brussels Gewest


In het Brussels Gewest is het percentage alcoholgebruikers het laagst (70%). Waarschijnlijk is dit te wijten aan een grotere concentratie immigranten van moslimafkomst. Mannen drinken meer alcohol dan vrouwen (74% tegen 67%). In Brussel zijn er veel minder jongeren die alcohol drinken (58%) dan in de twee andere gewesten (72% tot 82%). Het percentage gebruikers stijgt progressief met de leeftijd om 81% in de leeftijdsgroep 55-64 jaar te bereiken, wat hetzelfde is als voor België. Drie kwart van de ouderen (75+) consumeert alcohol (76%), wat een hoger percentage is dan voor de andere gewesten (ongeveer 70%).

Zo nemen we ook in Brussel een belangrijke sociale gradiënt waar in de distributie van alcoholgebruik, gaande van 40% tot 83% tussen de laagst en de hoogst opgeleiden. Het percentage gebruikers in Brussel is van dezelfde grootte-orde als dat geobserveerd in de Waalse grote steden (69%), maar is lager dan het cijfer geobserveerd in Gent en Antwerpen (78%), en dit verschil blijft significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Het percentage gebruikers is niet veranderd in de tijd tussen 1997 en 2004 (rond 73% à 74%), maar we nemen in 2008 een lichte daling waar. Na correctie voor leeftijd en geslacht, blijkt de tijdstrend echter constant te zijn. De afname van het cijfer geobserveerd in 2008 zou te wijten kunnen zijn aan verandering in de vraagstelling die gerelateerd is aan deze indicator.




Figuur 4 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol geconsumeerd heeft in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest



Waals Gewest

Meer mannen dan vrouwen consumeren alcohol (84% tegen 73%, significant verschil). Het cijfer gebruikers is, in functie van de leeftijd, stabiel gebleven tussen 25 en 64 jaar, schommelend rond 80-82%. Zoals in Vlaanderen, maar in tegenstelling tot Brussel, neemt het aantal gebruikers af na de leeftijd van 65 jaar (74% en 69% in de daaropvolgende leeftijdsgroepen). 72% van de jongeren van 15-24 jaar hebben alcohol geconsumeerd in het afgelopen jaar.

Figuur 5 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol geconsumeerd heeft in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 - Waals Gewest





Ook hier nemen we een progressieve stijging waar van het percentage gebruikers met het opleidingsniveau, gaande van 59% bij de laagst geschoolden tot 89% bij de hoogst geschoolden (significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht).

Hoewel het percentage gebruikers schommelt sinds 1997, bereikt dit cijfer zijn laagste niveau in 2008. Het statistisch model, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, is dat van een lineaire afname van het cijfer in de tijd (significant verschil).

4.2. Frequentie van alcoholgebruik (AL01_2) en dagelijks gebruik (AL01_3)

De frequentie van alcoholgebruik (AL01_2) bij de bevolking van 15 jaar en ouder staat gerapporteerd in de tabellen op het einde van het hoofdstuk volgens de volgende distributie (in percentages): 1. de personen die geen alcohol hebben geconsumeerd in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête, 2. de personen die maximum één keer per maand alcohol hebben geconsumeerd, 3. de personen die tussen 2 tot 4 keer per maand drinken, 4. zij die 2 tot 3 keer per week drinken, en 5. zij die 4 tot 6 keer per week drinken, en ten slotte, zij die elke dag drinken. De resultaten hieronder beschreven hebben voornamelijk betrekking op de prevalentie van dagelijkse drinkers (AL01_3).

4.2.1. België

De bevolking is in gelijke proporties verdeeld (ongeveer een vijfde) in de vijf verschillende aangegeven klassen van consumptie: de geheelonthouders, de gelegheidsdrinkers (minder dan één keer per maand), het matig gebruik (2 tot 4 keer per maand), het wekelijks gebruik (2 tot 3 keer per week) en meer dan 3 keer per week. 12% van de mensen drinkt dagelijks alcohol.


Analyse volgens geslacht en leeftijd

De dagelijkse consumptie van alcohol komt meer voor bij mannen (16%) dan bij vrouwen (9%), en dit verschil is significant.

Het percentage dagelijkse gebruikers neemt significant toe met de leeftijd: het is minder dan 3% bij de jongeren van 15-24 jaar en stijgt vanaf 45 jaar (15%) tot 55 jaar (ongeveer 21%) vanwaar de cijfers dan weer stabiel blijven, rond 26% bij de mannen en 15% bij de vrouwen (Figuur 6).



Figuur 6 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat dagelijks alcohol consumeert, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008



Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken

De dagelijkse consumptie van alcohol lijkt niet te variëren in functie van het opleidingsniveau (tussen 11% en 13%), dit in tegenstelling tot het wel of niet consumeren van alcohol. Er is evenwel een significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht: personen met een lagere opleiding zijn minder vaak dagelijkse drinkers dan diegenen met minstens een diploma hoger secundair.

De dagelijkse consumptie van alcohol komt meer voor in stedelijke gebieden (14%) dan in minder stedelijke gebieden (9% tot 11%), en de verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Evolutie doorheen de tijd


Het percentage dagelijkse gebruikers evolueert in de loop van de tijd, gaande van 8% in 1997, rond 9% in 2001 en 2004, tot 12% in 2008 (Figuur 7). Deze lineaire evolutie doorheen de tijd wordt bevestigd na correctie voor leeftijd en geslacht (significant verschillend). Men moet in gedachte houden dat vraag (AL.01) anders is gesteld dan in de voorgaande jaren, waardoor de resultaten beïnvloed zouden kunnen worden.

4.2.2. Regio's

Figuur 7 toont aan dat de stijging van het percentage dagelijkse gebruikers toe te schrijven is aan het Vlaams en Waals Gewest, want de situatie in het Brussels Gewest is het omgekeerde, namelijk een afname in de tijdstrend. Zo komen de percentages dagelijkse gebruikers van Vlaanderen en Brussel in 2008 op hetzelfde niveau (11%). Het cijfer blijft wel het hoogst in het Waals Gewest (14%). De statistische analyses, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, geven aan dat het dagelijks gebruik significant verschillend is tussen Vlaanderen en Brussel, maar niet tussen Brussel en Wallonië.




Figuur 7 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat dagelijks alcohol consumeert, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, 2008



Vlaams Gewest

Zoals op nationaal niveau, is de dagelijkse consumptie van alcohol gerelateerd met het geslacht en met de leeftijd (lineaire en constante stijging bij de mannen, maar bij de vrouwen stijgt deze later en neemt af na 65 jaar!), met het opleidingsniveau en met de urbanisatiegraad (percentage dagelijkse gebruikers is hoger in steden). Deze verbanden zijn significant na correctie voor leeftijd en/of geslacht. Wat de evolutie in de tijd van het aantal dagelijkse drinkers betreft, zien we dat deze op een lineaire manier toeneemt en significant is na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 8 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat dagelijks alcohol consumeert, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest






Brussels Gewest

In het Brussels Gewest geeft 11% van de bevolking aan elke dag alcohol te drinken. De verdeling volgens leeftijd toont een nagenoeg lineaire stijging aan bij de mannen en de vrouwen, met uitzondering van de leeftijdsgroep 65-74 jaar. Vanaf de leeftijd van 75 jaar zien we een record (inter- en intraregionaal) van meer dan 34% dagelijkse drinkers: 42% van de mannen en 30% van de vrouwen.

Figuur 9 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat dagelijks alcohol consumeert, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest



Het zijn de Brusselaars met de hoogste opleiding die het meest dagelijks drinken (12%, significant verschillend van de groep met de laagst geschoolden). Na correctie voor leeftijd en geslacht is het percentage dagelijkse drinkers niet significant verschillend van de andere grote steden van het land (15% in Gent en Antwerpen, 13% in Luik en Charleroi).


De trend van dagelijks drinken is in Brussel sinds 2001 aan het dalen, maar de verschillen tussen de drie laatste jaren zijn echter niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Waals Gewest

In het Waals Gewest vinden we het grootste aantal dagelijkse gebruikers van alcohol terug (14%), met een record van 18% bij de mannen (tegen 10% bij de vrouwen). Het profiel van de leeftijdsverdeling toont een stijging van het percentage dagelijkse drinkers bij de mannen tot de leeftijd van 55-64 jaar (met meer dan een derde van hen!) om vervolgens een beetje te dalen. Het percentage dagelijkse gebruikers bij de vrouwen stijgt geleidelijk, om vanaf 65 jaar 20% te bereiken.

In het Waals Gewest zijn de verschillen in cijfers van dagelijkse alcoholgebruikers tussen enerzijds de opleidingsniveaus en anderzijds de urbanisatiegraden niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht, wat wel het geval was in de andere gewesten. Het percentage dagelijkse gebruikers is op een lineaire manier gestegen over de verschillende jaren van enquête, de verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 10 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat dagelijks alcohol consumeert, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 - Waals Gewest



4.3. Hoeveelheid alcohol geconsumeerd en overconsumptie van alcohol (AL02_4 tot AL02_6)

Drie indicatoren brengen rapport uit over de hoeveelheid alcohol die de mensen consumeren. De eerste (AL02_4) verwijst naar het gemiddeld aantal glazen alcohol geconsumeerd in een typische 7-dagen week bij de individuen die minstens twee keer per maand alcohol drinken. De tweede (AL02_5) is alleen maar gerapporteerd in de tabellen op het einde van het hoofdstuk en betreft de verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder (de gelegheidsdrinkers en geheelonthouders ingesloten) volgens de klassen van consumptie gedefinieerd vanaf de hoeveelheid alcohol geconsumeerd tijdens een typische week (vraag AL.02). De laatste indicator uit de reeks (AL02_6) betreft de buitensporige consumptie van alcohol, die verschillend is voor mannen en vrouwen: overconsumptie verwijst hier naar 21 glazen per week voor mannen en 14 glazen per week voor vrouwen. Dit wordt hierna beschreven.

4.3.1. België

Volgens onze resultaten stellen we vast dat, naast de 41% die nooit of zelden alcohol drinkt, 32% van de bevolking tussen 1 en 7 glazen alcohol drinkt per week, 14% tussen 8 en 14 glazen drinkt, 7% tussen 15 en 21 glazen drinkt en 6% meer dan 21 glazen per week drinkt, wat overeenkomt met meer dan 3 glazen per dag. Het wekelijks gemiddelde bij de gebruikers is 11 glazen per week. Deze situatie komt overeen met die van 2004. Bovendien, als we verwijzen naar de indicator van overconsumptie (wat wil zeggen meer dan 14 glazen per week voor vrouwen en meer dan 21 glazen voor mannen), dan vertoont 8% van de bevolking dit gedrag.

Analyse volgens geslacht en leeftijd


Gemiddeld drinken vrouwen 8 glazen alcohol per week en mannen 13. Wat de overconsumptie van alcohol betreft, zien we dat dit ook meer voorkomt bij mannen (10%) dan bij vrouwen (6%). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd.



Het gemiddeld aantal glazen alcohol geconsumeerd bij de wekelijkse drinkers schommelt rond 9 à 12 glazen per week naargelang de leeftijd. Dit is al hoog bij de jongeren (10 glazen/week) en is het hoogst bij de personen tussen 45 en 64 jaar (gemiddeld ongeveer 12 glazen/week) (Figuur 11).

Het percentage overconsumptie schommelt rond 6 à 7% tussen de leeftijd van 15 en 44 jaar, daarna neemt dit toe om 13% te bereiken in de leeftijdsgroep 55-64 jaar, om vervolgens opnieuw te dalen tot 6% of minder na 65 jaar. De leeftijdsverdeling is dezelfde voor mannen als voor vrouwen, met een lagere frequentie voor deze laatsten.

Figuur 11 1) Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de gebruikers (van 15 jaar en ouder) en 2) prevalentie van overconsumptie in de bevolking (van 15 jaar en ouder), volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008



Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken

De gemiddelde hoeveelheid alcohol die men gewoonlijk drinkt tijdens een typische week varieert niet in functie van het opleidingsniveau, ook niet na correctie voor leeftijd en geslacht. Dit geldt ook voor het percentage overconsumptie, dat hoger is in de groep met een diploma hoger onderwijs (8%) ten opzichte van de groep zonder diploma of diploma lager onderwijs (6%), maar dat niet significant verschillend is na correctie voor leeftijd en geslacht.


Na correctie voor leeftijd en geslacht, wordt er in de halfstedelijke gebieden gemiddeld minder alcohol (-1 glas per week, significant verschil) gedronken dan in de stedelijke of landelijke gebieden. De urbanisatiegraad heeft geen invloed op de percentages overconsumptie.

Evolutie doorheen de tijd

Het gemiddelde alcoholgebruik per week lijkt gestabiliseerd te zijn ten opzichte van 2004 (10,6 glazen per week), maar de analyses waar er gecorrigeerd wordt voor leeftijd en geslacht wijzen op een afname van het gemiddeld gebruik tussen 2004 en 2008 (significant verschil). Het percentage overconsumptie is tegelijkertijd ook gedaald ten opzichte van 2001 en 2004 (9%), en de verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht.



Figuur 12 1) Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de gebruikers (van 15 jaar en ouder) en 2) prevalentie van overconsumptie in de bevolking (van 15 jaar en ouder), volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, 2008




4.3.2. Regio's

Het gemiddeld aantal glazen alcohol geconsumeerd per week is hoger in het Waals Gewest (12) dan in de twee andere gewesten (10), en dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Bovendien is het percentage overconsumptie hoger in het Vlaams en Waals Gewest (8%) dan in het Brussels Gewest (7%), maar de verschillen zijn niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Vlaams Gewest

Figuur 13 1) Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de gebruikers (van 15 jaar en ouder) en 2) prevalentie van overconsumptie in de bevolking (van 15 jaar en ouder), volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest





Het profiel van de resultaten bekomen in Vlaams Gewest is vergelijkbaar met die beschreven voor België. Het voornaamste verschil komt voor bij de jonge mannen van 15-24 jaar (Figuur 13), die het record verslaan wat de gemiddelde hoeveelheid (14 glazen) en de overconsumptie van alcohol (15%) betreft in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen en met de jongeren van de andere gewesten. Er moet evenwel opgemerkt worden dat deze indicatoren daar ten opzichte van 2004 zijn afgenomen, waar de gemiddelde consumptie bij jongeren zich toen situeerde rond de 17 glazen per week en de overconsumptie 17,5% bij de 15-24 jarigen betrof!

Een ander bijzonder kenmerk in Vlaanderen betreft het hoge aantal vrouwen dat een overconsumptie van alcohol aangeeft en dit in de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar (14%), dat het percentage van de mannen in dezelfde leeftijdsgroep overstijgt (13%).


Voor het overige variëren de hoeveelheid alcohol geconsumeerd en de overconsumptie niet in functie van het opleidingsniveau en ook niet in functie van de urbanisatiegraad. De gemiddelde consumptie lijkt overeen te komen met die van 2004 (10 glazen/week), maar het verschil blijkt toch significant te zijn: het gemiddelde was minder hoog in 2008 na correctie voor leeftijd en geslacht. Het percentage overconsumptie is ook gedaald sinds 2001, en het verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Brussels Gewest

De Brusselaars drinken gemiddeld 10 glazen alcohol per week, waardoor ze zich op hetzelfde niveau als Vlamingen (10) plaatsen, maar lager scoren dan de Walen (12). Mannen drinken gemiddeld meer dan vrouwen (11 glazen tegen 8), maar er is geen verschil tussen de geslachten na correctie voor leeftijd wat de prevalentie van overconsumptie betreft, wat kenmerkend is voor Brussel.

Er wordt gemiddeld het meest alcohol geconsumeerd in de leeftijdsgroep 55-64 jaar (12 glazen per week), en het is ook in deze leeftijdsgroep dat het hoogste percentage overconsumptie wordt teruggevonden (14%). Mannen van 75 jaar en ouder drinken gemiddeld meer alcohol (14 glazen) dan die van de andere gewesten (10). Bij de jongeren van 15-24 jaar ligt het gemiddeld aantal glazen per week (10) tussen dat van de jongeren van de twee andere gewesten, en het percentage overconsumptie is er een beetje hoger dan 4%.

Figuur 14 1) Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de gebruikers (van 15 jaar en ouder) en 2) prevalentie van overconsumptie in de bevolking (van 15 jaar en ouder), volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest





Zowel de gemiddelde wekelijkse consumptie als de overconsumptie zijn niet gerelateerd aan het opleidingsniveau na correctie voor leeftijd en geslacht (geen significante verschillen). De verkregen resultaten aangaande de gemiddelde consumptie is niet verschillend van die van de andere grote steden van het land (geen significante verschillen). Ook al is het percentage overconsumptie hoger in Gent en Antwerpen (8%) ten opzichte van Brussel (7%) of de Waalse steden (6%), toch zijn de verschillen niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Het gemiddeld gebruik is op een lineaire manier gedaald sinds 2001 (van 13 naar 10 glazen, significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht), en het huidige niveau gaat terug naar dat van 1997. Dit is ook het geval voor de overconsumptie van alcohol, dat de 10% had bereikt in 2001 in Brussel, maar daarna 8% in 2004 en 7% in 2008, significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht.


Waals Gewest

In Wallonië is de gemiddelde wekelijkse consumptie het hoogst, met 12 glazen per week (15 bij de mannen, 8 bij de vrouwen), maar het percentage overconsumptie (8,3%) benadert toch dat van het Vlaams Gewest (7,8%).

Bij de mannen ligt de kritieke leeftijd voor het drinken van alcohol tussen 25 en 34 jaar (19 glazen/week, een absoluut record!) en tussen 45 en 64 jaar (15 tot 18 glazen/week) (Figuur 15). Het percentage overconsumptie is ook hoger op deze leeftijden: 9% van de jongeren van 25 tot 34 jaar en 13% van de personen van 45 tot 64 jaar

Bij de vrouwen ligt de piek van gemiddeld gebruik en overconsumptie in de leeftijdsgroep 45-54 jaar, met 13 glazen per week en een overconsumptie van 10%.

Figuur 15 1) Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de gebruikers (van 15 jaar en ouder) en 2) prevalentie van overconsumptie in de bevolking (van 15 jaar en ouder), volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Waals Gewest



In het Waals Gewest is het gemiddeld gebruik hoger bij personen met een beperkte opleiding (16 glazen in de groep van de niet-gediplomeerden tegen 11 glazen in de groep met een diploma hoger onderwijs, significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht), maar het percentage overconsumptie is niet verschillend in functie van het opleidingsniveau na correctie voor leeftijd en geslacht. Er is geen verband tussen de hoeveelheid alcohol geconsumeerd of de overconsumptie en de urbanisatiegraad.



De indicator van hoeveelheid alcohol is blijven toenemen tussen 1997 en 2008, in tegenstelling tot de andere gewesten. Deze lineaire stijgende trend was statistisch significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Na een constante toename van 1997 tot 2004, is het percentage overconsumptie gedaald, gaande van 9% in 2004 tot 8% in 2008, maar dit verschil is niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

4.4. Piekdrinken (AL03_1 - AL03_2)

Piekdrinken ("binge drinking") verwijst hier naar de consumptie van minstens 6 glazen alcohol op eenzelfde gelegenheid. De indicator AL03_1 laat toe om de personen te identificeren die dit zwaar alcoholgedrag in de afgelopen 12 maanden hebben gehad, en in voorkomend geval, met welke frequentie dit is gebeurd. De percentages voor deze indicator, voorgesteld in de tabellen op het einde van het hoofdstuk, hebben betrekking op de bevolking van 15 jaar en ouder, en omvatten de niet-gebruikers en de individuen die matig gebruiken. De resultaten hieronder beschreven, en ook voorgesteld in de tabellen op het einde van het hoofdstuk, hebben betrekking op de proportie van individuen in de bevolking van 15 jaar en ouder die zich geregeld intoxiceren, en dit minstens een keer per week (AL03_2).

4.4.1. België

In België drinkt 40% van de bevolking van 15 jaar en ouder niet of een beetje, 26% van de inwoners geeft aan nog nooit 6 glazen alcohol of meer op eenzelfde gelegenheid te hebben gedronken, en 16% heeft dat minder dan een keer per maand over een periode van 12 maanden gedaan. Daartegenover drinkt 10% van de inwoners elke maand 6 glazen alcohol of meer op eenzelfde gelegenheid, 7% elke week en 1% elke dag of bijna elke dag.


Zo schatten we dat 8% van de bevolking zich geregeld overgeeft aan piekdrinken: anders gezegd, bijna één persoon op twaalf drinkt 6 glazen alcohol of meer op eenzelfde gelegenheid, en dit minstens een keer per week.

Analyse volgens geslacht en leeftijd

Drie keer zoveel mannen als vrouwen consumeren geregeld (minstens een keer per week) een dergelijke hoeveelheid alcohol (13% tegen 4%).



Figuur 16 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat een gedrag van geregeld piekdrinken aangeeft (minstens 1 keer per week), volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008



Geregeld piekdrinken is een gedrag dat meer voorkomt bij jongeren van 15-24 jaar (12%), en dan vooral bij jongens (17%). Het percentage is ook hoger tussen de leeftijd van 45 en 64 jaar (9-10%) en lager vanaf 65 jaar (<5%).

Bovendien komt dagelijks piekdrinken het meest voor bij de personen van 45 tot 64 jaar (om en bij de 2%), wat zich waarschijnlijk vertaalt in een situatie van alcoholafhankelijkheid.

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken

Geregeld piekdrinken komt vaker voor in de groep van de laagst opgeleiden (8,5%) dan in de groep van diegenen met een diploma hoger onderwijs (7,5%). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Piekdrinken is geen fenomeen dat gerelateerd is met de urbanisatiegraad waar het individu woont, na correctie voor leeftijd en geslacht.

4.4.2. Regio's


Geregeld piekdrinken komt meer voor in het Vlaams Gewest (9%) dan in het Brussels Gewest (6%), en dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Het percentage in het Waals Gewest (7%) ligt tussen de twee andere gewesten in, en verschilt niet op een statistisch significante manier.

Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest is, zoals in de andere gewesten, het geregeld piekdrinken eerder typisch mannelijk (14% tegen 4% van de vrouwen) en met de jeugd gerelateerd (14% van de 15-24 jarigen, tegen maximum 11% in de andere leeftijdsgroepen). Er kan geen verschil terug gevonden worden tussen de opleidingsniveaus van het huishouden of tussen de urbanisatiegraden van de woonplaats.




Figuur 17 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat een gedrag van geregeld piekdrinken aangeeft (minstens 1 keer per week), volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest



Brussels Gewest

De Brusselaars geven zich minder vaak (6%) over aan geregeld piekdrinken dan de inwoners van het Vlaams Gewest (9%), en het is zonder twijfel het percentage van de mannen die daarvoor verantwoordelijk is (9% in Brussel, tegen 14% in Vlaanderen). Dit gedrag is ook eerder typisch mannelijk in Brussel (9% tegen 4% bij de vrouwen), behalve bij de jongeren van 15-24 jaar: 10% van de meisjes en 10% van de jongens geeft aan minstens een keer per week excessief alcohol te gebruiken (Figuur 18). De grote betrouwbaarheidsintervallen rond de proporties spoort echter aan om deze resultaten met voorzichtigheid te interpreteren. Er is geen verband tussen het opleidingsniveau van het huishouden en geregeld piekdrinken, ook niet na correctie voor leeftijd en geslacht. De cijfers waargenomen in Brussel zijn evenredig met die van Gent en Antwerpen (7%) en van Luik en Charleroi (7%), en de verschillen zijn niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 18 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat een gedrag van geregeld piekdrinken aangeeft (minstens 1 keer per week), volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest






Waals Gewest

7% van de inwoners van het Waals Gewest vertonen minstens een keer per week het gedrag van piekdrinken. Meer mannen (11%) dan vrouwen (3%) hebben geregeld teveel alcohol gedronken.

Bij mannen is het percentage piekdrinken het hoogst in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar (15%, Figuur 19) en een tweede piek wordt bereikt tussen 55 en 64 jaar (15%). Bij de vrouwen observeren we twee kritieke leeftijdsgroepen voor dit gedrag: tussen 15 en 24 jaar (7%) en tussen 45 en 54 jaar (7%).

Het piekdrinken varieert niet in functie van het opleidingsniveau (hoewel het meer voorkomt in de groep met een diploma hoger secundair) na correctie voor leeftijd en geslacht. We stellen vast dat dit gedrag vaker voorkomt bij de inwoners van landelijke gebieden (9%) dan in stedelijke gebieden (6%) en dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 19 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat een gedrag van geregeld piekdrinken aangeeft (minstens 1 keer per week), volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 - Waals Gewest



4.5. Beginleeftijd van regelmatig alcoholgebruik (AL04_1)

Deze indicator gaat over de leeftijd wanneer de personen begonnen zijn met alcohol te drinken, dit wil zeggen meer dan de kleine simpele slokjes. De statistieken zijn aangemaakt op basis van de bevolking die de afgelopen 12 maanden alcohol heeft gedronken.


4.5.1. België

Analyse volgens geslacht en leeftijd

In België begint men alcohol te drinken op de gemiddelde leeftijd van 18 jaar en 2 maand. Jongens beginnen vroeger (rond 17 jaar 4 maand) dan meisjes (rond 19 jaar 1 maand), en dit verschil is significant na correctie voor de huidige leeftijd van de respondenten. Alcoholgebruik begint dus tijdens de adolescentie.

De leeftijd van de respondenten beïnvloedt de gemiddelde leeftijd dat men alcohol is beginnen drinken, hoewel deze beperkt blijft tussen gemiddeld 15 en 25 jaar (Figuur 20). Bij de mannen, wat ook de geboortecohort is (dit wil zeggen de huidige leeftijd), is de consumptie van alcohol begonnen op de gemiddelde leeftijd tussen 15 en 20 jaar. Bij de jongste generatie (15-24 jaar), zijn vrouwen op dezelfde leeftijd als mannen begonnen met alcohol te drinken. Het leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen bij de eerste consumptie neemt met de generaties toe. Zo zijn de oudste vrouwen (75 jaar en ouder) gemiddeld 4 à 5 jaar later begonnen met alcohol te drinken dan de mannen van hun generatie.

Figuur 20 Gemiddelde leeftijd waarop men alcohol is beginnen te drinken bij de gebruikers van 15 jaar en ouder, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008



Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken

Na correctie voor leeftijd en geslacht wordt er geen duidelijk verband vastgesteld tussen de beginleeftijd van alcoholgebruik en het opleidingsniveau van het huishouden. De urbanisatiegraad van de woonplaats heeft geen invloed op de gemiddelde leeftijd waarop men alcohol begint te drinken.

4.5.2. Regio's


Men begint in Brussel gemiddeld een jaar later te drinken (19 jaar) dan in de andere twee gewesten (18 jaar in Vlaanderen; 18 jaar 4 maand in Wallonië). Deze verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Vlaams Gewest

Zoals op nationaal niveau, beginnen mannen vroeger te drinken dan vrouwen (2 jaar eerder) en de beginleeftijd van alcoholconsumptie neemt een beetje toe met de cohorte, gaande van gemiddeld 15 tot 25 jaar bij de vrouwen en van 15 tot 18 jaar bij de mannen (Figuur 21). Het verschil tussen mannen en vrouwen voor deze indicator neemt ook toe met de generaties, vooral vanaf de leeftijd van 45 jaar.

We zien geen lineaire trend tussen het opleidingsniveau en de beginleeftijd van alcoholconsumptie. De analyse volgens urbanisatiegraad van de woonplaats toont geen verschil aangaande de leeftijd dat men begint met alcohol te drinken. Deze resultaten worden bevestigd wanneer gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht.


Figuur 21 Gemiddelde leeftijd waarop men alcohol is beginnen te drinken bij de gebruikers van 15 jaar en ouder, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest



Brussels Gewest

In het Brussels Gewest beginnen mannen een beetje later te drinken (18 jaar 7 maand) dan in de andere gewesten, wat verklaard zou kunnen worden door het feit dat het verschil tussen de geslachten aangaande de beginleeftijd van gebruik minder uitgesproken is dan in de andere gewesten.

Figuur 22 Gemiddelde leeftijd waarop men alcohol is beginnen te drinken bij de gebruikers van 15 jaar en ouder, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest





In tegenstelling tot de andere gewesten kan voor Brussel een samenhang worden vastgesteld tussen het opleidingsniveau en de gemiddelde leeftijd waarop men alcohol begint te drinken: de personen met de laagste opleiding beginnen later te drinken (22 jaar 8 maand) dan diegenen met een diploma hoger onderwijs (18 jaar 5 maand). Het verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.


Bovendien is de gemiddelde leeftijd waarop men alcohol begint te drinken in Brussel niet significant verschillend dan dat vastgesteld in de andere grote steden van het land.

Waals Gewest

In het Waals Gewest begint men alcohol te drinken rond de gemiddelde leeftijd van 18 jaar 3 maand (17 jaar 7 maand bij de mannen, 19 jaar 1 maand bij de vrouwen). De gemiddelde beginleeftijd van alcoholconsumptie evolueert met de huidige leeftijd van de respondenten, en dit zowel bij de mannen als bij de vrouwen (Figuur 23).

Zoals in het Vlaams Gewest, lijkt de gemiddelde leeftijd waarop men alcohol begint te drinken niet samen te hangen met het opleidingsniveau of met de urbanisatiegraad van de woonplaats.

Figuur 23 Gemiddelde leeftijd waarop men alcohol is begonnen te drinken bij de gebruikers van 15 jaar en ouder, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Waals Gewest



4.6. Problematisch alcoholgebruik (AL_1)

De indicator AL_1 geeft de prevalentie weer van problematisch alcoholgebruik en is gebaseerd op de CAGE vragenlijst. Men gaat uit van problematisch alcoholgebruik indien de persoon minstens twee van de vier vragen positief heeft beantwoord. Volgens de auteurs van CAGE is dit een schatter voor alcoholafhankelijkheid. Sommige wetenschappers menen echter dat de CAGE vragenlijst complicaties meet die eerder te maken hebben met een overmatig chronisch alcoholgebruik dan met alcoholafhankelijkheid. Daarom gebruiken wij hier liever de term "problematisch alcoholgebruik" of "problemen gerelateerd aan alcohol" dan "alcoholafhankelijkheid".



Deze indicator betreft de personen die aangegeven hebben dat ze in de afgelopen 12 maanden alcohol hebben gedronken. Naast uiteraard de personen die niet hebben gedronken in de afgelopen 12 maanden, zijn ook de personen die gestopt zijn met drinken omwille van een alcoholprobleem of om gezondheidsredenen die te maken hebben met een overmatig gebruik van alcohol niet in de noemer opgenomen.

4.6.1. België

In België heeft één persoon op tien van 15 jaar en ouder en die in de afgelopen 12 maanden alcohol heeft gedronken, problemen gekend die te wijten waren aan hun gebruik.


Analyse volgens geslacht en leeftijd

Het problematisch alcoholgebruik treft meer mannen dan vrouwen (13% tegen 7%, respectievelijk) en dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

De problemen die te maken hebben met alcohol variëren met de leeftijd: 8% van de jongeren van 15-24 jaar heeft al te maken gehad met problematisch gebruik, maar dit cijfer stijgt tot 13% bij de personen van 45-54 jaar. De prevalentie van problematisch alcoholgebruik neemt vervolgens gestaag af om nog maar 3% van de personen van 75 jaar en meer te treffen.

De distributie volgens leeftijd en geslacht (Figuur 24) toont aan dat één jonge man (15-24 jaar) op tien al in aanraking komt met problematisch gebruik en kent dergelijk gebruik een recordcijfer (17%) in de leeftijdsgroep van 25-34 jaar. Tussen de leeftijd van 45 en 64 jaar geeft iets meer dan 15% van de mannen aan een problematisch alcoholprobleem te hebben. Bij de vrouwen wordt de problematische consumptie vaker gemeld op de leeftijd van 45-54 jaar (12%).

Figuur 24 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008





Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken


Het opleidingsniveau heeft niet echt een invloed op het problematisch alcoholgebruik. We stellen echter vast dat de individuen met een diploma van het hoger secundair minder problemen te wijten aan alcohol aan geven dan diegenen met niet meer dan een diploma basisonderwijs. Het verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Problematisch alcoholgebruik komt meer voor in stedelijke (10%) en landelijke gebieden (10%) dan in halfstedelijke gebieden (8%). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Evolutie doorheen de tijd

Het problematisch gebruik van alcohol neemt op een lineaire en statistisch significante manier toe sinds 2001: 7% in dat jaar, 8% in 2004 en 10% in 2008 (Figuur 25). De verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 25 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, 2008



4.6.2. Regio's


Van de personen in Brussel die hebben aangegeven alcohol te hebben gedronken in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête, heeft 14% al te maken gehad met problemen die gerelateerd waren aan hun alcoholgedrag, tegen 10% in het Vlaams Gewest en 11% in het Waals Gewest. Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Vlaams Gewest

Zo hebben in Vlaanderen meer mannen dan vrouwen een problematisch alcoholgebruik (gehad) (13% tegen 6%). Dit verschil wordt vastgesteld in alle leeftijdsgroepen (Figuur 26). Het problematisch gebruik betreft proportioneel meer mannen (16%) in de leeftijdsgroep 25-34 jaar alsook in de leeftijdsgroep 45-64 jaar. Bij de vrouwen ligt de kritieke leeftijd tussen 45 en 54 jaar (9%).



Figuur 26 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest



In het Vlaams Gewest komen de problematische gebruikers meer voor bij de laagst geschoolden (14%). De verschillen met de andere opleidingsniveaus zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Het problematisch gebruik komt minder voor in halfstedelijke gebieden, en dit zelfs na correctie voor leeftijd en geslacht.

In Vlaanderen lijkt het problematisch alcoholgebruik een sprong in de tijd te hebben gemaakt: het verschil tussen enerzijds 2001 (5,2%) en 2004 (5,9%), en anderzijds 2008 (9,6%), is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.


Brussels Gewest

In het Brussels Gewest is het problematisch alcoholgebruik (14%) hoger dan in de twee andere gewesten. Bij mannen komt het vaker voor dan bij vrouwen (respectievelijk 17% en 12%). Het verschil tussen de geslachten is significant na correctie voor leeftijd.

Het problematisch alcoholgebruik varieert met de leeftijd, maar niet op lineaire wijze. Bij de jongeren van 15 tot 24 jaar heeft het problematisch alcoholgebruik betrekking op 15% van de gebruikers (tegen 5% in 2004!), en bereikt een record (17%) bij de volwassenen van 25 tot 34 jaar. Dit cijfer stagneert vervolgens rond de 15% tot de leeftijd van 64 jaar, en neemt daarna af. Mannen zijn het meest gevoelig voor een problematisch gebruik wanneer ze jong zijn (15-34 jaar: 19% à 22%) (Figuur 27). Vrouwen rapporteren meer problemen gerelateerd aan alcohol tussen 45 en 64 jaar (15%).



Figuur 27 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest



In tegenstelling tot het Vlaams Gewest, komen de alcohol gerelateerde problemen in Brussel minder vaak voor bij de laagst opgeleide personen (4%). Het percentage blijkt hoger te zijn in Brussel (14%) dan in de andere grote steden van het noorden en het zuiden van het land (11%), maar de verschillen zijn niet statistisch significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

De stijging in de tijd van het percentage problematisch alcoholgebruik (9% in 2001, 11% in 2004, 14% in 2008) is lineair en significant na correctie voor leeftijd en geslacht.


Waals Gewest

In het Waals Gewest ligt de prevalentie van het problematisch alcoholgebruik (11%) dicht bij dat van het Vlaams Gewest (10%). Het cijfer van problematisch alcoholgebruik verschilt niet significant tussen mannen (12%) en vrouwen (10%) na correctie voor leeftijd, zoals ook het geval is in het Brussels Gewest.

De problemen gerelateerd aan alcohol variëren met de leeftijd. Zo komt het problematisch gebruik minder voor in de uiterste leeftijdsgroepen. Bij de jonge Walen van 15-24 jaar komen proportioneel minder problemen voor die gerelateerd zijn aan alcohol in vergelijking met de andere gewesten (6% in Wallonië tegen 8% à 15% in de andere gewesten). De kritieke leeftijd waarop problematisch alcoholgebruik zich voordoet bij mannen is tussen 25 en 34 jaar (16%) en tussen 55 en 74 jaar (ongeveer 14%) (Figuur 28). De kritieke leeftijd bij vrouwen is tussen 45 en 54 jaar (16%).



Figuur 28 Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Waals Gewest



In het Waals Gewest is het problematisch alcoholgebruik na correctie voor leeftijd en geslacht onafhankelijk van het opleidingsniveau, en de de urbanisatiegraad van hun woonplaats.

In tegenstelling tot de twee andere gewesten, is de prevalentie van het problematisch alcoholgebruik gestegen tussen 2001 (9%) en 2004 (11%) en is sindsdien stabiel gebleven (11% en 2008, niet significant verschil).



5. Bespreking

In de Europese Regio is, van alle Regio's van de WGO, het alcoholgebruik het hoogst, namelijk twee keer zoveel als het wereldgemiddelde (2). In België wordt het gemiddeld alcoholgebruik in 2008 geschat op 9,0 liter per persoon. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2007 (9,3)². Wanneer we ons alleen richten op de bevolking van 15 jaar en ouder, dan bedraagt het gebruik van zuivere alcohol per persoon 10,8 liter per jaar². Het gemiddelde per volwassene en per jaar ligt in de EU rond 10,7 liter zuivere alcohol. België bevindt zich dus bij het gemiddelde van de landen van de Unie.

Volgens de gegevens van het rapport over de Europese Regio van de WGO³, zijn 6,3% van de vroegtijdige sterftes in de Regio te wijten aan alcohol, dit wil zeggen dat in 2002 ongeveer 600.000 Europeanen gestorven zijn ten gevolgen van alcoholisme. Zo waren meer dan 63.000 van deze doden jongeren tussen 15 en 29 jaar. Het aandeel van alcoholisme op de invaliditeit zou nog groter kunnen zijn aangezien 10,8% van de totale morbiditeit voor haar rekening is. Alcoholgebruik is bijgevolg de derde belangrijkste risicofactor voor sterfte en invaliditeit in Europa.

Het rapport van de WGO³ wijst er nogmaals op: "Alcohol maakt deel uit van het dagelijkse leven in vele Europese Regio's. Alcohol wordt gewaardeerd om verschillende redenen: het is bevorderlijk voor de gezelligheid, het hoort bij de maaltijd, het geeft een symbolische pauze aan en het brengt ontspanning na de verantwoordelijkheden van elke dag. Alcohol kan bijna overal bekomen worden, wordt erg geapprecieerd en is dus vertrouwd. Daarom is het moeilijk om afstand te nemen en objectief te blijven om te beseffen welke problemen er zich stellen en deze onder ogen durven te zien." Alcoholgebruik wordt deels positief beoordeeld. Toch moet men de nodige gezondheidsmaatregelen nemen om de kwalijke gevolgen ervan te voorkomen of te verminderen³. Om deze gevolgen in de samenleving te beperken, moet het preventiebeleid zich richten tot twee aspecten: het aanzetten om de gemiddelde consumptie te verminderen en om het problematisch gebruik terug te brengen (2).

Voor de WGO bestaan er maatregelen om de kwalijke gevolgen te voorkomen. Dit zou één van prioriteiten van het gezondheidsbeleid moeten zijn, zowel op regionaal als op nationaal niveau. De details van deze WGO-maatregelen³ zijn beschikbaar in de elektronische versie van het rapport vanaf volgende link: <http://www.euro.who.int/document/e88336.pdf>.

We weten dat de economische en fiscale belangen, van de productie en de verkoop van alcohol, het beleid echter beïnvloeden en kunnen dus initiatieven voor de volksgezondheid in de weg staan. Het gezondheidsbeleid over alcohol moet kunnen worden uitgewerkt zonder tussenkomst van commerciële belangen. Het beleid moet zich ook richten op de preventie en het terugbrengen van de kwalijke gevolgen door alcohol. Daarom is onderzoek over alcohol en de volksgezondheid nodig, met een publiek debat en een beschouwing door de beleidsverantwoordelijken vooropgesteld, en met de bedoeling om dit te verspreiden (compensatie van de economische belangen).

² Chiffres obtenus auprès du Service Public Fédéral Economie en octobre 2009.

³ Cadre de la politique en matière d'alcool dans la Région européenne de l'OMS. Organisation mondiale de la santé, 2006. <http://www.euro.who.int/document/e88336.pdf>. Dernière consultation le 18/03/2010.



Door beperkingen van de Gezondheidsenquête wordt het gebruikersprofiel van de bevolking beïnvloed: een onderschatting van het werkelijke gebruik, de sociale wenselijkheid, de bias te wijten aan het geheugen, ontkenning, zware drinkers bij de niet-deelnemers of het niet beantwoorden van de vragen met betrekking tot alcohol. Het voordeel van een gezondheidsenquête is dat het mogelijk is om het gebruikersprofiel in functie van sociodemografische en regionale factoren te bestuderen. De gegevens van de gezondheidsenquête laten ook diepgaandere analyses toe, maar die worden hier niet gerapporteerd.

De meerderheid van de inwoners van België van 15 jaar en ouder consumeert alcohol: 81% heeft verklaard alcohol te hebben gedronken in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête. Wanneer dit cijfer wordt vergeleken met de enquêtes uitgevoerd sinds 1997, dan is dit cijfer relatief stabiel gebleven in de tijd. Men geeft aan gemiddeld 11 glazen alcohol per week te hebben geconsumeerd. Wekelijkse overconsumptie (wat overeenkomt met meer dan 14 glazen per week voor vrouwen en 21 glazen per week voor mannen) is vastgesteld bij 8% van de inwoners, wat een lichte daling is.

Bovendien drinkt iets meer dan één Belg op tien (12%) dagelijks. Dit is een stijging sinds de laatste enquêtes (9%). Een ander probleem waar beleidsmakers zich zorgen over zouden moeten maken is dat het problematisch alcoholgebruik (dit betekent een chronisch overmatig alcoholgebruik of afhankelijk zijn van alcohol) blijft toenemen: 7% in 2001, 8% in 2004 en 10% in 2008. Ten slotte komt het piekdrinken (het drinken van 6 glazen of meer op eenzelfde gelegenheid), minstens wekelijks, voor bij 12% van de jongeren en bij één op tien volwassenen van 45 tot 64 jaar. Tevens er geen vermindering van dit fenomeen in de tijd waargenomen. Daarom verdient dit probleem zeker de nodige aandacht wat de bewustmaking van de risico's en de preventie ervan betreft.

Daarom is onderzoek naar het profiel van risicogebruik in functie van de sociodemografische variabelen zo belangrijk voor een gericht gezondheidsbeleid. Zo zien we dat het risicogebruik van alcohol meer voorkomt bij mannen, jongeren of volwassenen. Gezien de vermindering van overconsumptie van alcohol - episodisch en chronisch – in onze samenleving, is het nuttig hiermee rekening te houden bij het uitwerken van de maatregelen. Men mag echter ook niet het alcoholprobleem bij vrouwen negeren, namelijk in het kader van de bescherming van het kind: alcohol tijdens de zwangerschap en de borstvoeding, fysiek geweld veroorzaakt door alcohol, alcohol bij eenoudergezinnen, enz. (deze laatste beschouwingen gelden ook voor de mannen).

Jongeren van 15 tot 24 jaar, en meer bepaald de jongens, zijn een belangrijke risicogroep waarbij acties ondernomen zouden moeten worden. Piekdrinken (6+ glazen op 1 gelegenheid), alsook zijn frequentie, is een gedrag dat eigen is aan deze leeftijdsgroep. Opmerkelijk is ook dat het gemiddeld aantal glazen alcohol per week (10 glazen) bij jongeren van 15-24 jaar bijna zoveel is als bij volwassenen van rijpere leeftijd – hoewel jongeren minder dagelijks drinken. Anders gezegd, jongeren consumeren op enkele dagen wat oudere personen op een hele week consumeren. Ten slotte heeft 10% van de jonge mannen van 15-24 jaar en 17% van de mannen van 25-34 jaar al problemen ervaren door hun alcoholgebruik (volgens de CAGE).



De resultaten van de Gezondheidsenquête bevestigen dus dat het belangrijk is om dringend acties bij jongeren uit te voeren om zo de schade aangericht door alcoholintoxicatie (hetzij “binge drinking” hetzij alcoholmisbruik) te beperken. Daarom is inperking van de beschikbaarheid van alcohol (wetgeving voor de minderjarigen, beperking van de verkooppunten, evaluatie van de prijs...) een belangrijke strategie. Meer nog dan het verbieden van alcohol tot aan de leeftijd van 18 of 21 jaar – wat alleen maar de nieuwsgierigheid en de zin naar alcohol heeft gestimuleerd – zou het aangewezen zijn om bijvoorbeeld de reclame voor alcohol te verbieden en zich zo kanten tegen de marketingstrategieën, welke zijn opgezet door de alcoholindustrie en vooral de jeugd willen verleiden – en aan zich wil binden! Deze maatregelen moeten worden gedragen door gezondheidsinformatie en -vorming en moet iedereen van de maatschappij omvatten.

Alcoholgebruik, risicogebruik en problemen gerelateerd aan alcohol zijn gedragingen die vooral worden vastgesteld op veertigjarige leeftijd, en dit tot de leeftijd van ongeveer 65 jaar. Deze gedragingen komen tevens voor in alle lagen van de bevolking. De gehele bevolking zou dus kunnen profiteren van een efficiënte sensibilisering aangaande de alcohol gerelateerde risico's en het schadelijk alcoholgebruik.

Er bestaat een internationale consensus (WGO) met de meest doeltreffende methoden om het alcoholgebruik in de samenleving te verminderen. De belangrijkste maatregelen zijn een verhoging van de prijs (via belastingen), het verbod op reclame of sponsoring, uitdrukkelijke waarschuwingen voor de gezondheidsrisico's op de verpakkingen, gezondheidsinformatie en –opvoeding via verschillende kanalen, steun aan personen die willen minderen met drinken of proberen er een termijn op te zetten... Om echt effect te hebben op het niveau van de ganse bevolking, dienen deze maatregelen gecombineerd te worden en een lange tijd volgehouden te worden.

Alcohol is een punt op het beleidskader van 2006 en is dus een nieuwe stap in het beleid inzake alcohol, onder leiding van het Regionaal Bureau van de WGO voor Europa. Het kader is gericht op het aanmoedigen en het vergemakkelijken van de uitwerking, de toepassing en de acties op wereldniveau, maar ook op regionaal, nationaal en lokaal niveau, zodat de kwalijke gevolgen van alcohol worden voorkomen of beperkt. Dit laat toe om de instrumenten en de bestaande internationale documenten bij elkaar te brengen, en beantwoordt aan recente ontwikkelingen, nieuwe uitdagingen en nood aan onderzoek.



6. Bibliografie

- (1) Marks DF, Murray M, Evans E, Willig C. Health Psychology: Theory, research and practice. London: Sage Publications Ltd, 2000.
- (2) Rehn N, Room R, Edwards G. Alcohol in the European Region - consumption, harm and policies. 1-107. 2001. WHO.



Tabellen

België

Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol consumeert heeft in de afgelopen 12 maanden, België	428
Verdeling (%) van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens de frequentie van alcoholgebruik in de afgelopen 12 maanden, België	429
Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat dagelijks alcohol consumeert in de afgelopen 12 maanden, België	430
Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de wekelijkse alcoholgebruikers van 15 en ouder, België	431
Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens het gemiddeld aantal glazen alcohol geconsumeerd per week, België	432
Percentage van de bevolking (van 15 en ouder) met een wekelijkse overconsumptie van alcohol (15+ glazen voor vrouwen; 22+ glazen voor mannen), België	433
Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens de frequentie van piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid) in de afgelopen 12 maanden, België	434
Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat zich minstens een keer per week overgeeft aan piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid), België	435
Gemiddelde leeftijd waarop men alcohol is beginnen te drinken bij de gebruikers (van 15 jaar en ouder), België	436
Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft (gebaseerd op de CAGE, grenswaarde 2+), België	437



Vlaams Gewest

Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol consumeert heeft in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest.....	438
Verdeling (%) van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens de frequentie van alcoholgebruik in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest	439
Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat dagelijks alcohol consumeert in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest.....	440
Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de wekelijkse alcoholgebruikers van 15 en ouder, Vlaams Gewest.....	441
Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens het gemiddeld aantal glazen alcohol geconsumeerd per week, Vlaams Gewest	442
Percentage van de bevolking (van 15 en ouder) met een wekelijkse overconsumptie van alcohol (15+ glazen voor vrouwen; 22+ glazen voor mannen), Vlaams Gewest	443
Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens de frequentie van piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid) in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest	444
Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat zich minstens een keer per week overgeeft aan piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid), Vlaams Gewest.....	445
Gemiddelde leeftijd waarop men alcohol is begonnen te drinken bij de gebruikers (van 15 jaar en ouder), Vlaams Gewest	446
Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft (gebaseerd op de CAGE, grenswaarde 2+), Vlaams Gewest	447



Brussels Gewest

Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol consumeert heeft in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest.....	448
Verdeling (%) van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens de frequentie van alcoholgebruik in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest	449
Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat dagelijks alcohol consumeert in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest	450
Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de wekelijkse alcoholgebruikers van 15 en ouder, Brussels Gewest.....	451
Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens het gemiddeld aantal glazen alcohol geconsumeerd per week, Brussels Gewest	452
Percentage van de bevolking (van 15 en ouder) met een wekelijkse overconsumptie van alcohol (15+ glazen voor vrouwen; 22+ glazen voor mannen), Brussels Gewest	453
Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens de frequentie van piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid) in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest.....	454
Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat zich minstens een keer per week overgeeft aan piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid), Brussels Gewest.....	455
Gemiddelde leeftijd waarop men alcohol is begonnen te drinken bij de gebruikers (van 15 jaar en ouder), Brussels Gewest	456
Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft (gebaseerd op de CAGE, grenswaarde 2+), Brussels Gewest	457



Waals Gewest

Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol consumeert heeft in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest.....	458
Verdeling (%) van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens de frequentie van alcoholgebruik in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest	459
Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat dagelijks alcohol consumeert in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest.....	460
Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de wekelijkse alcoholgebruikers van 15 en ouder, Waals Gewest.....	461
Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens het gemiddeld aantal glazen alcohol geconsumeerd per week, Waals Gewest	462
Percentage van de bevolking (van 15 en ouder) met een wekelijkse overconsumptie van alcohol (15+ glazen voor vrouwen; 22+ glazen voor mannen), Waals Gewest	463
Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens de frequentie van piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid) in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest	464
Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat zich minstens een keer per week overgeeft aan piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid), Waals Gewest.....	465
Gemiddelde leeftijd waarop men alcohol is beginnen te drinken bij de gebruikers (van 15 jaar en ouder), Waals Gewest	466
Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft (gebaseerd op de CAGE, grenswaarde 2+), Waals Gewest	467



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol consumeert heeft
in de afgelopen 12 maanden, België

AL01_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	84,5	(82,8-86,2)	84,4	(82,6-86,1)	3495
	Vrouwen	76,9	(75,1-78,8)	77,0	(75,1-78,8)	4078
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	77,5	(73,5-81,5)	77,7	(73,3-81,6)	901
	25 - 34	79,1	(75,7-82,4)	79,5	(75,9-82,6)	1090
	35 - 44	83,1	(80,5-85,6)	83,4	(80,7-85,8)	1261
	45 - 54	84,8	(82,3-87,4)	85,1	(82,3-87,4)	1193
	55 - 64	84,6	(81,9-87,3)	84,8	(81,9-87,3)	1150
	65 - 74	76,5	(71,9-81,2)	77,0	(72,0-81,3)	723
	75 +	70,5	(66,5-74,6)	71,4	(67,2-75,3)	1255
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	64,0	(59,1-68,8)	64,5	(59,0-69,7)	945
	Lager secundair	74,4	(70,5-78,3)	73,8	(69,4-77,7)	1204
	Hoger secundair	79,0	(76,4-81,5)	79,3	(76,7-81,7)	2342
	Hoger onderwijs	88,5	(86,8-90,2)	88,8	(87,0-90,5)	2902
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	78,0	(76,0-80,0)	78,5	(76,3-80,5)	4140
	Halfstedelijk gebied	81,8	(78,9-84,8)	82,1	(79,0-84,8)	1348
	Landelijk gebied	83,4	(81,0-85,8)	83,7	(81,1-85,9)	2085
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	83,2	(81,3-85,1)	83,5	(81,5-85,3)	2989
	Brussels Gewest	70,5	(67,8-73,3)	70,9	(67,9-73,6)	1928
	Waals Gewest	78,2	(76,0-80,3)	78,5	(76,3-80,7)	2656
JAAR	1997	84,1	(82,9-85,3)	84,2	(83,0-85,4)	8259
	2001	80,5	(79,3-81,7)	81,5	(80,3-82,6)	9321
	2004	84,2	(83,1-85,3)	85,2	(84,0-86,3)	9531
	2008	80,6	(79,2-82,0)	81,5	(80,1-82,9)	7573

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling (%) van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens de frequentie van alcoholgebruik in de afgelopen 12 maanden, België

AL01_2		Drinkt niet	Eén keer per maand of minder	2 tot 4 keer per maand	2 tot 3 keer per week	4 keer per week of meer	N
GESLACHT	Mannen	15,5	15,0	20,4	23,6	25,5	3495
	Vrouwen	23,1	25,2	22,6	14,7	14,5	4078
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	22,5	25,7	28,3	17,6	5,9	901
	25 - 34	20,9	21,7	25,5	21,4	10,5	1090
	35 - 44	16,9	23,5	24,0	20,1	15,5	1261
	45 - 54	15,2	18,4	19,9	21,0	25,5	1193
	55 - 64	15,4	15,5	17,4	20,6	31,1	1150
	65 - 74	23,5	17,6	16,4	14,6	28,0	723
	75 +	29,5	17,6	15,4	12,1	25,4	1255
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	36,0	21,7	16,5	12,0	13,8	945
	Lager secundair	25,6	22,4	19,5	15,0	17,5	1204
	Hoger secundair	21,0	21,4	21,9	17,1	18,6	2342
	Hoger onderwijs	11,5	18,3	23,5	23,8	22,9	2902
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	22,0	20,0	18,4	17,8	21,9	4140
	Halfstedelijk gebied	18,2	18,6	28,5	17,3	17,4	1348
	Landelijk gebied	16,6	21,9	21,0	22,0	18,5	2085
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	16,8	20,3	23,3	20,0	19,6	2989
	Brussels Gewest	29,5	17,8	15,3	17,9	19,7	1928
	Waals Gewest	21,8	21,0	19,8	17,2	20,2	2656
JAAR	2008	19,4	20,3	21,6	19,0	19,8	7573

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat dagelijks alcohol consumeert in de afgelopen 12 maanden, België

AL01_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	15,6	(14,0-17,2)	12,2	(10,7-13,9)	3495
	Vrouwen	8,7	(7,6-9,8)	6,4	(5,5-7,4)	4078
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	2,7	(1,4-4,0)	2,6	(1,6-4,1)	901
	25 - 34	3,8	(2,3-5,3)	3,6	(2,4-5,4)	1090
	35 - 44	6,5	(4,9-8,1)	6,2	(4,8-8,0)	1261
	45 - 54	15,0	(12,3-17,7)	14,4	(11,9-17,3)	1193
	55 - 64	21,4	(18,2-24,6)	20,7	(17,7-24,1)	1150
	65 - 74	20,5	(16,0-24,9)	20,1	(16,0-24,9)	723
	75 +	20,6	(16,8-24,4)	20,7	(17,2-24,8)	1255
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	11,3	(8,6-14,1)	5,4	(4,0-7,3)	945
	Lager secundair	12,8	(9,9-15,7)	7,1	(5,5-9,2)	1204
	Hoger secundair	12,0	(10,0-14,0)	9,1	(7,5-11,0)	2342
	Hoger onderwijs	11,5	(9,9-13,1)	9,8	(8,4-11,5)	2902
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	14,4	(12,7-16,1)	10,8	(9,4-12,4)	4140
	Halfstedelijk gebied	9,0	(7,0-11,0)	6,4	(5,1-8,2)	1348
	Landelijk gebied	10,8	(8,9-12,6)	7,7	(6,3-9,5)	2085
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	11,3	(9,8-12,8)	8,1	(6,9-9,4)	2989
	Brussels Gewest	11,3	(9,7-12,9)	9,4	(7,9-11,1)	1928
	Waals Gewest	13,6	(11,8-15,5)	10,2	(8,7-12,0)	2656
JAAR	1997	7,7	(6,8-8,6)	6,2	(5,5-7,1)	8259
	2001	9,6	(8,8-10,4)	7,3	(6,6-8,0)	9413
	2004	9,2	(8,4-10,0)	6,9	(6,2-7,6)	9531
	2008	12,0	(10,9-13,1)	9,0	(8,1-9,9)	7573

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de wekelijkse alcoholgebruikers van 15 en ouder, België**

AL02_4		Gemiddelde (Ruw)	+ 95% BI	Gemiddelde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	13,0	(12,2-13,7)	12,8	(12,1-13,5)	2208
	Vrouwen	7,6	(7,1-8,1)	7,4	(6,9-7,9)	1901
LEEFTIJD- GROEP	15 - 24	10,4	(9,2-11,6)	10,1	(9,0-11,2)	411
	25 - 34	10,2	(8,6-11,7)	9,8	(8,3-11,3)	582
	35 - 44	9,0	(8,2-9,8)	8,7	(7,9-9,5)	689
	45 - 54	11,8	(10,6-13,1)	11,5	(10,2-12,7)	724
	55 - 64	12,5	(11,2-13,8)	12,1	(10,9-13,4)	729
	65 - 74	9,8	(8,7-10,9)	9,4	(8,4-10,5)	392
	75 +	8,7	(7,6-9,7)	8,3	(7,3-9,3)	582
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	11,2	(8,9-13,5)	11,1	(8,6-13,5)	327
	Lager secundair	11,4	(9,7-13,0)	10,4	(8,8-12,1)	527
	Hoger secundair	10,8	(9,9-11,7)	10,3	(9,4-11,1)	1241
	Hoger onderwijs	10,1	(9,4-10,7)	9,5	(8,9-10,1)	1925
URBANISATIE- GRAAD	Stedelijk gebied	10,8	(10,0-11,6)	10,4	(9,7-11,2)	2197
	Halfstedelijk gebied	9,8	(9,0-10,6)	9,1	(8,3-9,9)	757
	Landelijk gebied	10,9	(10,0-11,8)	10,2	(9,3-11,1)	1155
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	10,2	(9,6-10,8)	9,6	(9,1-10,1)	1724
	Brussels Gewest	9,9	(9,2-10,6)	9,7	(9,0-10,4)	990
	Waals Gewest	11,7	(10,5-12,9)	11,2	(10,1-12,3)	1395
JAAR	1997	9,8	(9,2-10,3)	9,1	(8,6-9,6)	4426
	2001	11,4	(10,9-12,0)	10,9	(10,4-11,4)	4933
	2004	10,6	(10,1-11,0)	10,1	(9,7-10,6)	5343
	2008	10,6	(10,1-11,1)	10,0	(9,6-10,5)	4109

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens het gemiddeld aantal glazen alcohol geconsumeerd per week, België

AL02_5		Drinkt niet of een beetje	1-7 glazen	8-14 glazen	15-21 glazen	22 glazen of meer	N
GESLACHT	Mannen	31,8	29,4	18,6	10,2	10,0	3354
	Vrouwen	49,9	33,8	10,4	3,6	2,4	3941
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	50,1	25,6	12,7	5,7	5,9	864
	25 - 34	44,1	32,4	13,6	4,8	5,2	1061
	35 - 44	41,6	36,5	11,4	6,3	4,2	1226
	45 - 54	34,8	30,3	19,3	8,5	7,2	1154
	55 - 64	32,2	32,3	16,3	9,2	9,9	1100
	65 - 74	42,8	31,4	13,6	6,8	5,3	687
	75 +	50,1	31,7	10,7	4,7	2,9	1203
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	59,9	24,5	6,7	4,2	4,7	906
	Lager secundair	50,8	27,5	10,7	4,8	6,2	1144
	Hoger secundair	44,1	29,4	13,5	6,7	6,2	2261
	Hoger onderwijs	30,8	36,8	18,2	8,1	6,1	2808
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	43,4	29,7	15,0	6,4	5,6	4013
	Halfstedelijk gebied	38,4	35,6	13,1	6,7	6,2	1287
	Landelijk gebied	40,2	31,7	14,3	7,4	6,5	1995
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	38,4	32,9	15,1	7,8	5,9	2888
	Brussels Gewest	49,0	29,5	11,4	5,3	4,8	1869
	Waals Gewest	44,9	29,8	13,6	5,0	6,7	2538
JAAR	1997	41,8	34,1	13,3	5,0	5,7	8061
	2001	42,6	30,5	13,1	6,3	7,6	8817
	2004	37,7	34,4	14,8	5,9	7,3	9051
	2008	41,2	31,7	14,3	6,7	6,0	7295

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de bevolking (van 15 en ouder) met een wekelijkse overconsumptie van alcohol (15+ glazen voor vrouwen; 22+ glazen voor mannen), België

AL02_6		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	10,0	(8,6-11,3)	9,2	(8,0-10,6)	3354
	Vrouwen	5,9	(4,9-7,0)	5,6	(4,7-6,7)	3941
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	7,3	(4,9-9,7)	7,1	(5,1-9,8)	864
	25 - 34	6,3	(4,3-8,3)	6,2	(4,5-8,4)	1061
	35 - 44	6,3	(4,6-8,0)	6,2	(4,7-8,1)	1226
	45 - 54	9,1	(7,0-11,2)	8,9	(7,0-11,2)	1154
	55 - 64	13,3	(10,7-16,0)	13,0	(10,5-15,9)	1100
	65 - 74	6,5	(4,1-8,9)	6,4	(4,4-9,2)	687
	75 +	4,0	(2,3-5,6)	4,0	(2,6-6,0)	1203
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	5,9	(3,8-8,0)	5,7	(3,9-8,2)	906
	Lager secundair	7,5	(5,2-9,8)	6,5	(4,8-8,8)	1144
	Hoger secundair	7,9	(6,3-9,5)	7,2	(5,8-8,9)	2261
	Hoger onderwijs	8,3	(6,9-9,7)	7,6	(6,3-9,1)	2808
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	7,7	(6,4-9,0)	7,0	(5,9-8,4)	4013
	Halfstedelijk gebied	8,1	(6,2-10,1)	7,4	(5,8-9,4)	1287
	Landelijk gebied	8,0	(6,4-9,5)	7,2	(5,8-8,8)	1995
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	7,8	(6,6-9,1)	7,1	(6,0-8,4)	2888
	Brussels Gewest	6,7	(5,4-7,9)	6,3	(5,2-7,6)	1869
	Waals Gewest	8,3	(6,8-9,8)	7,6	(6,3-9,1)	2538
JAAR	1997	7,0	(6,2-7,8)	6,3	(5,5-7,1)	8061
	2001	9,3	(8,4-10,1)	8,5	(7,7-9,4)	8817
	2004	9,0	(8,1-9,8)	8,2	(7,4-9,1)	9051
	2008	7,9	(7,0-8,8)	7,1	(6,3-8,0)	7295

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens de frequentie van piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid) in de afgelopen 12 maanden, België

AL03_1		Drinkt niet of bijna niet	Nooit piekdrinken	Minder dan één keer per maand	Maandelijk	Wekelijks	Dagelijks of bijna dagelijks	N
GESLACHT	Mannen	30,7	22,2	20,5	13,8	10,9	1,8	3469
	Vrouwen	48,6	29,2	12,4	6,2	3,2	0,5	4052
LEEFTIJDSGROEP	15 - 24	48,6	9,8	15,0	14,5	11,3	0,8	896
	25 - 34	42,7	17,1	20,2	12,2	7,1	0,7	1086
	35 - 44	40,5	22,8	18,7	11,1	6,2	0,8	1256
	45 - 54	33,7	26,3	19,2	11,4	7,6	1,7	1188
	55 - 64	31,4	33,7	16,8	8,2	7,6	2,2	1139
	65 - 74	41,5	39,4	10,3	4,0	3,9	1,0	715
	75 +	47,6	43,2	5,4	1,5	2,0	0,2	1241
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	58,1	20,4	7,1	6,0	6,8	1,7	941
	Lager secundair	48,3	24,7	11,5	6,5	7,5	1,5	1196
	Hoger secundair	42,9	23,5	16,3	9,3	7,2	0,9	2322
	Hoger onderwijs	30,0	29,5	20,4	12,7	6,6	1,0	2882
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	42,2	27,8	14,6	8,1	5,8	1,5	4112
	Halfstedelijk gebied	37,3	26,2	17,6	10,7	7,6	0,6	1335
	Landelijk gebied	38,8	22,5	17,9	11,8	8,1	1,0	2074
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	37,4	27,4	16,0	10,3	7,7	1,2	2965
	Brussels Gewest	47,5	24,9	12,8	8,6	5,2	1,0	1916
	Waals Gewest	43,0	22,8	17,9	9,3	5,8	1,1	2640
JAAR	2008	40,0	25,8	16,3	9,8	6,9	1,1	7521

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat zich minstens een keer per week overgeeft aan piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid), België

AL03_2		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	12,7	(11,2-14,3)	11,7	(10,3-13,3)	3469
	Vrouwen	3,7	(2,8-4,6)	3,4	(2,7-4,4)	4052
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	12,0	(9,0-15,0)	10,4	(7,8-13,6)	896
	25 - 34	7,8	(5,7-9,9)	6,8	(5,1-9,0)	1086
	35 - 44	7,0	(5,1-8,8)	5,9	(4,5-7,8)	1256
	45 - 54	9,4	(7,0-11,7)	8,0	(6,1-10,3)	1188
	55 - 64	9,9	(7,6-12,1)	8,4	(6,5-10,7)	1139
	65 - 74	4,8	(2,7-6,9)	4,1	(2,6-6,5)	715
	75 +	2,3	(0,8-3,7)	2,0	(1,0-3,9)	1241
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	8,5	(5,2-11,8)	8,8	(5,8-13,0)	941
	Lager secundair	9,0	(6,7-11,4)	7,6	(5,7-10,0)	1196
	Hoger secundair	8,0	(6,4-9,7)	6,1	(4,7-7,8)	2322
	Hoger onderwijs	7,5	(6,2-8,9)	5,5	(4,5-6,8)	2882
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	7,3	(6,0-8,5)	5,7	(4,7-7,1)	4112
	Halfstedelijk gebied	8,2	(6,3-10,2)	6,5	(5,0-8,5)	1335
	Landelijk gebied	9,1	(7,4-10,8)	7,1	(5,8-8,8)	2074
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	8,9	(7,5-10,2)	7,0	(5,8-8,3)	2965
	Brussels Gewest	6,2	(4,8-7,6)	4,8	(3,8-6,2)	1916
	Waals Gewest	6,9	(5,6-8,3)	5,5	(4,4-6,8)	2640
JAAR	2008	8,1	(7,1-9,0)			7521

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Gemiddelde leeftijd waarop men alcohol is begonnen te drinken bij de gebruikers
(van 15 jaar en ouder), België**

AL04_1		Gemiddelde (Ruw)	+ 95% BI	Gemiddelde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	17,3	(17,1-17,4)	17,3	(17,1-17,5)	2773
	Vrouwen	19,1	(18,8-19,4)	19,2	(18,9-19,5)	2723
LEEFTIJD- GROEP	15 - 24	15,6	(15,4-15,8)	15,6	(15,4-15,8)	663
	25 - 34	16,5	(16,3-16,7)	16,6	(16,4-16,8)	816
	35 - 44	17,8	(17,5-18,1)	17,8	(17,5-18,1)	974
	45 - 54	18,5	(18,0-18,9)	18,5	(18,1-19,0)	941
	55 - 64	19,1	(18,7-19,5)	19,2	(18,8-19,6)	888
	65 - 74	20,7	(19,9-21,5)	20,8	(20,0-21,6)	490
	75 +	21,7	(20,5-22,9)	21,8	(20,6-23,0)	724
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	20,2	(19,0-21,4)	19,0	(18,0-20,1)	489
	Lager secundair	18,1	(17,7-18,5)	17,5	(17,2-17,9)	765
	Hoger secundair	18,2	(17,9-18,6)	18,5	(18,2-18,8)	1686
	Hoger onderwijs	17,8	(17,5-18,0)	18,2	(17,9-18,4)	2441
URBANISATIE- GRAAD	Stedelijk gebied	18,4	(18,1-18,7)	18,4	(18,1-18,7)	2938
	Halfstedelijk gebied	18,1	(17,7-18,5)	18,3	(17,9-18,7)	993
	Landelijk gebied	17,9	(17,6-18,2)	18,1	(17,8-18,4)	1565
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	18,0	(17,7-18,2)	18,1	(17,8-18,3)	2263
	Brussels Gewest	19,0	(18,7-19,4)	19,2	(18,9-19,6)	1319
	Waals Gewest	18,3	(18,0-18,7)	18,4	(18,1-18,8)	1914
JAAR	2008	18,2	(18,0-18,4)			5496

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft (gebaseerd op de CAGE, grenswaarde 2+), België

AL_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	13,1	(11,4-14,7)	11,9	(10,4-13,6)	2846
	Vrouwen	7,4	(6,2-8,6)	6,7	(5,7-7,9)	2893
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	7,8	(5,2-10,3)	7,4	(5,3-10,3)	669
	25 - 34	11,7	(8,8-14,6)	11,2	(8,8-14,2)	832
	35 - 44	10,4	(8,0-12,8)	10,0	(7,8-12,6)	996
	45 - 54	13,4	(10,4-16,3)	12,8	(10,3-15,9)	970
	55 - 64	12,0	(9,5-14,5)	11,5	(9,2-14,2)	936
	65 - 74	6,8	(4,5-9,0)	6,4	(4,5-9,0)	525
	75 +	3,3	(1,7-5,0)	3,2	(1,9-5,2)	811
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	11,7	(6,9-16,5)	12,9	(8,6-18,9)	532
	Lager secundair	7,2	(5,0-9,4)	6,3	(4,5-8,8)	811
	Hoger secundair	9,9	(8,0-11,9)	8,5	(6,9-10,3)	1769
	Hoger onderwijs	11,0	(9,5-12,5)	9,2	(7,9-10,7)	2504
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	11,4	(9,8-12,9)	10,0	(8,6-11,6)	3050
	Halfstedelijk gebied	8,0	(6,1-9,9)	6,8	(5,3-8,8)	1049
	Landelijk gebied	10,5	(8,5-12,5)	9,0	(7,4-10,9)	1640
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	9,6	(8,1-11,0)	8,3	(7,1-9,7)	2364
	Brussels Gewest	14,4	(12,2-16,7)	12,7	(10,7-15,1)	1376
	Waals Gewest	10,7	(9,1-12,4)	9,3	(7,9-11,0)	1999
JAAR	2001	6,6	(5,9-7,4)	5,5	(4,9-6,2)	7015
	2004	7,8	(7,0-8,6)	6,6	(5,9-7,4)	7249
	2008	10,3	(9,2-11,3)	8,9	(8,0-9,9)	5739

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol consumeert heeft
in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

AL01_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	86,1	(83,8-88,5)	86,2	(83,6-88,4)	1436
	Vrouwen	80,3	(77,8-82,9)	80,6	(77,8-83,1)	1553
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	82,5	(76,9-88,2)	82,6	(76,2-87,6)	349
	25 - 34	81,1	(75,9-86,2)	81,4	(75,8-85,9)	366
	35 - 44	85,8	(82,4-89,3)	86,0	(82,2-89,1)	462
	45 - 54	87,8	(84,4-91,2)	88,0	(84,1-91,0)	488
	55 - 64	86,8	(83,3-90,3)	86,9	(83,0-90,0)	477
	65 - 74	78,1	(71,9-84,3)	78,4	(71,4-84,0)	328
	75 +	70,7	(65,1-76,4)	71,3	(65,5-76,6)	519
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	69,2	(62,8-75,7)	71,3	(63,6-78,0)	410
	Lager secundair	78,4	(72,7-84,2)	77,9	(71,0-83,6)	458
	Hoger secundair	82,2	(78,6-85,8)	82,4	(78,6-85,6)	961
	Hoger onderwijs	89,0	(86,6-91,4)	89,1	(86,3-91,3)	1114
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	83,6	(80,4-86,7)	84,3	(80,7-87,3)	1152
	Halfstedelijk gebied	82,3	(78,9-85,8)	82,4	(78,8-85,6)	932
	Landelijk gebied	83,5	(80,1-87,0)	83,7	(80,0-86,8)	905
JAAR	1997	86,0	(84,4-87,7)	86,0	(84,2-87,6)	2920
	2001	82,0	(80,3-83,8)	83,4	(81,7-84,9)	3316
	2004	86,4	(85,0-87,9)	87,8	(86,3-89,2)	3645
	2008	83,2	(81,3-85,1)	84,6	(82,5-86,5)	2989

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling (%) van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens de frequentie van alcoholgebruik in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

AL01_2		Drinkt niet	Eén keer per maand of minder	2 tot 4 keer per maand	2 tot 3 keer per week	4 keer per week of meer	N
GESLACHT	Mannen	13,9	14,1	21,9	24,8	25,4	1436
	Vrouwen	19,7	26,1	24,6	15,4	14,1	1553
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	17,5	25,8	31,1	19,7	6,0	349
	25 - 34	18,9	20,9	27,8	23,6	8,7	366
	35 - 44	14,2	23,5	27,1	20,2	15,1	462
	45 - 54	12,2	17,5	20,9	22,8	26,7	488
	55 - 64	13,2	16,4	19,1	21,0	30,3	477
	65 - 74	21,9	18,7	17,1	14,3	28,0	328
	75 +	29,3	18,4	15,8	12,6	23,9	519
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	30,8	24,4	18,2	15,0	11,6	410
	Lager secundair	21,6	22,5	21,3	17,7	17,0	458
	Hoger secundair	17,8	20,4	23,8	18,6	19,5	961
	Hoger onderwijs	11,0	18,2	25,1	23,4	22,3	1114
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	16,4	20,0	20,2	19,7	23,6	1152
	Halfstedelijk gebied	17,7	18,9	29,0	17,2	17,3	932
	Landelijk gebied	16,5	22,1	21,3	23,3	16,9	905
JAAR	2008	16,8	20,3	23,3	20,0	19,6	2989

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat dagelijks alcohol consumeert in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

AL01_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	14,9	(12,7-17,1)	11,1	(9,0-13,7)	1436
	Vrouwen	7,9	(6,3-9,4)	5,5	(4,4-6,9)	1553
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	2,1	(0,4-3,9)	2,0	(0,9-4,3)	349
	25 - 34	3,2	(1,0-5,4)	3,0	(1,5-6,0)	366
	35 - 44	5,8	(3,6-8,0)	5,5	(3,7-8,0)	462
	45 - 54	14,8	(11,0-18,6)	14,1	(10,8-18,2)	488
	55 - 64	19,7	(15,4-24,0)	18,9	(14,9-23,6)	477
	65 - 74	19,2	(13,1-25,3)	18,6	(13,2-25,4)	328
	75 +	19,1	(13,8-24,4)	19,0	(14,3-24,8)	519
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	8,6	(5,2-12,0)	3,7	(2,3-5,9)	410
	Lager secundair	11,9	(8,0-15,9)	5,6	(3,8-8,2)	458
	Hoger secundair	12,0	(9,1-14,9)	8,4	(6,4-11,1)	961
	Hoger onderwijs	10,6	(8,5-12,8)	8,7	(6,8-11,1)	1114
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	15,2	(12,4-17,9)	10,7	(8,5-13,4)	1152
	Halfstedelijk gebied	8,9	(6,6-11,2)	6,0	(4,4-8,0)	932
	Landelijk gebied	8,9	(6,4-11,4)	5,9	(4,2-8,2)	905
JAAR	1997	6,5	(5,3-7,7)	5,0	(4,1-6,1)	2920
	2001	8,5	(7,4-9,6)	6,2	(5,3-7,2)	3353
	2004	8,1	(7,0-9,3)	5,7	(4,8-6,8)	3645
	2008	11,3	(9,8-12,8)	8,0	(6,9-9,4)	2989

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de wekelijkse alcoholgebruikers van 15 en ouder, Vlaams Gewest**

AL02_4		Gemiddelde (Ruw)	+ 95% BI	Gemiddelde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	12,5	(11,7-13,3)	12,3	(11,5-13,1)	968
	Vrouwen	7,3	(6,7-7,9)	7,1	(6,5-7,7)	756
LEEFTIJD- GROEP	15 - 24	11,3	(9,8-12,9)	11,0	(9,5-12,5)	197
	25 - 34	8,7	(7,2-10,2)	8,2	(6,8-9,7)	214
	35 - 44	9,0	(7,8-10,1)	8,7	(7,5-9,8)	273
	45 - 54	11,1	(9,7-12,4)	10,8	(9,5-12,1)	330
	55 - 64	11,8	(10,5-13,1)	11,5	(10,2-12,8)	313
	65 - 74	9,6	(8,1-11,1)	9,1	(7,6-10,5)	189
	75 +	8,4	(6,8-10,0)	7,8	(6,3-9,3)	208
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	9,4	(7,2-11,6)	9,0	(6,6-11,3)	148
	Lager secundair	10,2	(8,6-11,9)	9,2	(7,7-10,8)	224
	Hoger secundair	10,6	(9,7-11,6)	10,2	(9,2-11,1)	567
	Hoger onderwijs	9,9	(9,1-10,7)	9,4	(8,6-10,2)	759
URBANISATIE- GRAAD	Stedelijk gebied	10,3	(9,3-11,2)	10,0	(9,1-10,9)	693
	Halfstedelijk gebied	9,8	(8,9-10,7)	9,1	(8,2-10,0)	526
	Landelijk gebied	10,5	(9,5-11,5)	9,7	(8,7-10,7)	505
JAAR	1997	9,6	(8,9-10,4)	8,9	(8,2-9,7)	1778
	2001	11,4	(10,7-12,2)	10,8	(10,1-11,6)	1875
	2004	10,0	(9,5-10,6)	9,6	(9,1-10,2)	2235
	2008	10,2	(9,6-10,8)	9,6	(9,1-10,2)	1724

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens het gemiddeld aantal glazen alcohol geconsumeerd per week, Vlaams Gewest

AL02_5		Drinkt niet of een beetje	1-7 glazen	8-14 glazen	15-21 glazen	22 glazen of meer	N
GESLACHT	Mannen	29,0	29,7	19,7	11,9	9,7	1386
	Vrouwen	47,3	35,9	10,7	3,9	2,3	1502
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	44,6	26,0	14,2	7,4	7,8	339
	25 - 34	41,5	35,4	14,2	4,5	4,3	354
	35 - 44	38,7	38,3	11,4	7,1	4,5	450
	45 - 54	30,3	31,6	21,5	10,7	5,9	475
	55 - 64	30,8	32,9	16,9	9,8	9,7	458
	65 - 74	41,8	32,5	13,3	7,5	4,9	318
	75 +	51,4	30,9	10,1	5,1	2,5	494
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	56,4	28,6	6,8	4,4	3,8	398
	Lager secundair	46,7	29,9	13,0	5,5	4,9	433
	Hoger secundair	39,6	30,6	14,3	9,0	6,5	928
	Hoger onderwijs	30,0	37,0	18,5	8,4	6,2	1084
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	37,5	32,4	16,6	7,9	5,6	1123
	Halfstedelijk gebied	38,1	36,0	12,5	7,2	6,2	892
	Landelijk gebied	39,8	30,2	15,8	8,2	5,9	873
JAAR	1997	36,4	37,1	14,3	6,0	6,1	2864
	2001	39,7	32,1	13,4	6,6	8,2	3117
	2004	33,3	37,5	15,7	6,2	7,3	3482
	2008	38,4	32,9	15,1	7,8	5,9	2888

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de bevolking (van 15 en ouder) met een wekelijkse overconsumptie van alcohol (15+ glazen voor vrouwen; 22+ glazen voor mannen), Vlaams Gewest

AL02_6		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	9,7	(7,9-11,4)	8,7	(7,2-10,6)	1386
	Vrouwen	6,1	(4,5-7,7)	5,6	(4,3-7,3)	1502
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	9,7	(6,0-13,4)	9,4	(6,4-13,7)	339
	25 - 34	4,9	(2,4-7,4)	4,9	(2,9-8,0)	354
	35 - 44	7,0	(4,4-9,6)	6,8	(4,7-9,9)	450
	45 - 54	7,9	(5,2-10,6)	7,7	(5,4-10,8)	475
	55 - 64	13,5	(9,9-17,2)	13,2	(9,9-17,4)	458
	65 - 74	6,2	(3,0-9,5)	6,1	(3,6-10,1)	318
	75 +	3,2	(0,9-5,5)	3,2	(1,5-6,5)	494
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	4,9	(2,3-7,5)	4,8	(2,7-8,2)	398
	Lager secundair	6,0	(3,4-8,6)	5,2	(3,3-7,9)	433
	Hoger secundair	8,5	(6,2-10,8)	7,5	(5,6-10,1)	928
	Hoger onderwijs	8,5	(6,5-10,5)	7,7	(5,9-10,0)	1084
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	8,1	(6,0-10,2)	7,3	(5,6-9,6)	1123
	Halfstedelijk gebied	8,1	(5,9-10,4)	7,2	(5,4-9,6)	892
	Landelijk gebied	7,2	(5,1-9,2)	6,3	(4,6-8,5)	873
JAAR	1997	7,7	(6,4-9,0)	6,8	(5,7-8,1)	2864
	2001	10,1	(8,7-11,4)	9,1	(8,0-10,5)	3117
	2004	9,0	(7,8-10,2)	8,2	(7,1-9,4)	3482
	2008	7,8	(6,6-9,1)	7,1	(6,0-8,3)	2888

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens de frequentie van piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid) in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

AL03_1		Drinkt niet of bijna niet	Nooit piekdrinken	Minder dan één keer per maand	Maande-lijks	Weke-lijks	Dage-lijks of bijna dage-lijks	N
GESLACHT	Mannen	28,2	22,9	20,6	14,2	12,2	1,9	1427
	Vrouwen	46,2	31,7	11,6	6,6	3,4	0,5	1538
LEEFTIJDSGROEP	15 - 24	43,9	11,6	15,4	15,1	12,8	1,2	346
	25 - 34	39,9	21,3	19,5	11,4	7,4	0,5	366
	35 - 44	37,8	24,0	19,1	11,3	6,9	0,9	460
	45 - 54	29,8	27,7	19,0	13,1	8,5	1,9	485
	55 - 64	30,2	33,9	16,2	9,2	8,6	1,9	471
	65 - 74	41,1	40,3	9,9	3,7	4,1	1,0	326
	75 +	48,4	41,9	4,5	2,1	2,9	0,2	511
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	55,7	20,6	7,3	6,5	8,9	1,0	407
	Lager secundair	44,5	26,1	13,3	7,0	7,5	1,7	454
	Hoger secundair	38,6	25,1	16,3	10,8	8,3	0,9	950
	Hoger onderwijs	29,4	31,4	18,9	12,2	7,0	1,2	1108
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	36,6	31,0	14,8	8,9	6,9	1,8	1143
	Halfstedelijk gebied	37,1	27,0	16,7	10,7	8,1	0,4	922
	Landelijk gebied	38,9	23,1	17,0	11,6	8,3	1,1	900
JAAR	2008	37,4	27,4	16,0	10,3	7,7	1,2	2965

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat zich minstens een keer per week overgeeft aan piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid), Vlaams Gewest

AL03_2		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	14,1	(11,9-16,3)	13,1	(11,1-15,4)	1427
	Vrouwen	3,9	(2,6-5,1)	3,6	(2,6-5,0)	1538
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	14,0	(9,6-18,3)	11,8	(8,3-16,5)	346
	25 - 34	7,9	(4,7-11,0)	6,7	(4,4-10,1)	366
	35 - 44	7,8	(5,0-10,5)	6,5	(4,4-9,5)	460
	45 - 54	10,4	(7,0-13,7)	8,7	(6,1-12,1)	485
	55 - 64	10,6	(7,4-13,7)	8,8	(6,3-12,2)	471
	65 - 74	5,1	(2,1-8,2)	4,3	(2,3-7,9)	326
	75 +	3,1	(0,7-5,4)	2,6	(1,2-5,8)	511
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	9,9	(4,9-14,9)	10,1	(5,9-16,9)	407
	Lager secundair	9,1	(5,9-12,4)	7,6	(5,1-11,1)	454
	Hoger secundair	9,2	(6,7-11,6)	6,9	(4,9-9,6)	950
	Hoger onderwijs	8,2	(6,3-10,1)	5,8	(4,4-7,7)	1108
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	8,7	(6,5-10,8)	6,9	(5,1-9,2)	1143
	Halfstedelijk gebied	8,6	(6,3-10,9)	6,6	(4,9-9,0)	922
	Landelijk gebied	9,4	(7,0-11,9)	7,2	(5,5-9,5)	900
JAAR	2008	8,9	(7,5-10,2)			2965

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Gemiddelde leeftijd waarop men alcohol is beginnen te drinken bij de gebruikers
(van 15 jaar en ouder), Vlaams Gewest**

AL04_1		Gemid- delde (Ruw)	+ 95% BI	Gemid- delde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	17,0	(16,8-17,2)	17,0	(16,8-17,2)	1182
	Vrouwen	19,1	(18,6-19,5)	19,2	(18,7-19,6)	1081
LEEFTIJD- GROEP	15 - 24	15,6	(15,3-15,9)	15,6	(15,3-15,9)	284
	25 - 34	16,6	(16,3-16,8)	16,6	(16,3-16,9)	290
	35 - 44	17,6	(17,2-18,0)	17,6	(17,2-18,0)	384
	45 - 54	18,1	(17,5-18,7)	18,1	(17,6-18,7)	413
	55 - 64	18,8	(18,3-19,3)	18,9	(18,4-19,4)	388
	65 - 74	20,5	(19,6-21,5)	20,6	(19,7-21,5)	228
	75 +	21,5	(19,7-23,3)	21,6	(19,9-23,4)	276
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	19,8	(18,2-21,4)	18,6	(17,4-19,9)	229
	Lager secundair	17,7	(17,2-18,1)	17,0	(16,6-17,4)	315
	Hoger secundair	18,2	(17,8-18,6)	18,4	(18,0-18,8)	743
	Hoger onderwijs	17,6	(17,3-17,9)	18,1	(17,7-18,4)	946
URBANISATIE- GRAAD	Stedelijk gebied	18,3	(17,9-18,7)	18,2	(17,8-18,6)	890
	Halfstedelijk gebied	18,0	(17,5-18,5)	18,2	(17,8-18,7)	684
	Landelijk gebied	17,6	(17,2-17,9)	17,8	(17,5-18,2)	689
JAAR	2008	18,0	(17,7-18,2)			2263

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft (gebaseerd op de CAGE, grenswaarde 2+), Vlaams Gewest

AL_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	13,1	(10,7-15,4)	11,9	(9,9-14,3)	1212
	Vrouwen	5,9	(4,3-7,5)	5,3	(4,0-6,9)	1152
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	7,6	(4,1-11,1)	7,0	(4,3-11,1)	289
	25 - 34	9,8	(5,7-14,0)	9,0	(5,9-13,5)	297
	35 - 44	9,9	(6,4-13,3)	9,1	(6,3-13,1)	390
	45 - 54	13,1	(8,9-17,2)	12,2	(8,8-16,6)	422
	55 - 64	11,5	(8,1-14,9)	10,6	(7,7-14,3)	403
	65 - 74	4,8	(2,1-7,5)	4,3	(2,4-7,5)	247
	75 +	3,8	(1,2-6,4)	3,3	(1,7-6,5)	316
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	13,6	(7,0-20,3)	15,1	(9,3-23,5)	247
	Lager secundair	6,4	(3,4-9,4)	5,2	(3,1-8,7)	335
	Hoger secundair	9,5	(6,7-12,2)	7,6	(5,6-10,3)	777
	Hoger onderwijs	9,7	(7,6-11,7)	7,5	(5,9-9,5)	970
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	10,4	(8,0-12,8)	8,9	(6,9-11,3)	925
	Halfstedelijk gebied	7,2	(5,1-9,3)	5,8	(4,2-8,0)	724
	Landelijk gebied	11,0	(8,0-14,0)	8,9	(6,8-11,6)	715
JAAR	2001	5,2	(4,1-6,2)	4,1	(3,3-5,0)	2535
	2004	5,9	(4,9-6,9)	4,8	(4,0-5,7)	2839
	2008	9,6	(8,1-11,0)	8,0	(6,8-9,4)	2364

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol consumeert heeft
in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

AL01_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	74,0	(70,3-77,8)	75,0	(71,1-78,6)	871
	Vrouwen	67,3	(63,9-70,8)	68,1	(64,6-71,5)	1057
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	58,0	(49,6-66,4)	58,2	(49,6-66,3)	232
	25 - 34	66,2	(60,7-71,6)	66,3	(60,6-71,5)	392
	35 - 44	69,4	(63,9-75,0)	69,5	(63,7-74,8)	350
	45 - 54	77,1	(71,3-82,9)	77,0	(70,7-82,4)	259
	55 - 64	80,7	(74,8-86,7)	81,0	(74,4-86,2)	259
	65 - 74	73,1	(64,6-81,6)	73,6	(64,5-81,0)	137
	75 +	75,7	(69,6-81,8)	76,5	(69,9-81,9)	299
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	40,3	(30,5-50,1)	36,3	(27,2-46,5)	182
	Lager secundair	55,5	(47,3-63,7)	57,1	(49,0-64,9)	266
	Hoger secundair	65,6	(59,9-71,2)	67,9	(62,0-73,3)	505
	Hoger onderwijs	83,3	(80,2-86,4)	85,8	(82,6-88,6)	908
GROTE STEDEN	Brussel	70,5	(67,8-73,3)	71,0	(68,1-73,8)	1928
	Gent en Antwerpen	78,4	(72,4-84,5)	78,8	(72,0-84,2)	366
	Luik en Charleroi	68,9	(61,2-76,6)	68,7	(60,1-76,2)	244
JAAR	1997	73,0	(69,8-76,3)	74,3	(70,9-77,3)	2415
	2001	73,3	(70,8-75,8)	74,3	(71,8-76,6)	2217
	2004	74,5	(71,8-77,3)	75,5	(72,6-78,1)	2180
	2008	70,5	(67,8-73,3)	71,1	(68,2-73,8)	1928

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling (%) van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens de frequentie van alcoholgebruik in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

AL01_2		Drinkt niet	Eén keer per maand of minder	2 tot 4 keer per maand	2 tot 3 keer per week	4 keer per week of meer	N
GESLACHT	Mannen	26,0	15,7	14,7	19,5	24,2	871
	Vrouwen	32,7	19,7	15,7	16,4	15,5	1057
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	42,0	17,2	19,4	12,2	9,2	232
	25 - 34	33,8	18,1	17,5	18,4	12,2	392
	35 - 44	30,6	18,0	14,6	21,9	14,9	350
	45 - 54	22,9	21,5	12,6	18,4	24,6	259
	55 - 64	19,3	15,7	14,4	18,4	32,2	259
	65 - 74	26,9	20,3	14,1	16,7	22,1	137
	75 +	24,3	9,7	10,8	14,1	41,0	299
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	59,7	17,7	5,5	7,2	9,9	182
	Lager secundair	44,5	19,9	9,1	10,2	16,3	266
	Hoger secundair	34,4	17,1	18,0	13,9	16,6	505
	Hoger onderwijs	16,7	17,9	17,1	24,2	24,1	908
GROTE STEDEN	Brussel	29,5	17,8	15,3	17,9	19,7	1928
	Gent en Antwerpen	21,6	21,4	19,8	16,3	21,0	366
	Luik en Charleroi	31,1	18,4	20,8	12,0	17,7	244
JAAR	2008	29,5	17,8	15,3	17,9	19,7	1928

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat dagelijks alcohol consumeert in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

AL01_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	13,3	(10,8-15,8)	11,8	(9,4-14,8)	871
	Vrouwen	9,4	(7,5-11,4)	7,4	(5,7-9,7)	1057
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	4,0	(0,6-7,5)	4,0	(1,7-9,1)	232
	25 - 34	2,5	(0,9-4,0)	2,4	(1,3-4,5)	392
	35 - 44	7,2	(4,0-10,5)	7,0	(4,5-10,8)	350
	45 - 54	14,3	(9,5-19,2)	13,9	(9,7-19,4)	259
	55 - 64	20,3	(15,2-25,4)	20,3	(15,6-25,9)	259
	65 - 74	17,9	(10,5-25,2)	17,9	(11,7-26,5)	137
	75 +	34,3	(27,6-41,0)	35,3	(28,7-42,5)	299
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	9,3	(4,5-14,1)	4,8	(2,6-8,9)	182
	Lager secundair	11,4	(7,0-15,7)	8,8	(5,6-13,5)	266
	Hoger secundair	10,8	(7,6-14,1)	8,4	(5,9-11,8)	505
	Hoger onderwijs	11,8	(9,5-14,2)	11,0	(8,6-14,1)	908
GROTE STEDEN	Brussel	11,3	(9,7-12,9)	9,7	(8,0-11,7)	1928
	Gent en Antwerpen	15,4	(10,1-20,8)	12,0	(8,4-16,9)	366
	Luik en Charleroi	12,9	(7,9-18,0)	10,1	(6,5-15,3)	244
JAAR	1997	8,6	(7,1-10,1)	7,3	(6,0-8,9)	2415
	2001	13,0	(11,3-14,7)	10,9	(9,3-12,6)	2242
	2004	11,7	(10,1-13,3)	9,9	(8,4-11,5)	2180
	2008	11,3	(9,7-12,9)	9,6	(8,1-11,3)	1928

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de wekelijkse alcoholgebruikers van 15 en ouder, Brussels Gewest**

AL02_4		Gemid- delde (Ruw)	+ 95% BI	Gemid- delde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	11,4	(10,4-12,4)	11,4	(10,4-12,4)	499
	Vrouwen	8,2	(7,4-9,1)	8,2	(7,3-9,0)	491
LEEFTIJD- GROEP	15 - 24	9,7	(7,3-12,1)	9,6	(7,3-11,8)	81
	25 - 34	9,3	(7,9-10,7)	9,2	(7,8-10,6)	193
	35 - 44	9,0	(7,5-10,5)	8,7	(7,2-10,1)	167
	45 - 54	9,5	(8,2-10,8)	9,4	(8,2-10,7)	138
	55 - 64	12,5	(10,5-14,5)	12,4	(10,4-14,4)	160
	65 - 74	9,6	(7,3-11,8)	9,6	(7,4-11,8)	69
	75 +	10,3	(7,9-12,7)	10,4	(8,1-12,8)	182
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	12,2	(7,6-16,7)	11,0	(6,2-15,7)	55
	Lager secundair	12,0	(9,0-15,0)	11,8	(8,8-14,8)	96
	Hoger secundair	9,6	(8,2-11,1)	9,3	(7,9-10,7)	242
	Hoger onderwijs	9,6	(8,8-10,4)	9,6	(8,7-10,4)	570
GROTE STEDEN	Brussel	9,9	(9,2-10,6)	9,7	(9,0-10,4)	990
	Gent en Antwerpen	11,2	(9,2-13,1)	11,1	(9,3-12,9)	197
	Luik en Charleroi	11,2	(6,5-16,0)	10,5	(6,2-14,8)	115
JAAR	1997	10,2	(9,1-11,2)	9,9	(8,9-11,0)	1176
	2001	13,0	(12,0-14,0)	12,7	(11,7-13,8)	1099
	2004	11,2	(10,3-12,2)	11,0	(10,1-11,9)	1110
	2008	9,9	(9,2-10,6)	9,7	(9,0-10,4)	990

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens het gemiddeld aantal glazen alcohol geconsumeerd per week, Brussels Gewest

AL02_5		Drinkt niet of een beetje	1-7 glazen	8-14 glazen	15-21 glazen	22 glazen of meer	N
GESLACHT	Mannen	43,5	27,9	14,1	7,2	7,3	837
	Vrouwen	53,8	31,0	9,1	3,6	2,5	1032
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	62,2	20,5	9,8	4,0	3,6	218
	25 - 34	53,3	27,1	9,5	6,8	3,2	385
	35 - 44	50,1	33,0	9,3	3,0	4,6	341
	45 - 54	46,8	28,4	15,0	5,7	4,1	253
	55 - 64	36,3	34,4	11,4	6,6	11,3	250
	65 - 74	48,6	30,5	11,8	5,7	3,4	131
	75 +	34,8	36,4	18,5	5,9	4,3	291
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	78,5	11,5	5,2	1,3	3,6	179
	Lager secundair	66,5	20,5	5,3	2,2	5,6	257
	Hoger secundair	52,6	29,3	8,9	4,2	5,0	493
	Hoger onderwijs	36,5	35,8	15,7	7,3	4,8	875
GROTE STEDEN	Brussel	49,0	29,5	11,4	5,3	4,8	1869
	Gent en Antwerpen	44,9	27,3	13,3	8,4	6,2	353
	Luik en Charleroi	51,8	26,8	14,8	1,6	5,0	235
JAAR	1997	52,2	27,6	10,9	4,2	5,2	2345
	2001	48,7	23,8	13,8	6,1	7,7	2105
	2004	46,6	28,1	13,4	5,8	6,1	2049
	2008	49,0	29,5	11,4	5,3	4,8	1869

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de bevolking (van 15 en ouder) met een wekelijkse overconsumptie van alcohol (15+ glazen voor vrouwen; 22+ glazen voor mannen), Brussels Gewest

AL02_6		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	7,3	(5,4-9,2)	7,0	(5,4-9,1)	837
	Vrouwen	6,1	(4,5-7,7)	5,7	(4,3-7,6)	1032
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	4,1	(1,3-6,9)	4,1	(2,1-8,0)	218
	25 - 34	5,5	(3,0-8,0)	5,5	(3,5-8,5)	385
	35 - 44	5,9	(3,1-8,7)	5,9	(3,6-9,4)	341
	45 - 54	5,5	(2,6-8,4)	5,4	(3,2-9,2)	253
	55 - 64	14,2	(9,8-18,5)	14,2	(10,4-19,1)	250
	65 - 74	6,2	(1,6-10,8)	6,2	(2,9-12,6)	131
	75 +	7,6	(3,6-11,6)	7,7	(4,6-12,8)	291
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	4,2	(0,9-7,5)	3,7	(1,6-8,2)	179
	Lager secundair	6,8	(3,1-10,5)	6,4	(3,7-10,9)	257
	Hoger secundair	6,3	(3,8-8,8)	6,0	(4,0-8,9)	493
	Hoger onderwijs	7,1	(5,3-8,8)	6,9	(5,2-9,1)	875
GROTE STEDEN	Brussel	6,7	(5,4-7,9)	6,3	(5,1-7,7)	1869
	Gent en Antwerpen	8,4	(4,6-12,1)	7,9	(5,0-12,4)	353
	Luik en Charleroi	5,7	(2,3-9,1)	5,1	(2,8-8,9)	235
JAAR	1997	7,1	(5,8-8,3)	6,7	(5,6-8,1)	2345
	2001	9,9	(8,5-11,4)	9,4	(8,1-11,0)	2105
	2004	8,0	(6,6-9,4)	7,6	(6,3-9,0)	2049
	2008	6,7	(5,4-7,9)	6,2	(5,1-7,6)	1869

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens de frequentie van piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid) in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

AL03_1		Drinkt niet of bijna niet	Nooit piekdrinken	Minder dan één keer per maand	Maandelijks	Wekelijks	Dagelijks of bijna dagelijks	N
GESLACHT	Mannen	42,1	21,0	15,8	12,1	7,6	1,4	860
	Vrouwen	52,4	28,5	10,2	5,4	2,9	0,7	1056
LEEFTIJDSGROEP	15 - 24	59,8	10,1	10,0	10,1	9,9	0,0	230
	25 - 34	52,0	12,7	16,1	12,9	5,6	0,6	391
	35 - 44	48,8	22,2	15,0	8,8	3,6	1,6	348
	45 - 54	44,5	27,7	15,9	6,4	5,2	0,3	258
	55 - 64	35,2	38,5	9,5	8,9	4,6	3,2	257
	65 - 74	47,4	34,9	9,8	3,8	3,3	0,8	136
	75 +	34,6	57,5	3,5	1,3	2,2	0,9	296
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	77,4	12,1	4,4	2,6	2,1	1,3	182
	Lager secundair	64,4	18,6	5,6	5,2	4,2	2,0	266
	Hoger secundair	51,8	24,3	10,8	6,6	5,5	1,1	503
	Hoger onderwijs	35,0	29,2	17,8	11,7	5,6	0,7	898
GROTE STEDEN	Brussel	47,5	24,9	12,8	8,6	5,2	1,0	1916
	Gent en Antwerpen	43,0	29,0	12,5	8,5	5,0	2,0	364
	Luik en Charleroi	49,5	21,3	17,7	4,3	5,6	1,6	244
JAAR	2008	47,5	24,9	12,8	8,6	5,2	1,0	1916

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat zich minstens een keer per week overgeeft aan piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid), Brussels Gewest

AL03_2		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	9,1	(6,6-11,5)	8,6	(6,5-11,4)	860
	Vrouwen	3,6	(2,2-4,9)	3,4	(2,3-4,9)	1056
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	9,9	(3,6-16,3)	9,3	(4,8-17,3)	230
	25 - 34	6,2	(3,6-8,9)	5,6	(3,6-8,7)	391
	35 - 44	5,2	(2,6-7,8)	4,7	(2,8-7,6)	348
	45 - 54	5,5	(2,3-8,7)	4,8	(2,6-8,7)	258
	55 - 64	7,8	(4,3-11,3)	7,3	(4,6-11,5)	257
	65 - 74	4,1	(0,3-7,8)	3,8	(1,5-9,2)	136
	75 +	3,1	(0,3-5,8)	3,0	(1,2-7,3)	296
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	3,4	(0,1-6,8)	3,0	(1,1-8,2)	182
	Lager secundair	6,2	(2,8-9,5)	5,5	(3,1-9,4)	266
	Hoger secundair	6,6	(3,3-10,0)	5,5	(3,5-8,7)	503
	Hoger onderwijs	6,3	(4,4-8,2)	5,5	(3,9-7,8)	898
GROTE STEDEN	Brussel	6,2	(4,8-7,6)	5,1	(3,9-6,6)	1916
	Gent en Antwerpen	7,0	(3,4-10,5)	5,9	(3,5-10,0)	364
	Luik en Charleroi	7,2	(3,2-11,1)	6,0	(3,4-10,2)	244
JAAR	2008	6,2	(4,8-7,6)			1916

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Gemiddelde leeftijd waarop men alcohol is beginnen te drinken bij de gebruikers
(van 15 jaar en ouder), Brussels Gewest**

AL04_1		Gemid- delde (Ruw)	+ 95% BI	Gemid- delde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	18,6	(18,1-19,0)	18,8	(18,3-19,3)	634
	Vrouwen	19,5	(19,0-20,1)	19,6	(19,1-20,1)	685
LEEFTIJD- GROEP	15 - 24	16,1	(15,6-16,5)	16,1	(15,6-16,6)	141
	25 - 34	17,0	(16,7-17,3)	17,0	(16,7-17,3)	267
	35 - 44	19,0	(18,4-19,7)	19,1	(18,4-19,7)	233
	45 - 54	19,8	(18,7-20,9)	19,8	(18,7-20,9)	193
	55 - 64	20,7	(19,5-21,8)	20,7	(19,5-21,8)	198
	65 - 74	21,8	(20,4-23,2)	21,8	(20,4-23,1)	87
	75 +	22,1	(20,1-24,2)	22,1	(20,0-24,1)	200
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	22,7	(19,7-25,7)	21,7	(18,9-24,6)	83
	Lager secundair	20,3	(18,8-21,7)	20,0	(18,6-21,4)	146
	Hoger secundair	19,3	(18,6-20,1)	19,3	(18,6-20,0)	321
	Hoger onderwijs	18,4	(18,0-18,9)	18,8	(18,3-19,2)	733
GROTE STEDEN	Brussel	19,0	(18,7-19,4)	19,2	(18,8-19,5)	1319
	Gent en Antwerpen	18,8	(17,8-19,8)	18,6	(17,7-19,5)	270
	Luik en Charleroi	18,7	(17,5-19,9)	18,7	(17,5-19,9)	165
JAAR	2008	19,0	(18,7-19,4)			1319

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft (gebaseerd op de CAGE, grenswaarde 2+), Brussels Gewest

AL_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	17,3	(13,8-20,9)	16,1	(12,8-20,0)	656
	Vrouwen	11,5	(8,8-14,3)	10,9	(8,5-13,9)	720
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	15,4	(5,8-25,0)	15,0	(8,0-26,5)	141
	25 - 34	17,1	(12,3-22,0)	16,8	(12,6-22,0)	270
	35 - 44	14,8	(9,9-19,7)	14,4	(10,2-20,0)	239
	45 - 54	16,3	(10,3-22,2)	15,9	(10,9-22,7)	201
	55 - 64	14,6	(9,6-19,6)	14,4	(10,1-20,1)	211
	65 - 74	9,8	(3,2-16,4)	9,7	(4,9-18,3)	96
	75 +	4,9	(1,3-8,4)	4,9	(2,4-10,0)	218
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	3,6	(0,0-8,5)	3,7	(0,9-13,1)	85
	Lager secundair	14,0	(7,7-20,3)	13,6	(8,5-21,1)	154
	Hoger secundair	15,5	(9,8-21,1)	14,8	(10,2-21,0)	339
	Hoger onderwijs	14,2	(11,5-16,9)	12,7	(10,3-15,7)	759
GROTE STEDEN	Brussel	14,4	(12,2-16,7)	12,7	(10,5-15,4)	1376
	Gent en Antwerpen	11,0	(6,3-15,8)	10,4	(6,8-15,5)	280
	Luik en Charleroi	11,1	(5,0-17,1)	9,8	(5,5-17,1)	166
JAAR	2001	9,4	(7,8-11,1)	8,2	(6,7-9,9)	1569
	2004	11,4	(9,5-13,3)	9,9	(8,3-11,7)	1535
	2008	14,4	(12,2-16,7)	12,6	(10,6-15,0)	1376

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol consumeert heeft
in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

AL01_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	84,1	(81,5-86,7)	84,1	(81,3-86,5)	1188
	Vrouwen	72,9	(70,0-75,9)	72,9	(69,8-75,8)	1468
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	72,5	(66,0-79,0)	73,1	(65,9-79,2)	320
	25 - 34	80,8	(75,7-85,9)	81,7	(76,1-86,2)	332
	35 - 44	81,8	(77,4-86,1)	82,5	(77,8-86,4)	449
	45 - 54	80,4	(76,1-84,7)	81,1	(76,5-84,9)	446
	55 - 64	81,0	(76,0-86,0)	81,5	(76,1-85,9)	414
	65 - 74	73,7	(65,6-81,8)	74,7	(66,1-81,7)	258
	75 +	68,9	(62,2-75,5)	70,4	(63,2-76,7)	437
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	58,7	(50,6-66,8)	60,1	(50,8-68,7)	353
	Lager secundair	71,6	(66,0-77,2)	72,1	(66,2-77,3)	480
	Hoger secundair	75,5	(71,8-79,1)	76,1	(72,2-79,7)	876
	Hoger onderwijs	89,4	(86,6-92,2)	89,8	(86,6-92,2)	880
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	73,0	(69,4-76,5)	73,4	(69,6-76,9)	1060
	Halfstedelijk gebied	79,5	(74,5-84,5)	80,5	(75,1-85,0)	416
	Landelijk gebied	83,3	(80,2-86,4)	84,2	(81,0-87,0)	1180
JAAR	1997	84,2	(82,2-86,2)	84,6	(82,4-86,5)	2924
	2001	79,7	(77,8-81,6)	80,8	(78,8-82,6)	3788
	2004	82,6	(80,6-84,5)	83,6	(81,6-85,4)	3706
	2008	78,2	(76,0-80,3)	79,2	(76,9-81,3)	2656

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling (%) van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens de frequentie van alcoholgebruik in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

AL01_2		Drinkt niet	Eén keer per maand of minder	2 tot 4 keer per maand	2 tot 3 keer per week	4 keer per week of meer	N
GESLACHT	Mannen	15,9	16,6	19,0	22,3	26,2	1188
	Vrouwen	27,1	24,8	20,5	12,8	14,8	1468
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	27,5	27,9	25,1	14,7	4,8	320
	25 - 34	19,2	24,6	24,5	18,5	13,3	332
	35 - 44	18,2	25,3	20,7	19,2	16,5	449
	45 - 54	19,6	19,7	19,7	17,8	23,2	446
	55 - 64	19,0	13,7	14,7	20,2	32,4	414
	65 - 74	26,3	14,2	15,2	14,6	29,6	258
	75 +	31,1	18,1	15,6	10,7	24,5	437
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	41,3	16,8	15,4	6,9	19,7	353
	Lager secundair	28,4	22,7	18,8	11,4	18,8	480
	Hoger secundair	24,5	24,3	19,0	14,8	17,3	876
	Hoger onderwijs	10,6	18,6	22,4	24,6	23,7	880
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	27,0	21,4	17,2	14,2	20,2	1060
	Halfstedelijk gebied	20,5	17,5	26,1	17,9	17,9	416
	Landelijk gebied	16,7	21,7	20,5	20,2	20,9	1180
JAAR	2008	21,8	21,0	19,8	17,2	20,2	2656

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat dagelijks alcohol consumeert
in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

AL01_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	17,7	(15,0-20,4)	14,5	(12,0-17,4)	1188
	Vrouwen	10,1	(8,2-12,0)	7,8	(6,2-9,7)	1468
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	3,6	(1,2-6,0)	3,4	(1,7-6,6)	320
	25 - 34	5,5	(2,7-8,4)	5,4	(3,2-8,9)	332
	35 - 44	7,7	(4,8-10,6)	7,4	(5,0-10,8)	449
	45 - 54	15,6	(11,3-19,9)	15,1	(11,4-19,9)	446
	55 - 64	25,0	(19,3-30,8)	24,5	(19,3-30,6)	414
	65 - 74	24,2	(17,3-31,1)	24,1	(17,8-31,8)	258
	75 +	20,2	(14,2-26,2)	20,4	(14,8-27,6)	437
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	17,6	(11,9-23,2)	9,9	(6,6-14,6)	353
	Lager secundair	14,8	(9,8-19,7)	9,9	(6,8-14,2)	480
	Hoger secundair	12,3	(9,5-15,2)	10,3	(7,8-13,4)	876
	Hoger onderwijs	13,5	(10,4-16,5)	11,7	(9,1-14,9)	880
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	15,0	(12,1-18,0)	11,5	(9,2-14,3)	1060
	Halfstedelijk gebied	9,4	(5,8-13,1)	7,9	(5,2-11,8)	416
	Landelijk gebied	13,6	(10,8-16,3)	10,6	(8,3-13,5)	1180
JAAR	1997	9,6	(7,7-11,4)	8,0	(6,5-9,9)	2924
	2001	10,6	(9,2-12,0)	8,2	(7,1-9,5)	3818
	2004	10,6	(9,1-12,1)	8,2	(7,0-9,6)	3706
	2008	13,6	(11,8-15,5)	10,5	(9,0-12,2)	2656

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de wekelijkse alcoholgebruikers van 15 en ouder, Waals Gewest**

AL02_4		Gemid- delde (Ruw)	+ 95% BI	Gemid- delde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	14,6	(12,7-16,4)	14,0	(12,3-15,7)	741
	Vrouwen	8,2	(7,0-9,4)	7,9	(6,7-9,0)	654
LEEFTIJD- GROEP	15 - 24	7,8	(6,4-9,2)	7,7	(6,2-9,1)	133
	25 - 34	13,5	(9,2-17,8)	13,1	(9,0-17,1)	175
	35 - 44	9,2	(8,0-10,4)	8,7	(7,5-9,9)	249
	45 - 54	14,3	(10,9-17,6)	13,7	(10,3-17,1)	256
	55 - 64	13,9	(10,6-17,2)	13,4	(10,3-16,6)	256
	65 - 74	10,6	(8,9-12,3)	10,3	(8,6-12,0)	134
	75 +	8,5	(7,1-9,9)	8,8	(7,4-10,2)	192
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	15,8	(9,4-22,2)	16,9	(10,3-23,4)	124
	Lager secundair	13,8	(9,7-17,9)	12,7	(8,6-16,9)	207
	Hoger secundair	11,5	(9,3-13,7)	10,4	(8,4-12,4)	432
	Hoger onderwijs	10,6	(9,2-11,9)	9,6	(8,4-10,8)	596
URBANISATIE- GRAAD	Stedelijk gebied	12,7	(10,4-15,0)	11,6	(9,6-13,7)	514
	Halfstedelijk gebied	9,7	(8,1-11,3)	9,1	(7,4-10,7)	231
	Landelijk gebied	11,5	(9,9-13,2)	10,9	(9,3-12,5)	650
JAAR	1997	10,0	(9,0-10,9)	9,1	(8,2-10,0)	1472
	2001	11,0	(10,2-11,8)	10,3	(9,5-11,0)	1959
	2004	11,6	(10,7-12,5)	11,0	(10,1-11,9)	1998
	2008	11,7	(10,5-12,9)	11,1	(9,9-12,2)	1395

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens het gemiddeld aantal glazen alcohol geconsumeerd per week, Waals Gewest

AL02_5		Drinkt niet of een beetje	1-7 glazen	8-14 glazen	15-21 glazen	22 glazen of meer	N
GESLACHT	Mannen	34,3	29,2	17,7	7,4	11,4	1131
	Vrouwen	54,1	30,3	10,1	3,0	2,6	1407
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	58,7	26,1	10,2	2,3	2,6	307
	25 - 34	45,0	28,9	14,1	4,3	7,6	322
	35 - 44	45,0	33,8	12,2	5,6	3,4	435
	45 - 54	41,3	27,8	15,7	4,4	10,8	426
	55 - 64	34,3	30,7	16,3	8,6	10,0	392
	65 - 74	44,0	29,1	14,9	5,5	6,5	238
	75 +	51,5	31,9	9,7	3,5	3,4	418
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	62,6	18,9	7,0	4,6	6,9	329
	Lager secundair	54,5	24,7	7,8	4,1	8,9	454
	Hoger secundair	51,0	27,2	13,1	2,7	6,0	840
	Hoger onderwijs	30,4	36,9	18,7	7,6	6,4	849
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	50,3	24,8	14,4	4,3	6,2	1021
	Halfstedelijk gebied	40,0	33,5	15,9	4,1	6,5	395
	Landelijk gebied	40,6	34,0	11,9	6,1	7,3	1122
JAAR	1997	48,4	30,6	12,2	3,6	5,2	2852
	2001	46,3	29,5	12,2	5,7	6,3	3595
	2004	43,6	30,2	13,4	5,3	7,5	3520
	2008	44,9	29,8	13,6	5,0	6,7	2538

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de bevolking (van 15 en ouder) met een wekelijkse overconsumptie van alcohol (15+ glazen voor vrouwen; 22+ glazen voor mannen), Waals Gewest

AL02_6		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	11,4	(9,0-13,9)	9,9	(7,9-12,3)	1131
	Vrouwen	5,6	(4,0-7,1)	4,8	(3,6-6,3)	1407
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	3,1	(0,9-5,3)	2,9	(1,4-6,0)	307
	25 - 34	9,3	(5,0-13,6)	9,0	(5,7-14,0)	322
	35 - 44	5,1	(3,0-7,2)	4,8	(3,1-7,4)	435
	45 - 54	12,7	(8,6-16,8)	12,2	(8,7-16,8)	426
	55 - 64	12,7	(8,1-17,3)	12,1	(8,3-17,3)	392
	65 - 74	7,3	(3,3-11,4)	7,1	(4,0-12,3)	238
	75 +	4,5	(1,9-7,2)	4,5	(2,5-8,0)	418
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	8,6	(4,5-12,7)	7,7	(4,5-12,9)	329
	Lager secundair	10,3	(5,4-15,1)	8,5	(5,3-13,4)	454
	Hoger secundair	7,1	(4,8-9,4)	5,7	(4,1-8,0)	840
	Hoger onderwijs	8,3	(5,9-10,7)	6,7	(4,9-9,1)	849
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	7,6	(5,2-9,9)	6,0	(4,4-8,2)	1021
	Halfstedelijk gebied	8,0	(4,3-11,6)	6,8	(4,2-10,7)	395
	Landelijk gebied	9,2	(6,8-11,5)	7,8	(5,9-10,2)	1122
JAAR	1997	5,7	(4,6-6,8)	4,9	(4,0-6,0)	2852
	2001	7,5	(6,4-8,7)	6,7	(5,6-7,8)	3595
	2004	9,2	(7,7-10,6)	8,1	(6,8-9,6)	3520
	2008	8,3	(6,8-9,8)	7,2	(6,0-8,7)	2538

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling (%) van de bevolking (van 15 en ouder) volgens de frequentie van piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid) in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

AL03_1		Drinkt niet of bijna niet	Nooit piekdrinken	Minder dan één keer per maand	Maandelijks	Wekelijks	Dagelijks of bijna dagelijks	N
GESLACHT	Mannen	32,6	21,1	21,8	13,5	9,3	1,6	1182
	Vrouwen	52,2	24,3	14,5	5,6	2,8	0,7	1458
LEEFTIJDSGROEP	15 - 24	55,4	5,8	15,6	14,7	8,5	0,1	320
	25 - 34	44,2	10,7	23,3	13,5	7,2	1,2	329
	35 - 44	43,6	20,3	18,9	11,3	5,5	0,5	448
	45 - 54	39,4	23,0	20,4	8,9	6,4	1,8	445
	55 - 64	32,9	32,2	19,8	6,1	6,3	2,6	411
	65 - 74	41,2	38,5	11,4	4,7	3,4	0,8	253
	75 +	49,5	42,1	7,7	0,3	0,3	0,2	434
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	58,2	22,0	7,3	5,7	3,5	3,3	352
	Lager secundair	51,3	23,7	9,6	5,9	8,3	1,2	476
	Hoger secundair	49,3	20,0	17,5	7,0	5,3	0,9	869
	Hoger onderwijs	29,4	25,1	24,9	14,1	5,9	0,7	876
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	48,7	24,0	15,5	6,3	4,2	1,3	1053
	Halfstedelijk gebied	38,4	22,6	21,9	10,5	5,3	1,3	413
	Landelijk gebied	38,6	21,6	19,2	12,0	7,8	0,8	1174
JAAR	2008	43,0	22,8	17,9	9,3	5,8	1,1	2640

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat zich minstens een keer per week overgeeft aan piekdrinken (6+ glazen/gelegenheid), Waals Gewest

AL03_2		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	10,9	(8,8-13,0)	9,0	(7,3-11,1)	1182
	Vrouwen	3,4	(2,1-4,8)	2,8	(1,9-4,1)	1458
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	8,6	(4,3-12,8)	7,5	(4,2-13,0)	320
	25 - 34	8,4	(4,9-11,9)	7,6	(4,9-11,5)	329
	35 - 44	5,9	(3,7-8,1)	5,2	(3,5-7,6)	448
	45 - 54	8,2	(4,9-11,6)	7,3	(4,7-11,0)	445
	55 - 64	9,0	(5,6-12,3)	7,8	(5,2-11,6)	411
	65 - 74	4,2	(1,7-6,8)	3,7	(2,0-6,9)	253
	75 +	0,4	(0,0-1,0)	0,4	(0,1-1,3)	434
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	6,8	(3,4-10,2)	7,0	(4,1-11,7)	352
	Lager secundair	9,5	(5,3-13,7)	7,5	(4,7-11,7)	476
	Hoger secundair	6,2	(4,0-8,3)	4,1	(2,7-6,2)	869
	Hoger onderwijs	6,6	(4,6-8,5)	4,4	(3,1-6,1)	876
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	5,5	(3,7-7,3)	3,8	(2,7-5,4)	1053
	Halfstedelijk gebied	6,6	(3,9-9,4)	4,9	(3,1-7,6)	413
	Landelijk gebied	8,6	(6,3-10,9)	6,3	(4,6-8,7)	1174
JAAR	2008	6,9	(5,6-8,3)			2640

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



**Gemiddelde leeftijd waarop men alcohol is begonnen te drinken bij de gebruikers
(van 15 jaar en ouder), Waals Gewest**

AL04_1		Gemid- delde (Ruw)	+ 95% BI	Gemid- delde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	17,6	(17,1-18,0)	17,6	(17,1-18,0)	957
	Vrouwen	19,1	(18,7-19,5)	19,2	(18,9-19,6)	957
LEEFTIJD- GROEP	15 - 24	15,5	(15,2-15,8)	15,5	(15,3-15,8)	238
	25 - 34	16,3	(15,9-16,7)	16,3	(15,9-16,7)	259
	35 - 44	17,9	(17,4-18,3)	17,9	(17,4-18,3)	357
	45 - 54	19,1	(18,4-19,7)	19,2	(18,5-19,8)	335
	55 - 64	19,4	(18,5-20,3)	19,5	(18,6-20,4)	302
	65 - 74	20,9	(19,1-22,8)	21,0	(19,2-22,8)	175
	75 +	22,1	(20,5-23,6)	22,1	(20,5-23,6)	248
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	20,7	(18,5-22,9)	19,5	(17,4-21,7)	177
	Lager secundair	18,7	(17,9-19,4)	18,2	(17,5-18,9)	304
	Hoger secundair	18,2	(17,7-18,7)	18,5	(18,0-19,0)	622
	Hoger onderwijs	17,9	(17,5-18,3)	18,2	(17,8-18,6)	762
URBANISATIE- GRAAD	Stedelijk gebied	18,2	(17,7-18,7)	18,2	(17,7-18,7)	729
	Halfstedelijk gebied	18,7	(18,0-19,4)	18,9	(18,2-19,5)	309
	Landelijk gebied	18,4	(17,9-18,9)	18,5	(18,0-19,0)	876
JAAR	2008	18,3	(18,0-18,7)			1914

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat een problematisch alcoholgebruik aangeeft (gebaseerd op de CAGE, grenswaarde 2+), Waals Gewest

AL_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	11,9	(9,6-14,2)	10,3	(8,4-12,7)	978
	Vrouwen	9,5	(7,3-11,7)	8,4	(6,6-10,7)	1021
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	6,3	(3,0-9,6)	6,3	(3,7-10,5)	239
	25 - 34	13,3	(8,5-18,2)	13,3	(9,2-18,8)	265
	35 - 44	10,3	(7,0-13,5)	10,2	(7,4-13,9)	367
	45 - 54	13,4	(9,4-17,4)	13,2	(9,7-17,8)	347
	55 - 64	12,6	(8,4-16,9)	12,4	(8,8-17,3)	322
	65 - 74	11,1	(6,0-16,2)	11,0	(6,8-17,2)	182
	75 +	1,9	(0,2-3,7)	1,9	(0,8-4,8)	277
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	8,2	(2,9-13,5)	8,6	(4,5-15,9)	200
	Lager secundair	7,7	(4,1-11,2)	6,5	(3,9-10,8)	322
	Hoger secundair	9,8	(7,2-12,5)	8,5	(6,4-11,2)	653
	Hoger onderwijs	13,0	(10,1-15,8)	11,2	(8,8-14,1)	775
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	11,4	(8,7-14,2)	9,8	(7,5-12,7)	749
	Halfstedelijk gebied	11,9	(7,5-16,2)	10,5	(7,2-15,0)	325
	Landelijk gebied	9,7	(7,4-12,0)	8,5	(6,6-10,8)	925
JAAR	2001	8,6	(7,2-9,9)	7,4	(6,3-8,7)	2911
	2004	10,7	(9,0-12,3)	9,3	(7,9-11,0)	2875
	2008	10,7	(9,1-12,4)	9,4	(7,9-11,0)	1999

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

