

GEBRUIK VAN CONTRACEPTIVE METHODES (INDICATEUR : MCH38_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIKT OP DIT OGENBLIK EEN METHODE OM ZWANGERSCHAP TE VOORKOMEN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
GESLACHT			
Vrouw	56,5	43,5	2554
Totaal	56,5	43,5	2554
LEEFTIJDGROEP			
15-19	39,7	60,3	207
20-24	68,9	31,1	259
25-29	66,9	33,1	375
30-34	67,0	33,0	404
35-39	62,9	37,1	383
40-44	55,1	44,9	359
45-49	51,5	48,5	321
50-54	25,4	74,6	246
Totaal	56,5	43,5	2554
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	46,7	53,3	58
Lager	41,9	58,1	188
Lager secundair	49,2	50,8	369
Hoger secundair	58,7	41,3	838
Hoger	61,7	38,3	993
Totaal	57,0	43,0	2446
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	50,4	49,6	206
20.000-30.000	54,3	45,7	503
30.000-40.000	52,3	47,7	515
40.000-60.000	59,5	40,5	854
>60.000	61,1	38,9	378
Totaal	56,5	43,5	2456
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	58,8	41,2	1972
Zeer slecht tot redelijk	46,9	53,1	482
Totaal	56,6	43,4	2454
CONSUMPTIE VAN TABAK			
Nooit	57,1	42,9	1249
Vroeger	58,1	41,9	460
Matige (< 20)	56,7	43,3	498
Grote roker	52,6	47,4	258
Totaal	56,8	43,2	2465
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	56,7	43,3	926
Brussels Gewest	54,9	45,1	714
Waals Gewest	56,4	43,6	914
België	56,5	43,5	2554

Vrouwen van 15 tot 54 jaar

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEBRUIK VAN CONTRACEPTIVE METHODES (INDICATEUR : MCH38_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIKT OP DIT OGENBLIK EEN METHODE OM ZWANGERSCHAP TE VOORKOMEN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
GESLACHT			
Vrouw	56,7	43,3	926
Totaal	56,7	43,3	926
LEEFTIJDGROEP			
15-19	40,1	59,9	77
20-24	72,5	27,5	89
25-29	66,6	33,4	139
30-34	64,9	35,1	157
35-39	62,3	37,7	133
40-44	57,1	42,9	118
45-49	52,2	47,8	117
50-54	26,5	73,5	96
Totaal	56,7	43,3	926
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	57,6	42,4	11
Lager	38,0	62,0	54
Lager secundair	51,7	48,3	139
Hoger secundair	59,5	40,5	352
Hoger	61,1	38,9	333
Totaal	57,4	42,6	889
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	58,6	41,4	24
20.000-30.000	58,6	41,4	140
30.000-40.000	48,8	51,2	201
40.000-60.000	58,5	41,5	356
>60.000	61,5	38,5	148
Totaal	56,9	43,1	869
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	59,0	41,0	768
Zeer slecht tot redelijk	44,3	55,7	136
Totaal	56,7	43,3	904
CONSUMPTIE VAN TABAK			
Nooit	58,4	41,6	480
Vroeger	58,9	41,1	189
Matige (< 20)	52,2	47,8	170
Grote roker	53,2	46,8	70
Totaal	56,9	43,1	909

Vrouwen van 15 tot 54 jaar

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEBRUIK VAN CONTRACEPTIVE METHODES (INDICATEUR : MCH38_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIKT OP DIT OGENBLIK EEN METHODE OM ZWANGERSCHAP TE VOORKOMEN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
GESLACHT			
Vrouw	54,9	45,1	714
Totaal	54,9	45,1	714
LEEFTIJDGROEP			
15-19	30,1	69,9	45
20-24	60,8	39,2	74
25-29	64,8	35,2	98
30-34	74,0	26,0	116
35-39	57,3	42,7	113
40-44	47,1	52,9	102
45-49	55,3	44,7	95
50-54	23,5	76,5	71
Totaal	54,9	45,1	714
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	33,4	66,6	30
Lager	39,2	60,8	70
Lager secundair	46,9	53,1	87
Hoger secundair	64,0	36,0	170
Hoger	58,8	41,2	322
Totaal	55,5	44,5	679
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	47,2	52,8	94
20.000-30.000	48,4	51,6	148
30.000-40.000	60,1	39,9	118
40.000-60.000	59,8	40,2	201
>60.000	58,4	41,6	135
Totaal	55,0	45,0	696
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	56,8	43,2	520
Zeer slecht tot redelijk	52,7	47,3	159
Totaal	55,9	44,1	679
CONSUMPTIE VAN TABAK			
Nooit	53,8	46,2	319
Vroeger	57,0	43,0	111
Matige (< 20)	55,7	44,3	155
Grote roker	60,6	39,4	80
Totaal	55,7	44,3	665

Vrouwen van 15 tot 54 jaar

REGIO: 3 Waals Gewest

GEBRUIK VAN CONTRACEPTIVE METHODES (INDICATEUR : MCH38_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIKT OP DIT OGENBLIK EEN METHODE OM ZWANGERSCHAP TE VOORKOMEN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
GESLACHT			
Vrouw	56,4	43,6	914
Totaal	56,4	43,6	914
LEEFTIJDGROEP			
15-19	41,4	58,6	85
20-24	65,3	34,7	96
25-29	68,0	32,0	138
30-34	69,1	30,9	131
35-39	65,7	34,3	137
40-44	53,7	46,3	139
45-49	49,4	50,6	109
50-54	23,4	76,6	79
Totaal	56,4	43,6	914
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	45,8	54,2	17
Lager	50,1	49,9	64
Lager secundair	45,6	54,4	143
Hoger secundair	56,0	44,0	316
Hoger	63,9	36,1	338
Totaal	56,6	43,4	878
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	48,2	51,8	88
20.000-30.000	51,1	48,9	215
30.000-40.000	56,4	43,6	196
40.000-60.000	61,5	38,5	297
>60.000	61,2	38,8	95
Totaal	56,3	43,7	891
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	58,9	41,1	684
Zeer slecht tot redelijk	48,6	51,4	187
Totaal	56,5	43,5	871
CONSUMPTIE VAN TABAK			
Nooit	55,5	44,5	450
Vroeger	56,9	43,1	160
Matige (< 20)	65,0	35,0	173
Grote roker	49,3	50,7	108
Totaal	56,8	43,2	891

Vrouwen van 15 tot 54 jaar

GEBRUIK VAN CONTRACEPTIVE METHODES (INDICATEUR : MCH39_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT METHODE DAT WORDT GEBRUIKT					Totaal
	Pil	Spiraaltje	Condoom/ pessarium	Stérili- satie	Natuurlijke methodes of andere	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Vrouw	67,2	9,3	6,2	14,5	2,8	1473
Totaal	67,2	9,3	6,2	14,5	2,8	1473
LEEFTIJDGROEP						
15-19	94,1	,0	5,6	,0	,3	88
20-24	89,7	2,9	5,1	,0	2,2	177
25-29	80,8	6,1	8,7	1,6	2,9	256
30-34	71,3	11,2	7,0	8,9	1,7	285
35-39	63,1	12,6	7,2	13,3	3,7	255
40-44	45,3	13,6	6,0	33,4	1,7	198
45-49	49,6	12,9	3,2	29,6	4,8	156
50-54	22,8	10,0	3,8	57,7	5,7	58
Totaal	67,2	9,3	6,2	14,5	2,8	1473
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	76,6	3,7	8,8	7,7	3,2	27
Lager	54,2	16,9	,0	27,4	1,5	77
Lager secundair	72,3	5,7	1,3	17,6	3,2	183
Hoger secundair	73,1	7,2	4,9	13,4	1,4	497
Hoger	61,9	11,5	9,4	13,0	4,2	636
Totaal	67,5	9,2	6,1	14,4	2,8	1420
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	76,8	8,7	4,5	8,4	1,6	108
20.000-30.000	66,7	8,7	5,0	16,7	2,9	271
30.000-40.000	67,5	11,5	3,5	14,2	3,3	290
40.000-60.000	66,7	10,1	5,8	15,7	1,8	518
>60.000	63,6	7,8	12,1	13,8	2,7	236
Totaal	66,9	9,6	6,2	14,9	2,5	1423
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	68,2	8,7	6,3	14,5	2,4	1189
Zeer slecht tot redelijk	59,8	12,0	6,8	17,3	4,0	234
Totaal	66,9	9,2	6,4	14,9	2,7	1423
CONSUMPTIE VAN TABAK						
Nooit	67,6	11,0	5,4	12,7	3,3	714
Vroeger	62,8	7,9	7,4	19,2	2,7	284
Matige (< 20)	71,2	8,3	7,8	11,2	1,5	297
Grote roker	70,2	6,4	5,5	14,9	3,0	139
Totaal	67,5	9,4	6,3	14,0	2,8	1434
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	67,2	6,0	6,7	18,7	1,6	516
Brussels Gewest	73,2	10,2	7,0	6,0	3,6	419
Waals Gewest	65,6	15,1	5,2	9,3	4,7	538
België	67,2	9,3	6,2	14,5	2,8	1473

Vrouwen van 15 tot 54 jaar die een voorbehoedsmiddel gebruiken

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEBRUIK VAN CONTRACEPTIVE METHODES (INDICATEUR : MCH39_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT METHODE DAT WORDT GEBRUIKT					Totaal
	Pil	Spiraaltje	Condoom/ pessarium	Stérili- satie	Natuurlijke methodes of andere	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Vrouw	67,2	6,0	6,7	18,7	1,6	516
Totaal	67,2	6,0	6,7	18,7	1,6	516
LEEFTIJDGROEP						
15-19	96,7	,0	3,3	,0	,0	28
20-24	88,6	4,3	6,4	,0	,7	63
25-29	82,0	4,0	9,3	2,8	1,9	94
30-34	68,9	9,8	9,0	12,3	,0	105
35-39	69,1	7,7	5,3	17,0	,9	88
40-44	45,6	7,2	6,5	39,7	,9	63
45-49	49,7	4,1	5,1	35,5	5,6	54
50-54	10,8	5,1	3,0	76,6	4,5	21
Totaal	67,2	6,0	6,7	18,7	1,6	516
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	65,1	,0	20,1	14,8	,0	6
Lager	47,1	7,8	,0	45,0	,0	19
Lager secundair	71,8	4,4	,0	21,9	1,9	64
Hoger secundair	74,1	3,9	5,1	16,2	,7	211
Hoger	61,4	8,3	10,6	17,0	2,7	200
Totaal	67,7	5,8	6,4	18,5	1,6	500
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	70,2	4,7	5,5	19,6	,0	13
20.000-30.000	66,2	4,8	5,2	22,3	1,5	79
30.000-40.000	67,3	5,9	5,9	19,6	1,3	101
40.000-60.000	66,1	7,9	5,7	19,8	,5	205
>60.000	67,2	5,0	10,5	15,6	1,7	89
Totaal	66,7	6,3	6,6	19,4	1,0	487
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	67,2	6,0	7,1	18,5	1,2	446
Zeer slecht tot redelijk	60,8	5,4	4,9	24,4	4,6	58
Totaal	66,4	5,9	6,9	19,2	1,6	504
CONSUMPTIE VAN TABAK						
Nooit	67,9	7,4	6,2	16,6	2,0	267
Vroeger	62,8	4,4	7,3	24,0	1,5	114
Matige (< 20)	71,4	4,6	8,1	14,5	1,4	91
Grote roker	71,9	5,1	6,4	16,6	,0	37
Totaal	67,6	6,1	6,8	17,9	1,6	509

Vrouwen van 15 tot 54 jaar die een voorbehoedsmiddel gebruiken

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEBRUIK VAN CONTRACEPTIVE METHODES (INDICATEUR : MCH39_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT METHODE DAT WORDT GEBRUIKT					Totaal
	Pil	Spiraaltje	Condoom/ pessarium	Stérili- satie	Natuurlijke methodes of andere	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Vrouw	73,2	10,2	7,0	6,0	3,6	419
Totaal	73,2	10,2	7,0	6,0	3,6	419
LEEFTIJDGROEP						
15-19	76,9	,0	18,2	,0	4,9	20
20-24	94,0	,7	1,8	,0	3,6	48
25-29	86,1	6,2	6,1	,0	1,7	66
30-34	73,7	11,3	10,1	2,4	2,6	88
35-39	64,2	15,5	9,8	3,0	7,5	75
40-44	52,7	16,5	6,2	21,3	3,4	55
45-49	62,2	17,3	1,5	14,8	4,2	49
50-54	53,6	6,8	11,8	27,8	,0	18
Totaal	73,2	10,2	7,0	6,0	3,6	419
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	71,3	4,5	,0	6,6	17,5	13
Lager	76,1	2,7	,0	8,7	12,5	31
Lager secundair	85,5	4,9	2,0	7,7	,0	49
Hoger secundair	72,4	16,7	3,6	3,4	3,8	108
Hoger	71,2	8,2	11,5	6,6	2,5	199
Totaal	73,6	9,7	7,1	6,0	3,6	400
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	76,1	10,1	5,3	6,9	1,6	51
20.000-30.000	71,6	11,3	3,2	3,7	10,2	82
30.000-40.000	79,7	9,0	1,0	7,3	3,0	70
40.000-60.000	77,0	9,5	8,8	2,4	2,3	125
>60.000	62,2	11,0	14,7	11,4	,8	84
Totaal	73,2	10,2	7,0	5,9	3,7	412
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	74,2	10,1	6,6	5,2	3,8	320
Zeer slecht tot redelijk	71,5	10,7	8,7	8,0	1,2	82
Totaal	73,7	10,3	7,1	5,8	3,3	402
CONSUMPTIE VAN TABAK						
Nooit	74,6	10,8	4,0	4,7	5,9	183
Vroeger	69,2	11,1	8,5	9,1	2,1	68
Matige (< 20)	73,5	8,6	10,7	5,0	2,1	96
Grote roker	79,2	12,8	5,2	2,8	,0	50
Totaal	74,1	10,6	6,6	5,3	3,5	397

Vrouwen van 15 tot 54 jaar die een voorbehoedsmiddel gebruiken

REGIO: 3 Waals Gewest

GEBRUIK VAN CONTRACEPTIVE METHODES (INDICATEUR : MCH39_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT METHODE DAT WORDT GEBRUIKT					Totaal
	Pil	Spiraaltje	Condoom/ pessarium	Stérili- satie	Natuurlijke methodes of andere	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Vrouw	65,6	15,1	5,2	9,3	4,7	538
Totaal	65,6	15,1	5,2	9,3	4,7	538
LEEFTIJDGROEP						
15-19	92,9	,0	7,1	,0	,0	40
20-24	90,5	1,1	3,7	,0	4,8	66
25-29	77,1	9,5	8,5	,0	4,9	96
30-34	75,2	14,1	1,8	4,3	4,7	92
35-39	51,5	20,9	10,2	9,5	7,9	92
40-44	43,1	24,1	5,0	24,9	2,8	80
45-49	45,4	27,5	,4	23,2	3,5	53
50-54	42,0	23,2	3,0	21,3	10,5	19
Totaal	65,6	15,1	5,2	9,3	4,7	538
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	92,5	7,5	,0	,0	,0	8
Lager	57,0	33,7	,0	9,3	,0	27
Lager secundair	69,9	8,6	3,6	11,6	6,4	70
Hoger secundair	71,0	12,1	4,9	9,7	2,4	178
Hoger	59,5	17,8	6,7	8,7	7,2	237
Totaal	65,4	15,2	5,2	9,4	4,9	520
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	80,6	10,2	3,6	3,1	2,5	44
20.000-30.000	66,1	13,3	5,2	12,6	2,8	110
30.000-40.000	65,4	19,8	,6	7,9	6,2	119
40.000-60.000	65,4	14,8	5,2	10,1	4,5	188
>60.000	52,7	15,4	15,9	8,9	7,1	63
Totaal	65,4	15,4	5,1	9,5	4,6	524
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	68,5	13,7	4,4	8,9	4,6	423
Zeer slecht tot redelijk	55,0	20,4	8,6	11,7	4,3	94
Totaal	65,8	15,0	5,2	9,4	4,5	517
CONSUMPTIE VAN TABAK						
Nooit	65,3	18,2	4,3	7,0	5,2	264
Vroeger	61,1	14,9	7,4	10,9	5,7	102
Matige (< 20)	70,1	13,5	6,3	8,5	1,5	110
Grote roker	64,5	5,9	4,3	17,1	8,2	52
Totaal	65,5	15,3	5,3	9,1	4,8	528

Vrouwen van 15 tot 54 jaar die een voorbehoedsmiddel gebruiken

GEBRUIK VAN CONTRACEPTIVE METHODES (INDICATEUR : MCH39_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WELKE METHODE WORDT OP DIT OGENBLIK GEBRUIKT						Totaal
	Geen methode	Pil	Spiraaltje	Condoom/pessarium	Stérilisatie	Andere	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Vrouw	43,7	37,9	5,2	3,5	8,2	1,6	2552
Totaal	43,7	37,9	5,2	3,5	8,2	1,6	2552
LEEFTIJDGROEP							
15-19	61,5	36,2	,0	2,2	,0	,1	205
20-24	31,3	61,6	2,0	3,5	,0	1,5	257
25-29	33,0	54,1	4,1	5,8	1,1	1,9	376
30-34	32,9	47,8	7,5	4,7	5,9	1,1	406
35-39	37,6	39,4	7,9	4,5	8,3	2,3	381
40-44	44,9	24,9	7,5	3,3	18,4	1,0	360
45-49	48,4	25,6	6,6	1,7	15,2	2,5	321
50-54	74,6	5,8	2,5	1,0	14,6	1,4	246
Totaal	43,7	37,9	5,2	3,5	8,2	1,6	2552
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	53,3	35,8	1,7	4,1	3,6	1,5	58
Lager	58,1	22,7	7,1	,0	11,5	,6	188
Lager secundair	51,1	35,4	2,8	,6	8,6	1,5	370
Hoger secundair	41,3	42,9	4,2	2,9	7,9	,8	840
Hoger	38,6	38,0	7,0	5,8	8,0	2,6	989
Totaal	43,1	38,4	5,2	3,5	8,2	1,6	2445
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	50,0	38,4	4,4	2,2	4,2	,8	204
20.000-30.000	45,7	36,2	4,7	2,7	9,1	1,6	507
30.000-40.000	47,7	35,4	6,0	1,8	7,4	1,7	516
40.000-60.000	40,8	39,5	5,9	3,4	9,3	1,1	850
>60.000	39,0	38,8	4,8	7,4	8,4	1,6	378
Totaal	43,6	37,7	5,4	3,5	8,4	1,4	2455
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	41,3	40,0	5,1	3,7	8,5	1,4	1970
Zeer slecht tot redelijk	53,5	27,8	5,6	3,2	8,0	1,9	481
Totaal	43,6	37,7	5,2	3,6	8,4	1,5	2451
CONSUMPTIE VAN TABAK							
Nooit	43,2	38,4	6,2	3,1	7,2	1,9	1246
Vroeger	41,9	36,5	4,6	4,3	11,2	1,6	460
Matige (< 20)	43,4	40,3	4,7	4,4	6,4	,9	497
Grote roker	47,3	37,0	3,4	2,9	7,9	1,6	259
Totaal	43,4	38,2	5,3	3,6	7,9	1,6	2462
VERBLIJFPLAATS (gewest)							
Vlaams Gewest	43,4	38,0	3,4	3,8	10,6	,9	923
Brussels Gewest	45,0	40,2	5,6	3,9	3,3	2,0	715
Waals Gewest	43,7	36,9	8,5	2,9	5,2	2,7	914
België	43,7	37,9	5,2	3,5	8,2	1,6	2552

Vrouwen van 15 tot 54 jaar

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEBRUIK VAN CONTRACEPTIVE METHODES (INDICATEUR : MCH39_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WELKE METHODE WORDT OP DIT OGENBLIK GEBRUIKT						Totaal
	Geen methode	Pil	Spiraaltje	Condoom/pessarium	Stérilisatie	Andere	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Vrouw	43,4	38,0	3,4	3,8	10,6	,9	923
Totaal	43,4	38,0	3,4	3,8	10,6	,9	923
LEEFTIJDGROEP							
15-19	62,4	36,4	,0	1,2	,0	,0	74
20-24	27,7	64,1	3,1	4,6	,0	,5	88
25-29	33,2	54,7	2,7	6,2	1,9	1,3	140
30-34	35,1	44,8	6,3	5,8	8,0	,0	157
35-39	37,7	43,1	4,8	3,3	10,6	,5	133
40-44	42,9	26,0	4,1	3,7	22,7	,5	118
45-49	47,8	25,9	2,1	2,7	18,5	2,9	117
50-54	73,5	2,9	1,3	,8	20,3	1,2	96
Totaal	43,4	38,0	3,4	3,8	10,6	,9	923
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	42,4	37,5	,0	11,6	8,5	,0	11
Lager	62,0	17,9	3,0	,0	17,1	,0	54
Lager secundair	48,3	37,1	2,3	,0	11,3	1,0	139
Hoger secundair	40,5	44,1	2,3	3,0	9,6	,4	353
Hoger	39,4	37,2	5,0	6,4	10,3	1,7	329
Totaal	42,7	38,7	3,3	3,7	10,6	,9	886
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	41,4	41,1	2,8	3,2	11,5	,0	24
20.000-30.000	41,4	38,8	2,8	3,0	13,1	,9	140
30.000-40.000	51,0	32,9	2,9	2,9	9,6	,6	202
40.000-60.000	41,8	38,5	4,6	3,3	11,5	,3	354
>60.000	38,6	41,3	3,1	6,5	9,6	1,0	147
Totaal	43,2	37,9	3,6	3,7	11,0	,6	867
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	41,2	39,5	3,5	4,2	10,9	,7	765
Zeer slecht tot redelijk	55,7	26,9	2,4	2,2	10,8	2,0	136
Totaal	43,5	37,5	3,4	3,9	10,9	,9	901
CONSUMPTIE VAN TABAK							
Nooit	42,0	39,4	4,3	3,6	9,6	1,1	476
Vroeger	41,1	37,0	2,6	4,3	14,1	,9	189
Matige (< 20)	47,8	37,3	2,4	4,3	7,6	,7	170
Grote roker	46,5	38,5	2,7	3,4	8,9	,0	71
Totaal	43,2	38,4	3,4	3,9	10,2	,9	906

Vrouwen van 15 tot 54 jaar

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEBRUIK VAN CONTRACEPTIVE METHODES (INDICATEUR : MCH39_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WELKE METHODE WORDT OP DIT OGENBLIK GEBRUIKT						Totaal
	Geen methode	Pil	Spiraaltje	Condoom/pessarium	Stérilisatie	Andere	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Vrouw	45,0	40,2	5,6	3,9	3,3	2,0	715
Totaal	45,0	40,2	5,6	3,9	3,3	2,0	715
LEEFTIJDGROEP							
15-19	69,9	23,1	,0	5,5	,0	1,5	45
20-24	39,2	57,1	,4	1,1	,0	2,2	74
25-29	35,2	55,8	4,0	3,9	,0	1,1	98
30-34	25,8	54,7	8,4	7,5	1,8	1,9	117
35-39	42,7	36,7	8,9	5,6	1,7	4,3	113
40-44	52,9	24,8	7,8	2,9	10,0	1,6	102
45-49	44,7	34,4	9,6	,8	8,2	2,3	95
50-54	76,5	12,6	1,6	2,8	6,5	,0	71
Totaal	45,0	40,2	5,6	3,9	3,3	2,0	715
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	66,6	23,8	1,5	,0	2,2	5,9	30
Lager	60,8	29,8	1,1	,0	3,4	4,9	70
Lager secundair	53,1	40,1	2,3	,9	3,6	,0	87
Hoger secundair	36,0	46,3	10,7	2,3	2,2	2,5	170
Hoger	41,1	41,9	4,8	6,8	3,9	1,5	323
Totaal	44,5	40,9	5,4	4,0	3,3	2,0	680
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	52,8	36,0	4,8	2,5	3,3	,8	94
20.000-30.000	51,6	34,7	5,4	1,5	1,8	5,0	148
30.000-40.000	39,9	47,9	5,4	,6	4,4	1,8	118
40.000-60.000	40,2	46,1	5,7	5,2	1,5	1,4	201
>60.000	41,4	36,5	6,4	8,6	6,7	,5	136
Totaal	44,9	40,3	5,6	3,9	3,3	2,0	697
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	43,1	42,2	5,8	3,8	2,9	2,2	521
Zeer slecht tot redelijk	47,3	37,7	5,6	4,6	4,2	,6	159
Totaal	44,0	41,2	5,7	3,9	3,2	1,8	680
CONSUMPTIE VAN TABAK							
Nooit	46,2	40,2	5,8	2,2	2,5	3,2	319
Vroeger	42,7	39,6	6,4	4,9	5,2	1,2	112
Matige (< 20)	44,3	41,0	4,8	5,9	2,8	1,2	155
Grote roker	39,4	48,0	7,7	3,1	1,7	,0	80
Totaal	44,3	41,3	5,9	3,7	2,9	2,0	666

Vrouwen van 15 tot 54 jaar

REGIO: 3 Waals Gewest

GEBRUIK VAN CONTRACEPTIVE METHODES (INDICATEUR : MCH39_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WELKE METHODE WORDT OP DIT OGENBLIK GEBRUIKT						Totaal
	Geen methode	Pil	Spiraaltje	Condoom/pessarium	Stérilisatie	Andere	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Vrouw	43,7	36,9	8,5	2,9	5,2	2,7	914
Totaal	43,7	36,9	8,5	2,9	5,2	2,7	914
LEEFTIJDGROEP							
15-19	58,1	39,0	,0	3,0	,0	,0	86
20-24	35,0	58,8	,7	2,4	,0	3,1	95
25-29	32,0	52,4	6,4	5,8	,0	3,4	138
30-34	30,7	52,1	9,7	1,3	3,0	3,2	132
35-39	35,6	33,1	13,5	6,6	6,1	5,1	135
40-44	46,3	23,2	13,0	2,7	13,4	1,5	140
45-49	50,5	22,5	13,6	,2	11,5	1,7	109
50-54	76,6	9,8	5,4	,7	5,0	2,5	79
Totaal	43,7	36,9	8,5	2,9	5,2	2,7	914
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	54,2	42,3	3,4	,0	,0	,0	17
Lager	49,9	28,6	16,9	,0	4,6	,0	64
Lager secundair	55,3	31,3	3,8	1,6	5,2	2,9	144
Hoger secundair	43,9	39,8	6,8	2,7	5,4	1,3	317
Hoger	36,3	37,9	11,3	4,3	5,6	4,6	337
Totaal	43,5	36,9	8,6	2,9	5,3	2,7	879
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	52,4	38,4	4,9	1,7	1,5	1,2	86
20.000-30.000	49,0	33,7	6,8	2,7	6,4	1,4	219
30.000-40.000	43,6	36,9	11,2	,3	4,5	3,5	196
40.000-60.000	38,8	40,0	9,0	3,2	6,2	2,8	295
>60.000	38,8	32,3	9,4	9,7	5,4	4,4	95
Totaal	43,9	36,7	8,6	2,9	5,3	2,6	891
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	41,1	40,3	8,1	2,6	5,2	2,7	684
Zeer slecht tot redelijk	52,6	26,1	9,7	4,1	5,5	2,0	186
Totaal	43,7	37,0	8,4	2,9	5,3	2,5	870
CONSUMPTIE VAN TABAK							
Nooit	44,8	36,0	10,0	2,4	3,9	2,9	451
Vroeger	43,3	34,7	8,4	4,2	6,2	3,2	159
Matige (< 20)	35,2	45,4	8,7	4,1	5,5	1,0	172
Grote roker	50,7	31,8	2,9	2,1	8,4	4,0	108
Totaal	43,4	37,1	8,7	3,0	5,1	2,7	890

Vrouwen van 15 tot 54 jaar