

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR07)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GENEESMIDDELENGEBRUIK TIJDENS AFGELOPEN 2 WEKEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	52,5	47,5	4940
Vrouw	67,7	32,3	5194
Totaal	60,1	39,9	10134
LEEFTIJDGROEP			
0-14	44,7	55,3	1638
15-24	52,3	47,7	1138
25-34	51,5	48,5	1631
35-44	57,8	42,2	1600
45-54	64,7	35,3	1283
55-64	76,3	23,7	1088
65-74	87,3	12,7	1075
75 +	88,7	11,3	681
Totaal	60,1	39,9	10134
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	67,4	32,6	351
Lager	68,1	31,9	1285
Lager secundair	62,9	37,1	1660
Hoger secundair	57,6	42,4	2928
Hoger	58,0	42,0	3487
Totaal	60,1	39,9	9711
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	54,5	45,5	782
20.000-30.000	60,5	39,5	2014
30.000-40.000	63,1	36,9	2366
40.000-60.000	58,8	41,2	3234
>60.000	61,0	39,0	1275
Totaal	60,2	39,8	9671
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	56,2	43,8	5879
Zeer slecht tot redelijk	86,3	13,7	2013
Totaal	62,7	37,3	7892
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	61,5	38,5	3703
Vroeger gerookt	69,1	30,9	1909
Matige roker (< 20)	58,0	42,0	1560
Zware roker	63,7	36,3	829
Totaal	62,8	37,2	8001
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	57,9	42,1	3523
Brussels Gewest	64,3	35,7	3007
Waals Gewest	62,6	37,4	3604
België	60,1	39,9	10134

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR07)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GENEESMIDDELEN GEBRUIK TIJDENS AFGELOPEN 2 WEKEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	49,2	50,8	1747
Vrouw	66,7	33,3	1776
Totaal	57,9	42,1	3523
LEEFTIJDSGROEP			
0-14	45,6	54,4	545
15-24	52,0	48,0	428
25-34	49,4	50,6	590
35-44	55,0	45,0	532
45-54	58,5	41,5	464
55-64	74,9	25,1	406
65-74	86,0	14,0	363
75 +	85,5	14,5	195
Totaal	57,9	42,1	3523
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	67,2	32,8	65
Lager	68,4	31,6	424
Lager secundair	62,3	37,7	606
Hoger secundair	56,8	43,2	1170
Hoger	53,4	46,6	1136
Totaal	58,0	42,0	3401
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	56,7	43,3	118
20.000-30.000	60,3	39,7	602
30.000-40.000	61,7	38,3	858
40.000-60.000	55,5	44,5	1292
>60.000	56,0	44,0	460
Totaal	58,0	42,0	3330
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	53,5	46,5	2274
Zeer slecht tot redelijk	87,9	12,1	567
Totaal	59,8	40,2	2841
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	58,7	41,3	1375
Vroeger gerookt	66,2	33,8	700
Matige roker (< 20)	54,8	45,2	559
Zware roker	60,0	40,0	239
Totaal	59,8	40,2	2873

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR07)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GENEESMIDDELENGEBRUIK TIJDENS AFGELOPEN 2 WEKEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	58,2	41,8	1453
Vrouw	69,9	30,1	1554
Totaal	64,3	35,7	3007
LEEFTIJDGROEP			
0-14	49,1	50,9	472
15-24	58,7	41,3	312
25-34	53,1	46,9	492
35-44	61,7	38,3	482
45-54	73,2	26,8	380
55-64	77,2	22,8	308
65-74	85,2	14,8	323
75 +	83,3	16,7	238
Totaal	64,3	35,7	3007
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	55,5	44,5	166
Lager	61,9	38,1	366
Lager secundair	64,5	35,5	426
Hoger secundair	66,5	33,5	697
Hoger	65,1	34,9	1187
Totaal	64,2	35,8	2842
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	51,0	49,0	365
20.000-30.000	63,2	36,8	616
30.000-40.000	69,0	31,0	608
40.000-60.000	66,2	33,8	780
>60.000	70,3	29,7	488
Totaal	64,6	35,4	2857
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	60,9	39,1	1667
Zeer slecht tot redelijk	86,1	13,9	615
Totaal	67,2	32,8	2282
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	64,4	35,6	1008
Vroeger gerookt	75,5	24,5	554
Matige roker (< 20)	66,1	33,9	453
Zware roker	65,6	34,4	278
Totaal	67,2	32,8	2293

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR07)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GENEESMIDDELENGEBRUIK TIJDENS AFGELOPEN 2 WEKEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	56,4	43,6	1740
Vrouw	68,8	31,2	1864
Totaal	62,6	37,4	3604
LEEFTIJDGROEP			
0-14	42,0	58,0	621
15-24	50,9	49,1	398
25-34	55,2	44,8	549
35-44	61,5	38,5	586
45-54	73,7	26,3	439
55-64	78,9	21,1	374
65-74	89,9	10,1	389
75 +	96,4	3,6	248
Totaal	62,6	37,4	3604
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	75,6	24,4	120
Lager	69,8	30,2	495
Lager secundair	63,5	36,5	628
Hoger secundair	56,9	43,1	1061
Hoger	63,1	36,9	1164
Totaal	62,4	37,6	3468
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	54,9	45,1	299
20.000-30.000	59,7	40,3	796
30.000-40.000	63,7	36,3	900
40.000-60.000	63,6	36,4	1162
>60.000	70,2	29,8	327
Totaal	62,6	37,4	3484
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	60,3	39,7	1938
Zeer slecht tot redelijk	84,3	15,7	831
Totaal	66,8	33,2	2769
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	65,8	34,2	1320
Vroeger gerookt	73,0	27,0	655
Matige roker (< 20)	60,9	39,1	548
Zware roker	68,3	31,7	312
Totaal	66,7	33,3	2835

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_GEN)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	HET GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN IN DE AFGELOPEN 2 WEKEN NAARGELANG VOORGESCHREVEN OF NIET			Totaal
	Voor- geschreven	Niet voor- geschreven	Geen gebruik	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	35,1	28,6	47,5	4940
Vrouw	46,7	37,9	32,3	5194
Totaal	40,9	33,2	39,9	10134
LEEFTIJDGROEP				
0-14	25,5	27,9	55,3	1638
15-24	26,9	34,4	47,7	1138
25-34	24,9	36,3	48,5	1631
35-44	35,1	36,1	42,2	1600
45-54	48,4	36,1	35,3	1283
55-64	64,2	32,5	23,7	1088
65-74	81,1	29,3	12,7	1075
75 +	85,8	23,5	11,3	681
Totaal	40,9	33,2	39,9	10134
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	53,8	33,3	32,6	351
Lager	56,7	25,1	31,9	1285
Lager secundair	43,8	32,3	37,1	1660
Hoger secundair	39,4	31,5	42,4	2928
Hoger	35,4	37,5	42,0	3487
Totaal	41,0	33,1	39,9	9711
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	39,9	26,6	45,5	782
20.000-30.000	44,0	29,8	39,5	2014
30.000-40.000	45,1	34,4	36,9	2366
40.000-60.000	38,7	32,7	41,2	3234
>60.000	36,7	41,0	39,0	1275
Totaal	41,1	33,3	39,8	9671
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	34,3	33,2	43,8	5879
Zeer slecht tot redelijk	75,5	40,1	13,7	2013
Totaal	43,2	34,7	37,3	7892
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	42,8	33,2	38,5	3703
Vroeger gerookt	50,7	35,7	30,9	1909
Matige roker (< 20)	35,6	34,6	42,0	1560
Zware roker	44,4	38,0	36,3	829
Totaal	43,4	34,5	37,2	8001
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	37,3	32,7	42,1	3523
Brussels Gewest	42,2	39,6	35,7	3007
Waals Gewest	47,1	32,1	37,4	3604
België	40,9	33,2	39,9	10134

Som van de percentages overschrijdt 100% wegens het simultaan gebruik van voorgeschreven en niet voorgeschreven geneesmiddelen

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_GEN)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HET GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN IN DE AFGELOPEN 2 WEKEN NAARGELANG VOORGESCHREVEN OF NIET			Totaal
	Voor- geschreven	Niet voor- geschreven	Geen gebruik	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	31,6	26,5	50,8	1747
Vrouw	43,0	39,0	33,3	1776
Totaal	37,3	32,7	42,1	3523
LEEFTIJDGROEP				
0-14	22,2	31,7	54,4	545
15-24	26,5	33,7	48,0	428
25-34	22,3	35,3	50,6	590
35-44	30,7	35,6	45,0	532
45-54	42,7	33,2	41,5	464
55-64	61,2	29,8	25,1	406
65-74	77,3	26,9	14,0	363
75 +	81,2	23,6	14,5	195
Totaal	37,3	32,7	42,1	3523
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	44,7	40,6	32,8	65
Lager	55,4	25,1	31,6	424
Lager secundair	41,4	31,9	37,7	606
Hoger secundair	37,5	31,4	43,2	1170
Hoger	29,8	36,1	46,6	1136
Totaal	37,5	32,6	42,0	3401
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	44,2	22,0	43,3	118
20.000-30.000	41,8	30,3	39,7	602
30.000-40.000	42,6	34,2	38,3	858
40.000-60.000	34,1	31,2	44,5	1292
>60.000	32,2	38,7	44,0	460
Totaal	37,5	32,6	42,0	3330
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	31,5	31,2	46,5	2274
Zeer slecht tot redelijk	75,1	42,5	12,1	567
Totaal	39,4	33,3	40,2	2841
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	39,0	32,4	41,3	1375
Vroeger gerookt	46,0	33,5	33,8	700
Matige roker (< 20)	31,3	33,8	45,2	559
Zware roker	43,5	35,2	40,0	239
Totaal	39,5	33,2	40,2	2873

Som van de percentages overschrijdt 100% wegens het simultaan gebruik van voorgeschreven en niet voorgeschreven geneesmiddelen

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_GEN)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HET GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN IN DE AFGELOPEN 2 WEKEN NAARGELANG VOORGESCHREVEN OF NIET			Totaal
	Voor- geschreven	Niet voor- geschreven	Geen gebruik	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	35,2	38,2	41,8	1453
Vrouw	48,6	40,9	30,1	1554
Totaal	42,2	39,6	35,7	3007
LEEFTIJDGROEP				
0-14	29,3	28,8	50,9	472
15-24	23,4	46,7	41,3	312
25-34	24,5	40,4	46,9	492
35-44	35,2	43,5	38,3	482
45-54	51,4	44,5	26,8	380
55-64	62,5	47,3	22,8	308
65-74	77,7	30,3	14,8	323
75 +	81,0	28,4	16,7	238
Totaal	42,2	39,6	35,7	3007
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	44,7	22,2	44,5	166
Lager	46,4	32,8	38,1	366
Lager secundair	45,2	35,0	35,5	426
Hoger secundair	45,8	40,6	33,5	697
Hoger	35,7	46,4	34,9	1187
Totaal	41,7	39,8	35,8	2842
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	32,5	30,3	49,0	365
20.000-30.000	43,9	36,5	36,8	616
30.000-40.000	48,6	41,8	31,0	608
40.000-60.000	40,2	43,0	33,8	780
>60.000	43,7	45,5	29,7	488
Totaal	42,3	39,8	35,4	2857
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	33,8	42,0	39,1	1667
Zeer slecht tot redelijk	75,2	43,5	13,9	615
Totaal	44,2	42,4	32,8	2282
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	43,2	40,3	35,6	1008
Vroeger gerookt	54,4	42,8	24,5	554
Matige roker (< 20)	39,0	45,6	33,9	453
Zware roker	38,6	47,4	34,4	278
Totaal	44,1	42,8	32,8	2293

Som van de percentages overschrijdt 100% wegens het simultaan gebruik van voorgeschreven en niet voorgeschreven geneesmiddelen

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_GEN)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HET GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN IN DE AFGELOPEN 2 WEKEN NAARGELANG VOORGESCHREVEN OF NIET			Totaal
	Voor- geschreven	Niet voor- geschreven	Geen gebruik	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	41,4	29,4	43,6	1740
Vrouw	52,7	34,9	31,2	1864
Totaal	47,1	32,1	37,4	3604
LEEFTIJDGROEP				
0-14	29,8	21,7	58,0	621
15-24	28,7	31,6	49,1	398
25-34	30,3	36,9	44,8	549
35-44	42,9	34,8	38,5	586
45-54	58,3	39,1	26,3	439
55-64	71,1	33,0	21,1	374
65-74	87,9	32,5	10,1	389
75 +	95,3	20,5	3,6	248
Totaal	47,1	32,1	37,4	3604
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	68,2	34,0	24,4	120
Lager	62,5	22,4	30,2	495
Lager secundair	47,5	32,3	36,5	628
Hoger secundair	41,6	29,4	43,1	1061
Hoger	44,6	36,7	36,9	1164
Totaal	47,0	32,0	37,6	3468
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	41,1	27,6	45,1	299
20.000-30.000	47,3	26,9	40,3	796
30.000-40.000	48,0	32,9	36,3	900
40.000-60.000	47,2	33,5	36,4	1162
>60.000	46,0	45,2	29,8	327
Totaal	46,8	32,4	37,4	3484
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	40,3	34,5	39,7	1938
Zeer slecht tot redelijk	76,0	36,0	15,7	831
Totaal	50,0	34,9	33,2	2769
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	50,1	32,4	34,2	1320
Vroeger gerookt	58,7	37,7	27,0	655
Matige roker (< 20)	42,3	32,4	39,1	548
Zware roker	47,3	39,1	31,7	312
Totaal	50,1	34,4	33,3	2835

Som van de percentages overschrijdt 100% wegens het simultaan gebruik van voorgeschreven en niet voorgeschreven geneesmiddelen

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_T_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)								
	Geneesmiddelen tegen pijn	Geneesmiddelen i.v.m. ademhalingsstelsel	Cardiovasculaire geneesmiddelen	Geneesmiddelen i.v.m. zenuwstelsel	Vitaminen, mineralen en tonica	Geneesmiddelen tegen maag/darmproblemen	Antibiotica	
	%	%	%	%	%	%	%	%
GESLACHT								
Man	20,9	17,6	11,8	6,6	5,9	6,0	4,6	
Vrouw	29,4	20,4	16,2	11,8	10,4	8,8	4,5	
Totaal	25,2	19,0	14,0	9,2	8,2	7,4	4,5	
LEEFTIJDGROEP								
0-14	12,3	24,7	,3	,9	9,0	2,4	5,7	
15-24	24,1	18,6	1,6	1,9	7,1	4,3	3,7	
25-34	24,4	18,6	2,4	4,0	6,6	5,4	5,1	
35-44	26,8	17,3	8,3	9,2	8,5	6,9	4,2	
45-54	31,1	16,5	14,1	11,1	6,8	8,9	4,1	
55-64	28,4	18,4	35,6	14,9	9,5	12,1	3,3	
65-74	31,8	19,3	51,7	26,3	9,3	16,2	3,9	
75 +	34,3	16,6	62,0	37,2	13,6	14,8	7,3	
Totaal	25,2	19,0	14,0	9,2	8,2	7,4	4,5	
ONDERWIJSNIVEAU								
Geen diploma	34,5	20,8	24,2	13,9	10,0	19,2	6,6	
Lager	30,2	18,5	27,7	18,4	7,5	9,5	3,3	
Lager secundair	28,0	19,1	18,5	12,9	8,6	8,1	4,4	
Hoger secundair	22,5	20,3	11,4	7,1	6,0	6,3	3,8	
Hoger	23,7	17,5	9,3	6,3	9,9	6,2	5,5	
Totaal	25,0	18,9	14,0	9,2	8,1	7,3	4,5	
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)								
< 20.000	25,3	15,4	16,8	11,9	5,9	7,6	3,6	
20.000-30.000	24,9	18,5	16,7	11,7	7,8	8,4	4,8	
30.000-40.000	27,1	20,3	15,6	10,8	7,8	8,3	5,2	
40.000-60.000	24,0	19,4	11,9	7,1	8,1	6,8	4,7	
>60.000	25,4	17,7	11,0	6,4	9,9	6,3	3,5	
Totaal	25,2	19,0	13,9	9,1	8,1	7,5	4,6	
GEZONDHEIDSBELEVING								
Goed tot zeer goed	23,4	16,5	10,1	4,8	6,2	5,6	3,5	
Zeer slecht tot redelijk	43,5	24,1	37,8	29,0	14,0	18,2	6,8	
Totaal	27,8	18,1	16,2	10,1	7,9	8,3	4,2	
ROOKGEWOONTEN								
Nooit gerookt	26,1	16,8	16,2	10,0	7,1	7,6	3,6	
Vroeger gerookt	27,5	20,1	21,8	11,0	7,8	10,1	4,3	
Matige roker (< 20)	29,3	18,2	10,1	8,2	8,6	6,9	5,8	
Zware roker	32,3	19,8	14,5	13,9	9,2	9,5	4,4	
Totaal	27,7	18,1	16,1	10,3	7,8	8,2	4,3	
VERBLIJFPLAATS (gewest)								
Vlaams Gewest	23,0	19,4	12,1	7,3	6,6	5,7	3,1	
Brussels Gewest	29,3	20,2	15,3	11,4	14,4	9,9	5,6	
Waaals Gewest	27,7	17,9	16,8	11,9	8,9	9,6	6,6	
België	25,2	19,0	14,0	9,2	8,2	7,4	4,5	

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_T_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)						Totaal
	Geneesmiddelen i.v.m. hormonaal stelsel (*)	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Geneesmiddelen tegen allergie	Geneesmiddelen voor oftalmol. gebruik	Andere geneesmiddelen	Geen geneesmiddelen	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	2,1	3,4	2,8	1,8	3,3	47,5	4947
Vrouw	6,0	3,3	3,8	2,7	4,4	32,2	5200
Totaal	4,1	3,3	3,3	2,3	3,9	39,9	10147
LEEFTIJDGROEP							
0-14	,0	2,8	3,5	,7	3,9	55,2	1640
15-24	,3	5,3	4,8	,7	3,9	47,6	1140
25-34	,7	3,1	3,0	,7	3,3	48,3	1636
35-44	1,3	3,5	3,7	2,0	3,5	42,2	1602
45-54	8,6	2,7	2,6	1,8	4,8	35,3	1285
55-64	13,1	2,6	2,6	4,2	5,6	23,8	1088
65-74	10,7	3,7	2,8	6,1	2,9	12,7	1075
75 +	8,6	2,4	1,5	11,4	1,8	11,3	681
Totaal	4,1	3,3	3,3	2,3	3,9	39,9	10147
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	6,4	4,0	2,5	6,8	1,9	32,5	352
Lager	8,5	2,2	3,1	2,3	2,8	31,9	1285
Lager secundair	5,0	3,1	2,9	2,3	3,6	37,0	1662
Hoger secundair	2,7	3,2	3,5	2,2	4,1	42,3	2934
Hoger	3,4	3,6	3,5	1,9	4,4	42,0	3491
Totaal	4,1	3,3	3,3	2,3	3,9	39,9	9724
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	3,8	3,2	3,8	2,5	2,7	45,4	784
20.000-30.000	4,8	3,5	3,1	3,3	3,7	39,5	2017
30.000-40.000	4,9	2,7	3,5	1,7	3,7	36,8	2371
40.000-60.000	3,7	3,4	3,3	2,0	3,6	41,2	3237
>60.000	3,4	4,5	3,1	2,5	5,1	39,1	1275
Totaal	4,2	3,4	3,3	2,3	3,8	39,8	9684
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	3,4	3,2	2,9	1,9	4,0	43,7	5887
Zeer slecht tot redelijk	9,7	4,6	4,7	4,5	3,5	13,7	2016
Totaal	4,8	3,5	3,3	2,5	3,9	37,2	7903
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	5,1	3,2	3,6	2,7	4,4	38,5	3705
Vroeger gerookt	6,3	3,5	3,0	3,3	4,5	30,9	1912
Matige roker (< 20)	2,7	4,0	3,4	2,1	2,7	41,9	1564
Zware roker	3,8	3,3	2,2	1,6	3,0	36,2	830
Totaal	4,7	3,4	3,3	2,6	3,9	37,2	8011
VERBLIJFPLAATS (gewest)							
Vlaams Gewest	3,0	2,8	3,1	1,7	4,1	42,1	3524
Brussels Gewest	5,6	4,0	3,7	4,1	3,0	35,6	3015
Waa's Gewest	5,5	4,0	3,4	2,7	3,7	37,3	3608
België	4,1	3,3	3,3	2,3	3,9	39,9	10147

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_T_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)						
	Geneesmiddelen tegen pijn	Geneesmiddelen i.v.m. ademhalingsstelsel	Cardiovasculaire geneesmiddelen	Geneesmiddelen i.v.m. zenuwstelsel	Vitaminen, mineralen en tonica	Geneesmiddelen tegen maag/darmproblemen	Antibiotica
	%	%	%	%	%	%	%
GESLACHT							
Man	18,9	16,8	10,8	4,7	4,7	4,7	2,8
Vrouw	27,1	22,0	13,5	9,9	8,5	6,6	3,5
Totaal	23,0	19,4	12,1	7,3	6,6	5,7	3,1
LEEFTIJDGROEP							
0-14	13,0	26,4	,4	,9	6,9	2,5	4,1
15-24	24,3	19,1	1,5	2,1	5,8	3,9	2,4
25-34	21,8	19,1	1,9	3,1	6,0	4,1	4,2
35-44	25,0	17,7	7,2	7,4	7,7	5,7	2,7
45-54	27,5	16,3	9,5	7,5	4,6	6,3	2,4
55-64	23,7	19,3	34,7	9,6	7,5	8,5	1,5
65-74	28,1	17,7	48,0	25,4	6,5	12,0	4,0
75 +	26,4	16,2	55,6	32,7	12,1	11,6	4,5
Totaal	23,0	19,4	12,1	7,3	6,6	5,7	3,1
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	33,3	18,7	29,0	12,6	8,0	15,7	1,4
Lager	28,6	20,3	25,1	15,5	4,7	6,7	2,5
Lager secundair	25,0	18,7	16,8	11,0	7,5	7,5	3,4
Hoger secundair	21,6	21,8	10,9	5,7	4,6	4,6	2,3
Hoger	20,9	17,0	6,4	4,5	8,4	4,6	4,1
Totaal	22,9	19,4	12,2	7,4	6,5	5,5	3,1
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	20,7	15,7	28,6	15,9	2,2	9,3	2,3
20.000-30.000	23,0	17,2	18,6	10,7	5,5	7,1	2,2
30.000-40.000	25,2	21,9	13,1	8,8	5,6	6,0	4,1
40.000-60.000	21,4	19,7	8,7	4,8	6,9	5,0	3,4
>60.000	23,1	17,9	8,3	3,8	8,3	4,7	2,7
Totaal	22,8	19,3	12,2	7,0	6,4	5,7	3,2
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	21,0	16,9	9,0	3,4	5,2	4,0	2,5
Zeer slecht tot redelijk	42,1	24,7	35,3	27,2	12,5	16,9	5,1
Totaal	24,8	18,4	13,8	7,8	6,6	6,3	3,0
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	23,1	17,4	13,3	8,1	5,9	5,5	2,5
Vroeger gerookt	22,8	21,3	18,9	8,1	7,4	8,8	2,7
Matige roker (< 20)	30,7	17,4	8,0	6,1	7,4	4,7	4,5
Zware roker	26,1	18,4	16,0	10,5	5,8	7,2	3,6
Totaal	24,8	18,4	13,8	7,9	6,5	6,3	3,1

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

REGIO: 1 Vlaams Gewest

 MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_T_2)
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)						Totaal
	Geneesmiddelen i.v.m. hormonaal stelsel (*)	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Geneesmiddelen tegen allergie	Geneesmiddelen voor oftalmol. gebruik	Andere geneesmiddelen	Geen geneesmiddelen	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	1,9	3,0	2,6	1,5	3,6	50,7	1748
Vrouw	4,1	2,7	3,7	2,0	4,6	33,3	1776
Totaal	3,0	2,8	3,1	1,7	4,1	42,1	3524
LEEFTIJDGROEP							
0-14	,0	2,0	3,2	1,2	3,7	54,4	545
15-24	,4	4,7	4,5	,3	3,3	48,0	428
25-34	,6	3,1	3,1	,7	3,4	50,6	590
35-44	,8	3,6	3,9	1,8	3,0	45,0	532
45-54	7,3	2,3	2,9	1,2	5,9	41,4	465
55-64	7,9	,6	2,0	2,5	7,5	25,1	406
65-74	6,7	3,4	2,1	5,3	2,5	14,0	363
75 +	8,0	1,7	,6	7,2	2,5	14,5	195
Totaal	3,0	2,8	3,1	1,7	4,1	42,1	3524
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	4,8	5,4	2,0	5,1	1,7	32,8	65
Lager	7,8	2,0	4,0	2,0	3,6	31,6	424
Lager secundair	4,3	2,7	2,8	1,7	4,5	37,7	606
Hoger secundair	2,1	2,9	3,2	1,8	4,0	43,1	1171
Hoger	1,6	3,0	3,3	1,5	4,5	46,6	1136
Totaal	3,0	2,8	3,2	1,7	4,2	42,0	3402
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	5,8	1,7	3,3	5,4	3,2	43,3	118
20.000-30.000	4,2	2,7	2,0	2,2	3,4	39,7	602
30.000-40.000	4,5	2,4	4,3	1,1	4,5	38,2	859
40.000-60.000	2,0	2,9	3,3	1,6	3,6	44,5	1292
>60.000	1,7	4,0	2,9	1,9	5,6	44,0	460
Totaal	3,1	2,9	3,2	1,7	4,1	42,0	3331
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	2,5	2,8	3,1	1,4	4,0	46,5	2274
Zeer slecht tot redelijk	8,2	3,8	3,2	4,1	5,0	12,1	568
Totaal	3,6	3,0	3,1	1,9	4,2	40,2	2842
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	3,7	2,8	3,7	1,7	4,7	41,3	1375
Vroeger gerookt	4,7	2,2	2,9	3,0	5,1	33,8	700
Matige roker (< 20)	2,1	4,4	3,3	1,3	1,9	45,1	560
Zware roker	2,4	3,0	1,0	1,1	3,8	40,0	239
Totaal	3,5	3,0	3,2	1,8	4,2	40,1	2874

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_T_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)							
	Geneesmiddelen tegen pijn	Geneesmiddelen i.v.m. ademhalingsstelsel	Cardiovasculaire geneesmiddelen	Geneesmiddelen i.v.m. zenuwstelsel	Vitaminen, mineralen en tonica	Geneesmiddelen tegen maag/darmproblemen	Antibiotica	
	%	%	%	%	%	%	%	%
GESLACHT								
Man	24,2	20,1	12,5	8,7	13,4	8,5	5,6	
Vrouw	34,0	20,4	17,9	13,8	15,3	11,3	5,6	
Totaal	29,3	20,2	15,3	11,4	14,4	9,9	5,6	
LEEFTIJDGROEP								
0-14	11,7	23,4	,2	2,3	15,8	3,0	7,6	
15-24	31,3	19,9	2,1	3,0	13,4	6,7	2,8	
25-34	29,1	19,7	3,1	5,9	12,8	7,5	5,1	
35-44	31,8	19,9	8,7	9,4	13,0	7,9	5,9	
45-54	37,1	24,1	19,1	17,5	10,7	13,7	5,8	
55-64	34,8	18,4	25,4	16,8	18,5	11,8	5,7	
65-74	26,6	15,3	49,8	21,0	16,7	21,8	6,4	
75 +	37,8	17,8	58,7	35,9	19,6	18,2	6,8	
Totaal	29,3	20,2	15,3	11,4	14,4	9,9	5,6	
ONDERWIJSNIVEAU								
Geen diploma	20,7	22,1	15,6	7,9	6,4	12,5	5,9	
Lager	30,7	19,4	19,6	15,3	12,2	10,5	5,8	
Lager secundair	28,9	16,7	20,2	16,7	14,9	9,6	5,6	
Hoger secundair	27,3	22,7	16,7	12,0	15,4	11,0	7,5	
Hoger	30,8	18,4	10,8	7,3	15,8	8,2	4,3	
Totaal	28,9	19,7	15,1	10,9	14,4	9,8	5,6	
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)								
< 20.000	23,7	19,7	7,6	8,5	10,7	6,0	3,3	
20.000-30.000	31,2	20,7	14,6	11,4	13,9	10,8	7,6	
30.000-40.000	28,2	25,6	19,6	15,0	18,9	12,3	7,1	
40.000-60.000	28,8	18,8	14,5	10,6	14,5	9,7	4,7	
>60.000	32,6	17,6	18,8	10,5	13,3	10,2	4,0	
Totaal	29,2	20,6	15,3	11,4	14,5	10,1	5,6	
GEZONDHEIDSBELEVING								
Goed tot zeer goed	28,6	17,2	11,6	5,9	12,5	7,9	3,6	
Zeer slecht tot redelijk	45,1	29,2	36,1	30,3	19,2	20,9	11,1	
Totaal	32,7	20,2	17,7	12,1	14,2	11,2	5,5	
ROOKGEWOONTEN								
Nooit gerookt	29,9	17,2	17,7	9,8	13,0	12,5	5,2	
Vroeger gerookt	35,4	20,6	30,0	14,5	17,4	10,3	4,0	
Matige roker (< 20)	32,1	24,3	11,7	11,4	15,6	10,1	6,7	
Zware roker	39,0	21,7	11,5	17,0	13,9	9,5	4,8	
Totaal	32,6	20,0	18,2	12,0	14,6	11,2	5,2	

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

REGIO: 2 Brussels Gewest

 MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_T_2)
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)							Totaal
	Geneesmiddelen i.v.m. hormonaal stelsel (*)	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Geneesmiddelen tegen allergie	Geneesmiddelen voor oftalmol. gebruik	Andere geneesmiddelen	Geen geneesmiddelen	N (*)	
	%	%	%	%	%	%		
GESLACHT								
Man	2,5	3,1	3,7	3,1	2,4	41,5	1458	
Vrouw	8,4	4,8	3,7	5,1	3,5	30,0	1557	
Totaal	5,6	4,0	3,7	4,1	3,0	35,6	3015	
LEEFTIJDGROEP								
0-14	,0	4,9	3,2	,2	3,1	50,8	473	
15-24	,8	4,6	5,9	,6	2,4	40,9	313	
25-34	,4	4,2	2,5	1,0	1,8	46,4	495	
35-44	1,3	4,2	3,1	2,0	3,5	38,3	483	
45-54	13,8	3,1	3,4	1,6	4,0	26,7	381	
55-64	15,2	3,8	7,2	6,0	3,5	22,8	309	
65-74	17,1	2,5	3,1	9,8	4,2	14,8	323	
75 +	7,6	3,4	,8	27,8	1,7	16,7	238	
Totaal	5,6	4,0	3,7	4,1	3,0	35,6	3015	
ONDERWIJSNIVEAU								
Geen diploma	7,9	2,7	4,7	3,1	3,2	44,2	167	
Lager	4,8	2,7	3,0	4,1	3,4	38,1	366	
Lager secundair	8,4	2,8	3,7	3,2	2,6	35,5	426	
Hoger secundair	5,2	4,9	3,5	5,9	2,4	33,1	700	
Hoger	4,5	4,6	3,3	2,9	3,4	34,8	1191	
Totaal	5,5	4,0	3,5	3,9	3,0	35,6	2850	
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)								
< 20.000	2,1	3,3	3,4	,8	2,1	48,4	367	
20.000-30.000	5,1	4,7	4,6	5,5	3,0	36,6	618	
30.000-40.000	6,9	3,2	3,1	4,5	1,7	31,0	608	
40.000-60.000	6,8	4,4	4,9	3,7	3,5	33,7	782	
>60.000	5,8	3,9	1,8	5,6	4,1	29,6	490	
Totaal	5,6	4,0	3,7	4,2	2,9	35,2	2865	
GEZONDHEIDSBELEVING								
Goed tot zeer goed	5,1	3,4	2,9	3,5	3,3	38,9	1672	
Zeer slecht tot redelijk	10,3	6,1	6,9	8,3	2,5	13,9	617	
Totaal	6,4	4,1	3,9	4,7	3,1	32,6	2289	
ROOKGEWOONTEN								
Nooit gerookt	6,5	2,6	2,9	5,8	3,6	35,5	1009	
Vroeger gerookt	9,4	5,0	5,4	6,0	2,5	24,3	557	
Matige roker (< 20)	3,5	4,7	5,0	2,6	3,1	33,4	455	
Zware roker	4,0	5,9	3,6	3,0	2,6	34,4	278	
Totaal	6,1	3,9	4,0	4,8	3,1	32,6	2299	

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_T_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)							
	Geneesmiddelen tegen pijn	Geneesmiddelen i.v.m. ademhalingsstelsel	Cardiovasculaire geneesmiddelen	Geneesmiddelen i.v.m. zenuwstelsel	Vitaminen, mineralen en tonica	Geneesmiddelen tegen maag/darmproblemen	Antibiotica	
	%	%	%	%	%	%	%	%
GESLACHT								
Man	23,4	18,3	13,3	9,4	5,6	7,5	7,4	
Vrouw	32,0	17,5	20,3	14,5	12,3	11,7	5,8	
Totaal	27,7	17,9	16,8	11,9	8,9	9,6	6,6	
LEEFTIJDGROEP								
0-14	11,3	22,4	,1	,4	10,4	2,3	7,7	
15-24	21,4	17,4	1,7	1,4	7,2	4,4	6,1	
25-34	27,8	17,1	3,1	5,0	5,4	7,2	6,8	
35-44	28,6	15,9	10,1	12,4	8,7	8,7	6,4	
45-54	36,2	14,5	21,4	16,0	9,9	12,4	6,9	
55-64	36,0	16,6	41,0	25,4	10,6	19,7	6,1	
65-74	39,2	22,9	58,1	29,6	11,2	20,7	2,9	
75 +	44,2	16,5	73,1	44,6	12,5	17,6	11,7	
Totaal	27,7	17,9	16,8	11,9	8,9	9,6	6,6	
ONDERWIJSNIVEAU								
Geen diploma	44,8	21,9	25,5	19,2	14,2	26,8	11,9	
Lager	32,5	15,3	35,0	24,3	10,5	13,7	3,9	
Lager secundair	32,9	20,4	21,0	15,2	9,0	8,8	5,8	
Hoger secundair	23,1	16,6	10,9	8,6	6,5	8,7	5,7	
Hoger	25,7	18,0	13,7	8,8	10,3	8,1	8,1	
Totaal	27,6	17,8	16,9	12,0	9,1	9,7	6,6	
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)								
< 20.000	29,3	12,8	14,0	11,1	5,8	7,4	4,6	
20.000-30.000	25,5	19,6	14,7	13,0	8,9	9,4	7,6	
30.000-40.000	29,8	16,6	18,4	12,7	8,4	10,8	6,4	
40.000-60.000	27,9	19,1	17,5	10,9	9,0	9,9	7,3	
>60.000	27,7	17,0	14,2	11,8	12,7	8,5	5,5	
Totaal	28,0	17,9	16,5	11,9	8,9	9,7	6,8	
GEZONDHEIDSBELEVING								
Goed tot zeer goed	26,8	15,2	12,1	7,3	6,1	8,2	5,5	
Zeer slecht tot redelijk	44,8	21,9	41,5	30,8	14,4	19,0	7,6	
Totaal	31,7	17,0	20,0	13,6	8,3	11,1	6,1	
ROOKGEWOONTEN								
Nooit gerookt	30,6	15,5	21,3	13,7	7,6	10,2	5,2	
Vroeger gerookt	34,5	17,4	25,1	15,8	6,0	12,4	7,6	
Matige roker (< 20)	25,7	17,5	13,2	11,0	8,4	9,8	7,8	
Zware roker	39,0	21,1	13,4	17,8	12,6	12,9	5,4	
Totaal	31,5	17,0	19,5	14,1	8,0	10,9	6,3	

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

REGIO: 3 Waals Gewest

 MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_T_2)
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)						Totaal
	Geneesmiddelen i.v.m. hormonaal stelsel (*)	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Geneesmiddelen tegen allergie	Geneesmiddelen voor oftalmol. gebruik	Andere geneesmiddelen	Geen geneesmiddelen	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	2,4	4,1	2,8	2,1	3,0	43,5	1741
Vrouw	8,7	3,9	4,0	3,3	4,4	31,1	1867
Totaal	5,5	4,0	3,4	2,7	3,7	37,3	3608
LEEFTIJDGROEP							
0-14	,0	3,4	4,0	,1	4,3	57,7	622
15-24	,0	6,6	4,9	1,5	5,3	48,9	399
25-34	1,0	2,6	3,0	,5	3,7	44,5	551
35-44	2,2	3,1	3,6	2,6	4,3	38,4	587
45-54	9,6	3,4	1,9	3,1	3,0	26,3	439
55-64	23,6	6,5	2,2	7,3	2,2	21,3	373
65-74	14,6	4,6	3,7	6,1	3,0	10,1	389
75 +	10,1	2,9	3,2	9,0	,9	3,6	248
Totaal	5,5	4,0	3,4	2,7	3,7	37,3	3608
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	6,8	3,6	1,4	10,7	1,2	24,4	120
Lager	10,9	2,5	1,7	2,0	1,1	30,2	495
Lager secundair	5,3	3,8	2,8	3,1	2,4	36,2	630
Hoger secundair	3,3	3,5	4,1	2,3	4,8	43,1	1063
Hoger	6,0	4,4	3,8	2,3	4,4	36,9	1164
Totaal	5,6	3,8	3,4	2,7	3,7	37,5	3472
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	3,4	4,1	4,4	1,5	2,8	45,1	299
20.000-30.000	5,4	4,2	4,1	4,2	4,5	40,1	797
30.000-40.000	5,1	2,9	2,4	1,9	3,2	36,0	904
40.000-60.000	6,2	4,2	3,0	2,5	3,6	36,4	1163
>60.000	7,2	6,5	4,5	2,5	4,4	30,1	325
Totaal	5,6	4,1	3,3	2,7	3,7	37,3	3488
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	4,7	3,9	2,5	2,6	4,2	39,6	1941
Zeer slecht tot redelijk	11,3	5,2	6,0	4,0	1,8	15,7	831
Totaal	6,5	4,2	3,4	3,0	3,6	33,1	2772
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	7,2	4,2	3,7	3,6	3,9	34,2	1321
Vroeger gerookt	8,7	5,6	2,5	3,0	4,0	27,0	655
Matige roker (< 20)	3,5	3,2	2,8	3,3	3,8	39,0	549
Zware roker	5,7	2,9	3,4	2,0	2,0	31,5	313
Totaal	6,6	4,2	3,2	3,2	3,7	33,3	2838

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_P_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)							
	Cardiovasculaire geneesmiddelen	Geneesmiddelen tegen pijn	Geneesmiddelen i.v.m. zenuwstelsel	Geneesmiddelen i.v.m. ademhalingsstelsel	Geneesmiddelen tegen maag/darmproblemen	Antibiotica	Geneesmiddelen i.v.m. hormonaal stelsel (*)
	%	%	%	%	%	%	%
GESLACHT							
Man	11,4	9,4	5,9	9,2	4,3	4,6	2,1
Vrouw	15,6	12,0	11,1	9,9	6,3	4,5	6,0
Totaal	13,5	10,7	8,5	9,5	5,3	4,5	4,1
LEEFTIJDGROEP							
0-14	,2	3,8	,7	14,5	1,7	5,7	,0
15-24	1,3	7,2	1,3	7,7	2,3	3,7	,3
25-34	1,8	6,0	3,4	6,6	3,0	5,1	,7
35-44	7,9	9,1	8,5	7,9	4,5	4,2	1,3
45-54	13,4	13,9	9,8	9,2	6,4	4,1	8,6
55-64	35,0	17,4	13,8	9,7	9,5	3,3	13,2
65-74	51,2	22,4	22,4	12,0	13,7	3,9	10,7
75 +	61,8	28,0	36,6	11,8	13,3	7,3	8,6
Totaal	13,5	10,7	8,5	9,5	5,3	4,5	4,1
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	23,7	18,3	13,7	15,0	15,7	6,6	6,4
Lager	27,6	19,6	17,1	11,1	8,1	3,3	8,5
Lager secundair	17,9	13,2	12,2	8,7	6,3	4,4	5,0
Hoger secundair	11,1	9,2	6,7	10,3	4,5	3,7	2,7
Hoger	8,7	7,6	5,5	8,2	3,8	5,4	3,4
Totaal	13,6	10,7	8,5	9,5	5,3	4,5	4,1
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	16,5	13,5	11,2	8,6	6,4	3,6	3,7
20.000-30.000	15,8	11,7	10,6	9,6	6,7	4,8	4,8
30.000-40.000	15,2	12,5	10,0	10,3	6,2	5,2	4,9
40.000-60.000	11,6	9,7	6,8	10,1	4,6	4,7	3,7
>60.000	10,5	8,0	5,8	7,4	3,8	3,5	3,4
Totaal	13,4	10,8	8,5	9,6	5,4	4,6	4,2
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	9,7	7,8	4,1	6,3	3,3	3,5	3,4
Zeer slecht tot redelijk	36,9	27,3	27,6	17,1	15,4	6,8	9,7
Totaal	15,6	12,1	9,2	8,7	5,9	4,2	4,8
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	15,8	11,5	9,3	8,0	5,2	3,6	5,1
Vroeger gerookt	21,0	13,4	10,6	10,7	7,8	4,3	6,4
Matige roker (< 20)	9,5	11,1	6,9	7,8	4,7	5,7	2,7
Zware roker	14,0	13,3	12,8	9,0	6,5	4,3	3,8
Totaal	15,5	12,0	9,5	8,7	5,8	4,3	4,7
VERBLIJFPLAATS (gewest)							
Vlaams Gewest	11,7	9,1	6,6	9,2	3,7	3,1	3,0
Brussels Gewest	14,9	12,2	10,3	9,4	7,0	5,6	5,6
Waaals Gewest	16,2	13,0	11,3	10,2	7,5	6,6	5,5
België	13,5	10,7	8,5	9,5	5,3	4,5	4,1

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_P_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)						Totaal
	Vitamines, mineralen en tonica	Geneesmiddelen tegen allergie	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Geneesmiddelen voor oftalmol. gebruik	Andere voorgeschreven geneesmiddelen	Geen voorgeschreven geneesmiddelen	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	2,5	2,4	2,5	1,6	2,1	65,0	4956
Vrouw	5,4	3,1	2,5	2,3	3,9	53,3	5200
Totaal	4,0	2,8	2,5	2,0	3,0	59,2	10156
LEEFTIJDGROEP							
0-14	3,2	3,3	2,0	,4	1,8	74,6	1646
15-24	3,0	3,8	4,2	,7	2,3	73,3	1142
25-34	1,8	2,3	1,6	,6	2,7	75,1	1637
35-44	3,9	2,9	2,9	1,3	2,5	65,0	1602
45-54	4,2	2,2	1,6	1,4	4,4	51,9	1289
55-64	4,7	2,6	2,5	4,2	5,6	35,5	1085
65-74	6,8	2,5	3,2	5,8	3,4	18,9	1075
75 +	12,4	1,5	2,3	10,8	2,1	14,1	680
Totaal	4,0	2,8	2,5	2,0	3,0	59,2	10156
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	7,0	2,3	3,9	6,4	2,4	46,3	352
Lager	5,7	3,0	1,9	2,1	2,2	43,3	1285
Lager secundair	4,5	2,4	2,9	1,9	2,9	56,2	1659
Hoger secundair	3,3	3,0	2,3	2,1	3,0	60,8	2940
Hoger	3,5	2,7	2,4	1,5	3,4	64,8	3496
Totaal	3,9	2,8	2,4	2,0	3,0	59,1	9732
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	2,8	3,4	2,3	1,7	1,3	60,4	787
20.000-30.000	4,4	2,9	2,7	3,2	3,2	56,1	2022
30.000-40.000	4,2	2,7	2,2	1,4	3,0	55,1	2373
40.000-60.000	4,0	2,7	2,5	1,6	2,9	61,4	3235
>60.000	2,9	2,4	2,9	2,0	3,9	63,3	1275
Totaal	3,9	2,8	2,5	2,0	3,0	59,0	9692
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	2,2	2,3	2,2	1,6	3,2	65,8	5892
Zeer slecht tot redelijk	10,1	4,5	3,9	4,2	3,9	24,6	2014
Totaal	3,9	2,7	2,6	2,1	3,4	56,9	7906
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	3,9	2,9	2,4	2,5	3,3	57,2	3706
Vroeger gerookt	3,3	2,7	2,7	2,7	4,2	49,3	1912
Matige roker (< 20)	3,8	2,6	2,5	1,7	2,9	64,5	1563
Zware roker	4,7	1,8	2,8	1,2	2,6	56,4	835
Totaal	3,8	2,7	2,6	2,2	3,3	56,8	8016
VERBLIJFPLAATS (gewest)							
Vlaams Gewest	2,8	2,6	1,9	1,4	3,1	62,8	3524
Brussels Gewest	6,5	3,0	3,1	3,6	2,6	58,0	3012
Waaals Gewest	5,1	3,0	3,3	2,4	3,0	53,2	3620
België	4,0	2,8	2,5	2,0	3,0	59,2	10156

(* Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

REGIO: 1 Vlaams Gewest

 MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_P_2)
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)							
	Cardiovasculaire geneesmiddelen	Geneesmiddelen tegen pijn	Geneesmiddelen i.v.m. zenuwstelsel	Geneesmiddelen i.v.m. ademhalingsstelsel	Geneesmiddelen tegen maag/darmproblemen	Antibiotica	Geneesmiddelen i.v.m. hormonaal stelsel (*)	
	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT								
Man	10,5	8,8	4,0	8,7	3,1	2,8	1,9	
Vrouw	13,0	9,4	9,3	9,7	4,4	3,5	4,1	
Totaal	11,7	9,1	6,6	9,2	3,7	3,1	3,0	
LEEFTIJDGROEP								
0-14	,2	2,8	,7	13,5	1,4	4,1	,0	
15-24	1,3	7,6	1,3	8,2	2,2	2,4	,4	
25-34	1,0	4,8	2,6	6,0	2,3	4,2	,6	
35-44	7,1	7,2	7,3	7,4	3,2	2,7	,8	
45-54	8,9	13,6	5,9	9,4	4,4	2,4	7,3	
55-64	34,6	15,1	8,6	10,3	6,0	1,6	8,0	
65-74	47,4	19,1	24,7	11,6	9,3	4,0	6,7	
75 +	55,6	19,3	31,8	10,5	10,2	4,5	8,0	
Totaal	11,7	9,1	6,6	9,2	3,7	3,1	3,0	
ONDERWIJSNIVEAU								
Geen diploma	29,0	14,0	12,6	12,2	7,2	1,4	4,8	
Lager	25,1	18,8	13,8	11,0	5,2	2,5	7,8	
Lager secundair	16,5	10,8	10,6	7,6	5,5	3,4	4,4	
Hoger secundair	10,7	8,8	5,5	10,6	3,2	2,3	2,1	
Hoger	5,7	5,8	3,5	7,9	2,5	4,1	1,5	
Totaal	11,8	9,3	6,7	9,2	3,7	3,1	3,0	
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)								
< 20.000	28,4	12,0	15,2	10,6	8,4	2,3	5,7	
20.000-30.000	17,5	9,4	9,5	7,6	5,3	2,2	4,2	
30.000-40.000	13,0	11,7	7,8	10,6	4,0	4,1	4,5	
40.000-60.000	8,4	8,0	4,6	9,9	3,3	3,4	2,0	
>60.000	8,1	7,6	3,6	7,8	2,2	2,7	1,7	
Totaal	11,8	9,2	6,5	9,3	3,8	3,2	3,1	
GEZONDHEIDSBELEVING								
Goed tot zeer goed	8,6	6,9	2,8	6,5	2,0	2,5	2,5	
Zeer slecht tot redelijk	34,3	26,0	25,6	17,8	14,3	5,1	8,2	
Totaal	13,3	10,4	7,0	8,6	4,2	3,0	3,6	
ROOKGEWOONTEN								
Nooit gerookt	12,9	9,2	7,5	7,8	3,1	2,5	3,7	
Vroeger gerookt	18,3	11,0	7,9	11,1	6,7	2,8	4,7	
Matige roker (< 20)	7,4	11,5	4,3	7,4	3,1	4,4	2,1	
Zware roker	15,5	11,2	9,6	8,9	4,7	3,5	2,4	
Totaal	13,3	10,3	7,2	8,6	4,1	3,1	3,5	

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_P_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)						Totaal
	Vitaminen, mineralen en tonica	Geneesmiddelen tegen allergie	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Geneesmiddelen voor oftalmol. gebruik	Andere voorgeschreven geneesmiddelen	Geen voorgeschreven geneesmiddelen	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	1,7	2,2	2,1	1,2	2,2	68,5	1752
Vrouw	4,0	3,0	1,7	1,6	4,1	56,9	1772
Totaal	2,8	2,6	1,9	1,4	3,1	62,8	3524
LEEFTIJDGROEP							
0-14	1,9	2,8	,9	,7	1,5	77,9	547
15-24	2,7	3,5	3,3	,3	1,4	73,7	428
25-34	1,4	2,5	1,5	,6	2,8	77,7	589
35-44	3,2	3,1	3,1	,9	1,9	69,3	532
45-54	2,9	2,3	1,4	1,1	5,3	57,5	467
55-64	3,2	2,1	,5	2,5	7,2	38,2	403
65-74	3,3	1,8	2,7	4,9	3,3	22,7	363
75 +	11,2	,6	1,5	6,7	3,1	18,8	195
Totaal	2,8	2,6	1,9	1,4	3,1	62,8	3524
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	5,6	2,0	5,0	4,3	3,6	55,3	65
Lager	2,6	4,0	1,7	2,0	3,1	44,6	424
Lager secundair	3,0	2,6	2,4	1,4	4,0	58,4	603
Hoger secundair	2,5	2,5	1,9	1,6	2,8	62,6	1174
Hoger	3,0	2,5	1,6	1,0	3,1	70,3	1136
Totaal	2,8	2,7	2,0	1,5	3,1	62,5	3402
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	2,1	2,7	1,4	4,1	,6	56,1	119
20.000-30.000	2,0	2,0	1,7	2,2	3,7	58,2	601
30.000-40.000	2,4	3,3	1,8	1,1	3,7	57,4	860
40.000-60.000	3,8	2,8	1,9	1,1	2,5	65,9	1291
>60.000	1,6	2,1	2,3	1,2	3,5	67,8	459
Totaal	2,8	2,6	1,9	1,4	3,1	62,5	3330
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	1,8	2,5	1,7	1,1	3,1	68,5	2272
Zeer slecht tot redelijk	8,4	3,1	3,6	3,8	5,8	25,0	568
Totaal	3,0	2,6	2,1	1,6	3,6	60,6	2840
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	3,0	2,9	1,9	1,5	3,4	61,0	1373
Vroeger gerookt	3,1	2,7	1,6	2,4	4,4	53,8	699
Matige roker (< 20)	3,3	2,5	2,7	1,2	2,3	68,9	561
Zware roker	1,1	1,0	2,5	,7	3,6	57,2	241
Totaal	2,9	2,6	2,1	1,6	3,4	60,5	2874

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_P_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)							
	Cardiovasculaire geneesmiddelen	Geneesmiddelen tegen pijn	Geneesmiddelen i.v.m. zenuwstelsel	Geneesmiddelen i.v.m. ademhalingsstelsel	Geneesmiddelen tegen maag/darmproblemen	Antibiotica	Geneesmiddelen i.v.m. hormonaal stelsel (*)	
	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT								
Man	12,2	9,6	7,9	8,7	5,7	5,6	2,5	
Vrouw	17,4	14,6	12,6	10,0	8,2	5,6	8,5	
Totaal	14,9	12,2	10,3	9,4	7,0	5,6	5,6	
LEEFTIJDGROEP								
0-14	,0	4,6	1,7	13,8	2,6	7,6	,0	
15-24	2,1	7,2	1,7	6,5	1,7	2,8	,8	
25-34	2,7	8,4	4,1	6,6	3,7	5,1	,4	
35-44	8,0	11,9	8,9	7,8	5,5	5,9	1,3	
45-54	18,3	14,9	16,3	10,4	11,5	5,8	13,9	
55-64	25,0	17,5	15,6	9,8	9,8	5,7	15,2	
65-74	49,4	17,6	10,6	10,6	14,9	6,4	17,1	
75 +	58,3	30,9	34,9	13,4	16,7	6,8	7,6	
Totaal	14,9	12,2	10,3	9,4	7,0	5,6	5,6	
ONDERWIJSNIVEAU								
Geen diploma	15,6	11,2	7,2	15,9	10,9	5,9	7,9	
Lager	19,1	18,0	14,5	8,9	8,7	5,8	4,8	
Lager secundair	19,7	14,0	15,6	9,9	8,0	5,6	8,4	
Hoger secundair	16,1	12,0	10,8	10,7	6,6	7,6	5,2	
Hoger	10,3	8,9	6,4	5,7	5,0	4,3	4,5	
Totaal	14,6	11,7	9,9	8,8	6,7	5,7	5,5	
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)								
< 20.000	7,0	11,2	7,3	9,9	5,8	3,3	2,1	
20.000-30.000	14,3	15,1	10,7	10,1	9,2	7,7	5,1	
30.000-40.000	19,4	13,9	14,0	15,1	9,3	7,1	7,0	
40.000-60.000	14,0	11,0	9,6	7,0	4,0	4,7	6,8	
>60.000	17,9	9,0	9,1	5,1	6,6	4,0	5,8	
Totaal	14,8	12,3	10,3	9,5	7,0	5,6	5,6	
GEZONDHEIDSBELEVING								
Goed tot zeer goed	11,0	7,8	5,1	5,3	4,4	3,7	5,1	
Zeer slecht tot redelijk	35,8	30,2	28,9	17,9	17,2	11,1	10,3	
Totaal	17,3	13,4	11,1	8,4	7,6	5,5	6,4	
ROOKGEWOONTEN								
Nooit gerookt	17,4	13,1	8,7	7,7	8,9	5,2	6,5	
Vroeger gerookt	29,0	16,3	13,9	9,6	7,5	4,0	9,4	
Matige roker (< 20)	11,4	11,3	10,2	9,9	5,7	6,7	3,5	
Zware roker	10,7	11,9	16,3	7,3	6,1	4,8	4,0	
Totaal	17,7	13,2	11,1	8,5	7,6	5,2	6,2	

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen
tegen suikerziekte in rekening gebracht

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_P_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)						Totaal
	Vitaminen, mineralen en tonica	Geneesmiddelen tegen allergie	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Geneesmiddelen voor oftalmol. gebruik	Andere voorgeschreven geneesmiddelen	Geen voorgeschreven geneesmiddelen	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	5,6	3,1	2,3	2,6	2,4	65,1	1458
Vrouw	7,5	2,8	3,8	4,6	2,8	51,4	1554
Totaal	6,5	3,0	3,1	3,6	2,6	58,0	3012
LEEFTIJDGROEP							
0-14	7,9	3,0	4,2	,2	1,1	70,8	474
15-24	2,3	4,7	3,6	,0	1,7	76,9	313
25-34	3,6	1,5	2,4	,5	2,1	75,8	496
35-44	4,8	2,0	2,6	1,1	2,8	64,7	481
45-54	6,3	2,8	2,5	1,3	3,4	48,5	380
55-64	7,4	7,0	3,6	5,8	4,2	37,5	308
65-74	12,8	2,7	2,5	9,8	5,2	22,3	323
75 +	16,4	,8	3,4	26,4	1,7	18,6	237
Totaal	6,5	3,0	3,1	3,6	2,6	58,0	3012
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	1,6	4,7	2,7	3,1	2,7	55,6	167
Lager	9,9	2,3	1,9	3,5	2,5	53,4	365
Lager secundair	8,0	3,4	2,6	2,6	2,3	54,7	425
Hoger secundair	7,8	2,3	3,7	5,7	1,9	54,5	699
Hoger	4,8	2,7	3,4	2,3	3,5	64,4	1190
Totaal	6,4	2,8	3,1	3,4	2,7	58,5	2846
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	3,4	2,7	2,5	,7	1,2	68,0	368
20.000-30.000	9,5	4,1	3,9	5,1	2,4	56,2	618
30.000-40.000	9,4	2,5	2,1	3,7	1,5	51,3	607
40.000-60.000	5,0	3,6	3,4	3,2	3,4	59,9	780
>60.000	4,5	1,5	3,0	5,1	4,2	56,5	489
Totaal	6,7	3,0	3,1	3,7	2,6	57,8	2862
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	3,7	2,1	2,5	3,0	3,3	66,4	1670
Zeer slecht tot redelijk	14,3	6,0	4,5	7,4	2,0	24,8	615
Totaal	6,3	3,1	3,0	4,1	3,0	56,0	2285
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	5,6	2,4	2,0	5,4	3,1	56,8	1009
Vroeger gerookt	8,9	4,9	4,4	5,1	2,4	46,0	556
Matige roker (< 20)	4,7	3,4	2,2	2,3	3,7	61,1	452
Zware roker	8,7	2,2	5,0	2,3	2,9	61,4	278
Totaal	6,5	3,1	2,9	4,3	3,1	56,0	2295

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen
tegen suikerziekte in rekening gebracht

REGIO: 3 Waals Gewest

 MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_P_2)
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)							
	Cardiovasculaire geneesmiddelen	Geneesmiddelen tegen pijn	Geneesmiddelen i.v.m. zenuwstelsel	Geneesmiddelen i.v.m. ademhalingsstelsel	Geneesmiddelen tegen maag/darmproblemen	Antibiotica	Geneesmiddelen i.v.m. hormonaal stelsel (*)	
	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT								
Man	12,9	10,4	8,8	10,3	6,1	7,4	2,4	
Vrouw	19,5	15,5	13,8	10,1	8,9	5,8	8,6	
Totaal	16,2	13,0	11,3	10,2	7,5	6,6	5,5	
LEEFTIJDGROEP								
0-14	,1	5,1	,4	16,2	2,1	7,7	,0	
15-24	,9	6,6	1,1	7,4	2,6	6,1	,0	
25-34	3,0	7,4	4,7	7,6	4,3	6,8	1,0	
35-44	9,3	11,7	10,6	8,8	6,4	6,4	2,2	
45-54	20,5	14,3	15,4	8,5	8,9	6,8	9,5	
55-64	39,4	22,5	24,1	8,5	16,8	6,1	23,4	
65-74	57,6	29,6	29,0	13,2	20,0	2,9	14,6	
75 +	72,9	39,5	44,5	13,0	16,1	11,7	10,1	
Totaal	16,2	13,0	11,3	10,2	7,5	6,6	5,5	
ONDERWIJSNIVEAU								
Geen diploma	24,2	26,9	19,2	16,9	26,8	11,9	6,8	
Lager	34,9	21,4	23,4	11,9	12,5	3,9	10,9	
Lager secundair	19,8	17,1	10,3	10,3	7,3	5,8	5,3	
Hoger secundair	10,6	9,3	8,2	9,6	6,5	5,7	3,2	
Hoger	13,2	10,1	8,4	9,6	5,5	8,0	5,9	
Totaal	16,4	12,9	11,4	10,2	7,6	6,6	5,6	
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)								
< 20.000	13,9	15,8	10,8	6,5	5,5	4,6	3,3	
20.000-30.000	13,9	13,7	12,0	12,2	7,8	7,5	5,4	
30.000-40.000	17,7	13,5	12,3	8,8	8,8	6,3	5,1	
40.000-60.000	17,1	12,9	10,5	11,1	7,2	7,3	6,2	
>60.000	13,1	8,4	10,4	7,5	6,7	5,4	7,1	
Totaal	15,9	13,1	11,3	10,1	7,6	6,7	5,6	
GEZONDHEIDSBELEVING								
Goed tot zeer goed	11,4	9,9	6,6	6,2	5,7	5,5	4,7	
Zeer slecht tot redelijk	40,5	28,1	29,7	16,1	16,4	7,6	11,2	
Totaal	19,3	14,8	12,8	8,9	8,6	6,0	6,5	
ROOKGEWOONTEN								
Nooit gerookt	20,7	15,4	13,0	8,2	8,1	5,2	7,1	
Vroeger gerookt	23,7	17,2	14,9	10,4	10,1	7,5	8,6	
Matige roker (< 20)	12,7	10,2	10,5	8,0	7,1	7,7	3,4	
Zware roker	12,9	16,8	16,4	9,7	9,3	5,3	5,6	
Totaal	18,8	14,9	13,3	8,8	8,5	6,2	6,5	

(*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen tegen suikerziekte in rekening gebracht

REGIO: 3 Waals Gewest

 MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_P_2)
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)						Totaal
	Vitaminen, mineralen en tonica	Geneesmiddelen tegen allergie	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Geneesmiddelen voor oftalmol. gebruik	Andere voorgeschreven geneesmiddelen	Geen voorgeschreven geneesmiddelen	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	3,1	2,6	3,2	1,8	2,0	58,7	1746
Vrouw	7,2	3,3	3,3	3,0	3,9	47,7	1874
Totaal	5,1	3,0	3,3	2,4	3,0	53,2	3620
LEEFTIJDGROEP							
0-14	4,0	4,0	3,2	,1	2,4	70,5	625
15-24	3,7	4,1	6,1	1,4	3,9	71,5	401
25-34	1,9	2,1	1,3	,5	2,8	69,9	552
35-44	4,9	2,9	2,4	2,0	3,6	57,4	589
45-54	5,9	1,8	1,8	2,0	2,9	42,2	442
55-64	6,9	2,2	6,4	7,1	2,8	28,9	374
65-74	10,0	3,5	4,1	6,0	2,9	12,1	389
75 +	12,1	3,2	2,9	8,7	,9	4,7	248
Totaal	5,1	3,0	3,3	2,4	3,0	53,2	3620
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	12,0	1,1	3,6	10,6	1,2	31,8	120
Lager	9,4	1,5	2,2	1,9	,8	37,6	496
Lager secundair	6,2	2,0	3,6	2,6	1,3	52,9	631
Hoger secundair	3,7	4,1	2,7	2,0	3,8	58,7	1067
Hoger	4,0	3,0	3,2	2,1	3,8	55,8	1170
Totaal	5,2	2,9	3,0	2,4	2,9	53,3	3484
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	2,8	4,3	2,7	,7	1,7	59,2	300
20.000-30.000	6,2	3,8	3,7	4,0	2,8	53,2	803
30.000-40.000	5,6	1,9	2,8	1,4	2,2	52,5	906
40.000-60.000	4,1	2,4	3,4	2,3	3,5	52,9	1164
>60.000	5,6	4,0	4,4	2,4	5,2	54,0	327
Totaal	5,0	2,9	3,4	2,4	3,0	53,5	3500
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	2,7	1,9	3,0	2,1	3,5	60,0	1950
Zeer slecht tot redelijk	11,1	5,7	4,1	3,7	2,2	24,0	831
Totaal	4,9	2,9	3,3	2,6	3,1	50,3	2781
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	5,1	3,1	3,5	3,4	3,1	50,1	1324
Vroeger gerookt	2,2	2,1	4,5	2,6	4,4	41,5	657
Matige roker (< 20)	4,3	2,4	2,3	2,5	3,6	57,9	550
Zware roker	8,5	2,8	2,5	1,6	1,0	53,7	316
Totaal	4,7	2,7	3,3	2,8	3,2	50,2	2847

 (*) Enkel hormonen tijdens de menopauze en geneesmiddelen
 tegen suikerziekte in rekening gebracht

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_N_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

GEBRUIK VAN NIET VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)						
	Geneesmiddelen tegen pijn	Geneesmiddelen i.v.m. ademhalingsstelsel	Vitamines, mineralen en tonica	Geneesmiddelen tegen maag/darmproblemen	Geneesmiddelen i.v.m. zenuwstelsel	Cardiovasculaire geneesmiddelen
	%	%	%	%	%	%
GESLACHT						
Man	13,9	10,2	3,8	2,2	1,0	,9
Vrouw	20,9	12,7	6,0	3,3	1,4	1,0
Totaal	17,4	11,5	4,9	2,7	1,2	1,0
LEEFTIJDGROEP						
0-14	9,5	12,7	6,6	1,0	,2	,1
15-24	18,4	12,2	4,6	2,3	,7	,4
25-34	21,0	13,8	5,1	2,9	,9	,7
35-44	21,1	10,7	5,5	2,8	1,0	,6
45-54	22,1	10,2	3,0	3,3	2,2	1,1
55-64	15,3	10,4	5,9	4,1	2,5	2,2
65-74	12,2	10,5	3,9	3,9	1,1	2,6
75 +	11,7	5,5	2,6	2,5	2,2	3,0
Totaal	17,4	11,5	4,9	2,7	1,2	1,0
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	21,4	8,7	3,3	4,4	2,1	1,5
Lager	15,2	9,5	2,3	2,0	2,0	,8
Lager secundair	17,6	11,5	4,7	2,9	1,3	1,7
Hoger secundair	16,2	11,9	3,4	2,2	,6	,6
Hoger	18,5	11,7	7,4	3,1	1,4	,9
Totaal	17,3	11,4	4,9	2,7	1,2	,9
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	15,5	8,1	3,1	1,6	1,4	,6
20.000-30.000	16,4	10,7	4,1	2,4	1,4	1,4
30.000-40.000	17,9	12,0	4,3	3,0	1,6	1,0
40.000-60.000	16,6	11,4	4,7	2,9	,5	,7
>60.000	21,4	12,7	8,1	2,8	1,2	1,0
Totaal	17,4	11,4	4,8	2,7	1,1	1,0
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	17,4	11,6	4,4	2,7	,8	,8
Zeer slecht tot redelijk	24,8	10,7	5,7	4,5	3,4	2,7
Totaal	19,0	11,4	4,7	3,1	1,4	1,2
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	17,7	10,8	4,0	3,1	1,1	1,0
Vroeger gerookt	17,2	11,7	5,3	3,3	1,4	1,8
Matige roker (< 20)	20,9	11,8	5,3	2,7	1,7	1,0
Zware roker	24,4	12,2	5,0	3,5	1,8	,9
Totaal	19,0	11,4	4,7	3,1	1,3	1,2
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	16,4	12,1	4,2	2,3	1,1	,7
Brussels Gewest	20,9	12,5	9,7	3,9	1,5	1,1
Waals Gewest	18,1	9,9	4,7	3,1	1,2	1,5
België	17,4	11,5	4,9	2,7	1,2	1,0

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_N_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN NIET VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)					Totaal
	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Geneesmiddelen tegen allergie	Geneesmiddelen voor ftalmol. gebruik	Andere niet voorgescreven geneesmiddelen	Geen niet voorgeschreven geneesmiddelen	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	1,0	,4	,4	1,0	71,4	4962
Vrouw	1,0	,9	,5	1,8	61,9	5207
Totaal	1,0	,6	,4	1,4	66,6	10169
LEEFTIJDSGROEP						
0-14	,8	,3	,3	1,6	72,0	1647
15-24	1,2	1,2	,2	1,3	65,4	1145
25-34	1,6	,8	,2	,6	63,5	1639
35-44	,7	,9	,8	1,4	63,9	1610
45-54	1,2	,6	,5	1,6	63,8	1286
55-64	1,0	,2	,2	2,1	67,4	1089
65-74	,6	,4	,6	2,1	70,7	1075
75 +	,3	,0	1,0	1,0	76,2	678
Totaal	1,0	,6	,4	1,4	66,6	10169
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	,2	,1	,5	,6	66,7	353
Lager	,4	,3	,2	,8	74,9	1287
Lager secundair	,6	,4	,5	1,4	67,4	1660
Hoger secundair	1,0	,7	,3	1,2	68,3	2944
Hoger	1,5	,9	,5	1,9	62,4	3501
Totaal	1,0	,6	,4	1,4	66,7	9745
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	1,1	,4	,9	1,3	73,2	787
20.000-30.000	,9	,3	,2	1,0	70,0	2025
30.000-40.000	,7	,9	,5	1,5	65,3	2371
40.000-60.000	1,1	,7	,4	1,7	67,2	3240
>60.000	1,7	,8	,7	1,5	59,0	1284
Totaal	1,1	,7	,4	1,4	66,6	9707
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,2	,7	,5	1,1	66,7	5901
Zeer slecht tot redelijk	1,0	,6	,6	2,3	59,8	2017
Totaal	1,1	,7	,5	1,4	65,2	7918
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	,9	,8	,4	1,7	66,7	3709
Vroeger gerookt	1,3	,4	,6	1,6	64,4	1917
Matige roker (< 20)	1,6	1,0	,4	,7	65,2	1569
Zware roker	,5	,4	,6	1,0	61,7	832
Totaal	1,1	,7	,5	1,4	65,4	8027
VERBLIJFFLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	,9	,6	,3	1,5	67,2	3521
Brussels Gewest	1,0	1,0	,9	1,3	60,2	3035
Waals Gewest	1,2	,7	,5	1,3	67,7	3613
België	1,0	,6	,4	1,4	66,6	10169

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_N_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN NIET VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)					
	Geneesmiddelen tegen pijn	Geneesmiddelen i.v.m. ademhalingsstelsel	Vitaminen, mineralen en tonica	Geneesmiddelen tegen maag/darmproblemen	Geneesmiddelen i.v.m. zenuwstelsel	Cardiovasculaire geneesmiddelen
	%	%	%	%	%	%
GESLACHT						
Man	12,3	10,0	3,2	2,0	,8	,6
Vrouw	20,5	14,2	5,2	2,6	1,4	,7
Totaal	16,4	12,1	4,2	2,3	1,1	,7
LEEFTIJDGROEP						
0-14	10,8	15,8	5,5	1,2	,2	,2
15-24	18,1	12,5	3,4	2,0	,9	,2
25-34	19,3	14,6	4,9	2,1	,7	,9
35-44	21,0	11,3	4,7	2,6	,5	,1
45-54	18,9	9,7	1,8	2,5	2,4	,6
55-64	11,4	10,8	5,6	2,6	2,1	1,3
65-74	10,1	9,1	3,9	4,1	1,2	1,6
75 +	12,0	6,5	1,3	1,9	2,7	3,1
Totaal	16,4	12,1	4,2	2,3	1,1	,7
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	25,3	9,1	2,5	8,5	5,0	1,4
Lager	14,9	10,4	2,3	1,5	2,3	,3
Lager secundair	15,7	11,5	4,8	3,0	,9	,9
Hoger secundair	15,6	13,5	2,3	1,6	,4	,4
Hoger	17,1	11,8	6,3	2,4	1,5	,7
Totaal	16,2	12,1	4,1	2,2	1,2	,6
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	10,7	6,8	,1	,8	2,5	,5
20.000-30.000	15,4	11,1	3,8	2,0	1,5	1,6
30.000-40.000	16,6	12,9	3,4	2,8	1,7	,5
40.000-60.000	15,5	11,8	3,5	1,9	,1	,5
>60.000	20,3	12,9	7,2	2,7	,9	,4
Totaal	16,3	11,9	4,0	2,2	,9	,7
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	15,6	11,9	3,6	2,2	,6	,5
Zeer slecht tot redelijk	25,4	10,5	6,0	4,1	4,2	2,2
Totaal	17,4	11,6	4,0	2,5	1,3	,8
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	16,5	11,4	3,2	2,7	1,0	,9
Vroeger gerookt	14,2	12,5	5,1	2,9	1,3	1,0
Matige roker (< 20)	21,9	11,2	4,5	1,9	2,0	,7
Zware roker	21,1	11,3	4,8	2,4	1,1	,3
Totaal	17,4	11,6	4,0	2,6	1,2	,8

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_N_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN NIET VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)					Totaal
	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Geneesmiddelen tegen allergie	Geneesmiddelen voor farmol. gebruik	Andere niet voorgescreven geneesmiddelen	Geen niet voorgeschreven geneesmiddelen	N (*)
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	,9	,4	,2	1,0	73,5	1749
Vrouw	1,0	,7	,4	2,0	60,9	1772
Totaal	,9	,6	,3	1,5	67,2	3521
LEEFTIJDGROEP						
0-14	1,1	,5	,5	1,6	68,4	546
15-24	1,4	1,0	,0	1,0	66,3	428
25-34	1,5	,6	,1	,5	64,7	590
35-44	,4	,8	,8	1,4	64,4	533
45-54	,9	,5	,1	2,2	66,6	464
55-64	,2	,0	,0	2,7	70,2	406
65-74	,7	,3	,5	2,5	73,1	362
75 +	,5	,0	,5	,4	75,5	192
Totaal	,9	,6	,3	1,5	67,2	3521
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	,5	,0	,9	,0	59,4	65
Lager	,4	,0	,0	,7	74,9	422
Lager secundair	,3	,2	,3	1,4	68,1	606
Hoger secundair	,9	,7	,1	1,1	68,5	1171
Hoger	1,3	,8	,5	2,5	63,8	1135
Totaal	,9	,6	,3	1,6	67,3	3399
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	,3	,6	1,4	2,4	77,8	117
20.000-30.000	,9	,0	,0	,8	69,7	601
30.000-40.000	,7	1,1	,0	1,3	65,7	859
40.000-60.000	,9	,5	,4	1,9	68,8	1291
>60.000	1,6	,8	,7	1,7	61,4	461
Totaal	1,0	,6	,3	1,6	67,4	3329
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,1	,6	,3	1,1	68,8	2275
Zeer slecht tot redelijk	,3	,1	,3	3,5	57,3	565
Totaal	,9	,5	,3	1,6	66,7	2840
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	,8	,8	,2	1,9	67,6	1373
Vroeger gerookt	,6	,2	,6	1,7	66,6	701
Matige roker (< 20)	1,7	,8	,1	,6	66,0	559
Zware roker	,5	,0	,4	1,2	64,8	239
Totaal	,9	,6	,3	1,5	66,8	2872

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_N_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN NIET VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)					
	Geneesmiddelen tegen pijn	Geneesmiddelen i.v.m. ademhalingsstelsel	Vitaminen, mineralen en tonica	Geneesmiddelen tegen maag/darmproblemen	Geneesmiddelen i.v.m. zenuwstelsel	Cardiovasculaire geneesmiddelen
	%	%	%	%	%	%
GESLACHT						
Man	17,8	12,6	9,7	4,0	1,2	,9
Vrouw	23,8	12,5	9,7	3,9	1,8	1,3
Totaal	20,9	12,5	9,7	3,9	1,5	1,1
LEEFTIJDGROEP						
0-14	8,3	10,6	12,0	,9	,5	,2
15-24	27,0	14,3	11,1	5,6	1,3	,0
25-34	24,3	14,4	10,1	3,9	1,9	,8
35-44	24,0	15,0	9,2	3,1	1,1	,7
45-54	26,5	16,9	5,9	3,8	2,0	2,0
55-64	25,6	10,6	12,5	3,4	1,9	,8
65-74	12,3	6,2	6,4	8,1	1,3	3,0
75 +	12,6	4,6	9,5	4,7	2,1	3,3
Totaal	20,9	12,5	9,7	3,9	1,5	1,1
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	11,2	8,3	4,8	2,1	1,2	,0
Lager	18,3	11,8	5,2	3,0	1,4	1,0
Lager secundair	20,3	9,5	7,8	2,3	1,4	1,2
Hoger secundair	18,0	13,5	11,7	4,9	1,5	1,2
Hoger	25,0	13,8	11,8	4,4	1,3	1,2
Totaal	20,6	12,5	9,9	3,9	1,4	1,1
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	16,7	11,2	7,2	1,4	1,9	,9
20.000-30.000	21,3	11,9	6,8	2,7	,8	,5
30.000-40.000	19,2	12,9	14,3	4,5	2,5	1,5
40.000-60.000	21,1	13,7	10,5	6,2	1,3	,7
>60.000	24,5	13,7	9,7	4,1	1,4	2,1
Totaal	20,7	12,8	9,7	4,0	1,5	1,1
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	23,0	13,2	9,6	4,2	1,1	,9
Zeer slecht tot redelijk	25,8	15,3	9,0	5,7	2,8	2,6
Totaal	23,7	13,7	9,5	4,6	1,5	1,3
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	21,2	11,6	9,7	4,7	1,7	,9
Vroeger gerookt	23,2	12,7	9,7	4,4	1,1	1,6
Matige roker (< 20)	24,5	16,7	11,4	4,8	1,8	1,1
Zware roker	31,5	16,3	6,6	4,5	1,4	2,6
Totaal	23,6	13,5	9,7	4,6	1,6	1,3

REGIO: 2 Brussels Gewest

 MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_N_2)
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN NIET VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)					Totaal
	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Geneesmiddelen tegen allergie	Geneesmiddelen voor farmol. gebruik	Andere niet voorgescreven geneesmiddelen	Geen niet voorgeschreven geneesmiddelen	N (*)
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	,8	,6	1,0	,9	61,6	1468
Vrouw	1,1	1,3	,9	1,7	58,9	1567
Totaal	1,0	1,0	,9	1,3	60,2	3035
LEEFTIJDGROEP						
0-14	,8	,2	,0	1,0	71,0	478
15-24	1,0	1,4	,6	,7	52,5	314
25-34	1,9	1,0	,6	,4	59,2	498
35-44	1,6	1,1	1,1	2,4	56,3	488
45-54	,6	,8	,6	2,0	55,5	384
55-64	,3	2,2	,8	2,3	53,0	311
65-74	,0	,8	2,1	,6	69,7	324
75 +	,0	,0	3,6	1,0	71,6	238
Totaal	1,0	1,0	,9	1,3	60,2	3035
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	,0	,0	,5	1,6	77,4	168
Lager	,8	1,5	1,6	1,7	67,3	368
Lager secundair	,4	,3	,7	1,0	64,9	425
Hoger secundair	1,3	1,2	,5	1,0	58,5	709
Hoger	1,2	1,1	1,1	1,4	53,7	1199
Totaal	1,0	1,0	,9	1,3	60,0	2869
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	,8	,6	,5	,9	68,9	369
20.000-30.000	,8	1,1	,6	1,0	63,3	625
30.000-40.000	1,2	1,3	2,1	1,5	58,1	609
40.000-60.000	1,1	1,3	,9	1,1	56,4	786
>60.000	1,1	,5	,8	1,8	54,9	496
Totaal	1,0	1,0	1,0	1,3	60,0	2885
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,0	1,1	,9	1,1	57,5	1679
Zeer slecht tot redelijk	1,7	1,6	1,9	1,7	56,6	622
Totaal	1,1	1,2	1,2	1,3	57,3	2301
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	,6	,9	1,1	1,0	59,7	1013
Vroeger gerookt	,7	1,2	1,4	1,1	56,9	559
Matige roker (< 20)	2,4	1,9	,7	2,2	53,9	461
Zware roker	,9	1,5	,9	1,2	52,5	279
Totaal	1,1	1,2	1,0	1,3	57,0	2312

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_N_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN NIET VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)					
	Geneesmiddelen tegen pijn	Geneesmiddelen i.v.m. ademhalingsstelsel	Vitaminen, mineralen en tonica	Geneesmiddelen tegen maag/darmproblemen	Geneesmiddelen i.v.m. zenuwstelsel	Cardiovasculaire geneesmiddelen
	%	%	%	%	%	%
GESLACHT						
Man	15,6	9,8	3,1	1,9	1,2	1,5
Vrouw	20,6	10,0	6,3	4,2	1,2	1,5
Totaal	18,1	9,9	4,7	3,1	1,2	1,5
LEEFTIJDGROEP						
0-14	7,7	8,5	6,8	,7	,0	,0
15-24	16,0	11,1	4,5	1,8	,3	,8
25-34	23,3	12,1	3,6	4,0	,8	,2
35-44	20,5	8,4	5,9	2,9	2,0	1,5
45-54	26,7	9,2	4,4	4,6	1,8	1,8
55-64	19,9	9,6	4,0	7,4	3,6	4,7
65-74	15,2	14,2	3,1	2,2	,8	4,1
75 +	10,7	4,6	,9	2,2	1,6	2,6
Totaal	18,1	9,9	4,7	3,1	1,2	1,5
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	24,7	8,5	2,9	2,2	,0	2,6
Lager	14,6	7,1	1,2	2,4	1,9	1,4
Lager secundair	20,2	11,9	3,7	2,8	2,1	3,1
Hoger secundair	16,8	8,3	3,6	2,8	,6	,6
Hoger	18,5	10,9	7,6	3,8	1,3	1,1
Totaal	18,1	9,8	4,8	3,1	1,2	1,4
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	17,9	7,3	2,9	2,2	,4	,5
20.000-30.000	16,2	9,5	3,6	2,7	1,6	1,4
30.000-40.000	19,6	10,4	3,1	2,8	1,0	1,8
40.000-60.000	17,6	10,3	5,8	4,1	1,1	1,1
>60.000	22,9	11,4	9,6	2,5	1,9	2,3
Totaal	18,3	10,0	4,7	3,2	1,2	1,4
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	19,4	10,5	4,3	3,2	1,2	1,3
Zeer slecht tot redelijk	23,9	9,7	4,4	4,8	2,5	3,3
Totaal	20,6	10,3	4,3	3,7	1,6	1,9
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	19,1	9,3	3,8	3,4	1,1	1,3
Vroeger gerookt	21,5	10,0	4,3	3,7	1,8	3,4
Matige roker (< 20)	17,9	11,3	4,5	3,3	1,1	1,6
Zware roker	26,8	12,3	4,9	4,7	2,8	1,2
Totaal	20,3	10,2	4,2	3,6	1,4	1,8

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_N_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN NIET VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN (PER CATEGORIE)					Totaal
	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Geneesmiddelen tegen allergie	Geneesmiddelen voor dermatol. gebruik	Andere niet voorgeschreven geneesmiddelen	Geen niet voorgeschreven geneesmiddelen	N (*)
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	1,3	,3	,4	1,1	70,6	1745
Vrouw	1,1	1,0	,5	1,5	64,7	1868
Totaal	1,2	,7	,5	1,3	67,7	3613
LEEFTIJDGROEP						
0-14	,3	,1	,0	1,9	77,9	623
15-24	1,0	1,6	,5	2,1	68,0	403
25-34	1,6	1,1	,3	,9	62,8	551
35-44	1,0	,9	,5	1,0	65,3	589
45-54	1,9	,6	1,3	,2	60,9	438
55-64	2,9	,0	,5	,8	66,5	372
65-74	,8	,3	,2	1,9	67,5	389
75 +	,1	,0	,3	2,0	79,5	248
Totaal	1,2	,7	,5	1,3	67,7	3613
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	,0	,4	,1	,5	66,0	120
Lager	,4	,2	,1	,5	77,6	497
Lager secundair	1,1	,8	,8	1,5	66,9	629
Hoger secundair	1,2	,4	,5	1,2	70,5	1064
Hoger	1,7	1,0	,2	1,2	63,2	1167
Totaal	1,2	,7	,4	1,2	67,8	3477
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	1,9	,1	,8	,9	72,6	301
20.000-30.000	1,0	,4	,3	1,2	72,8	799
30.000-40.000	,5	,6	,8	1,6	66,6	903
40.000-60.000	1,5	1,0	,3	1,3	66,5	1163
>60.000	2,5	1,2	,4	,8	54,6	327
Totaal	1,2	,7	,5	1,3	67,4	3493
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,4	,8	,6	1,1	65,3	1947
Zeer slecht tot redelijk	1,8	1,0	,5	,8	63,9	830
Totaal	1,5	,8	,6	1,1	64,9	2777
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	1,2	,8	,5	1,6	67,4	1323
Vroeger gerookt	2,7	,8	,5	1,4	62,4	657
Matige roker (< 20)	1,2	1,0	,8	,4	67,4	549
Zware roker	,4	,6	,9	,6	60,3	314
Totaal	1,4	,8	,6	1,2	65,4	2843

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_PSY)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN PSYCHOTROPE GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN				Totaal
	1	2	3	4	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	2,8	2,6	2,1	94,5	4956
Vrouw	5,7	4,3	4,5	89,5	5200
Totaal	4,3	3,4	3,3	92,0	10156
LEEFTIJDSGROEP					
0-14	,1	,3	,3	99,6	1646
15-24	,4	,6	1,0	98,8	1142
25-34	,9	1,4	1,9	97,1	1637
35-44	2,8	4,0	4,7	92,2	1602
45-54	4,3	4,4	5,4	90,4	1289
55-64	8,7	6,4	4,0	86,3	1085
65-74	14,8	9,6	7,5	75,6	1075
75 +	24,8	10,8	5,5	66,2	680
Totaal	4,3	3,4	3,3	92,0	10156
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	10,1	8,1	2,4	86,3	352
Lager	8,6	8,5	6,0	84,1	1285
Lager secundair	6,8	4,8	4,9	88,2	1659
Hoger secundair	2,4	2,9	3,0	93,9	2940
Hoger	3,0	1,5	1,9	94,9	3496
Totaal	4,2	3,5	3,2	92,0	9732
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	5,1	5,2	2,6	89,6	787
20.000-30.000	5,8	4,5	5,4	89,6	2022
30.000-40.000	5,0	3,8	3,6	90,9	2373
40.000-60.000	3,1	3,1	2,7	93,6	3235
>60.000	3,1	2,1	1,5	94,5	1275
Totaal	4,2	3,5	3,3	92,0	9692
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	2,1	1,5	1,4	95,9	5892
Zeer slecht tot redelijk	14,9	11,9	11,9	73,2	2014
Totaal	4,9	3,8	3,7	91,0	7906
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	4,6	3,6	3,4	91,1	3706
Vroeger gerookt	6,9	3,3	3,7	89,6	1912
Matige roker (< 20)	3,1	3,9	2,9	93,1	1563
Zware roker	5,4	6,7	7,7	88,4	835
Totaal	4,9	3,9	3,9	90,8	8016
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	2,9	2,2	2,4	94,1	3524
Brussels Gewest	6,1	4,7	4,4	90,1	3012
Waals Gewest	6,1	5,2	4,5	89,1	3620
België	4,3	3,4	3,3	92,0	10156

- (1) Slaapmiddelen
(2) Kalmeermiddelen
(3) Antidepressiva
(4) Geen gebruik van psychotrope middelen

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_PSY)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN PSYCHOTROPE GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN				Totaal
	1	2	3	4	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	1,5	1,3	1,5	96,5	1752
Vrouw	4,3	3,2	3,3	91,5	1772
Totaal	2,9	2,2	2,4	94,1	3524
LEEFTIJDGROEP					
0-14	,1	,4	,3	99,6	547
15-24	,6	,6	1,2	98,7	428
25-34	,8	1,0	1,5	97,7	589
35-44	2,1	2,2	3,7	93,7	532
45-54	2,1	1,9	3,0	94,5	467
55-64	4,9	2,8	2,7	91,5	403
65-74	11,6	9,3	6,2	77,9	363
75 +	20,4	8,4	2,6	72,5	195
Totaal	2,9	2,2	2,4	94,1	3524
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	9,5	5,0	1,4	87,4	65
Lager	6,3	5,5	3,8	88,2	424
Lager secundair	5,4	3,7	4,1	89,6	603
Hoger secundair	1,4	2,3	2,6	95,1	1174
Hoger	1,8	,5	,8	97,1	1136
Totaal	2,9	2,3	2,3	94,0	3402
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	8,0	6,6	,7	85,6	119
20.000-30.000	4,8	3,0	5,2	90,6	601
30.000-40.000	3,8	2,1	2,7	93,2	860
40.000-60.000	1,1	2,3	1,7	96,0	1291
>60.000	2,1	,8	,5	96,9	459
Totaal	2,8	2,3	2,4	94,1	3330
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	1,1	1,2	1,1	97,2	2272
Zeer slecht tot redelijk	13,8	7,5	10,5	75,3	568
Totaal	3,4	2,4	2,8	93,2	2840
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	3,5	2,4	3,0	92,9	1373
Vroeger gerookt	5,2	1,8	2,3	92,2	699
Matige roker (< 20)	1,4	2,3	1,6	95,7	561
Zware roker	2,7	3,6	5,0	92,4	241
Totaal	3,4	2,4	2,8	93,3	2874

- (1) Slaapmiddelen
(2) Kalmeermiddelen
(3) Antidepressiva
(4) Geen gebruik van psychotrope middelen

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_PSY)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN PSYCHOTROPE GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN				Totaal
	1	2	3	4	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	3,9	3,8	2,6	92,8	1458
Vrouw	8,1	5,4	6,0	87,6	1554
Totaal	6,1	4,7	4,4	90,1	3012
LEEFTIJDGROEP					
0-14	,2	,3	,0	99,6	474
15-24	,6	,9	,8	98,6	313
25-34	1,9	2,3	3,0	95,9	496
35-44	3,6	4,6	5,4	91,3	481
45-54	8,0	9,1	8,5	83,7	380
55-64	9,4	7,0	4,5	84,8	308
65-74	15,1	8,6	5,2	79,4	323
75 +	27,8	11,8	13,3	66,4	237
Totaal	6,1	4,7	4,4	90,1	3012
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	4,0	2,3	2,7	92,8	167
Lager	8,1	7,2	6,0	85,8	365
Lager secundair	10,2	9,0	8,9	84,9	425
Hoger secundair	5,9	4,9	4,2	90,3	699
Hoger	3,7	2,2	2,5	93,7	1190
Totaal	5,8	4,5	4,3	90,5	2846
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	3,8	3,6	3,5	92,8	368
20.000-30.000	6,9	4,9	4,2	89,4	618
30.000-40.000	7,7	6,1	5,3	87,6	607
40.000-60.000	5,8	5,5	4,4	90,6	780
>60.000	4,7	3,1	4,5	91,1	489
Totaal	6,0	4,8	4,4	90,1	2862
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	3,1	1,8	2,2	94,9	1670
Zeer slecht tot redelijk	17,3	14,7	13,1	71,7	615
Totaal	6,7	5,1	5,0	89,1	2285
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	6,2	2,6	3,0	91,4	1009
Vroeger gerookt	9,1	6,5	5,4	86,3	556
Matige roker (< 20)	4,0	5,7	4,9	89,9	452
Zware roker	8,6	9,8	10,3	84,1	278
Totaal	6,6	5,0	4,8	89,1	2295

- (1) Slaapmiddelen
(2) Kalmeermiddelen
(3) Antidepressiva
(4) Geen gebruik van psychotrope middelen

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR_PSY)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN PSYCHOTROPE GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN				Totaal
	1	2	3	4	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	4,8	4,4	3,0	91,4	1746
Vrouw	7,4	5,9	6,0	86,7	1874
Totaal	6,1	5,2	4,5	89,1	3620
LEEFTIJDGROEP					
0-14	,0	,0	,3	99,7	625
15-24	,2	,5	,6	99,0	401
25-34	,9	1,7	2,3	96,2	552
35-44	3,7	6,8	6,2	89,9	589
45-54	7,3	7,6	9,0	84,6	442
55-64	16,5	13,5	6,8	75,9	374
65-74	19,7	10,4	10,2	70,7	389
75 +	29,8	14,0	5,8	56,8	248
Totaal	6,1	5,2	4,5	89,1	3620
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	14,7	15,0	3,1	80,8	120
Lager	12,5	14,0	9,6	76,7	496
Lager secundair	8,2	5,7	5,2	86,8	631
Hoger secundair	3,5	3,4	3,5	92,3	1067
Hoger	4,6	3,0	3,5	91,8	1170
Totaal	6,1	5,3	4,5	89,0	3484
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	3,9	5,1	3,3	90,5	300
20.000-30.000	6,8	6,4	6,1	88,2	803
30.000-40.000	6,1	5,8	4,6	88,2	906
40.000-60.000	6,5	4,1	4,3	89,6	1164
>60.000	5,0	5,3	2,8	89,7	327
Totaal	6,1	5,2	4,6	89,0	3500
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	3,7	2,0	2,0	93,6	1950
Zeer slecht tot redelijk	15,5	16,4	13,3	70,9	831
Totaal	6,9	5,9	5,1	87,5	2781
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	6,2	6,1	4,3	87,5	1324
Vroeger gerookt	9,5	5,1	6,0	85,3	657
Matige roker (< 20)	5,9	6,2	4,6	89,5	550
Zware roker	8,1	10,1	10,9	84,0	316
Totaal	7,1	6,4	5,6	87,0	2847

- (1) Slaapmiddelen
(2) Kalmeermiddelen
(3) Antidepressiva
(4) Geen gebruik van psychotrope middelen

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR08)
Gezondheidsenquête, België, 1997

AANTAL VERSCHILLENDE SOORTEN GENEESMIDDELEN INGENOMEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN PER PERSOON					
	Gemiddelde	P 25	Mediaan	P 75	N
GESLACHT					
Man	1,9	1	1	2	2748
Vrouw	2,1	1	2	2	3546
Totaal	2,0	1	1	2	6294
LEEFTIJDGROEP					
0-14	1,5	1	1	2	706
15-24	1,6	1	1	2	587
25-34	1,6	1	1	2	870
35-44	1,9	1	1	2	919
45-54	2,0	1	2	2	850
55-64	2,3	1	2	3	831
65-74	2,6	1	2	3	914
75 +	2,9	2	2	3	617
Totaal	2,0	1	1	2	6294
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	2,6	1	2	3	239
Lager	2,4	1	2	3	907
Lager secundair	2,2	1	2	2	1083
Hoger secundair	1,8	1	1	2	1716
Hoger	1,8	1	1	2	2077
Totaal	2,0	1	1	2	6022
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	2,2	1	2	3	433
20.000-30.000	2,1	1	2	2	1269
30.000-40.000	2,0	1	2	2	1532
40.000-60.000	1,9	1	1	2	1960
>60.000	1,8	1	1	2	814
Totaal	2,0	1	1	2	6008
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	1,7	1	1	2	3424
Zeer slecht tot redelijk	2,9	1	2	3	1770
Totaal	2,0	1	2	2	5194
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	2,0	1	1	2	2405
Vroeger gerookt	2,1	1	2	2	1370
Matige roker (< 20)	2,0	1	2	2	951
Zware roker	2,2	1	2	3	529
Totaal	2,0	1	2	2	5255
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	1,8	1	1	2	2039
Brussels Gewest	2,3	1	2	3	1973
Waals Gewest	2,2	1	2	3	2282
België	2,0	1	1	2	6294

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR08)

Gezondheidsenquête, België, 1997

AANTAL VERSCHILLENDE SOORTEN GENEESMIDDELEN INGENOMEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN PER PERSOON					
	Gemiddelde	P 25	Mediaan	P 75	N
GESLACHT					
Man	1,7	1	1	2	872
Vrouw	1,9	1	1	2	1167
Totaal	1,8	1	1	2	2039
LEEFTIJDSGROEP					
0-14	1,5	1	1	2	233
15-24	1,5	1	1	2	217
25-34	1,6	1	1	2	292
35-44	1,8	1	1	2	274
45-54	1,8	1	1	2	265
55-64	1,9	1	1	2	294
65-74	2,4	1	2	3	297
75 +	2,5	1	2	3	167
Totaal	1,8	1	1	2	2039
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	2,4	1	2	2	47
Lager	2,1	1	2	2	290
Lager secundair	2,0	1	1	2	387
Hoger secundair	1,7	1	1	2	651
Hoger	1,6	1	1	2	592
Totaal	1,8	1	1	2	1967
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	2,5	1	2	3	67
20.000-30.000	1,9	1	2	2	376
30.000-40.000	1,9	1	1	2	532
40.000-60.000	1,7	1	1	2	703
>60.000	1,6	1	1	2	253
Totaal	1,8	1	1	2	1931
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	1,5	1	1	2	1223
Zeer slecht tot redelijk	2,7	1	2	3	495
Totaal	1,8	1	1	2	1718
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	1,8	1	1	2	828
Vroeger gerookt	1,9	1	1	2	464
Matige roker (< 20)	1,8	1	2	2	312
Zware roker	1,9	1	1	2	136
Totaal	1,8	1	1	2	1740

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR08)

Gezondheidsenquête, België, 1997

AANTAL VERSCHILLENDE SOORTEN GENEESMIDDELEN INGENOMEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN PER PERSOON					
	Gemiddelde	P 25	Mediaan	P 75	N
GESLACHT					
Man	2,1	1	2	2	876
Vrouw	2,4	1	2	3	1097
Totaal	2,3	1	2	3	1973
LEEFTIJDSGROEP					
0-14	1,6	1	1	2	212
15-24	1,7	1	1	2	172
25-34	1,9	1	1	2	278
35-44	2,1	1	2	2	297
45-54	2,5	1	2	3	274
55-64	2,6	1	2	3	242
65-74	2,7	1	2	3	284
75 +	3,7	2	3	5	214
Totaal	2,3	1	2	3	1973
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	2,3	1	2	2	103
Lager	2,5	1	2	3	242
Lager secundair	2,6	1	2	3	288
Hoger secundair	2,3	1	2	3	452
Hoger	2,0	1	1	2	777
Totaal	2,2	1	2	2	1862
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	2,0	1	1	2	197
20.000-30.000	2,5	1	2	3	406
30.000-40.000	2,5	1	2	3	415
40.000-60.000	2,1	1	2	2	517
>60.000	2,1	1	2	2	335
Totaal	2,3	1	2	3	1870
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	1,9	1	1	2	1052
Zeer slecht tot redelijk	3,3	2	3	4	542
Totaal	2,4	1	2	3	1594
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	2,3	1	2	2	686
Vroeger gerookt	2,5	1	2	3	432
Matige roker (< 20)	2,3	1	2	3	291
Zware roker	2,5	1	2	3	185
Totaal	2,4	1	2	3	1594

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN (INDICATOR : DR08)

Gezondheidsenquête, België, 1997

AANTAL VERSCHILLENDE SOORTEN GENEESMIDDELEN INGENOMEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN PER PERSOON					
	Gemiddelde	P 25	Mediaan	P 75	N
GESLACHT					
Man	2,0	1	1	2	1000
Vrouw	2,4	1	2	3	1282
Totaal	2,2	1	2	3	2282
LEEFTIJDSGROEP					
0-14	1,6	1	1	2	261
15-24	1,6	1	1	2	198
25-34	1,6	1	1	2	300
35-44	2,0	1	1	2	348
45-54	2,2	1	2	3	311
55-64	3,1	2	3	4	295
65-74	3,0	1	3	3	333
75 +	3,1	2	3	3	236
Totaal	2,2	1	2	3	2282
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	2,9	1	2	3	89
Lager	2,7	1	2	3	375
Lager secundair	2,4	1	2	3	408
Hoger secundair	2,0	1	1	2	613
Hoger	2,1	1	2	2	708
Totaal	2,2	1	2	3	2193
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	2,1	1	2	3	169
20.000-30.000	2,4	1	2	3	487
30.000-40.000	2,2	1	2	3	585
40.000-60.000	2,2	1	2	3	740
>60.000	2,0	1	2	2	226
Totaal	2,2	1	2	3	2207
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	1,8	1	1	2	1149
Zeer slecht tot redelijk	3,1	2	3	4	733
Totaal	2,3	1	2	3	1882
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	2,2	1	2	3	891
Vroeger gerookt	2,3	1	2	3	474
Matige roker (< 20)	2,1	1	2	2	348
Zware roker	2,5	1	2	3	208
Totaal	2,3	1	2	3	1921