

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | VASTE HUISARTS | | Totaal |
|---------------------------------|----------------|------|--------|
| | Ja | Neen | N |
| | % | % | |
| GESLACHT | | | |
| Man | 91,9 | 8,1 | 4973 |
| Vrouw | 94,0 | 6,0 | 5212 |
| Totaal | 93,0 | 7,0 | 10185 |
| LEEFTIJDGROEP | | | |
| 0-14 | 91,4 | 8,6 | 1653 |
| 15-24 | 92,1 | 7,9 | 1141 |
| 25-34 | 91,1 | 8,9 | 1641 |
| 35-44 | 91,5 | 8,5 | 1609 |
| 45-54 | 94,7 | 5,3 | 1289 |
| 55-64 | 96,2 | 3,8 | 1092 |
| 65-74 | 95,8 | 4,2 | 1077 |
| 75 + | 97,1 | 2,9 | 683 |
| Totaal | 93,0 | 7,0 | 10185 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 93,6 | 6,4 | 353 |
| Lager | 95,0 | 5,0 | 1292 |
| Lager secundair | 92,7 | 7,3 | 1663 |
| Hoger secundair | 95,4 | 4,6 | 2949 |
| Hoger | 90,7 | 9,3 | 3504 |
| Totaal | 93,1 | 6,9 | 9761 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 86,5 | 13,5 | 791 |
| 20.000-30.000 | 90,2 | 9,8 | 2035 |
| 30.000-40.000 | 96,0 | 4,0 | 2368 |
| 40.000-60.000 | 94,2 | 5,8 | 3242 |
| >60.000 | 91,4 | 8,6 | 1284 |
| Totaal | 92,9 | 7,1 | 9720 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 92,9 | 7,1 | 5902 |
| Zeer slecht tot redelijk | 95,4 | 4,6 | 2019 |
| Totaal | 93,4 | 6,6 | 7921 |
| ROOKGEWOONTEN | | | |
| Nooit gerookt | 93,9 | 6,1 | 3708 |
| Vroeger gerookt | 95,1 | 4,9 | 1918 |
| Matige roker (< 20) | 91,0 | 9,0 | 1571 |
| Zware roker | 90,7 | 9,3 | 837 |
| Totaal | 93,2 | 6,8 | 8034 |
| VERBLIJFPLAATS (gewest) | | | |
| Vlaams Gewest | 95,4 | 4,6 | 3523 |
| Brussels Gewest | 77,6 | 22,4 | 3036 |
| Waals Gewest | 93,7 | 6,3 | 3626 |
| België | 93,0 | 7,0 | 10185 |

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | VASTE HUISARTS | | Totaal |
|---------------------------------|----------------|------|--------|
| | Ja | Neen | N |
| | % | % | |
| GESLACHT | | | |
| Man | 94,6 | 5,4 | 1751 |
| Vrouw | 96,2 | 3,8 | 1772 |
| Totaal | 95,4 | 4,6 | 3523 |
| LEEFTIJDGROEP | | | |
| 0-14 | 94,9 | 5,1 | 547 |
| 15-24 | 95,7 | 4,3 | 428 |
| 25-34 | 94,3 | 5,7 | 590 |
| 35-44 | 93,6 | 6,4 | 531 |
| 45-54 | 96,1 | 3,9 | 465 |
| 55-64 | 98,2 | 1,8 | 405 |
| 65-74 | 95,8 | 4,2 | 363 |
| 75 + | 98,4 | 1,6 | 194 |
| Totaal | 95,4 | 4,6 | 3523 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 100,0 | ,0 | 65 |
| Lager | 96,8 | 3,2 | 424 |
| Lager secundair | 96,7 | 3,3 | 605 |
| Hoger secundair | 97,4 | 2,6 | 1172 |
| Hoger | 92,5 | 7,5 | 1135 |
| Totaal | 95,6 | 4,4 | 3401 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 93,1 | 6,9 | 119 |
| 20.000-30.000 | 94,3 | 5,7 | 603 |
| 30.000-40.000 | 97,8 | 2,2 | 855 |
| 40.000-60.000 | 95,4 | 4,6 | 1291 |
| >60.000 | 93,6 | 6,4 | 460 |
| Totaal | 95,4 | 4,6 | 3328 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 95,0 | 5,0 | 2273 |
| Zeer slecht tot redelijk | 96,9 | 3,1 | 565 |
| Totaal | 95,4 | 4,6 | 2838 |
| ROOKGEWOONTEN | | | |
| Nooit gerookt | 95,5 | 4,5 | 1370 |
| Vroeger gerookt | 96,7 | 3,3 | 700 |
| Matige roker (< 20) | 94,5 | 5,5 | 561 |
| Zware roker | 92,1 | 7,9 | 241 |
| Totaal | 95,3 | 4,7 | 2872 |

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | VASTE HUISARTS | | Totaal |
|---------------------------------|----------------|------|--------|
| | Ja | Neen | N |
| | % | % | |
| GESLACHT | | | |
| Man | 73,3 | 26,7 | 1470 |
| Vrouw | 81,6 | 18,4 | 1566 |
| Totaal | 77,6 | 22,4 | 3036 |
| LEEFTIJDSGROEP | | | |
| 0-14 | 73,6 | 26,4 | 479 |
| 15-24 | 69,7 | 30,3 | 310 |
| 25-34 | 71,6 | 28,4 | 498 |
| 35-44 | 74,8 | 25,2 | 488 |
| 45-54 | 83,7 | 16,3 | 383 |
| 55-64 | 84,5 | 15,5 | 313 |
| 65-74 | 87,9 | 12,1 | 325 |
| 75 + | 90,3 | 9,7 | 240 |
| Totaal | 77,6 | 22,4 | 3036 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 75,6 | 24,4 | 168 |
| Lager | 80,4 | 19,6 | 371 |
| Lager secundair | 77,5 | 22,5 | 426 |
| Hoger secundair | 80,2 | 19,8 | 708 |
| Hoger | 75,2 | 24,8 | 1197 |
| Totaal | 77,5 | 22,5 | 2870 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 70,5 | 29,5 | 370 |
| 20.000-30.000 | 72,0 | 28,0 | 626 |
| 30.000-40.000 | 85,5 | 14,5 | 608 |
| 40.000-60.000 | 80,4 | 19,6 | 787 |
| >60.000 | 78,8 | 21,2 | 495 |
| Totaal | 77,7 | 22,3 | 2886 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 77,3 | 22,7 | 1676 |
| Zeer slecht tot redelijk | 83,0 | 17,0 | 622 |
| Totaal | 78,8 | 21,2 | 2298 |
| ROOKGEWOONTEN | | | |
| Nooit gerookt | 78,7 | 21,3 | 1013 |
| Vroeger gerookt | 83,4 | 16,6 | 560 |
| Matige roker (< 20) | 71,9 | 28,1 | 459 |
| Zware roker | 77,4 | 22,6 | 279 |
| Totaal | 78,1 | 21,9 | 2311 |

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | VASTE HUISARTS | | Totaal |
|---------------------------------|----------------|------|--------|
| | Ja | Neen | N |
| | % | % | |
| GESLACHT | | | |
| Man | 92,9 | 7,1 | 1752 |
| Vrouw | 94,4 | 5,6 | 1874 |
| Totaal | 93,7 | 6,3 | 3626 |
| LEEFTIJDGROEP | | | |
| 0-14 | 90,6 | 9,4 | 627 |
| 15-24 | 93,0 | 7,0 | 403 |
| 25-34 | 92,1 | 7,9 | 553 |
| 35-44 | 92,7 | 7,3 | 590 |
| 45-54 | 95,3 | 4,7 | 441 |
| 55-64 | 96,4 | 3,6 | 374 |
| 65-74 | 98,3 | 1,7 | 389 |
| 75 + | 98,8 | 1,2 | 249 |
| Totaal | 93,7 | 6,3 | 3626 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 100,0 | ,0 | 120 |
| Lager | 97,3 | 2,7 | 497 |
| Lager secundair | 89,4 | 10,6 | 632 |
| Hoger secundair | 95,2 | 4,8 | 1069 |
| Hoger | 92,9 | 7,1 | 1172 |
| Totaal | 93,7 | 6,3 | 3490 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 90,8 | 9,2 | 302 |
| 20.000-30.000 | 90,6 | 9,4 | 806 |
| 30.000-40.000 | 95,7 | 4,3 | 905 |
| 40.000-60.000 | 95,0 | 5,0 | 1164 |
| >60.000 | 92,4 | 7,6 | 329 |
| Totaal | 93,6 | 6,4 | 3506 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 93,4 | 6,6 | 1953 |
| Zeer slecht tot redelijk | 97,4 | 2,6 | 832 |
| Totaal | 94,5 | 5,5 | 2785 |
| ROOKGEWOONTEN | | | |
| Nooit gerookt | 95,5 | 4,5 | 1325 |
| Vroeger gerookt | 95,2 | 4,8 | 658 |
| Matige roker (< 20) | 91,2 | 8,8 | 551 |
| Zware roker | 92,7 | 7,3 | 317 |
| Totaal | 94,2 | 5,8 | 2851 |

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP02_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | LAATSTE CONTACT MET DE HUISARTS | | | Totaal |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| | < 1 jaar geleden | > 1 jaar geleden | Nog nooit contact gehad | N |
| | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | |
| Man | 74,4 | 23,9 | 1,7 | 4724 |
| Vrouw | 82,7 | 16,1 | 1,3 | 5000 |
| Totaal | 78,6 | 20,0 | 1,5 | 9724 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | |
| 0-14 | 78,4 | 15,5 | 6,0 | 1564 |
| 15-24 | 76,6 | 22,5 | ,8 | 1062 |
| 25-34 | 74,7 | 24,8 | ,5 | 1563 |
| 35-44 | 75,2 | 24,2 | ,6 | 1521 |
| 45-54 | 77,3 | 22,0 | ,7 | 1231 |
| 55-64 | 82,4 | 17,2 | ,4 | 1060 |
| 65-74 | 88,5 | 10,5 | ,9 | 1051 |
| 75 + | 92,4 | 7,5 | ,2 | 672 |
| Totaal | 78,6 | 20,0 | 1,5 | 9724 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | |
| Geen diploma | 79,4 | 19,0 | 1,6 | 335 |
| Lager | 84,7 | 14,8 | ,5 | 1223 |
| Lager secundair | 80,8 | 17,9 | 1,3 | 1583 |
| Hoger secundair | 78,4 | 20,2 | 1,3 | 2826 |
| Hoger | 75,8 | 22,1 | 2,1 | 3347 |
| Totaal | 78,6 | 19,9 | 1,5 | 9314 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | |
| < 20.000 | 74,3 | 24,0 | 1,7 | 735 |
| 20.000-30.000 | 80,7 | 17,5 | 1,8 | 1945 |
| 30.000-40.000 | 80,1 | 18,5 | 1,4 | 2295 |
| 40.000-60.000 | 79,0 | 19,4 | 1,6 | 3083 |
| >60.000 | 74,7 | 24,2 | 1,1 | 1241 |
| Totaal | 78,8 | 19,7 | 1,5 | 9299 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | |
| Goed tot zeer goed | 74,4 | 24,9 | ,7 | 5606 |
| Zeer slecht tot redelijk | 91,8 | 7,8 | ,4 | 1981 |
| Totaal | 78,3 | 21,1 | ,6 | 7587 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | |
| Nooit gerookt | 79,1 | 20,2 | ,6 | 3543 |
| Vroeger gerookt | 79,5 | 20,0 | ,5 | 1861 |
| Matige roker (< 20) | 75,8 | 23,6 | ,6 | 1496 |
| Zware roker | 77,0 | 22,4 | ,6 | 797 |
| Totaal | 78,3 | 21,1 | ,6 | 7697 |
| VERBLIJFPLAATS (gewest) | | | | |
| Vlaams Gewest | 79,7 | 19,3 | 1,0 | 3361 |
| Brussels Gewest | 71,8 | 23,9 | 4,3 | 2907 |
| Waals Gewest | 78,7 | 19,8 | 1,4 | 3456 |
| België | 78,6 | 20,0 | 1,5 | 9724 |

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP02_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | LAATSTE CONTACT MET DE HUISARTS | | | Totaal |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| | < 1 jaar geleden | > 1 jaar geleden | Nog nooit contact gehad | N |
| | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | |
| Man | 76,1 | 22,8 | 1,1 | 1661 |
| Vrouw | 83,4 | 15,8 | ,9 | 1700 |
| Totaal | 79,7 | 19,3 | 1,0 | 3361 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | |
| 0-14 | 80,9 | 14,6 | 4,5 | 514 |
| 15-24 | 79,8 | 19,6 | ,6 | 395 |
| 25-34 | 78,4 | 21,6 | ,0 | 558 |
| 35-44 | 75,8 | 24,0 | ,2 | 502 |
| 45-54 | 77,7 | 21,7 | ,6 | 447 |
| 55-64 | 82,9 | 17,1 | ,0 | 396 |
| 65-74 | 84,6 | 14,2 | 1,1 | 358 |
| 75 + | 89,1 | 10,6 | ,3 | 191 |
| Totaal | 79,7 | 19,3 | 1,0 | 3361 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | |
| Geen diploma | 78,9 | 21,1 | ,0 | 62 |
| Lager | 86,2 | 13,5 | ,4 | 407 |
| Lager secundair | 81,2 | 18,2 | ,6 | 585 |
| Hoger secundair | 80,5 | 18,6 | ,9 | 1124 |
| Hoger | 76,6 | 21,7 | 1,7 | 1065 |
| Totaal | 79,9 | 19,1 | 1,0 | 3243 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | |
| < 20.000 | 71,7 | 28,3 | ,0 | 114 |
| 20.000-30.000 | 85,9 | 13,6 | ,6 | 570 |
| 30.000-40.000 | 82,6 | 16,7 | ,8 | 832 |
| 40.000-60.000 | 78,8 | 19,4 | 1,7 | 1229 |
| >60.000 | 75,4 | 24,1 | ,5 | 443 |
| Totaal | 80,2 | 18,7 | 1,0 | 3188 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | |
| Goed tot zeer goed | 75,9 | 23,6 | ,4 | 2156 |
| Zeer slecht tot redelijk | 93,7 | 6,3 | ,0 | 562 |
| Totaal | 79,3 | 20,4 | ,4 | 2718 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | |
| Nooit gerookt | 79,7 | 20,1 | ,2 | 1305 |
| Vroeger gerookt | 80,6 | 19,1 | ,2 | 679 |
| Matige roker (< 20) | 77,8 | 21,7 | ,4 | 534 |
| Zware roker | 77,5 | 21,4 | 1,1 | 232 |
| Totaal | 79,3 | 20,3 | ,3 | 2750 |

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP02_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | LAATSTE CONTACT MET DE HUISARTS | | | Totaal |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| | < 1 jaar geleden | > 1 jaar geleden | Nog nooit contact gehad | N |
| | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | |
| Man | 65,4 | 29,2 | 5,4 | 1403 |
| Vrouw | 77,7 | 19,0 | 3,3 | 1504 |
| Totaal | 71,8 | 23,9 | 4,3 | 2907 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | |
| 0-14 | 65,1 | 16,8 | 18,1 | 450 |
| 15-24 | 67,9 | 27,8 | 4,3 | 300 |
| 25-34 | 65,1 | 32,8 | 2,1 | 477 |
| 35-44 | 66,4 | 32,1 | 1,5 | 464 |
| 45-54 | 74,4 | 24,2 | 1,4 | 370 |
| 55-64 | 73,9 | 24,2 | 2,0 | 302 |
| 65-74 | 89,7 | 8,4 | 1,9 | 310 |
| 75 + | 93,6 | 6,2 | ,1 | 234 |
| Totaal | 71,8 | 23,9 | 4,3 | 2907 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | |
| Geen diploma | 80,0 | 15,1 | 4,8 | 163 |
| Lager | 77,5 | 20,6 | 2,0 | 345 |
| Lager secundair | 75,1 | 21,6 | 3,3 | 402 |
| Hoger secundair | 71,2 | 24,6 | 4,2 | 679 |
| Hoger | 67,0 | 27,5 | 5,5 | 1157 |
| Totaal | 71,5 | 24,1 | 4,4 | 2746 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | |
| < 20.000 | 71,3 | 24,3 | 4,4 | 342 |
| 20.000-30.000 | 71,1 | 22,9 | 6,0 | 604 |
| 30.000-40.000 | 76,1 | 21,5 | 2,4 | 585 |
| 40.000-60.000 | 69,4 | 26,8 | 3,8 | 757 |
| >60.000 | 69,9 | 25,2 | 4,9 | 480 |
| Totaal | 71,5 | 24,2 | 4,3 | 2768 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | |
| Goed tot zeer goed | 67,2 | 30,7 | 2,1 | 1610 |
| Zeer slecht tot redelijk | 85,1 | 13,3 | 1,7 | 604 |
| Totaal | 71,8 | 26,2 | 2,0 | 2214 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | |
| Nooit gerookt | 73,8 | 24,0 | 2,2 | 976 |
| Vroeger gerookt | 71,9 | 27,0 | 1,2 | 543 |
| Matige roker (< 20) | 68,3 | 28,6 | 3,1 | 441 |
| Zware roker | 71,9 | 27,2 | ,8 | 264 |
| Totaal | 72,0 | 26,0 | 2,0 | 2224 |

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP02_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | LAATSTE CONTACT MET DE HUISARTS | | | Totaal |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| | < 1 jaar geleden | > 1 jaar geleden | Nog nooit contact gehad | N |
| | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | |
| Man | 74,3 | 24,1 | 1,6 | 1660 |
| Vrouw | 83,2 | 15,6 | 1,2 | 1796 |
| Totaal | 78,7 | 19,8 | 1,4 | 3456 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | |
| 0-14 | 78,1 | 16,7 | 5,2 | 600 |
| 15-24 | 74,1 | 25,8 | ,1 | 367 |
| 25-34 | 71,1 | 28,2 | ,8 | 528 |
| 35-44 | 76,6 | 22,4 | 1,0 | 555 |
| 45-54 | 77,4 | 21,9 | ,7 | 414 |
| 55-64 | 84,5 | 14,9 | ,5 | 362 |
| 65-74 | 94,0 | 5,7 | ,3 | 383 |
| 75 + | 96,3 | 3,6 | ,1 | 247 |
| Totaal | 78,7 | 19,8 | 1,4 | 3456 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | |
| Geen diploma | 79,6 | 19,6 | ,8 | 110 |
| Lager | 84,8 | 15,2 | ,0 | 471 |
| Lager secundair | 81,5 | 16,4 | 2,1 | 596 |
| Hoger secundair | 76,2 | 22,3 | 1,5 | 1023 |
| Hoger | 77,6 | 20,8 | 1,5 | 1125 |
| Totaal | 78,7 | 19,9 | 1,4 | 3325 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | |
| < 20.000 | 77,9 | 20,8 | 1,3 | 279 |
| 20.000-30.000 | 76,9 | 21,1 | 2,0 | 771 |
| 30.000-40.000 | 77,4 | 20,6 | 2,0 | 878 |
| 40.000-60.000 | 81,5 | 17,7 | ,9 | 1097 |
| >60.000 | 75,9 | 23,7 | ,4 | 318 |
| Totaal | 78,6 | 20,0 | 1,4 | 3343 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | |
| Goed tot zeer goed | 73,7 | 25,7 | ,6 | 1840 |
| Zeer slecht tot redelijk | 91,4 | 8,0 | ,6 | 815 |
| Totaal | 78,6 | 20,8 | ,6 | 2655 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | |
| Nooit gerookt | 79,8 | 19,3 | ,8 | 1262 |
| Vroeger gerookt | 79,5 | 19,6 | ,9 | 639 |
| Matige roker (< 20) | 74,6 | 25,3 | ,1 | 521 |
| Zware roker | 77,7 | 22,3 | ,0 | 301 |
| Totaal | 78,5 | 20,9 | ,6 | 2723 |

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GPCOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE HUISARTS PER JAAR PER PERS. IN DE BEVOLKING | N |
|---------------------------------|---|------|
| GESLACHT | | |
| Man | 4,8 | 4724 |
| Vrouw | 7,0 | 5000 |
| Totaal | 5,9 | 9724 |
| LEEFTIJDGROEP | | |
| 0-14 | 4,6 | 1564 |
| 15-24 | 4,4 | 1062 |
| 25-34 | 3,9 | 1563 |
| 35-44 | 5,0 | 1521 |
| 45-54 | 5,8 | 1231 |
| 55-64 | 8,1 | 1060 |
| 65-74 | 9,9 | 1051 |
| 75 + | 15,1 | 672 |
| Totaal | 5,9 | 9724 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | |
| Geen diploma | 7,9 | 335 |
| Lager | 8,6 | 1223 |
| Lager secundair | 6,9 | 1583 |
| Hoger secundair | 5,0 | 2826 |
| Hoger | 5,3 | 3347 |
| Totaal | 5,9 | 9314 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | |
| < 20.000 | 5,3 | 735 |
| 20.000-30.000 | 6,1 | 1945 |
| 30.000-40.000 | 6,2 | 2295 |
| 40.000-60.000 | 6,0 | 3083 |
| >60.000 | 5,0 | 1241 |
| Totaal | 5,9 | 9299 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | |
| Goed tot zeer goed | 4,3 | 5606 |
| Zeer slecht tot redelijk | 12,0 | 1981 |
| Totaal | 6,1 | 7587 |
| ROOKGEWOONTEN | | |
| Nooit gerookt | 6,3 | 3543 |
| Vroeger gerookt | 6,4 | 1861 |
| Matige roker (< 20) | 4,7 | 1496 |
| Zware roker | 6,2 | 797 |
| Totaal | 6,0 | 7697 |
| VERBLIJFPLAATS (gewest) | | |
| Vlaams Gewest | 6,0 | 3361 |
| Brussels Gewest | 4,2 | 2907 |
| Waals Gewest | 6,1 | 3456 |
| België | 5,9 | 9724 |

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GPCOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE HUISARTS PER JAAR PER PERS. IN DE BEVOLKING | N |
|--------------------------|---|------|
| ----- | | |
| GESLACHT | | |
| Man | 5,0 | 1661 |
| Vrouw | 7,1 | 1700 |
| Totaal | 6,0 | 3361 |
| LEEFTIJDGROEP | | |
| 0-14 | 5,2 | 514 |
| 15-24 | 4,3 | 395 |
| 25-34 | 4,4 | 558 |
| 35-44 | 4,8 | 502 |
| 45-54 | 5,8 | 447 |
| 55-64 | 9,0 | 396 |
| 65-74 | 9,4 | 358 |
| 75 + | 15,5 | 191 |
| Totaal | 6,0 | 3361 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | |
| Geen diploma | 6,1 | 62 |
| Lager | 9,3 | 407 |
| Lager secundair | 7,6 | 585 |
| Hoger secundair | 4,8 | 1124 |
| Hoger | 5,7 | 1065 |
| Totaal | 6,1 | 3243 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | |
| < 20.000 | 6,4 | 114 |
| 20.000-30.000 | 6,7 | 570 |
| 30.000-40.000 | 6,4 | 832 |
| 40.000-60.000 | 5,9 | 1229 |
| >60.000 | 5,2 | 443 |
| Totaal | 6,1 | 3188 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | |
| Goed tot zeer goed | 4,4 | 2156 |
| Zeer slecht tot redelijk | 13,3 | 562 |
| Totaal | 6,1 | 2718 |
| ROOKGEWOONTEN | | |
| Nooit gerookt | 6,6 | 1305 |
| Vroeger gerookt | 6,5 | 679 |
| Matige roker (< 20) | 4,1 | 534 |
| Zware roker | 6,3 | 232 |
| Totaal | 6,0 | 2750 |
| ----- | | |

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GPCOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE HUISARTS PER JAAR PER PERS. IN DE BEVOLKING | N |
|---------------------------------|---|------|
| GESLACHT | | |
| Man | 3,4 | 1403 |
| Vrouw | 4,9 | 1504 |
| Totaal | 4,2 | 2907 |
| LEEFTIJDGROEP | | |
| 0-14 | 2,7 | 450 |
| 15-24 | 3,7 | 300 |
| 25-34 | 2,5 | 477 |
| 35-44 | 3,8 | 464 |
| 45-54 | 4,8 | 370 |
| 55-64 | 4,5 | 302 |
| 65-74 | 6,7 | 310 |
| 75 + | 9,1 | 234 |
| Totaal | 4,2 | 2907 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | |
| Geen diploma | 5,5 | 163 |
| Lager | 4,3 | 345 |
| Lager secundair | 5,5 | 402 |
| Hoger secundair | 3,9 | 679 |
| Hoger | 3,6 | 1157 |
| Totaal | 4,2 | 2746 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | |
| < 20.000 | 4,1 | 342 |
| 20.000-30.000 | 4,8 | 604 |
| 30.000-40.000 | 4,2 | 585 |
| 40.000-60.000 | 3,7 | 757 |
| >60.000 | 4,1 | 480 |
| Totaal | 4,2 | 2768 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | |
| Goed tot zeer goed | 3,0 | 1610 |
| Zeer slecht tot redelijk | 7,9 | 604 |
| Totaal | 4,3 | 2214 |
| ROOKGEWOONTEN | | |
| Nooit gerookt | 3,8 | 976 |
| Vroeger gerookt | 5,2 | 543 |
| Matige roker (< 20) | 4,3 | 441 |
| Zware roker | 3,3 | 264 |
| Totaal | 4,2 | 2224 |

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GPCOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE HUISARTS PER JAAR PER PERS. IN DE BEVOLKING | N |
|--------------------------|---|------|
| ----- | | |
| GESLACHT | | |
| Man | 4,8 | 1660 |
| Vrouw | 7,5 | 1796 |
| Totaal | 6,1 | 3456 |
| LEEFTIJDGROEP | | |
| 0-14 | 4,2 | 600 |
| 15-24 | 4,6 | 367 |
| 25-34 | 3,6 | 528 |
| 35-44 | 5,6 | 555 |
| 45-54 | 6,2 | 414 |
| 55-64 | 7,3 | 362 |
| 65-74 | 11,5 | 383 |
| 75 + | 17,5 | 247 |
| Totaal | 6,1 | 3456 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | |
| Geen diploma | 11,4 | 110 |
| Lager | 9,1 | 471 |
| Lager secundair | 6,2 | 596 |
| Hoger secundair | 5,7 | 1023 |
| Hoger | 5,3 | 1125 |
| Totaal | 6,2 | 3325 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | |
| < 20.000 | 5,3 | 279 |
| 20.000-30.000 | 5,5 | 771 |
| 30.000-40.000 | 6,5 | 878 |
| 40.000-60.000 | 6,8 | 1097 |
| >60.000 | 5,3 | 318 |
| Totaal | 6,2 | 3343 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | |
| Goed tot zeer goed | 4,6 | 1840 |
| Zeer slecht tot redelijk | 11,6 | 815 |
| Totaal | 6,5 | 2655 |
| ROOKGEWOONTEN | | |
| Nooit gerookt | 6,6 | 1262 |
| Vroeger gerookt | 6,5 | 639 |
| Matige roker (< 20) | 5,9 | 521 |
| Zware roker | 7,1 | 301 |
| Totaal | 6,5 | 2723 |
| ----- | | |

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP06)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | REDEN VOOR HET CONTACT MET DE HUISARTS | | | | | | Totaal |
|---------------------------------|--|------|------|-----|-----|-----|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N (*) |
| | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | | | | |
| Man | 54,0 | 19,7 | 21,0 | 3,4 | ,9 | 1,0 | 2912 |
| Vrouw | 47,3 | 22,5 | 25,6 | 2,9 | ,6 | 1,1 | 4009 |
| Totaal | 50,1 | 21,3 | 23,7 | 3,1 | ,7 | 1,1 | 6921 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | | | | |
| 0-14 | 82,3 | 8,3 | 7,0 | ,7 | ,0 | 1,6 | 761 |
| 15-24 | 67,4 | 10,7 | 14,8 | 4,7 | ,5 | 1,9 | 513 |
| 25-34 | 65,2 | 12,1 | 18,1 | 2,2 | 1,2 | 1,1 | 756 |
| 35-44 | 53,6 | 19,3 | 22,5 | 3,1 | 1,0 | ,4 | 834 |
| 45-54 | 49,1 | 17,1 | 28,2 | 3,1 | 1,8 | ,8 | 873 |
| 55-64 | 35,2 | 27,1 | 30,9 | 6,1 | ,1 | ,6 | 908 |
| 65-74 | 27,5 | 35,3 | 33,0 | 2,9 | ,4 | 1,0 | 1245 |
| 75 + | 20,3 | 42,8 | 33,0 | 2,2 | ,1 | 1,5 | 1031 |
| Totaal | 50,1 | 21,3 | 23,7 | 3,1 | ,7 | 1,1 | 6921 |
| ONDERWIJNSNIVEAU | | | | | | | |
| Geen diploma | 51,2 | 16,4 | 29,1 | 2,5 | ,4 | ,5 | 324 |
| Lager | 34,3 | 22,2 | 37,9 | 4,4 | ,1 | 1,0 | 1301 |
| Lager secundair | 48,9 | 24,5 | 22,5 | 2,3 | ,6 | 1,2 | 1420 |
| Hoger secundair | 51,3 | 24,0 | 20,0 | 2,8 | ,9 | 1,1 | 1853 |
| Hoger | 58,2 | 15,8 | 20,3 | 3,6 | 1,0 | 1,1 | 1776 |
| Totaal | 50,2 | 21,1 | 23,7 | 3,1 | ,7 | 1,1 | 6674 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | |
| < 20.000 | 44,7 | 25,9 | 24,0 | 2,5 | ,9 | 2,0 | 467 |
| 20.000-30.000 | 45,1 | 22,6 | 26,4 | 4,1 | ,4 | 1,5 | 1575 |
| 30.000-40.000 | 44,8 | 25,5 | 25,3 | 2,5 | ,8 | 1,1 | 1815 |
| 40.000-60.000 | 55,9 | 17,4 | 22,9 | 2,7 | ,6 | ,5 | 2032 |
| >60.000 | 56,5 | 19,0 | 17,9 | 3,9 | 1,6 | 1,1 | 741 |
| Totaal | 50,0 | 21,3 | 23,8 | 3,1 | ,7 | 1,0 | 6630 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 52,0 | 21,2 | 20,6 | 3,9 | 1,0 | 1,3 | 2944 |
| Zeer slecht tot redelijk | 38,5 | 24,5 | 32,7 | 3,0 | ,5 | ,8 | 2711 |
| Totaal | 46,2 | 22,6 | 25,9 | 3,5 | ,8 | 1,1 | 5655 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | | | | |
| Nooit gerookt | 48,2 | 21,0 | 26,5 | 2,7 | ,5 | 1,1 | 2616 |
| Vroeger gerookt | 38,4 | 25,6 | 28,2 | 5,9 | 1,0 | ,8 | 1582 |
| Matige roker (< 20) | 52,4 | 19,3 | 23,0 | 3,5 | 1,1 | ,8 | 966 |
| Zware roker | 45,2 | 27,4 | 22,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 565 |
| Totaal | 46,0 | 22,7 | 25,9 | 3,5 | ,8 | 1,0 | 5729 |
| VERBLIJFPLAATS (gewest) | | | | | | | |
| Vlaams Gewest | 53,4 | 21,1 | 20,7 | 3,5 | ,5 | ,8 | 2488 |
| Brussels Gewest | 45,6 | 24,0 | 25,6 | 2,7 | ,9 | 1,3 | 1707 |
| Waals Gewest | 45,5 | 21,0 | 28,3 | 2,6 | 1,1 | 1,4 | 2726 |
| België | 50,1 | 21,3 | 23,7 | 3,1 | ,7 | 1,1 | 6921 |

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

1 Klacht of ziekte

2 Diagnostisch of preventief onderzoek

3 Behandeling of voorschrift

4 Resultaat van onderzoek

5 Administratieve reden

6 Doorverwezen of om een andere reden

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP06)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | REDEN VOOR HET CONTACT MET DE HUISARTS | | | | | | Totaal N (*) |
|---------------------------------|--|------|------|-----|-----|-----|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | | | | |
| Man | 58,7 | 18,7 | 17,0 | 4,1 | ,5 | 1,0 | 1028 |
| Vrouw | 49,7 | 22,8 | 23,2 | 3,1 | ,4 | ,7 | 1460 |
| Totaal | 53,4 | 21,1 | 20,7 | 3,5 | ,5 | ,8 | 2488 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | | | | |
| 0-14 | 86,8 | 4,9 | 6,2 | 1,2 | ,0 | 1,0 | 272 |
| 15-24 | 66,7 | 8,4 | 16,0 | 6,6 | ,2 | 2,1 | 218 |
| 25-34 | 67,3 | 8,4 | 20,7 | 2,8 | ,5 | ,3 | 319 |
| 35-44 | 55,5 | 24,4 | 16,6 | 2,8 | ,7 | ,0 | 256 |
| 45-54 | 52,4 | 16,1 | 26,5 | 2,6 | 1,6 | ,8 | 323 |
| 55-64 | 35,8 | 27,7 | 28,9 | 7,3 | ,0 | ,3 | 364 |
| 65-74 | 27,0 | 43,9 | 25,8 | 2,2 | ,0 | 1,1 | 434 |
| 75 + | 27,2 | 46,6 | 21,3 | 3,0 | ,0 | 2,0 | 302 |
| Totaal | 53,4 | 21,1 | 20,7 | 3,5 | ,5 | ,8 | 2488 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | |
| Geen diploma | 48,8 | 20,4 | 27,9 | 2,4 | ,0 | ,5 | 58 |
| Lager | 36,6 | 24,2 | 33,4 | 4,8 | ,0 | 1,0 | 487 |
| Lager secundair | 52,8 | 23,3 | 19,5 | 2,1 | ,4 | 1,9 | 537 |
| Hoger secundair | 54,9 | 24,3 | 16,8 | 3,2 | ,2 | ,7 | 706 |
| Hoger | 62,1 | 13,3 | 18,6 | 4,6 | 1,2 | ,2 | 634 |
| Totaal | 53,6 | 20,8 | 20,6 | 3,6 | ,5 | ,8 | 2422 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | |
| < 20.000 | 35,6 | 39,9 | 23,3 | 1,3 | ,0 | ,0 | 102 |
| 20.000-30.000 | 45,2 | 26,3 | 21,9 | 4,8 | ,0 | 1,8 | 539 |
| 30.000-40.000 | 47,5 | 25,4 | 22,6 | 2,8 | ,5 | 1,2 | 667 |
| 40.000-60.000 | 62,0 | 14,1 | 20,2 | 3,2 | ,3 | ,2 | 770 |
| >60.000 | 62,1 | 17,2 | 14,9 | 3,7 | 1,8 | ,3 | 300 |
| Totaal | 53,5 | 21,1 | 20,6 | 3,5 | ,5 | ,8 | 2378 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 55,5 | 18,5 | 19,8 | 4,7 | ,4 | 1,0 | 1217 |
| Zeer slecht tot redelijk | 40,9 | 28,7 | 26,9 | 2,5 | ,3 | ,7 | 867 |
| Totaal | 49,6 | 22,6 | 22,7 | 3,8 | ,4 | ,8 | 2084 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | | | | |
| Nooit gerookt | 52,9 | 21,3 | 22,3 | 2,7 | ,3 | ,6 | 1019 |
| Vroeger gerookt | 41,6 | 24,7 | 25,0 | 7,6 | ,7 | ,5 | 574 |
| Matige roker (< 20) | 52,1 | 17,4 | 24,8 | 3,5 | ,9 | 1,2 | 342 |
| Zware roker | 50,1 | 28,7 | 17,3 | 1,2 | ,8 | 1,9 | 170 |
| Totaal | 49,6 | 22,4 | 22,7 | 3,8 | ,5 | ,8 | 2105 |

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

1 Klacht of ziekte

2 Diagnostisch of preventief onderzoek

3 Behandeling of voorschrift

4 Resultaat van onderzoek

5 Administratieve reden

6 Doorverwezen of om een andere reden

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP06)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | REDEN VOOR HET CONTACT MET DE HUISARTS | | | | | | Totaal |
|---------------------------------|--|------|------|-----|-----|-----|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N (*) |
| | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | | | | |
| Man | 45,4 | 24,4 | 24,7 | 3,5 | 1,1 | ,9 | 720 |
| Vrouw | 45,6 | 23,7 | 26,1 | 2,2 | ,7 | 1,6 | 987 |
| Totaal | 45,6 | 24,0 | 25,6 | 2,7 | ,9 | 1,3 | 1707 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | | | | |
| 0-14 | 75,4 | 15,1 | 7,1 | ,0 | ,0 | 2,5 | 154 |
| 15-24 | 60,7 | 13,8 | 24,6 | ,0 | ,9 | ,0 | 111 |
| 25-34 | 67,2 | 17,3 | 10,9 | 1,2 | 2,5 | ,9 | 169 |
| 35-44 | 59,4 | 11,8 | 21,1 | 3,9 | ,4 | 3,3 | 213 |
| 45-54 | 44,9 | 24,1 | 23,0 | 6,5 | 1,5 | ,0 | 252 |
| 55-64 | 30,2 | 24,2 | 41,1 | 4,0 | ,4 | ,2 | 217 |
| 65-74 | 26,2 | 26,9 | 40,6 | 4,3 | 1,1 | ,9 | 280 |
| 75 + | 20,2 | 47,2 | 29,7 | ,0 | ,1 | 2,7 | 311 |
| Totaal | 45,6 | 24,0 | 25,6 | 2,7 | ,9 | 1,3 | 1707 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | |
| Geen diploma | 50,8 | 16,5 | 28,3 | 2,7 | 1,7 | ,0 | 131 |
| Lager | 38,3 | 32,6 | 24,0 | 3,2 | ,2 | 1,8 | 259 |
| Lager secundair | 38,0 | 25,7 | 33,7 | 1,5 | ,9 | ,2 | 320 |
| Hoger secundair | 38,0 | 27,0 | 30,7 | 2,2 | ,6 | 1,6 | 397 |
| Hoger | 58,0 | 18,5 | 17,0 | 3,5 | ,8 | 2,2 | 496 |
| Totaal | 45,5 | 23,8 | 25,9 | 2,7 | ,8 | 1,4 | 1603 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | |
| < 20.000 | 65,0 | 15,5 | 15,8 | 2,7 | 1,0 | ,0 | 163 |
| 20.000-30.000 | 38,2 | 22,6 | 35,0 | 2,4 | ,6 | 1,2 | 406 |
| 30.000-40.000 | 43,2 | 28,2 | 23,2 | 3,3 | 1,0 | 1,1 | 398 |
| 40.000-60.000 | 51,8 | 18,8 | 26,6 | 1,2 | ,2 | 1,5 | 415 |
| >60.000 | 42,1 | 30,7 | 19,0 | 4,2 | 1,5 | 2,4 | 236 |
| Totaal | 45,9 | 23,5 | 25,8 | 2,7 | ,8 | 1,3 | 1618 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 50,3 | 21,6 | 23,3 | 2,3 | ,8 | 1,7 | 693 |
| Zeer slecht tot redelijk | 31,4 | 27,7 | 34,7 | 4,4 | 1,1 | ,7 | 677 |
| Totaal | 41,6 | 24,4 | 28,5 | 3,3 | ,9 | 1,3 | 1370 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | | | | |
| Nooit gerookt | 39,6 | 25,3 | 31,4 | 1,5 | ,7 | 1,6 | 572 |
| Vroeger gerookt | 33,1 | 28,5 | 32,9 | 3,8 | ,6 | 1,0 | 400 |
| Matige roker (< 20) | 47,2 | 27,8 | 17,7 | 5,9 | 1,2 | ,2 | 251 |
| Zware roker | 52,8 | 13,1 | 28,6 | 2,7 | 1,7 | 1,0 | 156 |
| Totaal | 40,9 | 25,2 | 28,9 | 3,0 | ,9 | 1,1 | 1379 |

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

1 Klacht of ziekte

2 Diagnostisch of preventief onderzoek

3 Behandeling of voorschrift

4 Resultaat van onderzoek

5 Administratieve reden

6 Doorverwezen of om een andere reden

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP06)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | REDEN VOOR HET CONTACT MET DE HUISARTS | | | | | | Totaal N (*) |
|---------------------------------|--|------|------|-----|-----|-----|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | | | | |
| Man | 48,0 | 20,2 | 26,8 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 1164 |
| Vrouw | 43,8 | 21,5 | 29,4 | 2,8 | ,8 | 1,6 | 1562 |
| Totaal | 45,5 | 21,0 | 28,3 | 2,6 | 1,1 | 1,4 | 2726 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | | | | |
| 0-14 | 76,7 | 12,4 | 8,2 | ,2 | ,1 | 2,5 | 335 |
| 15-24 | 70,8 | 14,7 | 9,2 | 2,2 | 1,0 | 2,1 | 184 |
| 25-34 | 59,7 | 19,5 | 14,0 | 1,0 | 2,6 | 3,1 | 268 |
| 35-44 | 49,6 | 12,8 | 31,8 | 3,5 | 1,7 | ,6 | 365 |
| 45-54 | 43,4 | 17,0 | 33,1 | 3,1 | 2,3 | 1,1 | 298 |
| 55-64 | 35,1 | 26,6 | 32,3 | 4,3 | ,4 | 1,3 | 327 |
| 65-74 | 28,4 | 26,2 | 40,4 | 3,4 | ,8 | ,9 | 531 |
| 75 + | 13,6 | 37,8 | 45,5 | 2,1 | ,2 | ,7 | 418 |
| Totaal | 45,5 | 21,0 | 28,3 | 2,6 | 1,1 | 1,4 | 2726 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | |
| Geen diploma | 53,1 | 13,6 | 30,3 | 2,4 | ,0 | ,6 | 135 |
| Lager | 29,9 | 17,3 | 47,5 | 4,1 | ,3 | ,9 | 555 |
| Lager secundair | 44,1 | 26,4 | 25,7 | 2,8 | ,8 | ,3 | 563 |
| Hoger secundair | 47,5 | 22,7 | 23,7 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 750 |
| Hoger | 52,0 | 19,1 | 23,8 | 1,9 | ,8 | 2,3 | 646 |
| Totaal | 45,6 | 21,1 | 28,4 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 2649 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | |
| < 20.000 | 45,9 | 16,9 | 27,4 | 3,6 | 1,8 | 4,4 | 202 |
| 20.000-30.000 | 47,2 | 15,8 | 31,6 | 3,4 | ,9 | ,9 | 630 |
| 30.000-40.000 | 41,0 | 25,3 | 29,7 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 750 |
| 40.000-60.000 | 46,7 | 22,6 | 26,6 | 2,1 | 1,1 | ,8 | 847 |
| >60.000 | 46,9 | 18,0 | 26,6 | 4,4 | 1,0 | 3,2 | 205 |
| Totaal | 45,2 | 21,1 | 28,6 | 2,6 | 1,2 | 1,3 | 2634 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 45,5 | 26,6 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1034 |
| Zeer slecht tot redelijk | 36,7 | 17,6 | 40,6 | 3,5 | ,6 | 1,0 | 1167 |
| Totaal | 41,2 | 22,2 | 30,8 | 3,0 | 1,3 | 1,4 | 2201 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | | | | |
| Nooit gerookt | 41,6 | 19,6 | 33,0 | 3,1 | ,8 | 1,8 | 1025 |
| Vroeger gerookt | 34,2 | 26,6 | 32,5 | 3,6 | 1,7 | 1,4 | 608 |
| Matige roker (< 20) | 54,3 | 20,1 | 21,4 | 2,8 | 1,4 | ,1 | 373 |
| Zware roker | 36,0 | 28,2 | 29,8 | 2,1 | 2,5 | 1,4 | 239 |
| Totaal | 41,0 | 22,6 | 30,6 | 3,1 | 1,3 | 1,4 | 2245 |

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

1 Klacht of ziekte

2 Diagnostisch of preventief onderzoek

3 Behandeling of voorschrift

4 Resultaat van onderzoek

5 Administratieve reden

6 Doorverwezen of om een andere reden

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP07R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | BELANGRIJKSTE KLACHT/ZIEKTE/ONDERZOEK WAARVOOR HUISARTS GECONSULTEERD WERD | | | | | | | | | | Totaal |
|--------------------------|--|----------------------|---------------|-----------|----------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|--------|
| | Respiratoir | Cardio- vasculair | Locomotorisch | Digestief | Genito-urinair | Endocrien/ metabool | Dermatologisch | Psychosociaal | Neurologisch | Ander of algemeen | N (**) |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| GESLACHT | | | | | | | | | | | |
| Man | 33,0 | 15,6 | 17,4 | 6,1 | 2,6 | 4,7 | 5,3 | 4,8 | 3,0 | 7,5 | 2513 |
| Vrouw | 27,0 | 17,9 | 14,4 | 7,6 | 8,6 | 5,6 | 3,4 | 4,1 | 3,4 | 8,2 | 3406 |
| Totaal | 29,5 | 16,9 | 15,7 | 7,0 | 6,1 | 5,2 | 4,2 | 4,4 | 3,2 | 7,9 | 5919 |
| LEEFTIJDSGROEP | | | | | | | | | | | |
| 0-14 | 61,2 | ,8 | 2,4 | 7,5 | 3,2 | ,5 | 7,2 | ,7 | 2,8 | 13,8 | 710 |
| 15-24 | 31,1 | 1,6 | 15,1 | 11,7 | 11,5 | 1,2 | 8,0 | 5,8 | 3,9 | 10,0 | 492 |
| 25-34 | 32,3 | 3,3 | 19,3 | 9,0 | 14,0 | 2,3 | 4,2 | 2,9 | 4,5 | 8,1 | 703 |
| 35-44 | 28,5 | 12,5 | 16,0 | 6,1 | 3,6 | 5,7 | 4,0 | 10,1 | 5,2 | 8,3 | 776 |
| 45-54 | 22,2 | 15,6 | 22,4 | 8,6 | 6,7 | 8,3 | 2,5 | 5,7 | 3,1 | 5,0 | 775 |
| 55-64 | 19,1 | 27,3 | 23,2 | 3,9 | 3,3 | 8,8 | 2,4 | 2,0 | 3,2 | 6,8 | 757 |
| 65-74 | 21,0 | 38,5 | 14,2 | 4,6 | 3,2 | 7,2 | 3,1 | ,4 | 3,2 | 4,6 | 1000 |
| 75 + | 15,5 | 50,8 | 7,5 | 2,7 | 1,1 | 8,2 | 1,8 | 3,5 | 2,0 | 6,8 | 706 |
| Totaal | 29,5 | 16,9 | 15,7 | 7,0 | 6,1 | 5,2 | 4,2 | 4,4 | 3,2 | 7,9 | 5919 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | | | | | |
| Geen diploma | 20,5 | 25,8 | 20,5 | 9,5 | 5,6 | 4,0 | 1,3 | 3,8 | 3,4 | 5,7 | 294 |
| Lager | 21,0 | 23,3 | 15,4 | 4,9 | 6,7 | 6,8 | 2,6 | 8,8 | 2,6 | 7,9 | 1049 |
| Lager secundair | 23,5 | 21,9 | 19,0 | 6,3 | 3,9 | 5,3 | 4,7 | 7,1 | 2,2 | 6,1 | 1197 |
| Hoger secundair | 32,5 | 15,4 | 14,0 | 7,1 | 6,9 | 6,0 | 4,0 | 3,4 | 3,2 | 7,4 | 1601 |
| Hoger | 35,4 | 11,2 | 15,3 | 7,6 | 6,0 | 3,4 | 5,3 | 1,4 | 4,3 | 10,0 | 1556 |
| Totaal | 29,3 | 17,1 | 15,9 | 6,8 | 5,9 | 5,1 | 4,2 | 4,4 | 3,2 | 7,9 | 5697 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | | | | | |
| < 20.000 | 22,5 | 23,6 | 16,4 | 9,3 | 1,9 | 7,7 | 5,3 | 2,5 | 4,6 | 6,1 | 414 |
| 20.000-30.000 | 23,8 | 19,0 | 15,2 | 8,3 | 7,9 | 5,3 | 3,4 | 6,3 | 2,7 | 8,1 | 1336 |
| 30.000-40.000 | 26,3 | 21,0 | 14,5 | 6,3 | 5,7 | 7,2 | 3,9 | 5,4 | 2,8 | 7,0 | 1549 |
| 40.000-60.000 | 35,9 | 13,0 | 16,9 | 6,1 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | 2,9 | 8,0 | 1749 |
| >60.000 | 32,4 | 12,7 | 15,5 | 7,6 | 9,7 | 3,8 | 4,0 | 2,3 | 4,4 | 7,6 | 644 |
| Totaal | 29,6 | 17,0 | 15,7 | 7,0 | 6,1 | 5,3 | 4,2 | 4,5 | 3,1 | 7,6 | 5692 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 28,6 | 14,4 | 16,9 | 7,4 | 9,2 | 5,1 | 5,0 | 3,1 | 3,0 | 7,4 | 2556 |
| Zeer slecht tot redelijk | 20,0 | 26,2 | 18,7 | 6,0 | 3,4 | 6,3 | 2,6 | 7,3 | 2,8 | 6,6 | 2242 |
| Totaal | 25,0 | 19,4 | 17,6 | 6,8 | 6,7 | 5,6 | 4,0 | 4,9 | 2,9 | 7,1 | 4798 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | | | | | | | | |
| Nooit gerookt | 23,4 | 19,8 | 18,3 | 6,8 | 6,4 | 5,6 | 3,2 | 5,0 | 2,9 | 8,5 | 2210 |
| Vroeger gerookt | 25,9 | 23,4 | 14,4 | 7,2 | 8,4 | 6,7 | 2,7 | 2,5 | 3,4 | 5,3 | 1323 |
| Matige roker (< 20) | 33,5 | 12,7 | 18,4 | 8,4 | 5,8 | 4,1 | 5,4 | 3,9 | 1,6 | 6,3 | 836 |
| Zware roker | 18,5 | 16,5 | 20,7 | 3,7 | 5,6 | 7,4 | 6,4 | 11,5 | 4,2 | 5,4 | 494 |
| Totaal | 25,0 | 19,2 | 17,6 | 6,8 | 6,7 | 5,9 | 3,8 | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 4863 |
| VERBLIJFPLAATS (gewest) | | | | | | | | | | | |
| Vlaams Gewest | 27,3 | 17,4 | 17,6 | 6,8 | 7,4 | 4,9 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 6,5 | 2276 |
| Brussels Gewest | 31,5 | 19,3 | 10,6 | 8,0 | 4,5 | 7,4 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 8,6 | 1438 |
| Waaals Gewest | 33,2 | 15,3 | 13,3 | 7,1 | 3,9 | 5,2 | 4,0 | 5,1 | 2,5 | 10,3 | 2205 |
| België | 29,5 | 16,9 | 15,7 | 7,0 | 6,1 | 5,2 | 4,2 | 4,4 | 3,2 | 7,9 | 5919 |
| ----- | | | | | | | | | | | |

(*) Algemeen lichamelijk onderzoek niet inbegrepen

(**) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP07R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | BELANGRIJKSTE KLACHT/ZIEKTE/ONDERZOEK WAARVOOR HUISARTS GECONSULTEERD WERD | | | | | | | | | | Totaal |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------|------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|
| | Respiratoir | Cardio- vasculair | Locomotorisch | Digestief | Genito-urinair | Endocrien/ metabool | Dermatologisch | Psychosociaal | Neurologisch | Ander of algemeen | N (**) |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | | | | | | | | |
| Man | 29,8 | 17,7 | 19,5 | 5,9 | 2,2 | 4,7 | 5,4 | 5,1 | 3,2 | 6,6 | 946 |
| Vrouw | 25,5 | 17,3 | 16,2 | 7,4 | 11,2 | 5,1 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | 6,5 | 1330 |
| Totaal | 27,3 | 17,4 | 17,6 | 6,8 | 7,4 | 4,9 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 6,5 | 2276 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | | | | | | | | |
| 0-14 | 63,4 | ,8 | 2,5 | 7,2 | 3,0 | ,6 | 7,0 | ,9 | 3,5 | 11,2 | 254 |
| 15-24 | 21,8 | ,6 | 19,3 | 12,0 | 14,5 | ,3 | 9,4 | 7,4 | 3,8 | 11,0 | 216 |
| 25-34 | 29,7 | 2,8 | 23,6 | 9,0 | 16,9 | 1,5 | 4,3 | 2,2 | 4,4 | 5,5 | 303 |
| 35-44 | 26,7 | 13,9 | 12,4 | 6,7 | 4,9 | 8,7 | 4,9 | 7,9 | 6,1 | 7,8 | 241 |
| 45-54 | 22,3 | 12,6 | 26,8 | 8,0 | 8,9 | 7,0 | 1,9 | 6,7 | 3,5 | 2,3 | 295 |
| 55-64 | 18,0 | 30,3 | 23,5 | 3,8 | 3,5 | 9,8 | 2,7 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 331 |
| 65-74 | 22,2 | 46,6 | 15,4 | 2,2 | 1,1 | 2,8 | 3,8 | 1,4 | ,2 | 4,3 | 385 |
| 75 + | 6,6 | 54,6 | 5,7 | 2,5 | 1,4 | 10,1 | 2,7 | 3,8 | 2,5 | 10,1 | 251 |
| Totaal | 27,3 | 17,4 | 17,6 | 6,8 | 7,4 | 4,9 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 6,5 | 2276 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | | | | | |
| Geen diploma | 25,4 | 36,4 | 12,1 | 1,3 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 11,7 | 1,8 | 4,9 | 52 |
| Lager | 18,1 | 24,7 | 18,7 | 4,3 | 9,5 | 4,4 | 2,8 | 6,1 | 2,4 | 8,9 | 445 |
| Lager secundair | 18,9 | 20,9 | 21,1 | 7,2 | 3,9 | 5,8 | 6,3 | 8,4 | 2,5 | 5,2 | 469 |
| Hoger secundair | 33,0 | 16,3 | 14,6 | 6,7 | 8,7 | 6,0 | 3,8 | 3,1 | 3,0 | 5,0 | 651 |
| Hoger | 31,3 | 11,7 | 19,0 | 7,6 | 6,9 | 3,3 | 5,5 | ,5 | 5,7 | 8,4 | 598 |
| Totaal | 27,0 | 17,6 | 17,9 | 6,6 | 7,1 | 4,8 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 6,6 | 2215 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | | | | | |
| < 20.000 | 20,4 | 39,7 | 13,0 | 1,5 | 2,1 | 10,5 | 7,0 | 3,3 | 1,0 | 1,5 | 93 |
| 20.000-30.000 | 18,5 | 23,0 | 17,9 | 8,7 | 9,4 | 3,9 | 4,7 | 5,4 | 2,6 | 5,9 | 496 |
| 30.000-40.000 | 24,4 | 18,3 | 13,9 | 6,6 | 7,7 | 9,0 | 4,2 | 5,5 | 3,7 | 6,7 | 610 |
| 40.000-60.000 | 33,5 | 13,0 | 20,3 | 7,0 | 4,8 | 3,0 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | 6,6 | 699 |
| >60.000 | 33,9 | 11,7 | 18,4 | 5,5 | 11,7 | 3,3 | 3,5 | 1,4 | 3,6 | 7,1 | 286 |
| Totaal | 27,4 | 17,5 | 17,6 | 6,8 | 7,4 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,2 | 6,3 | 2184 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 26,3 | 13,8 | 18,3 | 7,0 | 11,4 | 5,1 | 5,9 | 3,3 | 3,0 | 5,9 | 1118 |
| Zeer slecht tot redelijk | 17,2 | 29,2 | 21,1 | 5,7 | 3,6 | 6,0 | 2,3 | 6,6 | 2,5 | 6,0 | 784 |
| Totaal | 22,7 | 19,9 | 19,4 | 6,5 | 8,3 | 5,4 | 4,4 | 4,6 | 2,8 | 5,9 | 1902 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | | | | | | | | |
| Nooit gerookt | 21,4 | 19,8 | 20,8 | 5,9 | 7,4 | 4,5 | 3,9 | 5,4 | 3,1 | 7,8 | 928 |
| Vroeger gerookt | 25,4 | 23,6 | 13,5 | 7,9 | 11,4 | 7,7 | 2,4 | ,8 | 3,0 | 4,5 | 526 |
| Matige roker (< 20) | 30,2 | 10,6 | 21,7 | 9,7 | 6,4 | 4,2 | 7,5 | 3,8 | 1,6 | 4,3 | 314 |
| Zware roker | 14,0 | 22,1 | 25,2 | 3,9 | 6,9 | 6,8 | 6,2 | 9,7 | 3,3 | 1,8 | 155 |
| Totaal | 22,9 | 19,7 | 19,5 | 6,7 | 8,2 | 5,5 | 4,3 | 4,5 | 2,9 | 5,7 | 1923 |

(*) Algemeen lichamelijk onderzoek niet inbegrepen

(**) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP07R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | BELANGRIJKSTE KLACHT/ZIEKTE/ONDERZOEK WAARVOOR HUISARTS GECONSULTEERD WERD | | | | | | | | | | Totaal |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------|------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|
| | Respiratoir | Cardio- vasculair | Locomotorisch | Digestief | Genito-urinair | Endocrien/ metabool | Dermatologisch | Psychosociaal | Neurologisch | Ander of algemeen | N (**) |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | | | | | | | | |
| Man | 36,2 | 17,4 | 11,0 | 10,0 | 2,4 | 5,4 | 2,9 | 3,4 | 5,3 | 6,0 | 614 |
| Vrouw | 28,2 | 20,5 | 10,3 | 6,7 | 5,9 | 8,7 | 1,6 | 4,4 | 3,1 | 10,4 | 824 |
| Totaal | 31,5 | 19,3 | 10,6 | 8,0 | 4,5 | 7,4 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 8,6 | 1438 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | | | | | | | | |
| 0-14 | 76,7 | ,0 | 1,7 | 6,6 | 1,2 | ,2 | ,8 | ,0 | 2,9 | 9,9 | 133 |
| 15-24 | 36,4 | 2,1 | 11,8 | 12,3 | 7,6 | 1,0 | 8,9 | 3,9 | 5,3 | 10,6 | 103 |
| 25-34 | 29,1 | 5,0 | 12,3 | 10,1 | 9,7 | 4,5 | 1,8 | 7,3 | 5,6 | 14,7 | 156 |
| 35-44 | 33,8 | 10,0 | 17,2 | 7,6 | 2,7 | 3,4 | 1,1 | 8,9 | 5,1 | 10,1 | 195 |
| 45-54 | 24,9 | 13,8 | 13,7 | 9,5 | 7,9 | 12,2 | 1,1 | 5,1 | 5,5 | 6,2 | 228 |
| 55-64 | 20,6 | 33,7 | 11,4 | 4,7 | 3,8 | 7,1 | 1,9 | 2,8 | 5,6 | 8,2 | 182 |
| 65-74 | 15,2 | 46,1 | 6,6 | 7,8 | 1,0 | 14,7 | 2,1 | 1,4 | ,7 | 4,3 | 226 |
| 75 + | 22,4 | 42,3 | 8,7 | 4,9 | ,7 | 12,1 | ,3 | 1,9 | 1,0 | 5,8 | 215 |
| Totaal | 31,5 | 19,3 | 10,6 | 8,0 | 4,5 | 7,4 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 8,6 | 1438 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | | | | | |
| Geen diploma | 28,4 | 28,5 | 9,7 | 12,5 | 5,3 | 6,1 | 1,3 | ,6 | 3,1 | 4,5 | 125 |
| Lager | 18,3 | 24,7 | 13,6 | 8,3 | 1,1 | 9,9 | 1,5 | 5,3 | 8,1 | 9,1 | 213 |
| Lager secundair | 27,2 | 19,5 | 14,7 | 4,9 | 3,3 | 9,5 | 1,0 | 7,6 | 5,7 | 6,6 | 273 |
| Hoger secundair | 37,0 | 19,0 | 7,7 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 3,9 | 1,8 | 3,8 | 9,7 | 331 |
| Hoger | 34,4 | 15,2 | 10,0 | 10,4 | 5,2 | 5,4 | 2,3 | 4,3 | 2,7 | 10,1 | 406 |
| Totaal | 31,0 | 19,8 | 10,6 | 8,0 | 4,5 | 7,0 | 2,3 | 3,9 | 4,3 | 8,5 | 1348 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | | | | | |
| < 20.000 | 25,1 | 10,8 | 15,9 | 17,9 | 2,5 | 3,8 | 3,3 | 1,0 | 5,6 | 14,1 | 145 |
| 20.000-30.000 | 35,3 | 22,0 | 7,8 | 7,3 | 5,7 | 6,7 | 1,2 | 4,0 | 3,8 | 6,2 | 343 |
| 30.000-40.000 | 32,7 | 20,6 | 13,6 | 5,1 | 1,6 | 11,8 | ,9 | 4,8 | 3,0 | 5,8 | 342 |
| 40.000-60.000 | 33,8 | 17,9 | 8,0 | 4,5 | 6,5 | 6,2 | 3,4 | 5,1 | 4,7 | 9,9 | 346 |
| >60.000 | 25,2 | 17,9 | 10,6 | 13,4 | 5,6 | 7,6 | 2,4 | 4,2 | 3,8 | 9,3 | 195 |
| Totaal | 31,7 | 18,8 | 10,5 | 8,3 | 4,6 | 7,6 | 2,1 | 4,1 | 4,0 | 8,3 | 1371 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 29,0 | 18,3 | 13,0 | 9,4 | 7,3 | 5,5 | 3,8 | 2,7 | 2,3 | 8,7 | 597 |
| Zeer slecht tot redelijk | 21,3 | 28,9 | 9,9 | 5,9 | 2,5 | 9,7 | 1,1 | 7,7 | 6,1 | 6,9 | 559 |
| Totaal | 25,5 | 23,1 | 11,6 | 7,8 | 5,1 | 7,4 | 2,6 | 5,0 | 4,0 | 7,9 | 1156 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | | | | | | | | |
| Nooit gerookt | 20,8 | 25,2 | 9,5 | 8,5 | 5,2 | 11,5 | 2,7 | 1,8 | 4,6 | 10,1 | 481 |
| Vroeger gerookt | 24,2 | 29,8 | 13,9 | 7,3 | 7,0 | 5,8 | ,7 | 3,1 | 4,4 | 3,8 | 334 |
| Matige roker (< 20) | 35,1 | 19,9 | 13,3 | 7,7 | 3,5 | 2,1 | 3,5 | 6,9 | 2,0 | 6,0 | 212 |
| Zware roker | 24,8 | 10,9 | 13,3 | 6,6 | 1,7 | 7,0 | 4,1 | 16,1 | 5,8 | 9,5 | 136 |
| Totaal | 24,9 | 23,6 | 11,7 | 7,8 | 4,9 | 7,7 | 2,5 | 4,8 | 4,2 | 7,7 | 1163 |

(*) Algemeen lichamelijk onderzoek niet inbegrepen

(**) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP07R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | BELANGRIJKSTE KLACHT/ZIEKTE/ONDERZOEK WAARVOOR HUISARTS GECONSULTEERD WERD | | | | | | | | | | Totaal |
|--------------------------|--|----------------------|---------------|-----------|----------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|--------|
| | Respiratoir | Cardio- vasculair | Locomotorisch | Digestief | Genito-urinair | Endocrien/ metabool | Dermatologisch | Psychosociaal | Neurologisch | Ander of algemeen | N (**) |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | | | | | | | | |
| Man | 38,0 | 11,2 | 15,0 | 5,7 | 3,5 | 4,7 | 5,6 | 4,5 | 2,3 | 9,5 | 953 |
| Vrouw | 29,6 | 18,4 | 12,1 | 8,2 | 4,2 | 5,6 | 2,8 | 5,6 | 2,7 | 10,9 | 1252 |
| Totaal | 33,2 | 15,3 | 13,3 | 7,1 | 3,9 | 5,2 | 4,0 | 5,1 | 2,5 | 10,3 | 2205 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | | | | | | | | |
| 0-14 | 55,1 | ,9 | 2,2 | 8,3 | 3,8 | ,5 | 8,6 | ,5 | 1,7 | 18,4 | 323 |
| 15-24 | 51,1 | 4,0 | 6,3 | 11,0 | 5,5 | 3,5 | 4,6 | 2,4 | 3,8 | 7,7 | 173 |
| 25-34 | 39,7 | 4,2 | 10,4 | 8,6 | 7,8 | 3,6 | 4,9 | 3,6 | 4,4 | 12,8 | 244 |
| 35-44 | 30,4 | 10,8 | 21,4 | 4,8 | 1,7 | 1,6 | 3,1 | 13,7 | 3,8 | 8,7 | 340 |
| 45-54 | 21,1 | 23,0 | 15,2 | 9,4 | 1,5 | 9,8 | 4,1 | 3,6 | 1,4 | 10,9 | 252 |
| 55-64 | 21,6 | 17,5 | 25,5 | 3,8 | 2,6 | 6,5 | 1,6 | 3,5 | 3,6 | 13,9 | 244 |
| 65-74 | 20,7 | 24,9 | 14,2 | 7,4 | 6,8 | 12,0 | 2,4 | 6,0 | ,6 | 5,1 | 389 |
| 75 + | 25,9 | 48,6 | 9,8 | 2,2 | ,9 | 3,8 | 1,2 | 3,6 | 1,6 | 2,3 | 240 |
| Totaal | 33,2 | 15,3 | 13,3 | 7,1 | 3,9 | 5,2 | 4,0 | 5,1 | 2,5 | 10,3 | 2205 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | | | | | |
| Geen diploma | 13,1 | 17,2 | 31,7 | 13,6 | 8,0 | 3,9 | 1,1 | ,0 | 4,7 | 6,8 | 117 |
| Lager | 27,2 | 20,3 | 9,3 | 5,2 | 2,3 | 10,9 | 2,5 | 14,9 | 1,8 | 5,7 | 391 |
| Lager secundair | 32,1 | 24,4 | 15,8 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,5 | 4,5 | ,8 | 7,7 | 455 |
| Hoger secundair | 30,6 | 12,8 | 14,1 | 8,5 | 3,1 | 6,1 | 4,7 | 4,5 | 3,4 | 12,2 | 619 |
| Hoger | 43,1 | 9,5 | 9,9 | 6,9 | 4,7 | 3,2 | 5,6 | 2,3 | 2,1 | 12,8 | 552 |
| Totaal | 33,2 | 15,5 | 13,5 | 7,0 | 4,0 | 5,2 | 4,0 | 5,1 | 2,3 | 10,2 | 2134 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | | | | | |
| < 20.000 | 23,8 | 11,6 | 20,2 | 14,3 | 1,5 | 6,3 | 4,2 | 2,2 | 8,0 | 7,9 | 176 |
| 20.000-30.000 | 30,8 | 10,2 | 12,0 | 7,9 | 5,7 | 7,7 | 1,4 | 8,8 | 2,6 | 13,0 | 497 |
| 30.000-40.000 | 28,0 | 25,4 | 15,6 | 6,1 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 5,4 | 1,3 | 7,6 | 597 |
| 40.000-60.000 | 40,8 | 12,2 | 12,3 | 4,9 | 4,1 | 5,4 | 5,2 | 3,5 | 1,4 | 10,2 | 704 |
| >60.000 | 30,8 | 13,6 | 7,0 | 12,3 | 4,2 | 3,7 | 7,0 | 4,9 | 7,7 | 8,7 | 163 |
| Totaal | 33,1 | 15,4 | 13,4 | 7,1 | 4,0 | 5,3 | 4,1 | 5,2 | 2,6 | 9,8 | 2137 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 33,9 | 14,6 | 14,6 | 8,0 | 4,3 | 5,1 | 3,1 | 2,6 | 3,1 | 10,7 | 841 |
| Zeer slecht tot redelijk | 24,5 | 20,6 | 16,7 | 6,5 | 3,5 | 6,1 | 3,6 | 8,3 | 2,6 | 7,5 | 899 |
| Totaal | 29,4 | 17,5 | 15,6 | 7,3 | 3,9 | 5,5 | 3,4 | 5,4 | 2,8 | 9,2 | 1740 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | | | | | | | | |
| Nooit gerookt | 28,6 | 18,5 | 15,2 | 8,5 | 4,5 | 6,5 | 1,8 | 4,8 | 1,9 | 9,8 | 801 |
| Vroeger gerookt | 27,3 | 21,5 | 16,4 | 6,0 | 2,7 | 5,0 | 3,9 | 5,7 | 4,1 | 7,3 | 463 |
| Matige roker (< 20) | 38,9 | 14,5 | 14,1 | 6,1 | 5,5 | 4,4 | 2,0 | 3,1 | 1,5 | 9,9 | 310 |
| Zware roker | 25,0 | 8,0 | 14,6 | 2,8 | 4,1 | 8,4 | 7,2 | 13,6 | 5,3 | 10,9 | 203 |
| Totaal | 29,5 | 17,2 | 15,3 | 6,7 | 4,1 | 6,0 | 3,1 | 6,0 | 2,9 | 9,3 | 1777 |

(*) Algemeen lichamelijk onderzoek niet inbegrepen

(**) N = totaal aantal vermelde contacten

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP08R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | SOORT CONTACT MET DE HUISARTS(*) | | Totaal |
|---------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| | Consultatie | Huisbezoek | N (**) |
| | % | % | |
| GESLACHT | | | |
| Man | 69,5 | 30,5 | 2974 |
| Vrouw | 62,2 | 37,8 | 4134 |
| Totaal | 65,2 | 34,8 | 7108 |
| LEEFTIJDGROEP | | | |
| 0-14 | 66,1 | 33,9 | 771 |
| 15-24 | 82,2 | 17,8 | 540 |
| 25-34 | 82,5 | 17,5 | 753 |
| 35-44 | 76,0 | 24,0 | 864 |
| 45-54 | 76,1 | 23,9 | 886 |
| 55-64 | 67,5 | 32,5 | 939 |
| 65-74 | 44,2 | 55,8 | 1305 |
| 75 + | 16,6 | 83,4 | 1050 |
| Totaal | 65,2 | 34,8 | 7108 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 47,2 | 52,8 | 342 |
| Lager | 49,3 | 50,7 | 1344 |
| Lager secundair | 61,2 | 38,8 | 1452 |
| Hoger secundair | 68,0 | 32,0 | 1905 |
| Hoger | 74,9 | 25,1 | 1809 |
| Totaal | 64,8 | 35,2 | 6852 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 55,2 | 44,8 | 488 |
| 20.000-30.000 | 61,4 | 38,6 | 1609 |
| 30.000-40.000 | 61,1 | 38,9 | 1885 |
| 40.000-60.000 | 69,8 | 30,2 | 2084 |
| >60.000 | 74,7 | 25,3 | 753 |
| Totaal | 65,3 | 34,7 | 6819 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 74,0 | 26,0 | 3020 |
| Zeer slecht tot redelijk | 56,4 | 43,6 | 2812 |
| Totaal | 66,2 | 33,8 | 5832 |
| ROOKGEWOONTEN | | | |
| Nooit gerookt | 63,5 | 36,5 | 2710 |
| Vroeger gerookt | 64,2 | 35,8 | 1631 |
| Matige roker (< 20) | 70,3 | 29,7 | 989 |
| Zware roker | 72,6 | 27,4 | 581 |
| Totaal | 65,9 | 34,1 | 5911 |
| VERBLIJFPLAATS (gewest) | | | |
| Vlaams Gewest | 70,8 | 29,2 | 2528 |
| Brussels Gewest | 70,5 | 29,5 | 1729 |
| Waals Gewest | 54,9 | 45,1 | 2851 |
| België | 65,2 | 34,8 | 7108 |

(*) Enkel consultaties en huisbezoeken in aanmerking genomen

(**) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP08R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | SOORT CONTACT MET DE HUISARTS(*) | | Totaal |
|---------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| | Consultatie | Huisbezoek | N(**) |
| | % | % | |
| GESLACHT | | | |
| Man | 74,6 | 25,4 | 1046 |
| Vrouw | 68,1 | 31,9 | 1482 |
| Totaal | 70,8 | 29,2 | 2528 |
| LEEFTIJDSGROEP | | | |
| 0-14 | 67,3 | 32,7 | 266 |
| 15-24 | 87,2 | 12,8 | 220 |
| 25-34 | 85,8 | 14,2 | 320 |
| 35-44 | 82,1 | 17,9 | 263 |
| 45-54 | 80,5 | 19,5 | 327 |
| 55-64 | 75,1 | 24,9 | 382 |
| 65-74 | 42,8 | 57,2 | 441 |
| 75 + | 14,5 | 85,5 | 309 |
| Totaal | 70,8 | 29,2 | 2528 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 26,1 | 73,9 | 60 |
| Lager | 59,6 | 40,4 | 491 |
| Lager secundair | 68,7 | 31,3 | 550 |
| Hoger secundair | 71,4 | 28,6 | 728 |
| Hoger | 80,0 | 20,0 | 634 |
| Totaal | 70,5 | 29,5 | 2463 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 44,9 | 55,1 | 109 |
| 20.000-30.000 | 69,7 | 30,3 | 542 |
| 30.000-40.000 | 64,3 | 35,7 | 692 |
| 40.000-60.000 | 77,7 | 22,3 | 780 |
| >60.000 | 75,0 | 25,0 | 301 |
| Totaal | 70,7 | 29,3 | 2424 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 79,8 | 20,2 | 1238 |
| Zeer slecht tot redelijk | 62,6 | 37,4 | 887 |
| Totaal | 72,8 | 27,2 | 2125 |
| ROOKGEWOONTEN | | | |
| Nooit gerookt | 70,5 | 29,5 | 1033 |
| Vroeger gerookt | 69,2 | 30,8 | 588 |
| Matige roker (< 20) | 76,9 | 23,1 | 351 |
| Zware roker | 84,0 | 16,0 | 177 |
| Totaal | 72,8 | 27,2 | 2149 |

(*) Enkel consultaties en huisbezoeken in aanmerking genomen

(**) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP08R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | SOORT CONTACT MET DE HUISARTS (*) | | Totaal |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|
| | Consultatie | Huisbezoek | N(**) |
| | % | % | |
| GESLACHT | | | |
| Man | 77,6 | 22,4 | 723 |
| Vrouw | 65,9 | 34,1 | 1006 |
| Totaal | 70,5 | 29,5 | 1729 |
| LEEFTIJDSGROEP | | | |
| 0-14 | 79,6 | 20,4 | 154 |
| 15-24 | 87,0 | 13,0 | 118 |
| 25-34 | 85,9 | 14,1 | 165 |
| 35-44 | 86,3 | 13,7 | 216 |
| 45-54 | 92,3 | 7,7 | 253 |
| 55-64 | 66,2 | 33,8 | 218 |
| 65-74 | 50,7 | 49,3 | 290 |
| 75 + | 30,3 | 69,7 | 315 |
| Totaal | 70,5 | 29,5 | 1729 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 67,8 | 32,2 | 136 |
| Lager | 55,0 | 45,0 | 263 |
| Lager secundair | 70,9 | 29,1 | 322 |
| Hoger secundair | 68,1 | 31,9 | 395 |
| Hoger | 80,0 | 20,0 | 505 |
| Totaal | 70,4 | 29,6 | 1621 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 88,6 | 11,4 | 165 |
| 20.000-30.000 | 67,7 | 32,3 | 412 |
| 30.000-40.000 | 65,6 | 34,4 | 405 |
| 40.000-60.000 | 73,3 | 26,7 | 413 |
| >60.000 | 69,0 | 31,0 | 244 |
| Totaal | 71,0 | 29,0 | 1639 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 74,8 | 25,2 | 702 |
| Zeer slecht tot redelijk | 63,9 | 36,1 | 695 |
| Totaal | 69,7 | 30,3 | 1397 |
| ROOKGEWOONTEN | | | |
| Nooit gerookt | 61,0 | 39,0 | 591 |
| Vroeger gerookt | 72,0 | 28,0 | 406 |
| Matige roker (< 20) | 75,6 | 24,4 | 251 |
| Zware roker | 86,4 | 13,6 | 157 |
| Totaal | 69,3 | 30,7 | 1405 |

(*) Enkel consultaties en huisbezoeken in aanmerking genomen

(**) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP08R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | SOORT CONTACT MET DE HUISARTS (*) | | Totaal |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|
| | Consultatie | Huisbezoek | N(**) |
| | % | % | |
| GESLACHT | | | |
| Man | 59,4 | 40,6 | 1205 |
| Vrouw | 51,7 | 48,3 | 1646 |
| Totaal | 54,9 | 45,1 | 2851 |
| LEEFTIJDSGROEP | | | |
| 0-14 | 62,0 | 38,0 | 351 |
| 15-24 | 70,8 | 29,2 | 202 |
| 25-34 | 73,7 | 26,3 | 268 |
| 35-44 | 64,9 | 35,1 | 385 |
| 45-54 | 62,4 | 37,6 | 306 |
| 55-64 | 51,9 | 48,1 | 339 |
| 65-74 | 44,6 | 55,4 | 574 |
| 75 + | 14,4 | 85,6 | 426 |
| Totaal | 54,9 | 45,1 | 2851 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 51,1 | 48,9 | 146 |
| Lager | 32,4 | 67,6 | 590 |
| Lager secundair | 45,6 | 54,4 | 580 |
| Hoger secundair | 61,5 | 38,5 | 782 |
| Hoger | 65,9 | 34,1 | 670 |
| Totaal | 54,3 | 45,7 | 2768 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 53,9 | 46,1 | 214 |
| 20.000-30.000 | 44,9 | 55,1 | 655 |
| 30.000-40.000 | 55,6 | 44,4 | 788 |
| 40.000-60.000 | 56,8 | 43,2 | 891 |
| >60.000 | 77,0 | 23,0 | 208 |
| Totaal | 55,2 | 44,8 | 2756 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 61,9 | 38,1 | 1080 |
| Zeer slecht tot redelijk | 46,0 | 54,0 | 1230 |
| Totaal | 54,0 | 46,0 | 2310 |
| ROOKGEWOONTEN | | | |
| Nooit gerookt | 51,8 | 48,2 | 1086 |
| Vroeger gerookt | 54,3 | 45,7 | 637 |
| Matige roker (< 20) | 58,1 | 41,9 | 387 |
| Zware roker | 51,3 | 48,7 | 247 |
| Totaal | 53,4 | 46,6 | 2357 |

(*) Enkel consultaties en huisbezoeken in aanmerking genomen

(**) N = totaal aantal vermelde contacten

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP09R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | INITIATIEFNEMER VOOR HET CONTACT MET DE HUISARTS | | | Totaal |
|---------------------------------|---|----------|------------------|--------|
| | Persoon zelf | Huisarts | Ander persoon | N(*) |
| | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | |
| Man | 75,8 | 19,7 | 4,5 | 2955 |
| Vrouw | 73,2 | 22,9 | 3,9 | 4102 |
| Totaal | 74,3 | 21,6 | 4,1 | 7057 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | |
| 0-14 | 82,1 | 5,8 | 12,1 | 764 |
| 15-24 | 85,7 | 9,7 | 4,6 | 536 |
| 25-34 | 89,3 | 8,6 | 2,1 | 763 |
| 35-44 | 78,9 | 17,2 | 3,9 | 847 |
| 45-54 | 76,9 | 20,3 | 2,8 | 876 |
| 55-64 | 75,0 | 23,6 | 1,5 | 938 |
| 65-74 | 58,4 | 38,4 | 3,2 | 1293 |
| 75 + | 43,6 | 52,0 | 4,3 | 1040 |
| Totaal | 74,3 | 21,6 | 4,1 | 7057 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | |
| Geen diploma | 73,4 | 26,0 | ,6 | 339 |
| Lager | 59,3 | 38,3 | 2,4 | 1331 |
| Lager secundair | 70,2 | 24,7 | 5,1 | 1437 |
| Hoger secundair | 77,3 | 17,9 | 4,8 | 1881 |
| Hoger | 81,9 | 14,3 | 3,8 | 1805 |
| Totaal | 74,2 | 21,8 | 4,0 | 6793 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | |
| < 20.000 | 71,4 | 26,7 | 1,9 | 485 |
| 20.000-30.000 | 70,2 | 28,0 | 1,8 | 1598 |
| 30.000-40.000 | 73,1 | 20,2 | 6,7 | 1854 |
| 40.000-60.000 | 75,9 | 20,3 | 3,8 | 2076 |
| >60.000 | 81,2 | 15,0 | 3,8 | 746 |
| Totaal | 74,2 | 21,8 | 4,0 | 6759 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | |
| Goed tot zeer goed | 81,3 | 15,7 | 3,0 | 2977 |
| Zeer slecht tot redelijk | 66,1 | 32,5 | 1,4 | 2801 |
| Totaal | 74,6 | 23,1 | 2,3 | 5778 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | |
| Nooit gerookt | 73,2 | 24,5 | 2,3 | 2678 |
| Vroeger gerookt | 70,9 | 27,3 | 1,8 | 1628 |
| Matige roker (< 20) | 77,6 | 19,8 | 2,6 | 974 |
| Zware roker | 79,9 | 17,3 | 2,8 | 578 |
| Totaal | 74,2 | 23,6 | 2,3 | 5858 |
| VERBLIJFPLAATS (gewest) | | | | |
| Vlaams Gewest | 72,6 | 23,3 | 4,1 | 2553 |
| Brussels Gewest | 71,9 | 25,1 | 3,0 | 1696 |
| Waals Gewest | 77,6 | 17,9 | 4,5 | 2808 |
| België | 74,3 | 21,6 | 4,1 | 7057 |

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP09R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | INITIATIEFNEMER VOOR HET CONTACT MET DE HUISARTS | | | Totaal N(*) |
|---------------------------------|---|----------|------------------|----------------|
| | Persoon zelf | Huisarts | Ander persoon | |
| | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | |
| Man | 74,3 | 21,2 | 4,6 | 1055 |
| Vrouw | 71,4 | 24,8 | 3,7 | 1498 |
| Totaal | 72,6 | 23,3 | 4,1 | 2553 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | |
| 0-14 | 83,5 | 6,3 | 10,3 | 267 |
| 15-24 | 84,5 | 13,1 | 2,4 | 225 |
| 25-34 | 87,8 | 10,5 | 1,6 | 326 |
| 35-44 | 75,9 | 18,2 | 5,9 | 261 |
| 45-54 | 76,2 | 19,9 | 4,0 | 329 |
| 55-64 | 70,8 | 27,1 | 2,1 | 382 |
| 65-74 | 50,9 | 46,0 | 3,1 | 451 |
| 75 + | 32,6 | 62,7 | 4,8 | 312 |
| Totaal | 72,6 | 23,3 | 4,1 | 2553 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | |
| Geen diploma | 64,0 | 35,0 | 1,1 | 60 |
| Lager | 56,8 | 40,9 | 2,3 | 505 |
| Lager secundair | 68,3 | 27,3 | 4,4 | 550 |
| Hoger secundair | 76,5 | 18,0 | 5,5 | 725 |
| Hoger | 79,9 | 16,7 | 3,4 | 645 |
| Totaal | 72,4 | 23,5 | 4,1 | 2485 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | |
| < 20.000 | 54,2 | 45,8 | ,0 | 111 |
| 20.000-30.000 | 67,6 | 30,7 | 1,8 | 549 |
| 30.000-40.000 | 72,3 | 19,5 | 8,2 | 692 |
| 40.000-60.000 | 74,0 | 23,0 | 3,0 | 784 |
| >60.000 | 85,0 | 12,6 | 2,4 | 304 |
| Totaal | 72,7 | 23,5 | 3,8 | 2440 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | |
| Goed tot zeer goed | 80,8 | 16,8 | 2,5 | 1249 |
| Zeer slecht tot redelijk | 61,2 | 37,3 | 1,5 | 892 |
| Totaal | 72,8 | 25,1 | 2,1 | 2141 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | |
| Nooit gerookt | 71,2 | 27,0 | 1,8 | 1040 |
| Vroeger gerookt | 71,2 | 26,7 | 2,1 | 592 |
| Matige roker (< 20) | 76,7 | 21,4 | 1,9 | 354 |
| Zware roker | 75,4 | 21,1 | 3,5 | 178 |
| Totaal | 72,6 | 25,3 | 2,1 | 2164 |

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP09R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | INITIATIEFNEMER VOOR HET CONTACT MET DE HUISARTS | | | Totaal |
|---------------------------------|---|----------|------------------|--------|
| | Persoon zelf | Huisarts | Ander persoon | N(*) |
| | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | |
| Man | 74,2 | 23,2 | 2,7 | 717 |
| Vrouw | 70,4 | 26,4 | 3,2 | 979 |
| Totaal | 71,9 | 25,1 | 3,0 | 1696 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | |
| 0-14 | 83,4 | 6,2 | 10,4 | 145 |
| 15-24 | 83,7 | 13,5 | 2,8 | 117 |
| 25-34 | 88,6 | 9,6 | 1,8 | 167 |
| 35-44 | 84,8 | 13,6 | 1,6 | 209 |
| 45-54 | 81,7 | 14,7 | 3,6 | 247 |
| 55-64 | 64,0 | 35,0 | 1,0 | 222 |
| 65-74 | 60,6 | 37,8 | 1,6 | 280 |
| 75 + | 41,4 | 55,8 | 2,8 | 309 |
| Totaal | 71,9 | 25,1 | 3,0 | 1696 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | |
| Geen diploma | 59,3 | 40,7 | ,0 | 136 |
| Lager | 61,4 | 35,6 | 3,0 | 253 |
| Lager secundair | 73,9 | 21,5 | 4,6 | 317 |
| Hoger secundair | 69,4 | 28,6 | 2,0 | 381 |
| Hoger | 82,1 | 15,1 | 2,8 | 498 |
| Totaal | 71,8 | 25,6 | 2,6 | 1585 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | |
| < 20.000 | 83,6 | 16,4 | ,0 | 164 |
| 20.000-30.000 | 66,4 | 31,4 | 2,3 | 403 |
| 30.000-40.000 | 71,0 | 24,3 | 4,8 | 397 |
| 40.000-60.000 | 77,2 | 17,8 | 4,9 | 407 |
| >60.000 | 68,1 | 30,4 | 1,5 | 236 |
| Totaal | 71,9 | 25,1 | 3,0 | 1607 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | |
| Goed tot zeer goed | 79,4 | 18,9 | 1,8 | 689 |
| Zeer slecht tot redelijk | 60,8 | 37,2 | 2,0 | 687 |
| Totaal | 70,7 | 27,4 | 1,9 | 1376 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | |
| Nooit gerookt | 66,7 | 31,7 | 1,7 | 578 |
| Vroeger gerookt | 68,3 | 28,8 | 2,8 | 400 |
| Matige roker (< 20) | 74,6 | 24,2 | 1,2 | 246 |
| Zware roker | 87,9 | 10,8 | 1,3 | 156 |
| Totaal | 71,0 | 27,2 | 1,8 | 1380 |

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP09R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | INITIATIEFNEMER VOOR HET CONTACT MET DE HUISARTS | | | Totaal |
|---------------------------------|---|----------|------------------|--------|
| | Persoon zelf | Huisarts | Ander persoon | N(*) |
| | % | % | % | |
| GESLACHT | | | | |
| Man | 78,9 | 16,4 | 4,8 | 1183 |
| Vrouw | 76,8 | 18,9 | 4,3 | 1625 |
| Totaal | 77,6 | 17,9 | 4,5 | 2808 |
| LEEFTIJDGROEP | | | | |
| 0-14 | 80,1 | 5,1 | 14,8 | 352 |
| 15-24 | 88,9 | 1,2 | 10,0 | 194 |
| 25-34 | 93,0 | 3,7 | 3,3 | 270 |
| 35-44 | 82,6 | 16,2 | 1,2 | 377 |
| 45-54 | 77,2 | 22,8 | ,0 | 300 |
| 55-64 | 86,3 | 13,3 | ,4 | 334 |
| 65-74 | 66,9 | 29,5 | 3,6 | 562 |
| 75 + | 55,3 | 40,3 | 4,4 | 419 |
| Totaal | 77,6 | 17,9 | 4,5 | 2808 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | |
| Geen diploma | 85,1 | 14,4 | ,5 | 143 |
| Lager | 62,8 | 34,8 | 2,4 | 573 |
| Lager secundair | 72,9 | 20,5 | 6,6 | 570 |
| Hoger secundair | 80,6 | 15,3 | 4,2 | 775 |
| Hoger | 84,8 | 10,5 | 4,7 | 662 |
| Totaal | 77,7 | 18,0 | 4,3 | 2723 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | |
| < 20.000 | 84,0 | 11,6 | 4,4 | 210 |
| 20.000-30.000 | 76,1 | 22,1 | 1,9 | 646 |
| 30.000-40.000 | 74,6 | 20,6 | 4,9 | 765 |
| 40.000-60.000 | 78,8 | 16,3 | 4,9 | 885 |
| >60.000 | 76,8 | 13,8 | 9,4 | 206 |
| Totaal | 77,3 | 18,2 | 4,5 | 2712 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | |
| Goed tot zeer goed | 82,9 | 12,7 | 4,4 | 1039 |
| Zeer slecht tot redelijk | 74,2 | 24,8 | 1,0 | 1222 |
| Totaal | 78,6 | 18,7 | 2,7 | 2261 |
| ROOKGEWOONTEN | | | | |
| Nooit gerookt | 78,2 | 18,4 | 3,3 | 1060 |
| Vroeger gerookt | 71,0 | 28,0 | 1,1 | 636 |
| Matige roker (< 20) | 80,0 | 15,9 | 4,1 | 374 |
| Zware roker | 85,8 | 12,2 | 2,0 | 244 |
| Totaal | 77,6 | 19,7 | 2,7 | 2314 |

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP10R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | VERWIJZING NA CONTACT | | Totaal |
|---------------------------------|-----------------------|------|--------|
| | Ja | Neen | N(*) |
| | % | % | |
| GESLACHT | | | |
| Man | 3,4 | 96,6 | 2904 |
| Vrouw | 3,2 | 96,8 | 4067 |
| Totaal | 3,3 | 96,7 | 6971 |
| LEEFTIJDGROEP | | | |
| 0-14 | 1,3 | 98,7 | 775 |
| 15-24 | 4,2 | 95,8 | 528 |
| 25-34 | 3,6 | 96,4 | 761 |
| 35-44 | 4,0 | 96,0 | 843 |
| 45-54 | 4,5 | 95,5 | 864 |
| 55-64 | 4,2 | 95,8 | 930 |
| 65-74 | 1,8 | 98,2 | 1268 |
| 75 + | 2,1 | 97,9 | 1002 |
| Totaal | 3,3 | 96,7 | 6971 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 2,0 | 98,0 | 331 |
| Lager | 3,5 | 96,5 | 1309 |
| Lager secundair | 2,6 | 97,4 | 1419 |
| Hoger secundair | 2,5 | 97,5 | 1873 |
| Hoger | 4,8 | 95,2 | 1776 |
| Totaal | 3,3 | 96,7 | 6708 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 3,1 | 96,9 | 481 |
| 20.000-30.000 | 2,2 | 97,8 | 1580 |
| 30.000-40.000 | 2,9 | 97,1 | 1837 |
| 40.000-60.000 | 3,8 | 96,2 | 2049 |
| >60.000 | 4,8 | 95,2 | 741 |
| Totaal | 3,3 | 96,7 | 6688 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 3,7 | 96,3 | 2946 |
| Zeer slecht tot redelijk | 3,3 | 96,7 | 2756 |
| Totaal | 3,5 | 96,5 | 5702 |
| ROOKGEWOONTEN | | | |
| Nooit gerookt | 3,0 | 97,0 | 2650 |
| Vroeger gerookt | 4,4 | 95,6 | 1596 |
| Matige roker (< 20) | 3,8 | 96,2 | 958 |
| Zware roker | 4,2 | 95,8 | 568 |
| Totaal | 3,6 | 96,4 | 5772 |
| VERBLIJFPLAATS (gewest) | | | |
| Vlaams Gewest | 2,6 | 97,4 | 2532 |
| Brussels Gewest | 4,5 | 95,5 | 1654 |
| Waals Gewest | 4,2 | 95,8 | 2785 |
| België | 3,3 | 96,7 | 6971 |

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP10R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | VERWIJZING NA CONTACT | | Totaal |
|---------------------------------|-----------------------|------|--------|
| | Ja | Neen | N(*) |
| | % | % | |
| GESLACHT | | | |
| Man | 3,0 | 97,0 | 1039 |
| Vrouw | 2,3 | 97,7 | 1493 |
| Totaal | 2,6 | 97,4 | 2532 |
| LEEFTIJDSGROEP | | | |
| 0-14 | ,5 | 99,5 | 273 |
| 15-24 | 3,7 | 96,3 | 221 |
| 25-34 | 2,5 | 97,5 | 326 |
| 35-44 | 3,3 | 96,7 | 261 |
| 45-54 | 3,7 | 96,3 | 328 |
| 55-64 | 2,4 | 97,6 | 380 |
| 65-74 | 2,0 | 98,0 | 438 |
| 75 + | 1,7 | 98,3 | 305 |
| Totaal | 2,6 | 97,4 | 2532 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 2,6 | 97,4 | 54 |
| Lager | 3,9 | 96,1 | 495 |
| Lager secundair | 2,0 | 98,0 | 544 |
| Hoger secundair | 2,1 | 97,9 | 722 |
| Hoger | 3,1 | 96,9 | 649 |
| Totaal | 2,6 | 97,4 | 2464 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | ,4 | 99,6 | 110 |
| 20.000-30.000 | 1,6 | 98,4 | 543 |
| 30.000-40.000 | 2,3 | 97,7 | 684 |
| 40.000-60.000 | 2,7 | 97,3 | 777 |
| >60.000 | 4,8 | 95,2 | 306 |
| Totaal | 2,5 | 97,5 | 2420 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 3,3 | 96,7 | 1240 |
| Zeer slecht tot redelijk | 2,1 | 97,9 | 884 |
| Totaal | 2,8 | 97,2 | 2124 |
| ROOKGEWOONTEN | | | |
| Nooit gerookt | 2,7 | 97,3 | 1033 |
| Vroeger gerookt | 3,6 | 96,4 | 586 |
| Matige roker (< 20) | 1,3 | 98,7 | 350 |
| Zware roker | 4,7 | 95,3 | 175 |
| Totaal | 2,9 | 97,1 | 2144 |

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP10R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | VERWIJZING NA CONTACT | | Totaal |
|---------------------------------|-----------------------|------|--------|
| | Ja | Neen | N(*) |
| | % | % | |
| GESLACHT | | | |
| Man | 4,3 | 95,7 | 690 |
| Vrouw | 4,6 | 95,4 | 964 |
| Totaal | 4,5 | 95,5 | 1654 |
| LEEFTIJDSGROEP | | | |
| 0-14 | ,7 | 99,3 | 150 |
| 15-24 | 3,8 | 96,2 | 114 |
| 25-34 | 7,1 | 92,9 | 165 |
| 35-44 | 8,2 | 91,8 | 205 |
| 45-54 | 3,9 | 96,1 | 246 |
| 55-64 | 2,8 | 97,2 | 218 |
| 65-74 | 2,4 | 97,6 | 271 |
| 75 + | 6,4 | 93,6 | 285 |
| Totaal | 4,5 | 95,5 | 1654 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 5,1 | 94,9 | 134 |
| Lager | 4,0 | 96,0 | 247 |
| Lager secundair | 3,5 | 96,5 | 311 |
| Hoger secundair | 3,4 | 96,6 | 382 |
| Hoger | 6,6 | 93,4 | 470 |
| Totaal | 4,6 | 95,4 | 1544 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 2,4 | 97,6 | 163 |
| 20.000-30.000 | 3,5 | 96,5 | 396 |
| 30.000-40.000 | 6,5 | 93,5 | 392 |
| 40.000-60.000 | 2,7 | 97,3 | 391 |
| >60.000 | 6,5 | 93,5 | 235 |
| Totaal | 4,4 | 95,6 | 1577 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 5,5 | 94,5 | 670 |
| Zeer slecht tot redelijk | 4,9 | 95,1 | 664 |
| Totaal | 5,2 | 94,8 | 1334 |
| ROOKGEWOONTEN | | | |
| Nooit gerookt | 3,4 | 96,6 | 566 |
| Vroeger gerookt | 6,1 | 93,9 | 381 |
| Matige roker (< 20) | 6,0 | 94,0 | 236 |
| Zware roker | 6,2 | 93,8 | 152 |
| Totaal | 4,9 | 95,1 | 1335 |

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE HUISARTS (INDICATOR : GP10R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | VERWIJZING NA CONTACT | | Totaal |
|---------------------------------|-----------------------|------|--------|
| | Ja | Neen | N(*) |
| | % | % | |
| GESLACHT | | | |
| Man | 3,7 | 96,3 | 1175 |
| Vrouw | 4,5 | 95,5 | 1610 |
| Totaal | 4,2 | 95,8 | 2785 |
| LEEFTIJDSGROEP | | | |
| 0-14 | 2,6 | 97,4 | 352 |
| 15-24 | 5,4 | 94,6 | 193 |
| 25-34 | 5,7 | 94,3 | 270 |
| 35-44 | 4,5 | 95,5 | 377 |
| 45-54 | 6,5 | 93,5 | 290 |
| 55-64 | 8,2 | 91,8 | 332 |
| 65-74 | 1,4 | 98,6 | 559 |
| 75 + | 1,2 | 98,8 | 412 |
| Totaal | 4,2 | 95,8 | 2785 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | ,4 | 99,6 | 143 |
| Lager | 2,8 | 97,2 | 567 |
| Lager secundair | 3,6 | 96,4 | 564 |
| Hoger secundair | 3,0 | 97,0 | 769 |
| Hoger | 7,3 | 92,7 | 657 |
| Totaal | 4,2 | 95,8 | 2700 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 6,0 | 94,0 | 208 |
| 20.000-30.000 | 3,0 | 97,0 | 641 |
| 30.000-40.000 | 3,0 | 97,0 | 761 |
| 40.000-60.000 | 5,6 | 94,4 | 881 |
| >60.000 | 3,8 | 96,2 | 200 |
| Totaal | 4,2 | 95,8 | 2691 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 4,3 | 95,7 | 1036 |
| Zeer slecht tot redelijk | 4,6 | 95,4 | 1208 |
| Totaal | 4,5 | 95,5 | 2244 |
| ROOKGEWOONTEN | | | |
| Nooit gerookt | 3,6 | 96,4 | 1051 |
| Vroeger gerookt | 5,5 | 94,5 | 629 |
| Matige roker (< 20) | 7,3 | 92,7 | 372 |
| Zware roker | 3,1 | 96,9 | 241 |
| Totaal | 4,6 | 95,4 | 2293 |

(*) N = totaal aantal vermelde contacten