

OPVOLGING VAN DE DUIZELING (MCH25_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | BEZOEK K&G/ONE NA MOEDERHUIS | | Totaal |
|--|---------------------------------|------|--------|
| | Ja | Nee | N |
| | % | % | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | |
| Jongen | 83,7 | 16,3 | 269 |
| Meisje | 83,8 | 16,2 | 214 |
| Totaal | 83,7 | 16,3 | 483 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE | | | |
| 15-24 jaar | 73,3 | 26,7 | 60 |
| 25-34 jaar | 87,8 | 12,2 | 398 |
| 35-44 jaar | 68,4 | 31,6 | 68 |
| Totaal | 84,5 | 15,5 | 526 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 65,4 | 34,6 | 18 |
| Lager | 91,8 | 8,2 | 15 |
| Lager secundair | 88,9 | 11,1 | 55 |
| Hoger secundair | 81,2 | 18,8 | 190 |
| Hoger | 87,6 | 12,4 | 225 |
| Totaal | 84,7 | 15,3 | 503 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 64,6 | 35,4 | 48 |
| 20.000-30.000 | 75,4 | 24,6 | 105 |
| 30.000-40.000 | 86,6 | 13,4 | 111 |
| 40.000-60.000 | 89,2 | 10,8 | 192 |
| >60.000 | 89,0 | 11,0 | 55 |
| Totaal | 84,5 | 15,5 | 511 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 85,1 | 14,9 | 433 |
| Zeer slecht tot redelijk | 87,1 | 12,9 | 71 |
| Totaal | 85,4 | 14,6 | 504 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE | | | |
| Neen | 86,7 | 13,3 | 388 |
| Ja | 74,1 | 25,9 | 110 |
| Totaal | 84,0 | 16,0 | 498 |
| VERBLIJFPLAATS (gewest) | | | |
| Vlaams Gewest | 90,7 | 9,3 | 185 |
| Brussels Gewest | 58,8 | 41,2 | 154 |
| Waals Gewest | 80,8 | 19,2 | 187 |
| België | 84,5 | 15,5 | 526 |

REGIO: 1 Vlaams Gewest

OPVOLGING VAN DE DUIZELING (MCH25_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

| | BEZOEK K&G NA MOEDERHUIS | | Totaal |
|--|-----------------------------|-------|--------|
| | Ja | Nee | N |
| | % | % | |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE | | | |
| 15-24 jaar | 81,8 | 18,2 | 16475 |
| 25-34 jaar | 92,5 | 7,5 | 220754 |
| 35-44 jaar | 84,6 | 15,4 | 14861 |
| Totaal | 91,4 | 8,6 | 252090 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 100,0 | ,0 | 1577 |
| Lager | 100,0 | ,0 | 3862 |
| Lager secundair | 93,8 | 6,3 | 22903 |
| Hoger secundair | 85,7 | 14,3 | 98645 |
| Hoger | 94,4 | 5,6 | 119179 |
| Totaal | 91,1 | 8,9 | 246166 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | ,0 | 100,0 | 1873 |
| 20.000-30.000 | 82,4 | 17,6 | 24489 |
| 30.000-40.000 | 94,7 | 5,3 | 50631 |
| 40.000-60.000 | 92,6 | 7,4 | 125199 |
| >60.000 | 88,5 | 11,5 | 39488 |
| Totaal | 90,9 | 9,1 | 241679 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 91,9 | 8,1 | 218996 |
| Zeer slecht tot redelijk | 94,7 | 5,3 | 25476 |
| Totaal | 92,2 | 7,8 | 244472 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE | | | |
| Neen | 93,8 | 6,3 | 198781 |
| Ja | 80,6 | 19,4 | 39836 |
| Totaal | 91,4 | 8,6 | 238617 |

REGIO: 2 Brussels Gewest

 OPVOLGING VAN DE DUIZELING (MCH25_1)
 Gezondheidsenquête, België, 1997

| | BEZOEK ONE/K&G NA MOEDERHUIS | | Totaal |
|--|---------------------------------|------|--------|
| | Ja | Nee | N |
| | % | % | |
| ----- | | | |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE | | | |
| 15-24 jaar | 54,2 | 45,8 | 8090 |
| 25-34 jaar | 59,8 | 40,2 | 27349 |
| 35-44 jaar | 48,5 | 51,5 | 6481 |
| Totaal | 56,5 | 43,5 | 41920 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 42,9 | 57,1 | 3953 |
| Lager | 55,6 | 44,4 | 2525 |
| Lager secundair | 47,1 | 52,9 | 4715 |
| Hoger secundair | 60,0 | 40,0 | 12575 |
| Hoger | 61,3 | 38,7 | 15405 |
| Totaal | 57,1 | 42,9 | 39172 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 66,7 | 33,3 | 8379 |
| 20.000-30.000 | 44,7 | 55,3 | 11631 |
| 30.000-40.000 | 48,3 | 51,7 | 7745 |
| 40.000-60.000 | 65,8 | 34,2 | 8841 |
| >60.000 | 65,0 | 35,0 | 4869 |
| Totaal | 57,2 | 42,8 | 41465 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 57,3 | 42,7 | 32146 |
| Zeer slecht tot redelijk | 53,8 | 46,2 | 6877 |
| Totaal | 56,6 | 43,4 | 39023 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE | | | |
| Neen | 50,9 | 49,1 | 31676 |
| Ja | 71,0 | 29,0 | 8070 |
| Totaal | 55,1 | 44,9 | 39746 |
| ----- | | | |

REGIO: 3 Waals Gewest

OPVOLGING VAN DE DUIZELING (MCH25_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

| | BEZOEK ONE NA MOEDERHUIS | | Totaal |
|--|-----------------------------|-------------|---------------|
| | Ja | Nee | N |
| | % | % | |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE | | | |
| 15-24 jaar | 84,0 | 16,0 | 20757 |
| 25-34 jaar | 85,0 | 15,0 | 98223 |
| 35-44 jaar | 72,7 | 27,3 | 19492 |
| Totaal | 83,4 | 16,6 | 138472 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | |
| Geen diploma | 66,7 | 33,3 | 3145 |
| Lager | 100,0 | ,0 | 2756 |
| Lager secundair | 95,5 | 4,5 | 17451 |
| Hoger secundair | 85,3 | 14,7 | 56813 |
| Hoger | 79,5 | 20,5 | 50315 |
| Totaal | 84,1 | 15,9 | 130480 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | |
| < 20.000 | 80,0 | 20,0 | 16231 |
| 20.000-30.000 | 82,0 | 18,0 | 40300 |
| 30.000-40.000 | 79,5 | 20,5 | 36715 |
| 40.000-60.000 | 88,3 | 11,7 | 36865 |
| >60.000 | 100,0 | ,0 | 5867 |
| Totaal | 84,2 | 15,8 | 135977 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | |
| Goed tot zeer goed | 84,5 | 15,5 | 113450 |
| Zeer slecht tot redelijk | 80,8 | 19,2 | 18560 |
| Totaal | 84,0 | 16,0 | 132009 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE | | | |
| Neen | 83,6 | 16,4 | 92792 |
| Ja | 81,3 | 18,8 | 39814 |
| Totaal | 83,0 | 17,0 | 132606 |

OPVOLGING VAN DE DUIZELING (MCH260, MCH2\$47-MCH2\$53)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| OPVOLGING VAN DE DUIZELING | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | | | | | | |
| Jongen | ,7 | 44,3 | 30,0 | 38,7 | 20,8 | 1,7 | 2,4 | 256 |
| Meisje | 1,7 | 31,7 | 37,1 | 39,8 | 20,8 | 5,1 | 1,8 | 206 |
| Totaal | 1,1 | 38,7 | 33,1 | 39,2 | 20,8 | 3,2 | 2,1 | 462 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE | | | | | | | | |
| 15-24 jaar | ,0 | 26,7 | 25,8 | 39,9 | 31,6 | ,0 | 1,7 | 57 |
| 25-34 jaar | 1,6 | 41,2 | 33,1 | 40,2 | 19,5 | 3,6 | 2,4 | 384 |
| 35-44 jaar | ,0 | 34,8 | 38,3 | 23,5 | 17,9 | 2,6 | ,8 | 62 |
| Totaal | 1,3 | 39,1 | 32,8 | 38,6 | 20,6 | 3,1 | 2,2 | 503 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | | |
| Geen diploma | ,0 | 44,0 | 5,6 | 33,7 | 22,3 | ,0 | ,0 | 15 |
| Lager | ,0 | 49,1 | 13,3 | 14,8 | 37,9 | ,0 | ,0 | 13 |
| Lager secundair | ,0 | 43,2 | 25,6 | 35,5 | 17,0 | ,7 | 4,7 | 54 |
| Hoger secundair | ,6 | 42,5 | 35,1 | 37,0 | 16,8 | 3,5 | 1,2 | 183 |
| Hoger | 2,4 | 36,2 | 34,0 | 43,0 | 22,2 | 3,9 | 2,7 | 217 |
| Totaal | 1,3 | 39,9 | 32,5 | 39,0 | 19,8 | 3,2 | 2,2 | 482 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | | |
| < 20.000 | ,0 | 44,1 | 15,4 | 35,3 | 27,4 | 4,6 | ,0 | 45 |
| 20.000-30.000 | ,0 | 30,3 | 23,0 | 43,4 | 24,0 | 4,8 | 3,4 | 99 |
| 30.000-40.000 | ,0 | 40,0 | 38,7 | 36,1 | 15,1 | 2,7 | 2,5 | 107 |
| 40.000-60.000 | 2,7 | 39,4 | 34,3 | 38,8 | 22,5 | 2,3 | 1,4 | 184 |
| >60.000 | ,0 | 46,7 | 38,7 | 42,3 | 17,2 | 3,9 | 2,3 | 53 |
| Totaal | 1,1 | 39,1 | 32,7 | 39,2 | 20,7 | 3,2 | 2,0 | 488 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 1,5 | 37,8 | 33,2 | 39,0 | 19,8 | 3,1 | 2,5 | 419 |
| Zeer slecht tot redelijk | ,0 | 42,0 | 29,8 | 32,4 | 29,0 | 4,6 | ,0 | 65 |
| Totaal | 1,3 | 38,3 | 32,8 | 38,2 | 20,9 | 3,2 | 2,2 | 484 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE | | | | | | | | |
| Neen | 1,7 | 40,2 | 31,4 | 41,2 | 21,0 | 3,5 | 2,3 | 369 |
| Ja | ,0 | 34,7 | 36,1 | 33,5 | 22,3 | 1,6 | 1,1 | 106 |
| Totaal | 1,3 | 39,0 | 32,4 | 39,6 | 21,3 | 3,1 | 2,1 | 475 |
| VERBLIJFPLAATS (gewest) | | | | | | | | |
| Vlaams Gewest | 2,1 | 45,6 | 27,9 | 38,5 | 17,3 | 2,7 | 1,7 | 185 |
| Brussels Gewest | ,4 | 12,2 | 44,4 | 43,9 | 20,3 | 4,8 | 1,8 | 135 |
| Waaals Gewest | ,0 | 34,4 | 38,6 | 37,4 | 26,9 | 3,4 | 3,0 | 183 |
| Belgie | 1,3 | 39,1 | 32,8 | 38,6 | 20,6 | 3,1 | 2,2 | 503 |

Legende:

1= Geen opvolging
 3= Privé-pediater
 5= ONE - K&G
 7= Andere

2= Huisarts
 4= Pediater in Ziekenhuis
 6= Kinderdagverblijf

REGIO: 1 Vlaams Gewest

OPVOLGING VAN DE DUIZELING (MCH260, MCH2\$47-MCH2\$53)
Gezondheidsenquête, België, 1997

| OPVOLGING VAN DE DUIZELING | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|------|------|------|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | | | | | | |
| Jongen | 1,0 | 53,3 | 21,3 | 20,4 | 40,1 | 2,6 | ,9 | 99 |
| Meisje | 3,1 | 34,5 | 35,9 | 15,4 | 38,9 | 3,5 | 2,4 | 70 |
| Total | 1,9 | 45,4 | 27,4 | 18,3 | 39,6 | 3,0 | 1,5 | 169 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE | | | | | | | | |
| 15-24 jaar | ,0 | 21,7 | 33,8 | 23,9 | 45,0 | ,0 | ,0 | 11 |
| 25-34 jaar | 2,4 | 48,7 | 26,7 | 17,1 | 39,2 | 3,1 | 2,0 | 161 |
| 35-44 jaar | ,0 | 26,0 | 40,6 | 12,9 | 20,5 | ,0 | ,0 | 13 |
| Total | 2,1 | 45,6 | 27,9 | 17,3 | 38,5 | 2,7 | 1,7 | 185 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | | |
| Geen diploma | ,0 | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 |
| Lager | ,0 | 69,7 | 30,3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3 |
| Lager secundair | ,0 | 61,9 | 18,9 | 6,5 | 34,6 | ,0 | ,0 | 16 |
| Hoger secundair | ,8 | 47,6 | 33,9 | 12,8 | 37,7 | 4,4 | 1,2 | 70 |
| Hoger | 3,7 | 40,6 | 24,6 | 22,4 | 41,9 | 2,1 | 2,7 | 90 |
| Total | 2,1 | 46,2 | 27,7 | 16,6 | 38,6 | 2,8 | 1,8 | 180 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | | |
| < 20.000 | ,0 | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 |
| 20.000-30.000 | ,0 | 39,5 | 6,5 | 25,5 | 60,9 | 13,7 | ,0 | 17 |
| 30.000-40.000 | ,0 | 48,6 | 30,5 | 8,6 | 30,8 | 5,0 | 4,6 | 38 |
| 40.000-60.000 | 3,5 | 43,9 | 28,6 | 19,5 | 38,0 | ,8 | ,9 | 94 |
| >60.000 | ,0 | 52,4 | 34,9 | 18,0 | 44,2 | ,0 | 2,1 | 26 |
| Total | 1,8 | 46,3 | 27,6 | 17,4 | 39,5 | 2,8 | 1,8 | 176 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 2,4 | 43,5 | 28,8 | 17,7 | 38,9 | 3,1 | 2,0 | 161 |
| Zeer slecht tot redelijk | ,0 | 50,3 | 21,0 | 18,7 | 29,7 | ,0 | ,0 | 19 |
| Total | 2,1 | 44,2 | 28,0 | 17,8 | 37,9 | 2,8 | 1,8 | 180 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE | | | | | | | | |
| Neen | 2,6 | 46,5 | 26,7 | 17,8 | 41,6 | 2,9 | 1,8 | 144 |
| Ja | ,0 | 37,3 | 33,6 | 20,6 | 30,1 | 2,8 | ,0 | 31 |
| Total | 2,2 | 45,0 | 27,9 | 18,3 | 39,7 | 2,9 | 1,5 | 175 |

Legende:

1= Geen opvolging
3= Privé-pediater
5= ONE - K&G
7= Andere

2= Huisarts
4= Pediater in Ziekenhuis
6= Kinderdagverblijf

REGIO: 2 Brussels Gewest

OPVOLGING VAN DE DUIZELING (MCH260, MCH2\$47-MCH2\$53)
Gezondheidsenquête, België, 1997

| OPVOLGING VAN DE DUIZELING | | | | | | | | |
|--|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N |
| | % | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | | | | | | |
| Jongen | ,8 | 16,6 | 50,7 | 12,7 | 38,2 | 1,7 | 4,1 | 65 |
| Meisje | ,0 | 6,2 | 43,6 | 24,9 | 50,2 | 7,0 | ,0 | 58 |
| Total | ,4 | 11,1 | 47,0 | 19,1 | 44,5 | 4,5 | 1,9 | 123 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE | | | | | | | | |
| 15-24 jaar | ,0 | 12,0 | 24,1 | 8,7 | 70,7 | ,0 | ,0 | 21 |
| 25-34 jaar | ,6 | 10,3 | 50,1 | 25,5 | 35,4 | 6,2 | 2,7 | 86 |
| 35-44 jaar | ,0 | 20,9 | 46,7 | 13,1 | 45,3 | 5,1 | ,0 | 28 |
| Total | ,4 | 12,2 | 44,4 | 20,3 | 43,9 | 4,8 | 1,8 | 135 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | | |
| Geen diploma | ,0 | 30,9 | 13,3 | 23,4 | 45,5 | ,0 | ,0 | 11 |
| Lager | ,0 | 13,6 | ,0 | 26,7 | 59,7 | ,0 | ,0 | 7 |
| Lager secundair | ,0 | 8,0 | 69,9 | 12,7 | 15,7 | 6,3 | 6,8 | 17 |
| Hoger secundair | 1,2 | 13,7 | 32,4 | 21,2 | 64,9 | 2,3 | 1,2 | 40 |
| Hoger | ,0 | 6,9 | 61,5 | 22,4 | 29,5 | 8,9 | 1,4 | 54 |
| Total | ,4 | 12,0 | 44,8 | 21,1 | 42,5 | 5,0 | 1,8 | 129 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | | |
| < 20.000 | ,0 | 13,2 | 8,2 | 10,9 | 75,0 | ,0 | ,0 | 24 |
| 20.000-30.000 | ,0 | 14,4 | 47,7 | 18,0 | 54,7 | 2,0 | ,0 | 34 |
| 30.000-40.000 | ,0 | 14,8 | 38,4 | 24,6 | 41,6 | ,0 | ,0 | 25 |
| 40.000-60.000 | 1,7 | 1,7 | 69,1 | 27,7 | 18,6 | 5,3 | 4,3 | 32 |
| >60.000 | ,0 | 20,7 | 55,3 | 22,2 | 21,2 | 23,1 | ,0 | 18 |
| Total | ,4 | 12,4 | 44,1 | 20,5 | 44,1 | 4,5 | ,9 | 133 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | ,5 | 9,2 | 52,0 | 19,6 | 41,6 | 5,7 | 2,3 | 106 |
| Zeer slecht tot redelijk | ,0 | 26,0 | 11,8 | 31,8 | 45,5 | 2,3 | ,0 | 21 |
| Total | ,4 | 12,0 | 45,3 | 21,7 | 42,3 | 5,1 | 1,9 | 127 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE | | | | | | | | |
| Neen | ,5 | 11,1 | 40,3 | 21,0 | 47,3 | 3,8 | 1,6 | 100 |
| Ja | ,0 | 16,0 | 56,7 | 16,7 | 36,2 | 3,6 | 2,7 | 28 |
| Total | ,4 | 12,2 | 43,8 | 20,1 | 44,9 | 3,8 | 1,9 | 128 |

Legende:

1= Geen opvolging
3= Privé-pediater
5= ONE - K&G
7= Andere

2= Huisarts
4= Pediater in Ziekenhuis
6= Kinderdagverblijf

REGIO: 3 Waals Gewest

OPVOLGING VAN DE DUIZELING (MCH260, MCH2\$47-MCH2\$53)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | OPVOLGING VAN DE DUIZELING | | | | | | | N |
|--|----------------------------|------|------|-------|------|------|------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | | | | | | |
| Jongen | ,0 | 33,5 | 41,9 | 23,3 | 36,2 | ,0 | 4,8 | 92 |
| Meisje | ,0 | 34,6 | 37,1 | 28,2 | 38,2 | 7,1 | 1,4 | 78 |
| Total | ,0 | 34,0 | 39,7 | 25,5 | 37,1 | 3,2 | 3,2 | 170 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE | | | | | | | | |
| 15-24 jaar | ,0 | 36,0 | 20,0 | 45,9 | 24,8 | ,0 | 3,6 | 25 |
| 25-34 jaar | ,0 | 31,9 | 43,5 | 23,6 | 43,7 | 4,0 | 3,2 | 137 |
| 35-44 jaar | ,0 | 45,4 | 34,2 | 23,2 | 19,5 | 3,8 | 1,7 | 21 |
| Total | ,0 | 34,4 | 38,6 | 26,9 | 37,4 | 3,4 | 3,0 | 183 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | | |
| Geen diploma | ,0 | 30,3 | ,0 | 32,2 | 37,5 | ,0 | ,0 | 3 |
| Lager | ,0 | 48,4 | ,0 | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3 |
| Lager secundair | ,0 | 27,9 | 22,3 | 32,2 | 42,2 | ,0 | 10,3 | 21 |
| Hoger secundair | ,0 | 39,5 | 37,7 | 22,8 | 29,9 | 2,0 | 1,3 | 73 |
| Hoger | ,0 | 33,8 | 48,7 | 21,7 | 49,3 | 6,9 | 3,3 | 73 |
| Total | ,0 | 35,7 | 38,2 | 25,5 | 38,6 | 3,6 | 3,2 | 173 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | | |
| < 20.000 | ,0 | 50,4 | 20,2 | 37,3 | 23,0 | 7,1 | ,0 | 20 |
| 20.000-30.000 | ,0 | 28,9 | 26,6 | 24,6 | 29,6 | ,0 | 6,3 | 48 |
| 30.000-40.000 | ,0 | 33,1 | 50,1 | 22,3 | 42,4 | ,0 | ,0 | 44 |
| 40.000-60.000 | ,0 | 31,7 | 46,6 | 31,5 | 45,8 | 7,1 | 2,3 | 58 |
| >60.000 | ,0 | 28,2 | 51,3 | 8,2 | 46,0 | 15,5 | 5,5 | 9 |
| Total | ,0 | 33,4 | 38,7 | 26,6 | 37,3 | 3,4 | 2,7 | 179 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | ,0 | 33,9 | 36,9 | 23,8 | 38,6 | 2,2 | 3,7 | 152 |
| Zeer slecht tot redelijk | ,0 | 35,4 | 47,8 | 42,6 | 31,9 | 11,8 | ,0 | 25 |
| Total | ,0 | 34,1 | 38,4 | 26,5 | 37,7 | 3,5 | 3,2 | 177 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE | | | | | | | | |
| Nee | ,0 | 35,2 | 38,8 | 27,9 | 38,6 | 4,6 | 3,7 | 125 |
| Ja | ,0 | 35,5 | 34,9 | 25,1 | 36,5 | ,0 | 1,9 | 47 |
| Total | ,0 | 35,3 | 37,6 | 27,1 | 38,0 | 3,2 | 3,2 | 172 |

Legende:

1= Geen opvolging
 3= Privé-pediater
 5= ONE - K&G
 7= Andere

2= Huisarts
 4= Pediater in Ziekenhuis
 6= Kinderdagverblijf

OPVOLGING VAN DE DUIZELING(MCH27_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| ----- | | | | | | |
|---|------------|------------|---------|------------|------------|-----|
| NUMMER RAADPLEGINGEN IN EERSTE LEVENSJAAR | | | | | | |
| | Gemiddelde | 25de | Mediaan | 75de | 90de | N |
| | | Percentile | | Percentile | Percentile | |
| ----- | | | | | | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | | | | |
| Jongen | 9,9 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 18,0 | 228 |
| Meisje | 9,2 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 187 |
| Totaal | 9,6 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 415 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE | | | | | | |
| 15-24 jaar | 10,8 | 5,0 | 10,0 | 17,0 | 20,0 | 48 |
| 25-34 jaar | 9,5 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 341 |
| 35-44 jaar | 9,6 | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 19,0 | 59 |
| Totaal | 9,6 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 448 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | |
| Geen diploma | 9,2 | 2,0 | 7,0 | 15,0 | 20,0 | 11 |
| Lager | 7,9 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 13 |
| Lager secundair | 11,5 | 5,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 42 |
| Hoger secundair | 9,4 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 164 |
| Hoger | 9,5 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 198 |
| Totaal | 9,6 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 428 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | |
| < 20.000 | 8,3 | 4,0 | 6,0 | 12,0 | 16,0 | 43 |
| 20.000-30.000 | 10,7 | 6,0 | 11,0 | 12,0 | 20,0 | 80 |
| 30.000-40.000 | 10,1 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 94 |
| 40.000-60.000 | 9,6 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 168 |
| >60.000 | 8,5 | 4,0 | 7,0 | 12,0 | 18,0 | 49 |
| Totaal | 9,7 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 434 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 9,6 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 372 |
| Zeer slecht tot redelijk | 9,5 | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 57 |
| Totaal | 9,6 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 429 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE | | | | | | |
| Neen | 9,5 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 338 |
| Ja | 10,5 | 6,0 | 11,0 | 12,0 | 20,0 | 90 |
| Totaal | 9,7 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 428 |
| VERBLIJFPLAATS (gewest) | | | | | | |
| Vlaams Gewest | 9,0 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 155 |
| Brussels Gewest | 11,0 | 7,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 132 |
| Waal Gewest | 10,4 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 161 |
| België | 9,6 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 448 |
| ----- | | | | | | |

REGIO: 1 Vlaams Gewest

OPVOLGING VAN DE DUIZELING(MCH27_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | NUMMER RAADPLEGINGEN IN EERSTE LEVENSJAAR | | | | | N |
|---|---|--------------------|---------|--------------------|--------------------|-----|
| | Gemiddelde | 25de Percentile | Mediaan | 75de Percentile | 90de Percentile | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | | | | |
| Jongen | 9,5 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 18,0 | 82 |
| Meisje | 8,2 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 60 |
| Totaal | 8,9 | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 142 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE | | | | | | |
| 15-24 jaar | 10,4 | 5,0 | 10,0 | 17,0 | 17,0 | 6 |
| 25-34 jaar | 9,1 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 137 |
| 35-44 jaar | 6,7 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 12,0 | 12 |
| Totaal | 9,0 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 155 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | |
| Lager | 8,4 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 3 |
| Lager secundair | 11,0 | 5,0 | 12,0 | 15,0 | 19,0 | 11 |
| Hoger secundair | 9,0 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 17,0 | 57 |
| Hoger | 8,9 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 80 |
| Totaal | 9,1 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 151 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | |
| < 20.000 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 1 |
| 20.000-30.000 | 9,1 | 5,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11 |
| 30.000-40.000 | 9,7 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 29 |
| 40.000-60.000 | 9,1 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 81 |
| >60.000 | 7,8 | 3,0 | 5,0 | 12,0 | 16,0 | 24 |
| Totaal | 9,0 | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 146 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 9,1 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 137 |
| Zeer slecht tot redelijk | 7,8 | 4,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 14 |
| Totaal | 8,9 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 151 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE | | | | | | |
| Neen | 8,7 | 4,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 126 |
| Ja | 10,8 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 20,0 | 24 |
| Totaal | 9,0 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 150 |

REGIO: 2 Brussels Gewest

OPVOLGING VAN DE DUIZELING(MCH27_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | NUMMER RAADPLEGINGEN IN EERSTE LEVENSJAAR | | | | | N |
|---|---|--------------------|---------|--------------------|--------------------|-----|
| | Gemiddelde | 25de Percentile | Mediaan | 75de Percentile | 90de Percentile | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | | | | |
| Jongen | 11,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 20,0 | 62 |
| Meisje | 10,6 | 7,0 | 11,0 | 15,0 | 16,0 | 58 |
| Totaal | 10,8 | 7,0 | 12,0 | 14,0 | 17,0 | 120 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE | | | | | | |
| 15-24 jaar | 13,6 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 20 |
| 25-34 jaar | 9,8 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 83 |
| 35-44 jaar | 13,1 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 24,0 | 29 |
| Totaal | 11,0 | 7,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 132 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | |
| Geen diploma | 11,8 | 7,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 10 |
| Lager | 11,4 | 5,0 | 12,0 | 15,0 | 24,0 | 7 |
| Lager secundair | 7,7 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 13 |
| Hoger secundair | 12,2 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 43 |
| Hoger | 10,3 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 53 |
| Totaal | 10,9 | 7,0 | 11,0 | 15,0 | 20,0 | 126 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | |
| < 20.000 | 11,1 | 7,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 25 |
| 20.000-30.000 | 11,9 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 29 |
| 30.000-40.000 | 10,1 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 26 |
| 40.000-60.000 | 11,5 | 8,0 | 12,0 | 14,0 | 20,0 | 34 |
| >60.000 | 9,3 | 3,0 | 9,0 | 13,0 | 20,0 | 17 |
| Totaal | 11,0 | 7,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 131 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 10,6 | 7,0 | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 102 |
| Zeer slecht tot redelijk | 12,9 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 21 |
| Totaal | 11,0 | 7,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 123 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE | | | | | | |
| Nee | 10,9 | 7,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 103 |
| Ja | 10,9 | 6,0 | 11,0 | 15,0 | 20,0 | 23 |
| Totaal | 10,9 | 7,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 126 |

REGIO: 3 Waals Gewest

OPVOLGING VAN DE DUIZELING(MCH27_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

| | NUMMER RAADPLEGINGEN IN EERSTE LEVENSJAAR | | | | | N |
|---|---|--------------------|---------|--------------------|--------------------|-----|
| | Gemiddelde | 25de Percentile | Mediaan | 75de Percentile | 90de Percentile | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | | | | |
| Jongen | 10,3 | 6,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 84 |
| Meisje | 10,2 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 69 |
| Totaal | 10,3 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 153 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE | | | | | | |
| 15-24 jaar | 10,1 | 5,0 | 8,0 | 20,0 | 20,0 | 22 |
| 25-34 jaar | 10,3 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 121 |
| 35-44 jaar | 10,9 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 19,0 | 18 |
| Totaal | 10,4 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 161 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | |
| Geen diploma | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1 |
| Lager | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 3 |
| Lager secundair | 13,0 | 6,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 18 |
| Hoger secundair | 9,4 | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 64 |
| Hoger | 10,6 | 8,0 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 65 |
| Totaal | 10,2 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 151 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | |
| < 20.000 | 6,4 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 17,0 | 17 |
| 20.000-30.000 | 11,1 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 40 |
| 30.000-40.000 | 10,6 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 39 |
| 40.000-60.000 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 53 |
| >60.000 | 12,0 | 7,0 | 12,0 | 20,0 | 20,0 | 8 |
| Totaal | 10,4 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 157 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 10,4 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 133 |
| Zeer slecht tot redelijk | 10,4 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 22 |
| Totaal | 10,4 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 155 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE | | | | | | |
| Nee | 10,6 | 7,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 109 |
| Ja | 10,2 | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 43 |
| Totaal | 10,5 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 152 |

OPVOLGING VAN DE DUIZELING (MCH28_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

| | WIE STOND IN VOOR VACCINATIE KIND | | | | | | Totaal |
|---|-----------------------------------|------|------|------|------|-----|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N |
| | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | | | | | |
| Jongen | 3,5 | 8,6 | 14,6 | 24,9 | 2,0 | 2,4 | 269 |
| Meisje | 2,7 | 5,1 | 12,9 | 19,7 | 2,7 | 1,1 | 215 |
| Totaal | 6,1 | 13,7 | 27,5 | 44,6 | 4,6 | 3,5 | 484 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE | | | | | | | |
| 15-24 jaar | 3,4 | 18,0 | 46,2 | 29,5 | ,5 | 2,4 | 60 |
| 25-34 jaar | 6,4 | 13,3 | 24,9 | 46,8 | 5,0 | 3,5 | 399 |
| 35-44 jaar | 4,6 | 18,5 | 39,6 | 32,8 | 2,1 | 2,2 | 68 |
| Totaal | 5,9 | 14,3 | 28,6 | 43,6 | 4,3 | 3,3 | 527 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | |
| Geen diploma | ,0 | 5,7 | 11,9 | 82,4 | ,0 | ,0 | 18 |
| Lager | ,0 | 30,8 | 24,2 | 30,1 | 12,8 | 2,2 | 15 |
| Lager secundair | 12,2 | 13,6 | 26,2 | 42,6 | 1,1 | 4,3 | 55 |
| Hoger secundair | 1,5 | 16,2 | 30,1 | 44,0 | 3,8 | 4,3 | 191 |
| Hoger | 8,8 | 13,6 | 27,2 | 42,1 | 5,6 | 2,7 | 225 |
| Totaal | 5,8 | 14,9 | 27,9 | 43,5 | 4,5 | 3,4 | 504 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | |
| < 20.000 | 4,0 | 26,1 | 19,8 | 46,5 | 2,8 | ,8 | 48 |
| 20.000-30.000 | 7,3 | 6,9 | 27,7 | 49,8 | 4,4 | 3,8 | 105 |
| 30.000-40.000 | 5,5 | 16,2 | 35,2 | 34,9 | 4,1 | 4,0 | 112 |
| 40.000-60.000 | 5,2 | 14,2 | 27,0 | 46,2 | 3,7 | 3,7 | 192 |
| >60.000 | 7,7 | 14,7 | 21,9 | 45,9 | 8,3 | 1,5 | 55 |
| Totaal | 5,9 | 14,1 | 27,9 | 44,3 | 4,4 | 3,4 | 512 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 5,7 | 14,4 | 27,7 | 45,1 | 4,2 | 2,8 | 434 |
| Zeer slecht tot redelijk | 6,3 | 8,8 | 40,1 | 36,1 | 5,4 | 3,2 | 71 |
| Totaal | 5,8 | 13,7 | 29,2 | 44,0 | 4,4 | 2,8 | 505 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE | | | | | | | |
| Neen | 6,3 | 11,8 | 26,5 | 47,5 | 4,9 | 3,1 | 389 |
| Ja | 4,4 | 20,5 | 33,9 | 35,4 | 3,2 | 2,5 | 110 |
| Totaal | 5,9 | 13,7 | 28,0 | 44,9 | 4,5 | 3,0 | 499 |
| VERBLIJFPLAATS (gewest) | | | | | | | |
| Vlaams Gewest | 7,2 | 16,4 | 20,1 | 48,7 | 4,0 | 3,6 | 185 |
| Brussels Gewest | 4,2 | 4,9 | 40,4 | 40,3 | 4,3 | 6,0 | 155 |
| Waals Gewest | 4,1 | 13,4 | 40,4 | 35,5 | 4,8 | 1,8 | 187 |
| Belgique | 5,9 | 14,3 | 28,6 | 43,6 | 4,3 | 3,3 | 527 |

legende

- 1= Geen vaccinatie
2= Huisarts
3= Pediater
4= ONE/K&G
5= Kinderverblijfgeneesheer
6= Andere

REGIO: 1 Vlaams Gewest

OPVOLGING VAN DE DUIZELING(MCH28_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

| | WIE STOND IN VOOR VACCINATIE KIND | | | | | | Totaal |
|---|-----------------------------------|-------|------|-------|------|-----|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N |
| | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | | | | | |
| Jongen | 5,0 | 8,5 | 8,2 | 29,7 | 2,9 | 3,7 | 99 |
| Meisje | 2,9 | 6,9 | 10,5 | 19,9 | 1,5 | ,3 | 70 |
| Totaal | 7,9 | 15,4 | 18,7 | 49,7 | 4,4 | 4,0 | 169 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE | | | | | | | |
| 15-24 jaar | ,0 | 31,2 | 46,3 | 22,4 | ,0 | ,0 | 11 |
| 25-34 jaar | 7,6 | 14,7 | 17,0 | 52,0 | 4,6 | 4,1 | 161 |
| 35-44 jaar | 8,6 | 26,0 | 36,3 | 29,1 | ,0 | ,0 | 13 |
| Totaal | 7,2 | 16,4 | 20,1 | 48,7 | 4,0 | 3,6 | 185 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | |
| Geen diploma | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | ,0 | ,0 | 1 |
| Lager | ,0 | 69,7 | ,0 | ,0 | 30,3 | ,0 | 3 |
| Lager secundair | 15,8 | 22,3 | 16,3 | 39,0 | ,0 | 6,6 | 16 |
| Hoger secundair | ,0 | 16,2 | 28,0 | 46,9 | 3,8 | 5,0 | 70 |
| Hoger | 11,1 | 14,7 | 15,6 | 52,0 | 4,3 | 2,3 | 90 |
| Totaal | 6,9 | 16,8 | 20,3 | 48,2 | 4,1 | 3,7 | 180 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | |
| < 20.000 | ,0 | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 |
| 20.000-30.000 | 5,9 | 4,3 | 12,1 | 57,8 | 13,7 | 6,1 | 17 |
| 30.000-40.000 | 8,3 | 18,8 | 27,5 | 36,5 | 3,9 | 5,0 | 38 |
| 40.000-60.000 | 6,9 | 15,7 | 17,6 | 54,0 | 1,7 | 4,1 | 94 |
| >60.000 | 7,6 | 18,1 | 16,6 | 51,2 | 6,5 | ,0 | 26 |
| Totaal | 7,2 | 16,2 | 18,8 | 49,9 | 4,2 | 3,8 | 176 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 7,0 | 16,3 | 19,5 | 49,6 | 4,6 | 3,1 | 161 |
| Zeer slecht tot redelijk | 11,1 | 15,3 | 31,0 | 42,5 | ,0 | ,0 | 19 |
| Totaal | 7,4 | 16,2 | 20,7 | 48,8 | 4,1 | 2,8 | 180 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE | | | | | | | |
| Neen | 8,5 | 13,6 | 16,8 | 53,1 | 4,0 | 4,0 | 144 |
| Ja | ,0 | 23,9 | 32,5 | 35,6 | 5,2 | 2,8 | 31 |
| Totaal | 7,1 | 15,3 | 19,4 | 50,1 | 4,2 | 3,8 | 175 |

legende

1= Geen vaccinatie

2= Huisarts

3= Pediater

4= ONE/K&G

5= Kinderverblijfgeneesheer

6= Andere

REGIO: 2 Brussels Gewest

OPVOLGING VAN DE DUIZELING (MCH28_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

| | WIE STOND IN VOOR VACCINATIE KIND | | | | | | Totaal |
|---|-----------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N |
| | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | | | | | |
| Jongen | ,6 | 2,4 | 20,4 | 19,6 | 3,2 | 1,2 | 75 |
| Meisje | 3,0 | 2,0 | 20,4 | 21,0 | 1,6 | 4,7 | 66 |
| Totaal | 3,6 | 4,3 | 40,9 | 40,6 | 4,7 | 5,8 | 141 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE | | | | | | | |
| 15-24 jaar | ,0 | 9,5 | 29,9 | 51,5 | 2,6 | 6,5 | 24 |
| 25-34 jaar | 6,3 | 2,0 | 42,7 | 38,2 | 5,3 | 5,4 | 98 |
| 35-44 jaar | ,0 | 11,4 | 43,7 | 35,2 | 2,1 | 7,5 | 33 |
| Totaal | 4,2 | 4,9 | 40,4 | 40,3 | 4,3 | 6,0 | 155 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | |
| Geen diploma | ,0 | 12,5 | 26,2 | 61,3 | ,0 | ,0 | 14 |
| Lager | ,0 | 4,8 | 18,4 | 68,8 | ,0 | 8,1 | 9 |
| Lager secundair | 15,7 | ,0 | 55,0 | 18,5 | 10,7 | ,0 | 17 |
| Hoger secundair | ,0 | 5,4 | 36,1 | 53,4 | ,0 | 5,1 | 46 |
| Hoger | 6,6 | 4,8 | 50,6 | 18,6 | 8,5 | 10,8 | 62 |
| Totaal | 4,5 | 5,2 | 41,9 | 37,5 | 4,6 | 6,4 | 148 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | |
| < 20.000 | ,0 | 5,1 | 12,8 | 79,6 | ,0 | 2,4 | 27 |
| 20.000-30.000 | 9,9 | 4,1 | 39,8 | 46,2 | ,0 | ,0 | 38 |
| 30.000-40.000 | 4,6 | 5,9 | 51,9 | 28,2 | ,0 | 9,3 | 30 |
| 40.000-60.000 | ,0 | 5,2 | 56,4 | 18,4 | 12,3 | 7,6 | 38 |
| >60.000 | 4,9 | 4,3 | 38,3 | 22,1 | 15,0 | 15,4 | 20 |
| Totaal | 4,2 | 4,9 | 40,1 | 40,7 | 4,3 | 5,7 | 153 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 3,3 | 4,2 | 46,0 | 37,6 | 4,5 | 4,4 | 118 |
| Zeer slecht tot redelijk | 5,5 | 5,8 | 17,7 | 55,5 | ,0 | 15,6 | 26 |
| Totaal | 3,7 | 4,5 | 41,1 | 40,7 | 3,7 | 6,4 | 144 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE | | | | | | | |
| Nee | 4,3 | 5,0 | 38,0 | 45,1 | 3,3 | 4,3 | 117 |
| Ja | 4,7 | 5,8 | 52,2 | 19,6 | 9,6 | 8,2 | 31 |
| Totaal | 4,4 | 5,1 | 40,8 | 40,0 | 4,5 | 5,1 | 148 |

legende

- 1= Geen vaccinatie
- 2= Huisarts
- 3= Pediater
- 4= ONE/K&G
- 5= Kinderverblijfgeneesheer
- 6= Andere

REGIO: 3 Waals Gewest

OPVOLGING VAN DE DUIZELING(MCH28_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

| | WIE STOND IN VOOR VACCINATIE KIND | | | | | | Totaal |
|---|-----------------------------------|------|------|-------|------|-----|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N |
| | % | % | % | % | % | % | |
| GESLACHT VAN HET KIND | | | | | | | |
| Jongen | 1,7 | 10,5 | 24,0 | 17,9 | ,0 | ,3 | 95 |
| Meisje | 2,1 | 2,9 | 15,0 | 18,9 | 5,1 | 1,6 | 79 |
| Totaal | 3,8 | 13,4 | 39,0 | 36,7 | 5,1 | 1,9 | 174 |
| LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE | | | | | | | |
| 15-24 jaar | 7,4 | 10,9 | 52,6 | 26,5 | ,0 | 2,7 | 25 |
| 25-34 jaar | 3,5 | 13,5 | 37,8 | 37,5 | 6,1 | 1,6 | 140 |
| 35-44 jaar | 3,1 | 15,2 | 40,8 | 34,9 | 3,8 | 2,2 | 22 |
| Totaal | 4,1 | 13,4 | 40,4 | 35,5 | 4,8 | 1,8 | 187 |
| ONDERWIJSNIVEAU | | | | | | | |
| Geen diploma | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | ,0 | ,0 | 3 |
| Lager | ,0 | ,0 | 63,3 | 36,7 | ,0 | ,0 | 3 |
| Lager secundair | 6,6 | 5,7 | 31,5 | 53,8 | ,0 | 2,4 | 22 |
| Hoger secundair | 4,5 | 18,7 | 32,5 | 36,8 | 4,7 | 2,8 | 75 |
| Hoger | 3,8 | 13,7 | 47,5 | 26,0 | 8,0 | 1,1 | 73 |
| Totaal | 4,3 | 14,2 | 38,0 | 36,4 | 5,1 | 1,9 | 176 |
| EQUIVALENT INKOMEN (BFR) | | | | | | | |
| < 20.000 | 6,5 | 28,5 | 25,7 | 34,8 | 4,5 | ,0 | 20 |
| 20.000-30.000 | 7,4 | 9,3 | 33,8 | 46,0 | ,0 | 3,6 | 50 |
| 30.000-40.000 | 2,0 | 14,9 | 42,2 | 34,3 | 5,3 | 1,4 | 44 |
| 40.000-60.000 | ,7 | 11,4 | 52,0 | 26,0 | 8,5 | 1,5 | 60 |
| >60.000 | 10,4 | ,0 | 44,1 | 30,0 | 15,5 | ,0 | 9 |
| Totaal | 4,1 | 13,2 | 40,5 | 35,4 | 4,9 | 1,9 | 183 |
| GEZONDHEIDSBELEVING | | | | | | | |
| Goed tot zeer goed | 4,0 | 13,8 | 38,2 | 38,8 | 3,5 | 1,7 | 155 |
| Zeer slecht tot redelijk | ,0 | 1,1 | 61,0 | 20,2 | 14,7 | 3,0 | 26 |
| Totaal | 3,4 | 12,0 | 41,4 | 36,2 | 5,1 | 1,9 | 181 |
| GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE | | | | | | | |
| Neen | 2,3 | 10,3 | 43,1 | 36,5 | 7,2 | ,6 | 128 |
| Ja | 8,8 | 20,1 | 31,7 | 38,4 | ,0 | 1,1 | 48 |
| Totaal | 4,2 | 13,3 | 39,7 | 37,1 | 5,1 | ,7 | 176 |

legende

1= Geen vaccinatie

2= Huisarts

3= Pediater

4= ONE/K&G

5= Kinderverblijfgeneesheer

6= Andere